

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r.
(poz. 24)

Wykaz refundowanych leków, rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r.

A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acarbosum	Adeksa, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990893423	2012-05-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	10,44	14,78	14,78	Cukrzyca		30%	4,43
2	Acarbosum	Glucobay 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990285518	2012-01-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	13,93	18,49	14,78	Cukrzyca		30%	8,14
3	Acarbosum	Glucobay 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990285419	2012-01-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	11,02	13,84	7,39	Cukrzyca		30%	8,67
4	Acarbosum	Glucobay 50, tabl., 50 mg	90 tabl.	5909990335541	2012-01-01	2 lata	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	32,94	39,74	22,17	Cukrzyca		30%	24,22
5	Acebutololum	Sectral 200, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990109920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,18	11,46	5,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	8,79
6	Acebutololum	Sectral 400, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990110018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,28	21,41	11,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,88
7	Acenocoumarolum	Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg	60 tabl.	5909990055715	2012-01-01	2 lata	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	8,32	11,97	11,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,12
8	Aciclovirum	Hascovir, tabl., 800 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990835782	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	32,40	42,97	42,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	21,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Aciclovirum	Hascovir, tabl. , 200 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991049515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	9,90	14,05	12,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	7,82
10	Aciclovirum	Hascovir, tabl. , 400 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991052218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	16,76	23,36	23,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	11,68
11	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840014	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	12,10	16,39	12,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	10,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	21,60	28,49	24,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	16,03
13	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 800 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840229	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	38,88	49,83	49,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	24,92
14	Aciclovirum	Virolex, ma do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990273317	2012-01-01	2 lata	115.1. Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	21,60	28,83	28,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,42
15	Aciclovirum	Viru-POS, ma do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990053049	2012-01-01	2 lata	115.1. Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	24,30	31,69	28,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,28
16	Acidum alendronicum	Alenato, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990919017	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,80	15,16	14,85	Osteoporoza		30%	4,77
17	Acidum alendronicum	Alendran 70, tabl. , 70 mg	4 tabl.	5909990072156	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,80	15,01	13,86	Osteoporoza		30%	5,31
18	Acidum alendronicum	Alendrogen, tabl. , 70 mg	4 tabl.	5909990623112	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	13,86	13,86	Osteoporoza		30%	4,16
19	Acidum alendronicum	Alendronat - ratiopharm 70, tabl. , 70 mg	12 tabl. (3 blist.po 4 szt.)	5909990566303	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	43,72	53,48	41,58	Osteoporoza		30%	24,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Acidum alendronicum	Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg	4szt.	5909990737673	2012-09-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	6,91	10,88	10,88	Osteoporoza		30%	3,26
21	Acidum alendronicum	Alendronat-ratiopharm 70, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990566297	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	15,34	19,83	13,86	Osteoporoza		30%	10,13
22	Acidum alendronicum	Alendronate Arrow, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990693726	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	7,56	11,57	11,57	Osteoporoza		30%	3,47
23	Acidum alendronicum	Alendronatum 123ratio, Alendronatum Farmacom, tabl., 70 mg	4 tabl. (blis.)	5909990036653	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	8,64	12,72	12,72	Osteoporoza		30%	3,82
24	Acidum alendronicum	Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg	4 tabl. (blis.)	5909991081713	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	22,68	27,60	13,86	Osteoporoza		30%	17,90
25	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl., 70 mg	4 tabl. (blis. w pudełku)	5909991087418	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	19,02	23,72	13,86	Osteoporoza		30%	14,02
26	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl., 70 mg	6 tabl. (blis. w pudełku)	5909991087425	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	27,95	34,23	20,79	Osteoporoza		30%	19,68
27	Acidum alendronicum	Ostolek, tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (blis.)	5909991032517	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	17,77	22,40	13,86	Osteoporoza		30%	12,70
28	Acidum alendronicum	Sedron 70, tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (blis.)	5909990039692	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,78	14,99	13,86	Osteoporoza		30%	5,29
29	Acidum alendronicum	Sedron 70, tabl. powł., 70 mg	12 tabl. (3 blis. po 4 szt.)	5909990039708	2012-01-01	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	30,62	39,60	39,60	Osteoporoza		30%	11,88
30	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990109210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,95	0,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczyca leczona metotreksatem	ryczałt	1,95
31	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl., 15 mg	30 tabl.	5909990109319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,00	2,96	2,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczyca leczona metotreksatem	ryczałt	2,96
32	Acidum folicum	Folacid, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blis. po 30 szt.)	5909990960811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,95	0,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczyca leczona metotreksatem	ryczałt	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 15 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960910	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,01	2,97	2,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Luszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	2,97
34	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 360 mg	120 tabl.	5909990219209	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	821,66	904,21	881,09	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	26,32
35	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 180 mg	120 tabl.	5909990219797	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	397,87	444,62	440,54	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	7,28
36	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 5 ml	5909990587810	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	60,62	75,96	75,93	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	3,23
37	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 10 ml	5909990587841	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	128,50	151,91	151,85	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	3,26
38	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 20 ml	5909990587872	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	267,98	303,77	303,70	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	3,27
39	Acidum pamidronicum	Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fiol.a 30 ml	5909990587902	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	407,78	455,55	455,55	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	3,20
40	Acidum pamidronicum	Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 30 mg	2 fiol.s.subs. (+2 rozp.szkto)	5909990661671	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	273,60	309,73	303,70	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	9,23
41	Acidum pamidronicum	Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 60 mg	1 fiol.s.subs.a 10 ml (+ rozp.szkto)	5909990661688	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	273,60	309,73	303,70	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	9,23
42	Acidum pamidronicum	Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 90 mg	1 fiol.s.subs.a 10 ml (+ rozp.szkto)	5909990661695	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	410,40	458,33	455,55	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	5,98
43	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 2 ml (PE)	5909991012649	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	135,00	158,80	151,85	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	10,15
44	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 4 ml (PE)	5909991012663	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	270,00	305,90	303,70	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	5,40
45	Acidum pamidronicum	Pamitor, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 6 ml (PE)	5909991012687	2012-01-01	2 lata	146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	406,08	453,75	453,75	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Acidum tranexamicum	Exacyl, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990035915	2012-01-01	2 lata	24.2. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,62
47	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór doustny , 1 g/10ml	5 amp.a 10 ml	5909990036011	2012-01-01	2 lata	24.3. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie płynne	10,09	14,34	14,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,17
48	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml	5 amp.a 5 ml	5909990306916	2012-01-01	2 lata	24.1. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,72	11,13	11,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,57
49	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml	5 amp.a 5 ml	5909990309313	2012-01-01	2 lata	24.1. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,72	11,13	11,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,57
50	Acidum valproicum	Convulex , kaps. mi kkie, 500 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990023813	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,10	46,10	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
51	Acidum valproicum	Convulex , kaps. mi kkie, 500 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990023813	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,10	46,10	Padaczka		ryczałt	3,56
52	Acidum valproicum	Convulex 150, kaps. mi kkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,12	14,09	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	5,03
53	Acidum valproicum	Convulex 150, kaps. mi kkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,12	14,09	Padaczka		ryczałt	8,23
54	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. mi kkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,17	28,17	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
55	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. mi kkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,17	28,17	Padaczka		ryczałt	3,20
56	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 200+87 mg	30 tabl. (blist.)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	12,96	17,50	14,50	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	3,00
57	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 200+87 mg	30 tabl. (blist.)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	12,96	17,50	14,50	Padaczka		ryczałt	6,20
58	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 333+145 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	17,82	24,17	24,17	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 333+145 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	17,82	24,17	24,17	Padaczka		ryczałt	3,20
60	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg	30 sasz.po 303 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	5,02	6,84	4,83	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	2,01
61	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg	30 sasz.po 303 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	5,02	6,84	4,83	Padaczka		ryczałt	5,21
62	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg	30 sasz.po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	42,23	52,92	48,34	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	4,58
63	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg	30 sasz.po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	42,23	52,92	48,34	Padaczka		ryczałt	7,78
64	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250 , granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg	30 sasz.po 758 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	12,56	16,64	12,09	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	4,55
65	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250 , granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg	30 sasz.po 758 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	12,56	16,64	12,09	Padaczka		ryczałt	7,75
66	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg	30 sasz.po 1515 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	21,11	27,66	24,17	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,49
67	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg	30 sasz.po 1515 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	21,11	27,66	24,17	Padaczka		ryczałt	6,69
68	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 750, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg	30 sasz.po 2273 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	31,67	40,32	36,26	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	4,06
69	Acidum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 750, granulāt o przedłu onym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg	30 sasz.po 2273 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	31,67	40,32	36,26	Padaczka		ryczałt	7,26
70	Acidum valproicum + Natrii valproas	ValproLEK 300, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 0,2+0,087 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619658	2012-03-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	9,72	14,07	14,07	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
71	Acidum valproicum + Natrii valproas	ValproLEK 300, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 0,2+0,087 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619658	2012-01-01	2 lata	161.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	9,72	14,07	14,07	Padaczka		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Acidum valproicum + Natrii valproas	ValproLEK 500, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,333+0,145 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619672	2012-03-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	16,63	22,90	22,90	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
73	Acidum valproicum + Natrii valproas	ValproLEK 500, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,333+0,145 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619672	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	16,63	22,90	22,90	Padaczka		ryczałt	3,20
74	Acitretinum	Acitren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps.	5909990907731	2012-09-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	46,98	59,28	52,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,94
75	Acitretinum	Acitren, kaps. twarde, 10 mg	100 kaps.	5909990907755	2012-09-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	156,60	182,65	175,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,71
76	Acitretinum	Acitren, kaps. twarde, 25 mg	30 kaps.	5909990907762	2012-09-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	117,45	139,23	131,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,07
77	Acitretinum	Acitren, kaps. twarde, 25 mg	100 kaps.	5909990907786	2012-09-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	391,50	437,86	437,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	7,62
78	Acitretinum	Neotigason, kaps., 25 mg	100 kaps.	5909990696925	2012-01-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	391,50	437,86	437,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	7,62
79	Acitretinum	Neotigason, kaps., 10 mg	100 kaps.	5909990697021	2012-01-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	156,60	182,65	175,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,71
80	Acitretinum	Neotigason, kaps., 10 mg	30 szt.	5909990854462	2013-01-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	46,98	59,28	52,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,94
81	Acitretinum	Neotigason, kaps., 25 mg	30 szt.	5909990854479	2013-01-01	2 lata	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	117,45	139,23	131,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,07
82	Adrenalinum	Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwa , 1 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990182510	2012-01-01	2 lata	32.0, Leki pobudzające czynno serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	12,96	17,99	17,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
83	Alergeny kurzu domowego	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnymch,	3 fioł.a 4,5 ml (st .1-3)	5909990001118	2012-01-01	2 lata	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	405,21	445,09	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	291,15
84	Alergeny kurzu domowego	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnymch,	1 but.a 9,5 ml	5909990001132	2012-01-01	2 lata	214.2, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymujacego	422,56	463,49	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	309,55
85	Alergeny kurzu domowego	Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub st enie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fioł.a 5 ml	5909990820313	2012-01-01	2 lata	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
86	Alergeny kurzu domowego	Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 10 IR/ml lub st enie: 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	1 fioł.a 5 ml	5909990820320	2012-01-01	2 lata	214.2, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymujacego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Alergeny pyłków ro lin	Allergovit , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, zestaw: 2 fiol. po 3 ml (st enia A i B) TU	2 fiol.a 3 ml	5909990001316	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	311,04	345,28	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	191,34
88	Alergeny pyłków ro lin	Allergovit , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, 3 ml	1 fiol.a 3 ml	5909990001323	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	293,76	326,96	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	173,02
89	Alergeny pyłków ro lin	Catalet C, zawiesina do wstrzykiwa , st enie 1-25 JS/ml, st enie 2-250 JS/ml, st enie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); st enie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymuj ce) ml	3 fiol.a 2 ml	5909990011117	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,11	98,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
90	Alergeny pyłków ro lin	Catalet C, zawiesina do wstrzykiwa , 4 - 5000 JS/ml	1 fiol.a 2 ml	5909990011124	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	70,03	89,81	89,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
91	Alergeny pyłków ro lin	Catalet D 1-3, zawiesina do wstrzykiwa , st enie 1-25 JS/ml, st enie 2-250 JS/ml, st enie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); st enie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymuj ce) ml	3 fiol.a 2 ml	5909990011216	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,11	98,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
92	Alergeny pyłków ro lin	Catalet D 4, zawiesina do wstrzykiwa , 4 - 5000 JS/ml	1 fiol.a 2 ml	5909990011223	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	70,03	89,81	89,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
93	Alergeny pyłków ro lin	Catalet T 1-3, zawiesina do wstrzykiwa , st enie 1-25 JS/ml, st enie 2-250 JS/ml, st enie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); st enie 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymuj ce) ml	3 fiol.a 2 ml	5909990011018	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,11	98,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
94	Alergeny pyłków ro lin	Catalet T 4, zawiesina do wstrzykiwa , 4 - 10 000 JS/ml JS/ml	1 fiol.a 2 ml	5909990011025	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	70,03	89,81	89,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
95	Alergeny pyłków ro lin	Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, Leczenie pocz tkowe: st enie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; st enie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; st enie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; st enie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymuj ca: ste enie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	3 fiol.a 4,5 ml (st .1-3)	5909990000715	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	405,21	445,09	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	291,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	Alergeny pyłków ro lin	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, Leczenie pocz tkowe: st enie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; st enie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; st enie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; st enie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymuj ca: ste enie 3- 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	1 but.a 9,5 ml (st .3)	5909990000739	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	422,56	463,49	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	309,55
97	Alergeny pyłków ro lin	Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub st enie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fioła.5 ml	5909990820115	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
98	Alergeny pyłków ro lin	Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , 10 IR/ml	1 fioła.5 ml	5909990820122	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
99	Alergeny pyłków ro lin	Pollinex Tree, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; SU/ml	3 fiołki po 1 ml (fiołka nr 1- 600 SU/ml, fiołka nr 2 - 1600 SU/ml, fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 5 strzykawek jednorazowego u ytku + 5 igiel jednorazowego u ytku	5909990687411	2012-07-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
100	Alergeny pyłków ro lin	Pollinex Tree, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podtrzymuj cego: 4000 SU/ml SU/ml	1 fiołka po 1,5 ml (fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 3 strzykawki jednorazowego u ytku + 3 igly jednorazowego u ytku	5909990687428	2012-07-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
101	Alergeny pyłków ro lin	Pollinex+Rye, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; SU/ml	3 fiołki po 1 ml (fiołka nr 1- 600 SU/ml, fiołka nr 2 - 1600 SU/ml, fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 5 strzykawek jednorazowego u ytku + 5 igiel jednorazowego u ytku	5909990684816	2012-07-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
102	Alergeny pyłków ro lin	Pollinex+Rye, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podtrzymuj cego: 4000 SU/ml SU/ml	1 fiołka po 1,5 ml (fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 3 strzykawki jednorazowego u ytku + 3 igly jednorazowego u ytku	5909990684823	2012-07-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
103	Alergeny pyłków ro lin	Purethal, zawiesina do wstrzykiwa , 20000 AUM	1 fioła.3 ml (+8 strzyk.z igł)	5909990975310	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	226,80	255,99	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	102,05
104	Alergeny pyłków ro lin	Purethal, zawiesina do wstrzykiwa , 20000 AUM	1 fioła.3 ml (+8 strzyk.z igł)	5909990975419	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego	226,80	255,99	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	102,05
105	Alfacalcidolum	Alfadiol, kaps. mi kkie, 0,25 g	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990296828	2012-01-01	2 lata	18.1. Witamina D i jej analogi - alfakalcydol	10,67	12,79	4,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	Alfacalcidolum	Alfadiol, kaps. mi kkie, 1 g	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990296927	2012-01-01	2 lata	18.1, Witamina D i jej analogi - alfa-kalcydol	14,05	19,37	19,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,67
107	Alfuzosinum	Alfabax, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990746576	2012-05-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	22,68	30,64	30,64	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,27
108	Alfuzosinum	AlfuLEK 10, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990609246	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,38	34,75	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	13,90
109	Alfuzosinum	Alfuzostad, tabl. dojelitowe o przedlu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990619580	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,76	31,78	31,78	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,27
110	Alfuzosinum	Alugen 10, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990037933	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,76	31,78	31,78	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,27
111	Alfuzosinum	Dalfaz, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990681211	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,12	18,57	8,69	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	13,08
112	Alfuzosinum	Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990812714	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	11,88	15,83	11,58	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	7,45
113	Alfuzosinum	Dalfaz Uno, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990837816	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,38	34,75	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	13,90
114	Alfuzosinum	Kofuzin, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990718337	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	24,30	32,36	32,36	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,27
115	Allopurinolum	Allupol, tabl. , 100 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990109418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	5,94	8,69	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
116	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 100 mg	50 tabl.	5909990163212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	5,94	8,69	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
117	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 300 mg	30 tabl.	5909990414819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	10,80	15,21	15,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
118	Amantadinum	Viregyt-K, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990320912	2012-01-01	2 lata	169.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna	14,90	20,45	20,45	Choroba i zespół Parkinsona		30%	6,14
119	Ambenonium	Mytelase, tabl. , 10 mg	50 tabl. (but.)	5909990030927	2012-01-01	2 lata	189.0, Leki parasymptakomimetyczne - ambenonium	8,14	11,72	11,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,52
120	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, tabl. , 5+50 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990206025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,09	9,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Moczówka nerkopochodna	30%	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid mite, tabl. , 2,5+25 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990373819	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0. Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,27	6,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Moczówka nerkopochodna	30%	3,01
122	Amiodaronum	Opacorden, tabl. powl., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990086818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	31.0. Leki przeciwyarytmiczne klasy III - amiodaron	17,63	23,93	23,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, cz. stoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
123	Amisulpridum	Amisan, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762897	2012-03-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	27,11	35,53	33,73	Schizofrenia		ryczałt	5,00
124	Amisulpridum	Amisan, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762965	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	54,00	67,46	67,46	Schizofrenia		ryczałt	3,20
125	Amisulpridum	Amisan, tabl. , 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762996	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	113,40	134,43	134,43	Schizofrenia		ryczałt	3,20
126	Amisulpridum	ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	5909990936502	2013-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	54,00	67,46	67,46	Schizofrenia		ryczałt	3,20
127	Amisulpridum	ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg	30 tabl.	5909990936557	2013-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	108,00	128,70	128,70	Schizofrenia		ryczałt	3,20
128	Amisulpridum	Candela, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990798193	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	27,00	35,41	33,73	Schizofrenia		ryczałt	4,88
129	Amisulpridum	Candela, tabl. , 200 mg	30 tabl.	5909990798209	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	54,00	67,46	67,46	Schizofrenia		ryczałt	3,20
130	Amisulpridum	Candela, tabl. powl., 400 mg	30 tabl.	5909990798230	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	108,00	128,70	128,70	Schizofrenia		ryczałt	3,20
131	Amisulpridum	SOLIAN, tabl. powl., 400 mg	30 tabl.	5909997195520	2012-03-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	122,04	143,59	134,92	Schizofrenia		ryczałt	11,87
132	Amisulpridum	Solian, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990840816	2012-03-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	30,51	39,13	33,73	Schizofrenia		ryczałt	8,60
133	Amisulpridum	Solian, tabl. , 200 mg	30 tabl. (blist.)	5909990840915	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	54,00	67,46	67,46	Schizofrenia		ryczałt	3,20
134	Amisulpridum	Solian, tabl. powl., 400 mg	30 tabl. (blist.)	5909990841011	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	113,86	134,91	134,91	Schizofrenia		ryczałt	3,20
135	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	7,02	8,41	3,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Neuralgie, ból neuropatyczny	30%	6,23
136	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	7,02	8,41	3,11	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	5,30
137	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	3,89	4,50	1,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Neuralgie, ból neuropatyczny	30%	3,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	Amitriptylinum	Amitriptylinum VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	3,89	4,50	1,24	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,26
139	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642267	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
140	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,14	8,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,44
141	Amlodipinum	Agen 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991099022	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,10	16,73	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,10
142	Amlodipinum	Agen 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991098926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,60	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,78
143	Amlodipinum	Aldan, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008635	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,10	10,89	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,07
144	Amlodipinum	Aldan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008734	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,55	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,92
145	Amlodipinum	Amlaxopin, tabl., 5 mg	30 szt.	5909990752690	2013-03-01	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,64	7,23	7,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,17
146	Amlodipinum	Amlaxopin, tabl., 10 mg	30 szt.	5909990752720	2013-03-01	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,91	13,34	13,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	Amlodipinum	Amlodipine Arrow 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057399	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,91	13,34	13,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,00
148	Amlodipinum	Amlodipine Arrow 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057351	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,64	7,23	7,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,17
149	Amlodipinum	Amlodipine Bluefish, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990800469	2012-09-01	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,43	7,00	7,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,10
150	Amlodipinum	Amlodipine Bluefish, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990800551	2012-09-01	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,10	12,49	12,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,75
151	Amlodipinum	Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721580	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,97	7,57	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,27
152	Amlodipinum	Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721603	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
153	Amlodipinum	Amlomyl, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990842476	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,08	7,68	7,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,30
154	Amlodipinum	Amlomyl, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990842698	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
155	Amlodipinum	Amlonor, tabl. , 5 mg	30 tabl. (blist.)	5909990642618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,79	7,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	Amlodipinum	Amlonor, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990642625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
157	Amlodipinum	Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048977	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	15,12	19,93	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	8,30
158	Amlodipinum	Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048939	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,64	11,46	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,64
159	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	16,04	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,22
160	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	17,82	22,79	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	11,16
161	Amlodipinum	Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565993	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,80	16,41	16,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,92
162	Amlodipinum	Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565986	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,48	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,95	6,45	4,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,54
164	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,94	12,84	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	7,02
165	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,46	21,35	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	9,72
166	Amlodipinum	Finamlox, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990794430	2012-07-01	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,86	7,45	7,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,24
167	Amlodipinum	Finamlox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990794461	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,23	15,80	15,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,74
168	Amlodipinum	Lofral 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636075	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,54	17,20	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,57
169	Amlodipinum	Lofral 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636068	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,60	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,78
170	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990993017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	6,24	8,91	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990993116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,78
172	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	90 tabl.	5909990421824	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	26,46	33,15	24,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	15,70
173	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,18	12,03	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	6,21
174	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,74	21,65	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,02
175	Amlodipinum	Vilpin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990621217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,48	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,66
176	Amlodipinum	Vilpin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991042912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,99	16,61	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,98
177	Amoxicillinum	Amotaks, tabl. , 1 g	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	11,79	16,22	14,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,55
178	Amoxicillinum	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,70	10,34	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	Amoxicillinum	Amotaks, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml (39,2 g)	5909990794379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	11,88	16,61	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
180	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl. , 500 mg	16 tabl.	5909991043520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,78	8,31	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,07
181	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl. , 750 mg	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,55	12,07	11,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,12
182	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl. , 1 g	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,52	14,87	14,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
183	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 250 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,79	7,54	4,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,09
184	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 500 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,00	12,13	9,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,04
185	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 1000 miligram	20 tabl.	5909990063413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	13,15	18,23	18,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
186	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 375 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,27	9,78	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,01
187	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 750 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,26	14,47	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,73
188	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 kaps.	5909990066018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	3,24	4,55	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,03
189	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps.	5909990066117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,80	8,32	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,08
190	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990083619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	5,80	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
191	Amoxicillinum	Ospamox, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml	60 ml (5,1 g)	5909990086580	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	3,78	5,27	4,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 0,5 g	16 tabl.	5909990293124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,23	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,99
193	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 0,75 g	16 tabl.	5909990293223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,42	11,94	11,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,99
194	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 1 g	16 tabl.	5909990293322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,03	14,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
195	Amoxicillinum	Ospamox 1000 mg, tabl. , 1000 mg	20 tabl.	5909990778041	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	18,02	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
196	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoclan, tabl. powl., 875+125 g	14 tabl. (but.)	5909990572991	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,27	33,24	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,88
197	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powl., 0,25+0,125 g	21 tabl.	5909990077120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	20,92	14,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,91
198	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powl., 0,5+0,125 g	14 tabl. (blis.)	5909990081912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	20,53	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	11,18
199	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powl., 0,5+0,125 g	21 tabl. (but.)	5909990081929	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	27,06	27,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,53
200	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powl., 0,875+0,125 g	14 tabl. (2 blis.po 7 szt.)	5909990411115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	32,77	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,41
201	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	35 ml (8,75 g)	5909990894819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	9,18	12,10	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	8,20
202	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	70 ml (17,5 g)	5909990894826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	15,93	20,89	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,09
203	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	140 ml (35 g)	5909990894833	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,43	31,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	15,84
204	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powl., 875 + 125 mg	20 szt.	5909991012960	2013-03-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	35,36	45,61	45,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	22,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej /tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 0,875+0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990649747	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	21,60	29,49	29,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	14,75
206	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej /tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 0,5+0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990646906	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,78	17,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	8,89
207	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg	21 tabl. (3 blist.po 7 szt.)	5909990064120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	15,66	20,35	14,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,34
208	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990368235	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	17,28	22,82	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,47
209	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5ml	35 ml (5,3 g)	5909990419319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	11,34	14,39	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,49
210	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml	70 ml (10,6 g)	5909990419326	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	20,52	25,75	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	17,95
211	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml	140 ml (21 g)	5909990419333	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	27,00	34,86	31,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	19,27
212	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990717521	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	28,62	36,78	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	20,42
213	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg	14 tabl.	5909997198385	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	24,84	32,77	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,41
214	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg	14 tabl.	5909997199702	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	14,21	19,56	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,21
215	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg	14 tabl.	5909997200576	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	14,15	19,51	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,16
216	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin ES, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml	50 ml (but.)	5909990614288	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	20,52	25,93	16,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	17,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin ES, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5ml	100 ml (but.)	5909990614318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	32,94	41,43	33,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	24,72
218	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin SR, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 1000+62,5 mg	28 tabl. (7 blist.po 4 szt.)	5909990041985	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	50,67	64,21	64,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	32,11
219	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 1000, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990219087	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	25,92	33,92	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	17,56
220	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 312, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg	20 tabl. (5 blist.po 4 szt.)	5909990968015	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	16,50	21,13	13,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	14,45
221	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 625, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990968114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	14,20	19,56	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,21
222	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Recute, tabl. powl., 500 + 125 mg	14 szt.	5909990912032	2013-03-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	12,37	17,62	17,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,81
223	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Recute, tabl. powl., 875 + 125 mg	14 szt.	5909990912070	2013-03-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	21,55	29,28	29,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,64
224	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, tabl. powl., 0,5+0,125 g	21 tabl.	5909990430611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	19,87	26,94	26,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,47
225	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, tabl. powl., 0,5+0,125 g	14 tabl.	5909990430628	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	14,15	19,51	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,16
226	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	140 ml (25,2 g)	5909990793587	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	23,54	31,19	31,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	15,60
227	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	35 ml (6,3 g)	5909990793594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	8,96	11,88	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	7,98
228	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	70 ml (12,6 g)	5909990793600	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	15,71	20,65	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	12,85
229	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, tabl. powl., 0,875+0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909991087715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	24,79	32,72	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	Anastrozolum	Anastralan, tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909990670468	2012-01-01/2012-07-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,00	82,17	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	4,82
231	Anastrozolum	Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909990802432	2012-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	72,36	87,85	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	10,50
232	Anastrozolum	Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909990786497	2012-03-01/2012-09-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	60,48	75,26	75,26	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
233	Anastrozolum	Anastrozole Accord, tabl. powl., 1 mg	28 szt.	5909990731299	2013-07-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	54,00	68,39	68,39	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
234	Anastrozolum	Anastrozole Orion, tabl. powl., 1 mg	28 szt.	5909990924493	2013-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	70,20	85,56	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	8,21
235	Anastrozolum	Anastrozole Orion, tabl. powl., 1 mg	98 szt.	5909990924509	2013-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	253,80	287,35	270,74	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	16,61
236	Anastrozolum	Ansyn, tabl. powl., 1 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990635511	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	87,70	104,11	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	26,76
237	Anastrozolum	Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg	28 tabl. (blist.)	5909990802050	2012-05-01/2012-09-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	59,59	74,32	74,32	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
238	Anastrozolum	Arimidex, tabl. powl., 1 mg	28 tabl. (blist.)	5909990756711	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	91,80	108,46	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	31,11
239	Anastrozolum	Atrozol , tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909991090029	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	76,68	92,43	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	15,08
240	Anastrozolum	Egistrozol, tabl. powl., 1 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990082148	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	71,80	87,26	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	9,91
241	Anastrozolum	Mamostrol, tabl. powl., 1 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990082346	2012-01-01/2012-03-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	71,82	87,28	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	9,93
242	Anastrozolum	Symanastrol, tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909990661909	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	149,23	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	71,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
243	Anastrozolum	Zolastrol, tabl. powl., 1 miligram	28 tabl.	5909990666379	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	149,22	77,35	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	71,87
244	Aprepitantum	Emend, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007387	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant	199,80	229,58	229,58	Wczesne albo opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka	Wczesne lub opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka	ryczałt	3,20
245	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporz dzenia leków parenteralnych, 5 ml	100 amp.a 5 ml	5909990248230	2012-01-01	2 lata	218.3, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - woda do wstrzykiwa	18,00	23,10	15,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,23
246	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporz dzenia leków parenteralnych, 10 ml	100 amp.a 10 ml	5909990248247	2012-01-01	2 lata	218.3, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - woda do wstrzykiwa	23,77	31,48	31,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,74
247	Aripiprazolum	Abilify, tabl. , 15 mg	28 tabl. (blis.)	5909990002306	2012-01-01/2012-03-01	2 lata	178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol	362,53	406,38	406,38	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia		ryczałt	3,20
248	Atenololum	Atenolol Sanofi 25, tabl. , 25 mg	60 tabl. (6 blis.po 10 szt.)	5909990370610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	4,95	7,48	7,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
249	Atenololum	Atenolol Sanofi 50, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blis.po 10 szt.)	5909990011414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	4,95	7,48	7,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
250	Atomoxetineum	Strattera, kaps. twarde, 10 mg	7 kaps.	5909990568550	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	77,85	4,30	Nadpobudliwo psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniej cymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia l kowe lub z udokumentowan nietolerancj b d niepowodzeniem terapii lekami psychostymuluj cymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku ycia oraz u młodzie y.		ryczałt	76,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
251	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps.	5909990568574	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	309,77	17,19	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją lub niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	295,78
252	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 18 mg	7 kaps.	5909990568628	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	78,89	7,73	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją lub niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	74,36
253	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 18 mg	28 kaps.	5909990568642	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	311,86	30,94	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją lub niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	284,12
254	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 25 mg	7 kaps.	5909990568666	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	79,71	10,74	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją lub niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	72,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
255	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 25 mg	28 kaps.	5909990568680	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	313,50	42,97	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	273,73
256	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 40 mg	7 kaps.	5909990568703	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	80,91	17,19	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	66,92
257	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 40 mg	28 kaps.	5909990568727	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	315,89	68,75	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	250,34
258	Atomoxetine	Strattera, kaps. twarde, 60 mg	28 kaps.	5909990568765	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	318,33	103,12	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.		ryczałt	218,41
259	Atorvastatinum	ATORVOX, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990573547	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,18	38,67	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
260	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787586	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	10,15	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,48
261	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787609	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	20,05	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,71
262	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787647	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	39,06	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	24,39
263	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990792290	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,83	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,16
264	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990792573	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,88	15,39	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,05
265	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990792887	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	23,76	29,75	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,08
266	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990336647	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	35,85	15,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	24,85
267	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990419173	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	54,02	31,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	32,01
268	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990623464	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	36,04	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,37
269	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	60 tabl.	5909990623471	2013-03-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	50,39	60,49	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	31,15
270	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	90 tabl. (9 blisterów x 10)	5909990623488	2012-11-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	75,60	89,22	62,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	45,21
271	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 30 mg	30 tabl.	5909990885282	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,15	24,10	15,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	13,10
272	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 30 mg	60 szt.	5909990885299	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,16	36,85	31,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	14,84
273	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 60 mg	30 tabl.	5909990885336	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,55	43,62	31,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	21,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
274	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 80 mg	30 tabl.	5909990885374	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	48,65	58,66	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	29,32
275	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	13,55	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,88
276	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	19,39	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,05
277	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	60 tabl.	5909991013806	2013-03-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	32,04	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,37
278	Atorvastatinum	Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990961368	2012-11-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,18	7,02	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,35
279	Atorvastatinum	Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990961474	2012-11-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	13,10	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,76
280	Atorvastatinum	Atorvastatin Arrow, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990961573	2012-11-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,90	24,59	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,92
281	Atorvastatinum	Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990887279	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	11,95	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,61
282	Atorvastatinum	Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990887286	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22,88	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,21
283	Atorvastatinum	Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990848904	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,83	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,16
284	Atorvastatinum	Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990849086	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,43	13,85	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	6,51
285	Atorvastatinum	Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990849246	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	23,76	29,75	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	15,08
286	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	13,38	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,71
287	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077939	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	21,68	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,34
288	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	42,34	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573400	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,04	12,17	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,50
290	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	19,00	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,66
291	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 80 mg	30 tabl.	5909990849390	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	67,61	78,76	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	49,42
292	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078141	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	10,81	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,14
293	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078264	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	19,39	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,05
294	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (blist.)	5909990078356	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	36,04	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,37
295	Atorvastatinum	Atrox 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	10,69	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,02
296	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124717	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,85	18,53	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,19
297	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	26,89	33,06	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,39
298	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991150914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	10,69	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,02
299	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,74	17,35	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,01
300	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,83	31,94	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	17,27
301	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990905508	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,91	6,72	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990905638	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,88	13,26	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,92
303	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990905782	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,74	26,54	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,87
304	Atorvastatinum	Larus, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	11,26	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,59
305	Atorvastatinum	Larus, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078707	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	19,97	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,63
306	Atorvastatinum	Larus, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078790	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,80	44,63	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	29,96
307	Atorvastatinum	Pharmastatin, tabl. powł., 40 mg	30 szt.	5909990745340	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,65	25,39	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,72
308	Atorvastatinum	Pharmastatin, tabl. powł., 20 mg	30 szt.	5909990745579	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,82	13,21	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,87
309	Atorvastatinum	Pharmastatin, tabl. powł., 10 mg	30 szt.	5909990745807	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,91	6,72	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,05
310	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755547	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	7,49	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,82
311	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755554	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	54,72	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	25,38
312	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755561	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	14,70	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,36
313	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755578	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	28,37	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,70
314	Atorvastatinum	Torvacard, tabl. powł., 80 mg	30 tabl.	5909990957071	2013-01-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	41,44	51,02	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	21,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
315	Atorvastatinum	Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338290	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	14,69	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,02
316	Atorvastatinum	Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338368	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,68	17,30	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,96
317	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338436	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,48	31,57	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,90
318	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990338443	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	66,34	79,41	62,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	35,40
319	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053179	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,80	12,98	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,31
320	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053230	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,96	16,53	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,19
321	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053278	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,38	31,46	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,79
322	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	16,41	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,74
323	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	32,56	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	25,22
324	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	48,44	15,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	37,44
325	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	22,26	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,92
326	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	43,48	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	28,81
327	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998937	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	66,62	31,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	44,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
328	Atorvastatinum	Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990810161	2012-05-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,90	32,01	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,34
329	Atorvastatinum	Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg	30 szt.	5909990810208	2012-09-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	51,80	62,00	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	32,66
330	Atropinum	Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	5 ml	5909990243112	2012-01-01	2 lata	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	11,43	15,68	13,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,02
331	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,15	30,15	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
332	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,15	30,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; różmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	3,20
333	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,70	18,09	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	4,61
334	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,70	18,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; różmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
335	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 25 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,19	30,15	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	9,04
336	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 25 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,19	30,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	12,24
337	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	2012-01-01	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	62,54	60,30	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,24
338	Azathioprinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	62,54	60,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	5,80
339	Azithromycinum	Azibiot, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991054816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	17,82	21,58	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	17,08
340	Azithromycinum	Azigen, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909990859887	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	17,55	21,28	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
341	Azithromycinum	Azigen, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990859955	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,55	21,28	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,78
342	Azithromycinum	Azimycin, tabl. powl., 125 mg	6 tabl.	5909991034313	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,58	21,15	4,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,90
343	Azithromycinum	Azimycin, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909991034412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	23,87	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	19,37
344	Azithromycinum	Azimycin, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909991035518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	25,93	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	21,43
345	Azithromycinum	Aziteva, Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990609925	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	21,00	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,50
346	Azithromycinum	Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg	3 szt.	5909990969876	2013-07-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,99	18,57	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,07
347	Azithromycinum	Azitrin, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909990635641	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,55	21,28	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,78
348	Azithromycinum	Azitrin, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990635702	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	19,48	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,98
349	Azithromycinum	AzitroLEK, tabl. powl., 0,25 g	6 tabl. (1 blist. po 6 szt.)	5909990573738	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	32,45	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	27,95
350	Azithromycinum	AzitroLEK, tabl. powl., 0,5 g	3 tabl. (blist.)	5909990573752	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,44	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	19,94
351	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	butelka 20ml (400mg)	5909990635320	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	15,12	18,90	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,25
352	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	butelka 20ml (800mg)	5909990635337	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,14	18,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,83
353	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	butelka 30ml (1200mg)	5909990635344	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	27,00	34,68	27,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	20,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
354	Azithromycinum	Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg	3 tabl. (blist.)	5909991087319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	23,17	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,67
355	Azithromycinum	Azycyna, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909991098421	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,63	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	25,13
356	Azithromycinum	Azycyna, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909991098520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	19,48	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,98
357	Azithromycinum	Bactrazol, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	20 ml	5909990073559	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	11,07	14,60	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	9,95
358	Azithromycinum	Bactrazol, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	20 ml	5909990073566	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,14	18,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,83
359	Azithromycinum	Bactrazol, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990664672	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	21,00	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,50
360	Azithromycinum	Canbiox, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990740543	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	23,87	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	19,37
361	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 125 mg	6 tabl. (blist.)	5909991108625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,35	29,39	4,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	27,14
362	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 250 mg	6 tabl. (blist.)	5909991108724	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,14	30,40	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	25,90
363	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 500 mg	2 tabl. (blist.)	5909991108830	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,25	17,05	6,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,05
364	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 500 mg	3 tabl. (blist.)	5909991108847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,82	19,46	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,96
365	Azithromycinum	Sumamed, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	1 but.a 20 ml (HDPE)	5909990742110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	17,93	21,88	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	17,23
366	Azithromycinum	Sumamed, kaps. twarde, 250 mg	6 kaps.	5909990742318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,46	33,92	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	29,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
367	Azithromycinum	Sumamed, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990742417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,01	33,43	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	28,93
368	Azithromycinum	Sumamed, tabl. powł., 500 mg	2 tabl.	5909990742424	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,71	24,96	6,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	21,96
369	Azithromycinum	Sumamed, tabl. powł., 125 mg	6 tabl.	5909990846214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	30,41	4,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	28,16
370	Azithromycinum	Sumamed Forte, granulát do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 but.a 20 ml (HDPE)	5909990742219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	27,49	33,81	18,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	24,50
371	Azithromycinum	Sumamed Forte, granulát do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 but.a 30 ml (HDPE)	5909990742226	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	36,29	44,53	27,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	30,56
372	Azithromycinum	Zetamax, granulát o przedlu onym uwalnianiu do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 2 g	1 but.a 2g	5909990707577	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	34,82	45,36	45,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	22,68
373	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn	1 op. (200 daw.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,21	50,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	15,06
374	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn	1 op. (200 daw.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,21	50,21	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,67
375	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	37,74	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,97
376	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	37,74	35,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	5,55
377	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.)	5909990908615	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	75,55	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	26,00
378	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.)	5909990908615	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	75,55	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	10,10
379	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn	1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.)	5909990908714	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	95,54	95,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	28,66
380	Beclometasonum	Cortare, aerazol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn	1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.)	5909990908714	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	95,54	95,54	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	13,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
381	Beclometasonum + Formoterolum	Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, (0,1 mg+6 mcg) /dawk inhalacyjn	180 daw. (1 poj.)	5909990054152	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w reдных dawkach	162,00	188,00	178,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	14,02
382	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	18,21	3,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	17,88
383	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118915	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,13	7,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	22,05
384	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990119011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,76	34,07	14,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	27,91
385	Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas	Diprophos, zawiesina do wstrzykiwa , 6,43+2,63 mg/ml	5 amp.a 1 ml	5909990121625	2012-01-01	2 lata	81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	29,62	38,60	38,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	9,33
386	Betamethasonum	Celestone, roztwór do wstrzykiwa , 4 mg/ml	1 amp.a 1 ml	5909990121410	2012-01-01	2 lata	81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	4,05	5,72	4,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	4,51
387	Betaxololum	Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	5 ml	5909990186518	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	12,84	15,00	4,87	Jaskra		30%	11,59
388	Betaxololum	Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	10 ml	5909990186525	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	21,75	25,64	9,74	Jaskra		30%	18,82
389	Betaxololum	Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	5 ml (but.)	5909990925513	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	6,33	8,10	4,87	Jaskra		30%	4,69
390	Bimatoprostum	Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml	1 but.a 3 ml	5909990008469	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	45,36	56,94	52,93	Jaskra		ryczałt	7,21
391	Bimatoprostum + Timololum	Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml	1 but.a 3 ml	5909990574315	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	51,51	63,46	52,93	Jaskra		ryczałt	13,73
392	Biperideni hydrochloridum	Akineton, tabl., 2 mg	50 tabl.	5909990503834	2012-07-01	2 lata	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	13,50	18,67	18,67	Choroba i zespół Parkinsona		30%	5,60
393	Biperideni hydrochloridum	Akineton, tabl., 2 mg	50 szt.	5909997076140	2013-05-01	2 lata	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	12,96	18,10	18,10	Choroba i zespół Parkinsona		30%	5,43
394	Biperidenum	Akineton, tabl. , 2 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990193219	2012-01-01	2 lata	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	14,04	19,24	18,67	Choroba i zespół Parkinsona		30%	6,17
395	Biperidenum	Akineton, tabl. , 2 mg	50 tabl.	5909990500604	2012-01-01	2 lata	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	15,12	20,39	18,67	Choroba i zespół Parkinsona		30%	7,32
396	Bisoprololum	Bisoratio 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,15	11,73	11,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolno serca w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	3,20
397	Bisoprololum	Bisoratio 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015015	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	7,11	5,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolno serca w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
398	Bisoprololum	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633852	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,42	10,97	10,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolno serca w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	3,20
399	Bisoprololum	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633791	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	7,11	5,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolno serca w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	4,44
400	Brimonidinum	Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	5909990865024	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	27,00	35,24	34,10	Jaskra		ryczałt	4,34
401	Brimonidinum	Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	5909990874194	2012-11-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	22,68	30,66	30,66	Jaskra		ryczałt	3,20
402	Brimonidinum	Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	5909990974641	2013-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	22,68	30,66	30,66	Jaskra		ryczałt	3,20
403	Brimonidinum	Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	1 but. a 5 ml	5909990727063	2012-05-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	22,68	30,66	30,66	Jaskra		ryczałt	3,20
404	Brimonidinum	Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	5909990677733	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	23,92	31,98	31,98	Jaskra		ryczałt	3,20
405	Brimonidinum + Timololum	Combigan, krople do oczu, roztwór zło ony, 2+5 mg/ml	5 ml	5909990570546	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	32,55	41,12	34,10	Jaskra		ryczałt	10,22
406	Brinzolamidum	Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	5 ml (but.)	5909990869114	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	37,13	45,98	34,10	Jaskra		ryczałt	15,08
407	Bromocriptinum	Bromergon, tabl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990173013	2012-01-01	2 lata	62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzialania prolaktyny - bromokryptyna	14,58	20,05	20,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
408	Bromocriptinum	Bromocorn, tabl. , 2,5 mg	30 tabl.	5909990211913	2012-01-01	2 lata	62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna	12,30	17,63	17,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
409	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	72,38	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	22,83
410	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	72,38	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,93
411	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.)	5909990335176	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	74,40	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	24,85
412	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	74,40	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	8,95
413	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	280,04	280,04	Choroba Le niowskiego-Crohna	Choroba Le niowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku ycia; Posta jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; Mikroskopowe zapalenie jelita	ryczałt	3,56
414	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	280,04	280,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,56
415	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,31	21,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	10,44
416	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,31	21,24	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	7,27
417	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,47	42,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	12,74
418	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,47	42,47	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
419	Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp. po 2 ml	5909990826773	2012-09-01	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postaci plynne do nebulizacji w rednich dawkach	46,23	58,40	58,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
420	Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp. po 2 ml	5909990826773	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w reдных dawkach	46,23	58,40	58,40	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	ryczałt	3,20
421	Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 amp. po 2 ml	5909991005733	2013-03-01	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	70,74	86,98	86,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	26,09
422	Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 amp. po 2 ml	5909991005733	2013-03-01	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	70,74	86,98	86,98	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
423	Budesonidum	Neplit Easyhaler 100, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337354	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,49	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	26,72
424	Budesonidum	Neplit Easyhaler 100, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,49	35,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	19,30
425	Budesonidum	Neplit Easyhaler 200, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337323	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	77,84	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	28,29
426	Budesonidum	Neplit Easyhaler 200, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	77,84	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	12,39
427	Budesonidum	Neplit Easyhaler 400, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100 daw. (zest. startowy)	5909990337286	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,24	65,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	19,57
428	Budesonidum	Neplit Easyhaler 400, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100 daw. (zest. startowy)	5909990337286	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,24	65,24	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	5,33
429	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	88,85	88,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	ryczałt	3,20
430	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	88,85	88,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
431	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w reдных dawkach	65,10	78,41	58,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	ryczałt	23,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
432	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w reдных dawkach	65,10	78,41	58,40	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	23,21
433	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	112,54	86,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	51,65
434	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445813	2012-01-01	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	112,54	86,98	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	28,76
435	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 200 daw.	5909990677313	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	44,88	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	20,11
436	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 200 daw.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	44,88	35,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	12,69
437	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 100 daw.	5909990677412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,04	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	16,27
438	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 100 daw.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,04	35,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	8,85
439	Budesonidum	Ribupir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	72,38	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	22,83
440	Budesonidum	Ribupir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	72,38	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,93
441	Budesonidum	Ribupir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komor inhal.)	5909990335190	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	74,40	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	24,85
442	Budesonidum	Ribupir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komor inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	74,40	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	8,95
443	Budesonidum	Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 0,05 mg/dawk	1 poj.a 200 daw.	5909990849611	2012-01-01	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	9,99	14,21	14,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
444	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200). proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	78,41	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtni u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	28,86
445	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200). proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	78,41	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	12,96
446	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200). proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw.	5909991033248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	74,97	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtni u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	25,42
447	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200). proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	74,97	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	9,52
448	Budesonidum + Formoterolum	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 60 daw.	5909990882014, 5909990872886	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty zio one z kortykosteroidami w niskich dawkach	62,87	76,24	59,52	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	19,92
449	Budesonidum + Formoterolum	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 60 daw.	5909990882113, 5909990873029	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach	72,32	86,35	59,59	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	29,96
450	Budesonidum + Formoterolum	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 60 daw.	5909991079314, 5909990873241	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	125,45	147,26	129,96	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	20,50
451	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego	27,32	35,80	35,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,74
452	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego	27,32	35,80	35,80	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
453	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego	27,32	35,80	35,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,74
454	Buprenorphinum	Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego	27,32	35,80	35,80	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
455	Buprenorphinum	Transec 35 g/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	68,20	84,02	84,02	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
456	Buprenorphinum	Transec 35 g/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	68,20	84,02	84,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
457	Buprenorphinum	Transec 52,5 g/h, system transdermalny, 30 mg	5 szt.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	104,12	124,29	124,29	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
458	Buprenorphinum	Transec 52,5 g/h, system transdermalny, 30 mg	5 szt.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	104,12	124,29	124,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
459	Buprenorphinum	Transtec 70 g/h, system transdermalny, 40 mg	5 szt.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	140,49	164,65	164,65	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
460	Buprenorphinum	Transtec 70 g/h, system transdermalny, 40 mg	5 szt.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	140,49	164,65	164,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
461	Buspironum	Spamilan, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990073597	2012-01-01	2 lata	182.0, Leki przeciwl kowe - buspiron	18,25	24,06	19,68	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	10,28
462	Buspironum	Spamilan, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990073603	2012-01-01	2 lata	182.0, Leki przeciwl kowe - buspiron	30,24	39,36	39,36	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	11,81
463	Busulfanum	Myleran, tabl. powl., 2 mg	25 tabl.	5909990277919	2012-11-01	2 lata	236.0, Leki przeciwnowotworowe - leki alkiluj ce - busulfan	331,33	372,49	372,49	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
464	Calcifediolum	Devisol-25, krople doustne, 150 mcg/ml	10 ml	5909990227211	2012-01-01	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalciferol i kalcifediol	10,13	12,39	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,80
465	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 30 mg	5 amp.a 3 ml	5909990356515	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania pozajelitowego	40,10	49,90	36,81	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	13,09
466	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg	5 amp.a 10 ml	5909990356522	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania pozajelitowego	102,60	122,69	122,69	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
467	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 200 mg	1 fiol. po 20 ml	5909990356546	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania pozajelitowego	41,90	53,26	49,08	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	4,18
468	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg	20 kaps.	5909990356713	2012-01-01	2 lata	215.1, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania doustnego	21,60	28,83	28,83	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
469	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	10 fiol.	5909990123421	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania pozajelitowego	69,12	79,03	24,54	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	54,49
470	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 25 mg	10 fiol.	5909990123520	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania pozajelitowego	77,76	92,36	61,35	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	31,01
471	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol. po 50 ml	5909991117566	2012-01-01	2 lata	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postaci do stosowania pozajelitowego	90,72	110,10	110,10	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
472	Calcitoninum	Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 amp.a 1 ml	5909990808410	2012-01-01	2 lata	86.0, Leki wpływające na gospodark wapniow - kalcitonina	20,52	27,51	27,51	Osteoporoza		30%	8,25
473	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	14 tabl. (blist.)	5909990430017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	21,17	24,57	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,48
474	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	28 tabl. (blist.)	5909990430024	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	40,48	46,58	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	36,40
475	Candesartanum	Atacand, tabl. , 16 mg	14 tabl. (blist.)	5909990430116	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	20,12	25,00	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,82
476	Candesartanum	Atacand, tabl. , 16 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990430123	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	40,24	48,41	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	28,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
477	Candesartanum cilexetilum	Candepres, tabl., 8 mg	28 tabl.	5909990739592	2012-11-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,15	16,56	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	6,38
478	Candesartanum cilexetilum	Candepres, tabl., 16 mg	28 tabl.	5909990739653	2012-11-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,30	31,52	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	11,16
479	Candesartanum cilexetilum	Carzap, tabl., 8 mg	28 tabl.	5909990937080	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,94	15,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,09
480	Candesartanum cilexetilum	Carzap, tabl., 16 mg	28 tabl.	5909990937172	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,88	28,95	28,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,69
481	Candesartanum cilexetilum	Carzap, tabl., 32 mg	28 tabl.	5909990937264	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,76	55,23	55,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	16,57
482	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl., 8 mg	28 tabl.	5909990772162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	26,57	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,39
483	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl., 8 mg	56 tabl.	5909990772179	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,19	31,40	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	11,04
484	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl., 16 mg	28 tabl.	5909990772193	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	36,67	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,31
485	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl., 16 mg	56 tabl.	5909990772209	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	48,38	60,12	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,41
486	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl., 32 mg	28 tabl.	5909990772230	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	48,38	60,12	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,41
487	Candesartanum cilexetilum	Ranacand, tabl., 16 mg	28 tabl.	5909990801350	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	32,09	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	11,73
488	Candesartanum cilexetilum	Ranacand, tabl., 8 mg	28 tabl.	5909990801367	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,57	19,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,94
489	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg	28 tabl.	5909990800360	2012-11-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,94	15,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,09
490	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg	28 tabl.	5909990800629	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,88	28,95	28,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,69
491	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg	28 tabl.	5909990957170	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,94	15,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
492	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg	28 tabl.	5909990957255	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,88	28,95	28,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,69
493	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl. powł., 8 + 12,5 mg	28 szt.	5909990865130	2013-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,94
494	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl. powł., 8 + 12,5 mg	56 tabl.	5909990865147	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,77	28,84	28,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,65
495	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg	28 tabl.	5909990865178	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	36,67	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	16,31
496	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl. powł., 16 + 12,5 mg	56 tabl.	5909990865185	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,74	55,21	55,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	16,56
497	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl. powł., 32 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990865222	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	48,38	60,12	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,41
498	Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Karbicombi, tabl. powł., 32 + 25 mg	28 tabl.	5909990865260	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	48,38	60,12	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,41
499	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495238	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,52	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,52
500	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495337	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	6,94	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,46
501	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990830817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,39	1,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	2,39
502	Carbamazepinum	Amizepin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,46	10,44	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		bezpłatny	4,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
503	Carbamazepinum	Amizepin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,46	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	7,22
504	Carbamazepinum	Finlepsin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	13,98	10,44	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,54
505	Carbamazepinum	Finlepsin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	13,98	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,74
506	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	13,98	10,44	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,54
507	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	13,98	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
508	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,80	16,01	12,53	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,48
509	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,80	16,01	12,53	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,68
510	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,51	20,89	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	5,62
511	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,51	20,89	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	8,82
512	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,74	15,67	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	2,07
513	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,74	15,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	5,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
514	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,33	31,33	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
515	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,33	31,33	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerywanach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	3,20
516	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,74	8,62	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		bezpłatny	1,12
517	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,74	8,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerywanach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	4,32
518	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,55	21,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
519	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,55	21,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerywanach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	3,20
520	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,72	10,44	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		bezpłatny	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
521	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,72	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	8,48
522	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,36	12,53	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,83
523	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,36	12,53	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	7,03
524	Carbamazepinum	Timonil 150 retard, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,54	7,83	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,71
525	Carbamazepinum	Timonil 150 retard, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,54	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	6,91
526	Carbamazepinum	Timonil 300 retard, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	17,98	15,67	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
527	Carbamazepinum	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	17,98	15,67	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytatach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	5,51
528	Carbamazepinum	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	31,99	31,33	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,66
529	Carbamazepinum	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	31,99	31,33	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytatach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	3,86
530	Carbocisteinum	Mukolina, syrop, 50 mg/ml	120 ml	5909990032211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina	4,42	6,56	6,56	Mukowiscydoza , Pierwotna dyskineza rz sek	Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku ycia	30%	1,97
531	Carvedilolum	Atram 12,5, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570430	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,42	10,09	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	7,35
532	Carvedilolum	Atram 25, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570409	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,80	13,67	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	8,20
533	Carvedilolum	Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570454	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,79	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,42
534	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074051	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,79	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,42
535	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074099	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,96	10,66	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	7,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
536	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074129	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	14,47	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	9,00
537	Carvedilolum	Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419654	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,64	10,31	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	7,57
538	Carvedilolum	Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419609	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,12	14,02	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	8,55
539	Carvedilolum	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419685	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,32	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,95
540	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727100	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,39	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,02
541	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727148	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,32	9,98	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	7,24
542	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727193	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,82	13,70	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	8,23
543	Carvedilolum	Carvedilolum 123ratio, Carvedilol Teva, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338788	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,32	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,95
544	Carvedilolum	Carvedilolum 123ratio, Carvedilol Teva, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338856	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,80	9,43	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	6,69
545	Carvedilolum	Carvedilolum 123ratio, Carvedilol Teva, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338931	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,76	11,51	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	6,04
546	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 3,125 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,10	0,98	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,41
547	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,48	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,11
548	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991017019	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,37	12,15	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	9,41
549	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 25 mg	30 tabl. (blist.)	5909991017118	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	12,45	15,42	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	9,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550	Carvedilolum	Coryol , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (blist.)	5909990983315	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	17,04	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,67
551	Carvedilolum	Coryol 12,5, tabl. , 12,5 mg	30 tabl.	5909990216505	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,73	19,95	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	17,21
552	Carvedilolum	Coryol 25, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990216567	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,60	24,06	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	18,59
553	Carvedilolum	Coryol 3,125, tabl. , 3,125 mg	30 tabl.	5909990216604	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,80	12,80	0,98	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,11
554	Carvedilolum	Dilatrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl.	5909990716111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,82	17,35	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,98
555	Carvedilolum	Dilatrend, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990717613	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,90	24,38	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	18,91
556	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl.	5909990048465	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,83	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,46
557	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	100 tabl.	5909990048472	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	26,10	6,52	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	21,54
558	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl.	5909990048489	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,99	10,68	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	7,94
559	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg	100 tabl.	5909990048496	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	29,96	35,14	13,03	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	26,02
560	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990048502	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	14,47	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	9,00
561	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 25 mg	100 tabl.	5909990048540	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	38,51	46,16	26,07	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	27,91
562	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074662	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,23	14,13	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	8,66
563	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074754	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,56	9,17	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	6,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
564	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074792	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,79	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,42
565	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687862	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	23,27	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	17,80
566	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687879	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,70	45,88	15,64	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	34,93
567	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687886	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,50	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,13
568	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687893	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	33,02	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	30,28
569	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687909	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	19,36	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	16,62
570	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687930	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	38,66	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	33,19
571	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990789924	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	19,36	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	16,62
572	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990789931	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	38,66	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	33,19
573	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990790029	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	23,27	7,82	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	17,80
574	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990790036	2012-01-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,70	45,88	15,64	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV		30%	34,93
575	Cefaclorum	Ceclor , granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137411	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	15,95	20,64	13,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,76
576	Cefaclorum	Ceclor , granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137428	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	20,89	26,62	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,44
577	Cefaclorum	Ceclor , granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	75 ml (47,6 g)	5909990137510	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	32,32	40,11	27,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	26,34
578	Cefaclorum	Ceclor , granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml (63,47 g)	5909990137527	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	37,92	47,16	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	28,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
579	Cefaclorum	Ceclor , granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990775910	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	39,93	49,85	41,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	29,19
580	Cefaclorum	Ceclor , granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990775927	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	47,79	59,63	55,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	32,08
581	Cefaclorum	Ceclor, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	63,47g granulatu/100ml zawiesiny	5909997207827	2012-07-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	27,00	35,58	35,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,79
582	Cefaclorum	Ceclor Mr, tabl. powl. o przedtu onym uwalnianiu, 375 mg	10 tabl. (blist.)	5909990676514	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	24,76	29,99	13,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	23,11
583	Cefaclorum	Ceclor Mr, tabl. powl. o przedtu onym uwalnianiu, 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990676613	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	26,38	32,44	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	23,26
584	Cefaclorum	Ceclor Mr, tabl. powl. o przedtu onym uwalnianiu, 500 mg	14 tabl. (blist.)	5909990676620	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	36,95	44,80	25,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	31,95
585	Cefaclorum	Ceclor Mr, tabl. powl. o przedtu onym uwalnianiu, 750 mg	10 tabl. (blist.)	5909990676712	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	44,22	52,72	27,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	38,95
586	Cefaclorum	Vercef, kaps., 500 mg	15 kaps. (blist.)	5909990453511	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	27,00	34,47	27,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	20,70
587	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	75 ml (37,5 g)	5909990453610	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	30,24	37,90	27,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	24,13
588	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml (50 g)	5909990453627	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	30,24	39,02	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	20,66
589	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990732111	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	14,58	19,19	13,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,31
590	Cefaclorum	Vercef, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990732128	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	14,58	19,93	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,75
591	Cefadroxilum	Biodroxil, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780211	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	7,72	11,36	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,85
592	Cefadroxilum	Biodroxil, granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,5 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780310	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	12,42	18,24	18,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,12
593	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps., 0,5 g	12 kaps.	5909990780419	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	11,88	15,77	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,26
594	Cefadroxilum	Biodroxil, tabl. powl., 1 g	12 tabl.	5909990780518	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	19,31	25,54	22,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
595	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990050819	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	9,67	13,43	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,92
596	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990050826	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	18,86	24,47	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,29
597	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml	5909990050918	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	16,61	22,69	22,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,67
598	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	100 ml	5909990050925	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	29,25	37,97	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	19,61
599	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 1mg	12 kaps.	5909990051113	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	14,87	18,94	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,43
600	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 1mg	20 kaps.	5909990051120	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	27,37	33,49	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	24,31
601	Cefadroxilum	Duracef, tabl. do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 1 1g	10 tabl.	5909990764617	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	23,60	29,50	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	20,32
602	Cefalexinum	Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (1 blist.po 16 szt.)	5909990657216	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	18,85	23,86	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,52
603	Cefalexinum	Keflex, kaps., 250 mg	12 kaps.	5909990070213	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	7,02	9,23	5,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,48
604	Cefalexinum	Keflex, kaps., 500 mg	12 kaps.	5909990070312	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	14,58	18,63	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,12
605	Cefalexinum	Keflex, granulat do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (38,1g granulatu)	5909990070411	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	13,50	17,49	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,98
606	Cefuroximium	Biofuroksym, proszek do sporz. dzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwa , 750 mg	1 fiol.a 17 ml	5909990059416	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,71	8,07	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,20
607	Cefuroximium	Biofuroksym, proszek do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 1500 mg	1 fiol.a 26 ml	5909990059515	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	10,51	14,66	11,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,92
608	Cefuroximium	Biofuroksym, proszek do sporz. dzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwa , 250 mg	1 fiol.a 10 ml	5909990806812	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,38	4,25	1,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	3,30
609	Cefuroximium	Biofuroksym, proszek do sporz. dzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwa , 500 mg	1 fiol.a 17 ml	5909990806911	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,00	6,65	3,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,74
610	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063697	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	33,48	42,45	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	24,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
611	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063703	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,44	57,89	51,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	32,18
612	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063727	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,26	17,85	9,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,26
613	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063734	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	21,90	12,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,47
614	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 250 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063840	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,60	31,62	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	22,44
615	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063857	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	38,83	25,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	25,98
616	Cefuroxim	Ceroxim, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009113	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,35	35,95	35,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,98
617	Cefuroxim	Ceroxim, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009120	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	55,30	69,08	69,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	34,54
618	Cefuroxim	Ceroxim, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009212	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,18	20,57	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,39
619	Cefuroxim	Ceroxim, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009229	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,35	35,95	35,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,98
620	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909991010614	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,00	19,32	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,14
621	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991010621	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,00	36,64	36,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,32
622	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909991012519	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,00	36,64	36,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,32
623	Cefuroxim	Ceroxim, tabl. , 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991012526	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,00	69,81	69,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	34,91
624	Cefuroxim	Novocef, tabl. powl., 250 mg	10 tabl.	5909991033811	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,79	24,39	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,21
625	Cefuroxim	Novocef, tabl. powl., 500 mg	10 tabl.	5909991034016	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,86	40,74	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	22,38
626	Cefuroxim	Tarsime, proszek do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 1500 mg	1 fiol.a 20 ml	5909990442812	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	6,67	10,60	10,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
627	Cefuroximium	Tarsime, proszek do sporz. dzania roztworu / zawiesiny do wstrzykiwa, 750 mg	1 fiol.a 20 ml	5909990442911	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,41	5,63	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	2,82
628	Cefuroximium	Xorimax 125, tabl. dra owane, 125 mg	10 tabl. (blist.)	5909990224890	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	10,80	14,18	9,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,59
629	Cefuroximium	Xorimax 250, tabl. dra owane, 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990224951	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	18,36	23,94	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,76
630	Cefuroximium	Xorimax 500, tabl. dra owane, 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990224456	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	31,32	40,16	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	21,80
631	Cefuroximium	Zamur 250, tabl. powl., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990216383	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	18,79	24,39	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,21
632	Cefuroximium	Zamur 500, tabl. powl., 500 mg	10 tabl.	5909990216390	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	31,32	40,16	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	21,80
633	Cefuroximium	Zinacef, proszek do sporz. dzania zawiesiny do wstrzykiwa lub roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 750 mg	10 fiol.	5909990069828	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	48,60	61,08	57,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	32,36
634	Cefuroximium	Zinacef, proszek do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 1500 mg	10 fiol.	5909990069927	2012-01-01	2 lata	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	95,58	114,88	114,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	57,44
635	Cefuroximium	Zinnat, granulat do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	50 ml (42,20g granulatu)	5909990051335	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	15,12	20,50	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,32
636	Cefuroximium	Zinnat, granulat do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml (84,40g granulatu)	5909990051342	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	28,08	36,73	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,37
637	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 125 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990083213	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	15,12	18,76	9,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,17
638	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 tabl.	5909990083312	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	26,46	32,52	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	23,34
639	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 tabl.	5909990083411	2012-01-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	38,88	48,18	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	29,82
640	Cefuroximium	Zinnat, granulat do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	50 ml (39,98 g granulatu)	5909990468812	2012-01-01	2 lata	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	28,08	36,73	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,37
641	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 tabl.	5909997196077	2012-03-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	31,21	40,05	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	21,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
642	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 tabl.	5909997196350	2012-03-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,64	21,05	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,87
643	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 tabl.	5909997198378	2012-07-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,10	39,94	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	21,58
644	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 tabl.	5909997198606	2012-07-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,61	21,02	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,84
645	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	5909997210605	2013-07-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,59	38,34	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	19,98
646	Cefuroximium	Zinnox, tabl. powl., 250 mg	10 tabl.	5909990652907	2012-11-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,66	21,08	18,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,90
647	Cefuroximium	Zinnox, tabl. powl., 500 mg	10 tabl.	5909990652969	2012-11-01	2 lata	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,73	36,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,37
648	Cetirizinum	Alermed, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990910793	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,57
649	Cetirizinum	Alermed, tabl. powl., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991075224	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,24	10,46	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,35
650	Cetirizinum	Allertec, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569441	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,57
651	Cetirizinum	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 but.a 100 ml	5909990851119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,08	13,32	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,80
652	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w but. z kropłomierzem	5909991103811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	6,84	9,89	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
653	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w but. z kroplomierzem	5909991103835	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,14	17,23	17,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,17
654	Cetirizinum	Amertil, roztwór doustny, 1 mg/ml	200 ml (but.)	5909990215393	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	21,53	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	8,50
655	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990410729	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,48	9,66	9,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	2,90
656	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990410736	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,57
657	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	75 ml	5909990857012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,99	10,57	6,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,68
658	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	150 ml	5909990857029	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,90	19,43	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	9,65
659	Cetirizinum	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	10 ml	5909990857111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,21	11,34	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,82
660	Cetirizinum	CetAlergin, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990872626	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,78	11,04	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
661	Cetirizinum	Cetigran, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990044559	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	13,94	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,18
662	Cetirizinum	Letizen, tabl. powl., 10 mg	20 tabl.	5909990869725	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,37	10,60	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,49
663	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990184620	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,42	13,84	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,73
664	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990184637	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	20,96	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,29
665	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	10 ml	5909990184712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,50	10,59	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,07
666	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	5909990184736	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,46	18,62	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,59
667	Cetirizinum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	5909990781515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,16	11,81	6,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,92
668	Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg	25 tabl.	5909990345618	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	233.0, Leki przeciwnowotworowe - leki alkiluj ce - chlorambucyl	241,48	274,87	274,87	Nowotwory zło liwe	Amyloidoza	bezpłatny	0,00
669	Chloroquinum	Arechin, tabl. , 250 mg	30 tabl.	5909990061914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,05	20,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Porfiria skórna pó na	30%	6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
670	Chlorpromazinum	Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g	10 g	5909990274314	2012-01-01	2 lata	172.2, Leki przeciwpsychotyczne -chloropromazyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,95	4,38	4,38	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
671	Chlorprothixenum	Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,45	9,67	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,63
672	Chlorprothixenum	Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,45	9,67	5,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		ryczałt	7,10
673	Chlorprothixenum	Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,93	19,23	19,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,77
674	Chlorprothixenum	Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,93	19,23	19,23	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		ryczałt	3,20
675	Chlorquinaldolum	Chlorchinaldin, ma , 30 mg/g	20 g	5909990297610	2012-01-01	2 lata	57.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne - pochodne chinoliny - chlorchinaldol	6,37	9,28	9,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,64
676	Ciclesonidum	Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poj.a 120 daw.	5909990212064	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	136,62	160,27	160,27	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	12,80
677	Ciclesonidum	Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poj.a 60 daw.	5909990218530	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	68,04	83,57	83,57	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,40
678	Ciclesonidum	Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poj.a 120 daw.	5909990212057	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	118,80	137,38	84,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	58,84
679	Ciclesonidum	Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poj.a 60 daw.	5909990218523	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	59,40	70,68	42,47	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	31,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
680	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 25 mg	50 kaps.	5909990787289	2012-05-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,08	73,60	72,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
681	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 50 mg	50 kaps.	5909990787357	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	120,96	143,20	143,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
682	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 100 mg	50 kaps.	5909990787463	2012-05-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	254,34	288,59	288,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
683	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946426	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,10	73,64	72,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	4,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
684	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946525	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	144,68	144,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
685	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946624	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	255,04	289,32	289,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	Ciclosporinum	Equoral, roztwór doustny , 100 mg/ml	50 ml	5909990946716	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01/2012-07- 01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	277,61	314,12	314,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespólów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
687	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps.	5909990336616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	121,99	72,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	52,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
688	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps.	5909990336715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	172,37	197,70	144,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alport'a z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	56,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
689	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps.	5909990336814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	343,44	383,03	289,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	96,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
690	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, roztwór doustny , 100 mg/ml	50 ml	5909990336913	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	398,08	441,81	314,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	130,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
691	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	60 kaps.	5909990406111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	50,38	60,56	34,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko szpiny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	29,04
692	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990678648	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,04	11,31	2,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,31
693	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678655	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	17,01	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	14,91
694	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678679	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,90	23,93	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	19,31
695	Cilazaprilum	Cilan, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066636	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	8,11	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	8,11
696	Cilazaprilum	Cilan, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066667	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	11,55	2,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,55
697	Cilazaprilum	Cilan, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066780	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,80	19,48	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	17,00
698	Cilazaprilum	Cilan, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066803	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,81	34,61	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	29,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
699	Cilazaprilum	Cilapril, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990811939	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	12,12	2,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	12,12
700	Cilazaprilum	Cilapril, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl.	5909990812080	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	8,11	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	8,11
701	Cilazaprilum	Cilapril, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl.	5909990812196	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,90	17,35	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	15,25
702	Cilazaprilum	Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990696857	2012-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,26	5,19	2,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,19
703	Cilazaprilum	Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl. (4 blistry po 7 szt.)	5909990698004	2012-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,94	12,10	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	10,00
704	Cilazaprilum	Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990698356	2012-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,28	25,57	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	20,62
705	Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum	Cazacombi, tabl. powł., 5+12,5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990781676	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,90	23,93	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	19,31
706	Ciprofibratum	Liponor, kaps., 100 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990376612	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	22,27	29,49	27,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,04
707	Ciprofloxacinum	Ciphin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990499113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,78	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	6,78
708	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990066216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,50	16,62	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	12,62
709	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990066414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,37	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	8,37
710	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990308514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,22	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	7,22
711	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990334964	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,75	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	6,75
712	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990308712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,51	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	7,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
713	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990729012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,33	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	10,33
714	Ciprofloxacinum	Cyprofloksacyna 500 mg, tabl., 500 mg	10 tabl.	5909990338030	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,32	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	6,32
715	Ciprofloxacinum	Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909991033514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,81	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	4,81
716	Ciprofloxacinum	Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909991033613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,04	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	8,04
717	Clarithromycinum	Fromilid, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990059522	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	22,10	31,27	31,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,64
718	Clarithromycinum	Fromilid, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990818013	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	14,47	20,40	20,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,20
719	Clarithromycinum	Fromilid 250, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990773626	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	18,68	23,34	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,04
720	Clarithromycinum	Fromilid 500, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990781010	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	32,40	39,91	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	27,30
721	Clarithromycinum	Fromilid 500, tabl. powł., 500 mg	28 szt.	5909991036546	2013-05-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	38,34	49,22	49,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	24,61
722	Clarithromycinum	Klabax, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990045532	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	19,26	25,98	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,37
723	Clarithromycinum	Klabax, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045549	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	27,51	36,03	36,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,02
724	Clarithromycinum	Klabax, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990081165	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	15,12	19,57	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,27
725	Clarithromycinum	Klabax, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml (but.)	5909990620647	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	12,50	18,32	18,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,16
726	Clarithromycinum	Klabax, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml	5909990620654	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	20,83	29,03	29,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,52
727	Clarithromycinum	Klabax, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (but.)	5909990620661	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	27,53	37,03	37,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
728	Clarithromycinum	Klabax, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990620678	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	45,88	59,07	59,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	29,54
729	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powl., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990890927	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	14,58	18,14	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,64
730	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powl., 250 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990890934	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	14,58	18,14	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,64
731	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powl., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990890965	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	20,52	25,29	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,99
732	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powl., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990891030	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	21,60	27,31	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,30
733	Clarithromycinum	Klabion, tabl. powl., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990891061	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	33,48	41,05	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	28,44
734	Clarithromycinum	Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml	5909990331710	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	20,88	27,19	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,71
735	Clarithromycinum	Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml	5909990331727	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	34,80	43,85	34,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	26,39
736	Clarithromycinum	Klacid, tabl. powl., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990331819	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	24,06	28,19	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	23,69
737	Clarithromycinum	Klacid, tabl. powl., 250 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990331826	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	33,77	39,34	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	33,04
738	Clarithromycinum	Klacid, tabl. powl., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990719419	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	66,96	76,54	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	63,93
739	Clarithromycinum	Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990780624	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	33,92	43,81	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	22,86
740	Clarithromycinum	Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990780631	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	56,05	69,85	69,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	34,93
741	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powl., 500 mg	14 tabl.	5909991030117	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	19,22	25,93	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,32
742	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powl., 250 mg	14 tabl.	5909991030223	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	15,12	19,57	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,27
743	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powl., 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990913428	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	16,74	21,29	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
744	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990913510	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	30,78	38,19	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	25,58
745	Clarithromycinum	Taclar, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (blist.)	5909990898114	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,90	19,33	12,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,03
746	Clarithromycinum	Taclar, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (blist.)	5909991023416	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,38	28,22	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,61
747	Clindamycinum	Clindacin, kaps. twarde, 300 mg	16 kaps.	5909990790319	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,50	19,18	19,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,59
748	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 150, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 600 mg/4ml	5 amp.a 4 ml	5909991003043	2012-01-01	2 lata	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	49,57	62,30	62,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
749	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	12 tabl. (2 blist. po 6 szt.)	5909991001421	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,74
750	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991001438	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,43	20,17	20,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,09
751	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	12 tabl. (2 blist. po 6 szt.)	5909991001520	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,84	31,56	31,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,78
752	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg mg	16 tabl.	5909991001537	2012-05-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,24	38,54	38,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	19,27
753	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991001544	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,56	76,07	76,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	38,04
754	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 75 mg	16 kaps.	5909990071111	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	9,01	5,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,38
755	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 150 mg	16 kaps.	5909990071210	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,86	12,41	10,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,15
756	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 300 mg	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990306435	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,52	22,38	21,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,86
757	Clindamycinum	Klimicin, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 300 mg/2ml	5 amp.a 2 ml	5909990067510	2012-01-01	2 lata	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	31,21	39,52	31,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,57
758	Clindamycinum	Klimicin, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 600 mg/4ml	5 fioł.a 4 ml	5909990405817	2012-01-01	2 lata	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	51,84	64,70	62,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	5,60
759	Clindamycinum	Klimicin, kaps. twarde, 300 mg	16 kaps.	5909990745814	2012-01-01	2 lata	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	19,06	19,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
760	Clobetasolum	Clobederm, krem, 0,5 mg/g	25 g	5909990867714	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,42	11,40	8,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,92
761	Clobetasolum	Clobederm, ma , 0,5 mg/g	25 g	5909990867813	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,42	11,40	8,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,92
762	Clobetasolum	Dermovate, krem, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004713	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,64	11,63	8,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,15
763	Clobetasolum	Dermovate, ma , 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004812	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,64	11,63	8,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,15
764	Clobetasolum	Dermovate, roztwór na skór , 0,5 mg/ml	25 ml (but.)	5909990369911	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,64	11,63	8,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,15
765	Clobetasolum	Dermovate, roztwór na skór , 0,5 mg/ml	50 ml (but.)	5909990369928	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	17,28	22,45	17,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,49
766	Clobetasolum	Dermovate, roztwór na skór , 0,5 mg/ml	50 ml	5909997013800	2012-11-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	15,12	20,16	17,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,20
767	Clobetasolum	Novate, krem, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932023	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	7,45	10,76	10,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,38
768	Clobetasolum	Novate, ma , 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932122	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	7,45	10,76	10,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,38
769	Clomipraminum	Anafranil, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990294916	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	6,99	8,86	4,67	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	4,19
770	Clomipraminum	Anafranil, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990295012	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	11,01	14,91	11,67	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	3,24
771	Clomipraminum	Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990295111	2012-01-01	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	17,17	23,34	23,34	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
772	Clonazepamum	Clonazepamum TZF, tabl. , 2 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	8,10	11,66	11,66	Padaczka	Padaczka u dzieci do 1 roku ycia	ryczałt	3,20
773	Clonazepamum	Clonazepamum TZF, tabl. , 0,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,10	5,21	2,92	Padaczka	Padaczka u dzieci do 1 roku ycia	ryczałt	5,21
774	Clonidineum	Iporel, tabl. , 75 mikrogramy	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990282814	2012-01-01	2 lata	35.0, Leki antyadrenergiczne działające o rodkowo - klonidyna	4,86	7,20	7,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,16
775	Clopidamidum	Clopidamid VP, tabl. powl., 20 mg	20 tabl. (blist.)	5909990141012	2012-01-01	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	3,74	8,30	8,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
776	Clopidogrelum	Agregex, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990754748	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	19,87	26,72	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	8,02
777	Clopidogrelum	Areplex, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991167011	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	33,48	41,15	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	22,45
778	Clopidogrelum	Carder, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990760244	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	23,76	30,84	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
779	Clopidogrelum	Clopidix, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990625826	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	26,24	33,47	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	14,77
780	Clopidogrelum	Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (PVC/PE/PVDC/Alu)	5909990774401	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	24,84	31,99	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	13,29
781	Clopidogrelum	Clopidogrel GSK, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.Alu/Alu)	5909990768776	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	21,60	28,56	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	9,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
782	Clopidogrelum	Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg	28 szt.	5909991029388	2013-05-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	18,36	25,12	25,12	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	7,54
783	Clopidogrelum	Clopidogrel Teva , tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990718245	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	24,84	31,99	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	13,29
784	Clopidogrelum	Clopigamma, tabl. powl., 75 mg	28 tabl.	5909990775750	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	23,76	30,84	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
785	Clopidogrelum	Clopinovo, tabl. powl., 75 mg	28 tabl.	5909990768141	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	32,94	40,58	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	21,88
786	Clopidogrelum	Cloropid, tabl. powl., 75 mg	28 tabl.	5909990851300	2012-09-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	17,82	24,55	24,55	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	7,37
787	Clopidogrelum	Egitromb, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990724536	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	42,12	50,31	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	31,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
788	Clopidogrelum	Grepid, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (PVC/PVDC/alu)	5909990727667	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	17,71	24,43	24,43	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	7,33
789	Clopidogrelum	Pegorel, tabl. powl., 75 mg	28 tabl.	5909990793730	2012-03-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	17,66	24,38	24,38	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	7,31
790	Clopidogrelum	Plavocorin, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990762729	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	23,76	30,84	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
791	Clopidogrelum	Tessyron, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990764006	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	18,36	25,12	25,12	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	7,54
792	Clopidogrelum	Trogran, tabl. , 75 mg	28 tabl.	5909990762194	2012-03-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	24,68	31,82	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	13,12
793	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (but.)	5909990712793	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplytkowe - klopidogrel	30,24	37,71	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	19,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
794	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	30 tabl. (but.)	5909990712809	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	38,19	46,36	28,63	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	26,32
795	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	90 tabl. (but.)	5909990712830	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	106,92	124,60	85,89	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	64,48
796	Clopidogrelum	Vixam, tabl. , 75 mg	30 tabl.	5909990866533	2012-05-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	23,76	31,07	28,63	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	11,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
797	Clopidogrelum	Zyllt, tabl. powl., 75 mg	28 tabl. (blist.OPA/AL/PVC)	5909991109219	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwplytkowe - klopido-grel	21,00	27,92	26,72	Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		30%	9,22
798	Clotrimazolum	Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 500 mg	1 tabl. (blist.)	5909990148011	2012-01-01	2 lata	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o dziaaniu przeciwgrzybiczym	2,14	3,09	2,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	1,65
799	Clotrimazolum	Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg	6 tabl. (1 blist.po 6 szt.)	5909990363711	2012-01-01	2 lata	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o dziaaniu przeciwgrzybiezym	2,33	3,46	3,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	1,73
800	Cloxacillinum	Syntarpen, tabl. powl., 500 mg	16 tabl. (blist.)	5909990295715	2012-01-01	2 lata	89.6, Penicyliny pól syntetyczne doustne - kloksacylina	26,78	35,15	35,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,58
801	Clozapinum	Klozapol, tabl. , 25 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990139422	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpyszotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	9,72	12,78	9,24	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslwe		bezpłatny	3,54
802	Clozapinum	Klozapol, tabl. , 100 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990139521	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpyszotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	25,81	33,82	33,82	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslwe		bezpłatny	0,00
803	Colecalciferolum (vit. D3)	Devikap, plyn doustny, 15000 j.m./ ml	10 ml	5909990260218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - coleskacyferol i kalcyfediol	2,92	4,34	4,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekla choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,20
804	Colecalciferolum (vit. D3)	Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml	10 ml	5909991047818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - coleskacyferol i kalcyfediol	4,05	5,94	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekla choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
805	Colecalciferolum (vit. D3)	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml	10 ml (but.)	5909990178513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalciferol i kalcyfediol	4,01	5,91	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,32
806	Colistinum	Colistin TZF, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , infuzji lub inhalacji, 1000000 U	20 fiol.s.subs.	5909990366514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	106.0, Antybiotyki peptydowe - kolistyna	135,11	158,88	158,88	Mukowiscydoza	Pierwotna dyskineza rz sek	ryczałt	3,20
807	Collagenasum	Iruxol Mono, ma , 1,2 j.m./g	20 g	5909990015412	2012-01-01	2 lata	51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	32,40	42,00	42,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	21,00
808	Cyanocobalaminum (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwa , 100 g/ml	10 amp.a 1 ml	5909990243914	2012-01-01	2 lata	26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	8,69	9,69	1,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,53
809	Cyanocobalaminum (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwa , 500 g/ml	5 amp.a 2 ml	5909990244010	2012-01-01	2 lata	26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	5,67	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,49
810	Cyclophosphamidum	Endoxan, dra etki, 50 mg	50 dra .	5909990240814	2012-03-01	2 lata	117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki alkiluj ce - cyklofosfamid	72,36	88,87	88,87	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
811	Cyclophosphamidum	Endoxan, dra etki, 50 mg	50 dra .	5909990240814	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki alkiluj ce - cyklofosfamid	72,36	88,87	88,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza; Zespół aktywacji makrofagów (MAS); Zespół hemofagocytowy (HLH); Małopłytkowo ci i anemie hemolityczne odporne na leczenie sterydami; Zespół POEMS; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziemniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	3,20
812	Cyproteronum	Androcur, tabl. , 50 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990657476	2012-01-01	2 lata	71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	40,88	51,74	44,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	20,42
813	Cyproteronum	Androcur, tabl. , 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990657483	2012-01-01	2 lata	71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	92,88	111,88	111,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	33,56
814	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Cyprest, tabl. dra owane, 2+0,035 mg	21 tabl.	5909990613311	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynioestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,57	13,09	6,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
815	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Cyprest, tabl. dra owane, 2+0,035 mg	63 tabl.	5909990613328	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,21	18,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	26,54
816	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Cyprodiol, tabl. dra owane, 2+0,035 mg	21 tabl.	5909990080885	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,50	11,95	6,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,72
817	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg	21 tabl.	5909990222216	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	12,42	15,05	6,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,82
818	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg	63 tabl.	5909990222230	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	35,32	41,77	18,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	29,10
819	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35 , tabl. powl., 2+0,035 mg	21 tabl. (blist.)	5909990046171	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,59	13,12	6,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,89
820	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35 , tabl. powl., 2+0,035 mg	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909990046188	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,21	18,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	26,54
821	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. dra owane, 2+0,035 mg	21 tabl. (blist.)	5909990037773	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,86	12,34	6,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,11
822	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. dra owane, 2+0,035 mg	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909990086788	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	31,27	37,47	18,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	24,80
823	Dabigatranum etexilatam	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	10 kaps. (blist.)	5909990641215	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o dzialaniu heparyn drobnocz steczkowych	61,20	69,63	18,11	ylne powiklania zakrzepowo-zatorowe u doroslych pacjentow po przebytej planowej alloplastyce calkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna		ryczałt	54,72
824	Dabigatranum etexilatam	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	30 kaps. (blist.)	5909990641222	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o dzialaniu heparyn drobnocz steczkowych	183,60	204,01	54,32	ylne powiklania zakrzepowo-zatorowe u doroslych pacjentow po przebytej planowej alloplastyce calkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna		ryczałt	152,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
825	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	10 kaps. (blist.)	5909990641253	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	61,20	70,96	26,56	ylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna		ryczałt	47,60
826	Dabigatranum etexilatum	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	30 kaps. (blist.)	5909990641260	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	183,60	206,30	79,67	ylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna		ryczałt	129,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
827	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990776412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	44,38	56,33	53,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążym po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	6,42

													<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
828	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990776511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	92,01	110,82	106,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążymy po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	7,79

													<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dtu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
829	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	10 amp.a 1 ml	5909990776610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	202,93	202,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	4,27

												<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
830	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	10 amp.a 4 ml	5909990776719	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	202,93	202,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	4,27

													ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
831	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3 ml	5909990949410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	161,84	159,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	5,70

													<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y;</p> <p>Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dtu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
832	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	5 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990949519	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	113,38	134,67	132,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr ęenia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniej cymi czynnikami ryzyka wyst pienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ci arnych po wszczępieniu zastawki i z wad zastawkow ; Ostre zespoły wie cowe - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Schorzenia wymagaj ce przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow ocen mo liwo ci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalaj ce z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikła , w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) cz ste nieterapeutyczne lub nadmierne podwy szone warto ci INR, c) obiektywne trudno ci z odpowiednio cz st kontrol INR, nawroty ylnej choroby zakrzepowo-zatorwej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagaj cych czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze wzgl du na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	5,09

														<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
833	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	5 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990949618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	161,84	159,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	5,70

													ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecnicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
834	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	5 amp.-strz z igłami po 0,72 ml	5909990949717	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	156,11	182,29	182,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
835	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml	5 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990958818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	101,22	101,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	3,20

													ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
836	Danazolium	Danazol Jelfa, tabl. , 200 mg	100 tabl.	5909990282517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	122,87	122,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Maoplytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)	ryczałt	3,74
837	Danazolium	Danazol Polfarmex, tabl. , 200 mg	100 tabl. (fiol.)	5909990925339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,60	122,69	122,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Maoplytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)	ryczałt	3,56
838	Degarelixum	Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 80 mg	1 fiol. z prosz. i 1 fiol. z rozp.	5909990774852	2012-11-01	2 lata	237.0, Leki przeciwnowotworowe - antagoni ci hormonów i leki zbli one - degareliks	517,58	574,84	574,84	Zaawansowany hormonozale ny rak gruczolu krokowego		ryczałt	3,20
839	Degarelixum	Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 120 mg	2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp.	5909990774869	2012-11-01	2 lata	237.0, Leki przeciwnowotworowe - antagoni ci hormonów i leki zbli one - degareliks	1 580,99	1 724,92	1 724,52	Zaawansowany hormonozale ny rak gruczolu krokowego		ryczałt	9,88
840	Denosumabum	Prolia, roztwór do wstrzykiwa , 60 mg/1ml	1 amp.-strz.a 1 ml	5909990761647	2012-05-01	2 lata	231.0, Leki stosowane w chorobach ko ci - przeciwciała monoklonalne - denosumab	788,40	869,10	869,10	Osteoporoza u pacjentek w wieku powy ej 65 lat ze stwierdzonej pierwotnej osteoporozy pomenopauzalnej (T-score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metod DXA), ze złamaniem kr gowym lub złamaniem szyjki ko ci udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancj) do stosowania doustnych bisfosfonianów		30%	260,73
841	Desmopressinum	Minirin, aerozol do nosa, 10 mcg	5 ml	5909990828326	2012-01-01	2 lata	78.1, Hormony przysadki i podwzgórza – donosowe postacie farmaceutyczne desmopresyny	132,84	156,35	156,35	Moczówka prosta przysadkowa		ryczałt	3,20
842	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068494	2012-09-01	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	76,87	94,04	89,52	Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powy ej 6 r z prawidłów zdolno ci zag szczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczno ci 3-miesi cznego postępowania wspomagaj cego i motywuj cego		30%	31,38
843	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068494	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	76,87	94,04	89,52	Moczówka prosta przysadkowa	Choroba von Willebrandta	ryczałt	7,72
844	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068548	2012-09-01	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	153,27	179,04	179,04	Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powy ej 6 r z prawidłów zdolno ci zag szczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczno ci 3-miesi cznego postępowania wspomagaj cego i motywuj cego		30%	53,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
845	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068548	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	153,27	179,04	179,04	Moczówka prosta przysadkowa	Choroba von Willebrandta	ryczałt	3,20
846	Dexamethasonum	Dexapolcort, aerozol na skór , 0,28 mg/ml	30 ml (16,25 g)	5909990303519	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania	7,81	9,79	5,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,16
847	Dexamethasonum	Dexapolcort, aerozol na skór , 0,28 mg/ml	55 ml (32,5 g)	5909990303526	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania	9,68	12,83	9,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,01
848	Dexamethasonum	Pabi-Dexamethason, tabl. , 0,5 mg	20 tabl.	5909990170418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,73	4,99	3,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	<p>Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych;</p> <p>Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi);</p> <p>Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym;</p> <p>Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory</p>	ryczałt	4,59
849	Dexamethasonum	Pabi-Dexamethason, tabl. , 1 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990170517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	4,86	7,20	7,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	<p>Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych;</p> <p>Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi);</p> <p>Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym;</p> <p>Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory</p>	ryczałt	3,20
850	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg	5 wlew.a 2,5 ml	5909990709212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,14	24,58	24,58	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg	5 wlew.a 2,5 ml	5909990709311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,74	21,13	12,29	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg o	ryczałt	12,04
852	Diazepamum	Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5ml	100 g	5909990264018	2012-01-01	2 lata	181.2, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doustnego	5,40	7,94	7,94	Padaczka		ryczałt	3,20
853	Diazepamum	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml	5 wlew.a 2,5 ml	5909990751518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,09	20,45	12,29	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	11,36
854	Diazepamum	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml	5 wlew.a 2,5 ml	5909990751617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,58	25,04	24,58	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	3,66
855	Diclofenacum	DICLAC 150 DUO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl.	5909997199627	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,96	17,68	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	9,86
856	Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwa domi niowych, 75 mg/3ml	5 amp.a 3 ml	5909990753017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,72	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	5,07
857	Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwa domi niowych, 75 mg/3ml	10 amp.a 3 ml	5909990753024	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	11,77	15,30	10,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	10,00
858	Diclofenacum	Diclac 100, czopki doodbytnicze , 100 mg	10 czop.	5909990420018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	3,78	5,06	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	3,22
859	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	20,21	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	12,39
860	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990957828	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	10,47	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	6,56
861	Diclofenacum	Diclac 50, czopki doodbytnicze , 50 mg	10 czop. (blist.)	5909990419913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,92	3,63	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	2,71
862	Diclofenacum	Diclac 50, tabl. dojel., 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990716623	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,29	9,14	9,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
863	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	11,49	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	7,58
864	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	10 tabl. (blist.)	5909990957729	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,40	3,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	3,45
865	Diclofenacum	Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	10 ml (but.)	5909990074044	2012-01-01	2 lata	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	16,85	22,94	22,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
866	Diclofenacum	Dicloduo, kaps., 75 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990752010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,56	15,49	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	9,62
867	Diclofenacum	Diclofenac GSK, czopki, 50 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	1,91	2,55	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	1,63
868	Diclofenacum	Diclofenac GSK, czopki, 100 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,48	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	1,85
869	Diclofenacum	Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	5 ml (but.)	5909991026516	2012-01-01	2 lata	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	8,64	12,34	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,07
870	Diclofenacum	Majamil prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990033614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,13	8,39	8,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	4,20
871	Diclofenacum	Naclof, krople do oczu, 1 mg/ml	5 ml (but.)	5909990145317	2012-01-01	2 lata	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	11,88	15,77	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	7,50
872	Diclofenacum	Naklofen, roztwór do wstrzykiwa , 25 mg/ml	5 amp.a 3 ml	5909990241910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,72	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	5,07
873	Diclofenacum	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	10,40	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	6,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
874	Diclofenacum	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedu onym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990974122	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	15,73	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	9,86
875	Diclofenacum	Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990457113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	9,47	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	5,56
876	Diclofenacum	Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990457120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	23,48	23,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	11,74
877	Diclofenacum + Lidocainum	Dicloratio, roztwór do wstrzykiwa , (75+20) (mg +mg)/2ml	3 amp.a 2 ml	5909990413829	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	3,65	4,80	3,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	3,21
878	Diclofenacum + Lidocainum	Olfen 75 , roztwór do wstrzykiwa domi niowych, 75 mg	5 amp.a 2 ml	5909990161119	2012-01-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	10,90	13,09	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,44
879	Dienogestum	Visanne, tabl. , 2 mg	28 tabl.	5909990776962	2012-01-01	2 lata	66.0, Hormony płciowe - progestageny - dienogest	148,50	173,78	173,78	Endometrioza		ryczałt	3,20
880	Digoxinum	Digoxin Teva, tabl. , 100 mcg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990012114	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naporstnicy	1,02	1,47	1,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	1,47
881	Digoxinum	Digoxin Teva, tabl. , 250 mcg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990221516	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naporstnicy	1,27	2,33	2,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	2,33
882	Digoxinum	Digoxin WZF, tabl. , 250 g	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990037711	2012-01-01	2 lata	28.0, Glikozydy naporstnicy	2,30	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
883	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,03	91,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	39,70
884	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,03	91,90	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	12,13
885	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	45,95	45,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,79
886	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	45,95	45,95	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
887	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,80	78,85	68,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	30,60
888	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,80	78,85	68,93	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	9,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
889	Diltiazemum	Diltiazem Polfarmex, tabl. , 30 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,05	9,10	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,76
890	Diltiazemum	Dilzem, tabl. , 60 mg	100 tabl.	5909990205011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	14,58	19,67	18,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,42
891	Diltiazemum	Dilzem 120 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl.	5909990482917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,41	11,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,54
892	Diltiazemum	Dilzem 180 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl.	5909990483310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,88	16,53	16,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
893	Diltiazemum	Dilzem Retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	5909990213214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,02	9,77	8,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,67
894	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powl. o przedfu onym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,41	11,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,54
895	Diltiazemum	Oxycardil 180, tabl. powl. o przedfu onym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,99	16,65	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,24
896	Diltiazemum	Oxycardil 240, tabl. powl. o przedfu onym uwalnianiu, 240 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	16,74	22,50	22,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,56
897	Diltiazemum	Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990121120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,67	11,07	11,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
898	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (but.)	5909990029815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas kłodronowy	270,00	305,86	303,78	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postępowanie kostnej części zapalenie mięśni	ryczałt	5,28
899	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (blister.)	5909990029822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas kłodronowy	270,00	305,86	303,78	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postępowanie kostnej części zapalenie mięśni	ryczałt	5,28
900	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990421879	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas kłodronowy	269,98	305,83	303,78	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postępowanie kostnej części zapalenie mięśni	ryczałt	5,25
901	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990953523	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas kłodronowy	270,00	305,86	303,78	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postępowanie kostnej części zapalenie mięśni	ryczałt	5,28
902	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	120 kaps.	5909990953530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas kłodronowy	324,00	364,53	364,53	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postępowanie kostnej części zapalenie mięśni	ryczałt	3,20
903	Donepezilum	Alzdone, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blister. po 14 szt.)	5909990712847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	40,64	47,97	20,77	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	33,43
904	Donepezilum	Alzdone, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blister. po 14 szt.)	5909990713097	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	45,62	55,95	41,54	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	26,87
905	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blister. po 14 szt.)	5909990724369	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	56,16	64,42	20,77	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	49,88
906	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blister. po 14 szt.)	5909990724383	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	86,49	99,27	41,54	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	70,19
907	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990770038	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	26,89	33,39	20,77	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	18,85
908	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990770045	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,78	40,22	40,22	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,07
909	Donepezilum	Cogiton 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blister. po 7 szt.)	5909991024413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	49,68	60,25	41,54	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,17
910	Donepezilum	Cogiton 5, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blister. po 7 szt.)	5909991024314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	37,80	44,96	20,77	Choroba Alzheimera	Odepnie w przebiegu choroby Lewy'ego, odepnie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
911	Donepezilum	Cognezil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	44,96	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,42
912	Donepezilum	Cognezil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657346	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	60,25	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,17
913	Donepezilum	Cognezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990798964	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	39,24	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	24,70
914	Donepezilum	Cognezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990799053	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	60,25	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,17
915	Donepezilum	DONECTIL, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990683581	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	39,24	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	24,70
916	Donepezilum	Donecept, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689781	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	27,11	33,63	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	19,09
917	Donepezilum	Donecept, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689873	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,02	41,54	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,46
918	Donepezilum	Donectil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990683666	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	30,00	39,39	39,39	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	11,82
919	Donepezilum	Donectil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	30 tabl.	5909990851478	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	31,86	38,91	22,25	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	23,34
920	Donepezilum	Donectil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	30 tabl.	5909990851492	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	31,17	40,99	40,99	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,30
921	Donepezilum	Donepex, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909991055912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	44,96	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,42
922	Donepezilum	Donepex, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909991056018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	43,20	53,38	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	24,30
923	Donepezilum	Donepezil Bluefish, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990814077	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	24,84	31,22	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	16,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
924	Donepezilum	Donepezil Bluefish, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990814138	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	36,35	46,13	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	17,05
925	Donepezilum	Donepezil Polfarmex, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990877553	2012-09-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	16,04	21,89	20,77	Choroba Alzheimerera		30%	7,35
926	Donepezilum	Donepezil Polfarmex, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990877669	2012-09-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,08	41,59	41,54	Choroba Alzheimerera		30%	12,51
927	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990776870	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	28,08	34,66	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	20,12
928	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990776900	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	33,48	43,08	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	14,00
929	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657353	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	42,12	49,54	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	35,00
930	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657360	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,14	59,68	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,60
931	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726929	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	30,24	36,95	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	22,41
932	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726936	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,34	41,87	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,79
933	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990743940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	60,48	69,00	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	54,46
934	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990744008	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	71,28	83,15	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	54,07
935	Donepezilum	Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990798933	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	28,45	35,06	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	20,52
936	Donepezilum	Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990798940	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	33,66	43,27	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	14,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
937	Donepezilum	Symepezil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990662104	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	28,05	34,63	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	20,09
938	Donepezilum	Symepezil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990662203	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	32,40	41,94	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,86
939	Donepezilum	Yasnal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,44	54,12	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	39,58
940	Donepezilum	Yasnal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,80	76,28	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	47,20
941	Donepezilum	Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990850075	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	27,00	33,51	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	18,97
942	Donepezilum	Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990850204	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	33,66	43,27	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	14,19
943	Dornasum alfa	Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	30 amp.a 2,5 ml	5909990375813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	205.2, Leki mukolityczne - dornaza alfa	2 381,40	2 584,34	2 584,34	Mukowiscydoza	Pierwotna dyskineza rz sek	ryczałt	3,20
944	Dorzolamidum	Adolamid , krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (but.)	5909990851430	2012-03-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	21,06	27,49	22,73	Jaskra		ryczałt	7,96
945	Dorzolamidum	Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (but.)	5909990695744	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	17,17	23,36	22,73	Jaskra		ryczałt	3,83
946	Dorzolamidum	Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml	5909990795284	2012-11-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	16,74	22,91	22,73	Jaskra		ryczałt	3,38
947	Dorzolamidum	Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (but.)	5909990838325	2012-03-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	16,49	22,65	22,65	Jaskra		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
948	Dorzolamidum	Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but. a 5ml	5909990942855	2012-09-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	17,17	23,36	22,73	Jaskra		ryczałt	3,83
949	Dorzolamidum	Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (but.)	5909990849741	2012-03-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	22,57	29,09	22,73	Jaskra		ryczałt	9,56
950	Dorzolamidum	Rozalin, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml (but.)	5909990643929	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	32,64	22,73	Jaskra		ryczałt	13,11
951	Dorzolamidum	Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (but.)	5909990661329	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	42,94	22,73	Jaskra		ryczałt	23,41
952	Dorzolamidum + Timololum	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	5 ml (but.)	5909990442423	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	44,40	34,10	Jaskra		ryczałt	13,50
953	Dorzolamidum + Timololum	Dotiteva, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but. a 5 ml	5909990799343	2012-07-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	20,52	28,37	28,37	Jaskra		ryczałt	3,20
954	Dorzolamidum + Timololum	Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg+ml	5 ml	5909990866144	2012-09-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	19,44	27,23	27,23	Jaskra		ryczałt	3,20
955	Dorzolamidum + Timololum	Rozacom, krople do oczu, 20+5 mg/ml	5 ml (but.)	5909990746705	2012-01-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	34,10	34,10	Jaskra		ryczałt	3,20
956	Dorzolamidum + Timololum	Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	5 ml (but.)	5909990864225	2012-03-01	2 lata	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	21,06	28,94	28,94	Jaskra		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
957	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990969517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,64	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,08
958	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990969517	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,64	6,52	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	15,32
959	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990969616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,34	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,22
960	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990969616	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,34	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	13,51
961	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990969715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,33	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,09
962	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990969715	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,33	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	7,47
963	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,11	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,87
964	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,11	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,25
965	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	57,24	69,27	52,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	32,79
966	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	57,24	69,27	52,12	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	23,55
967	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,04	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,80
968	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,04	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,18
969	Doxazosinum	Doxalong, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990790951	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,09	26,87	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
970	Doxazosinum	Doxalong, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990790951	2012-03-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,09	26,87	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,01
971	Doxazosinum	Doxalong, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	90 tabl.	5909990884582	2012-09-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	60,26	74,53	74,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	22,36
972	Doxazosinum	Doxalong, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	90 tabl.	5909990884582	2012-09-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	60,26	74,53	74,53	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60
973	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,46	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	22,90
974	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,46	6,52	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	24,14
975	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,31	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	24,19
976	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,31	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	23,48
977	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	32,40	39,92	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	21,68
978	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	32,40	39,92	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	17,06
979	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,62	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,06
980	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,62	6,52	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	20,30
981	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	28,97	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,85
982	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	28,97	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	19,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
983	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,38	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,14
984	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,38	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	10,52
985	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,32	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,20
986	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,32	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	8,49
987	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,10	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,86
988	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,10	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	12,24
989	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,00	32,17	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,05
990	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,00	32,17	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	22,34
991	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,32	34,53	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,29
992	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,32	34,53	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	11,67
993	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,70	34,94	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,70
994	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,70	34,94	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	12,08
995	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	60 szt.	5909991013820	2013-05-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	38,88	49,81	49,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
996	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	60 szt.	5909991013820	2013-05-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	38,88	49,81	49,81	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	6,40
997	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,34	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,78
998	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,34	6,52	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,02
999	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,15	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	11,03
1000	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,15	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	10,32
1001	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,43	34,66	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,42
1002	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,43	34,66	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	11,80
1003	Doxazosinum	Zoxon 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,52	23,79	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,23
1004	Doxazosinum	Zoxon 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,52	23,79	6,52	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	20,47
1005	Doxazosinum	Zoxon 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,98	24,73	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,61
1006	Doxazosinum	Zoxon 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,98	24,73	13,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	14,90
1007	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	62,64	77,04	77,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,11
1008	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	62,64	77,04	77,04	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1009	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	24,30	31,33	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	13,09
1010	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	24,30	31,33	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	8,47
1011	Doxycyclinum	Doxycyclinum Farma-Projekt, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps.	5909990958719	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	4,95	7,33	7,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	3,67
1012	Doxycyclinum	Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps. (2 blist.po 5 szt.)	5909990072316	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	4,96	7,34	7,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	3,67
1013	Doxycyclinum	Unidox Solutab, tabl. , 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990752713	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	5,72	8,14	7,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,47
1014	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014934	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	2,91	3,92	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,92
1015	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014958	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	5,31	7,29	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,81
1016	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990015030	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	4,26	6,19	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,71
1017	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990015054	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	8,37	11,87	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,92
1018	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990020829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	14,58	20,29	20,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	12,80
1019	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990020836	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,88	11,35	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
1020	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	2,54	3,53	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1021	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374243	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,29	10,74	10,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
1022	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422364	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,62	6,57	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,09
1023	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422371	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,63	18,23	18,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
1024	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422388	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,08	10,50	10,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
1025	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990440535	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,94	5,85	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1026	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990048328	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,14	53,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet w ciąży; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	10,23

													<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecnicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1027	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990048427	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	115,48	106,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	12,45

													<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1028	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990774821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	135,53	159,34	159,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawkowymi; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	3,20

													<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1029	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990774920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	265,39	299,79	265,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciąży w wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	39,55

													<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1030	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990775026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,12	202,92	202,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet w ciąży po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	4,27

												<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecnicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1031	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwa , 120 mg/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990891429	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	292,08	329,29	318,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr ęnienia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespól antyfosfolipidowy w ci y; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespól antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wyst pienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ci arnych po wszczępieniu zastawki i z wad zastawkow ; Ostre zespoły wie cowe - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Schorzenia wymagaj ce przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow ocen mo liwo ci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalaj ce z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikła , w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) cz ste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy szone warto ci INR, c) obiektywne trudno ci z odpowiednio cz st kontrol INR, nawroty ylniej choroby zakrzepowo-zatorwej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagaj cych czasowego zaprzestania doustnymi antykoagulantami ze wzgl du na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	17,01

												<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1032	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990891528	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	345,84	388,07	388,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	8,00

													i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1033	Enzyma pancreatis	Kreon 25000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy	50 kaps. (but.)	5909990042579	2012-01-01	2 lata	13.0, Enzymy trzustkowe	44,49	55,48	47,83	Mukowiscydoza; Stan po resekcji trzustki		bezpłatny	7,65
1034	Enzyma pancreatis	Lipancra 16 000, kaps., 16000 j. Ph. Eur. lipazy	60 kaps. (poj.)	5909990723164	2012-01-01	2 lata	13.0, Enzymy trzustkowe	28,08	36,73	36,73	Mukowiscydoza; Stan po resekcji trzustki		bezpłatny	0,00
1035	Eprosartanum	Teveten, tabl. powł., 600 mg	14 tabl.	5909990868414	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	36,93	41,28	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	36,19
1036	Ergotaminum	Ergotaminum Filofarm , tabl. dra owane, 1 mg	20 tabl.	5909990211517	2012-01-01	2 lata	154.0, Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	3,48	5,17	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	2,59
1037	Erythromycinum	Davercin, tabl. powł., 250 mg	16 tabl. (blis.)	5909990087419	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,70	12,51	3,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,71
1038	Erythromycinum	Erythromycinum TZF, tabl. powł., 200 mg	16 tabl.	5909990295616	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,48	8,86	2,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,42
1039	Estradiolum	Climara-50, system transdermalny, 50 g / 24h	4 szt.	5909990458318	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,60	26,39	12,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	17,86
1040	Estradiolum	Divigel 0,1%, el, 0,5 mg/0,5g	28 szt.	5909990447619	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	26,70	33,29	21,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	18,37
1041	Estradiolum	Divigel 0,1%, el, 1 mg/g	28 szt.	5909990447718	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	33,49	43,23	42,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,39
1042	Estradiolum	Estraderm MX 100, system transdermalny, plaster, 100 g / 24h	6 szt.	5909990703012	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,04	26,79	18,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,00
1043	Estradiolum	Estraderm MX 25, system transdermalny, plaster, 25 g / 24h	6 szt.	5909990702817	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,40	15,70	4,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,50
1044	Estradiolum	Estraderm MX 50, system transdermalny, plaster, 50 g / 24h	6 szt.	5909990702916	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	15,31	18,98	9,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,58
1045	Estradiolum	Estraderm TTS 25, system transdermalny, plaster, 25 g / 24h	6 szt.	5909990118410	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,40	15,70	4,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,50
1046	Estradiolum	Estradot 100, system transdermalny, plaster, 100 g / 24h	8 szt.	5909990939510	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	27,72	34,86	24,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	17,81
1047	Estradiolum	Estrofem, tabl. powł., 2 mg	28 tabl.	5909990330713	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	11,45	15,69	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1048	Estradiolum	Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909990823215	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	10,75	13,44	6,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,60
1049	Estradiolum	Fem 7, system transdermalny, 50 g / 24h	4 szt.	5909990774616	2013-07-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,86	18,18	12,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	9,65
1050	Estradiolum	Oesclim 25, system transdermalny, 25 g / 24h	6 szt.	5909990761517	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,39	20,99	4,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	17,79
1051	Estradiolum	Oesclim 50, system transdermalny, 50 g / 24h	6 szt.	5909990761616	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,39	22,24	9,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	15,84
1052	Estradiolum	Progynova 21, tabl. powl., 2 mg	21 tabl.	5909990304110	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	8,48	11,80	10,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,55
1053	Estradiolum	System 50, system transdermalny, plaster, 50 g / 24h	6 szt.	5909990169214	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,25	22,10	9,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	15,70
1054	Estradiolum + Drospirenonum	Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg	28 tabl.	5909990221073	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	43,20	49,34	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	39,67
1055	Estradiolum + Dydrogesteronum	Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990973316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,59	26,44	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hipogonadyzm hipogonadotropowy i hipogonadotropowy u dziewcz t do 18 r. - terapia substytucyjna	30%	16,77
1056	Estradiolum + Levonorgestrelum	Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50, faza II:50+10 g / 24h	4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy)	5909991054410	2013-07-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	27,00	36,36	36,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,91
1057	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. dra owane, 2 + 0,15 mg	21 tabl.	5909990059713	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	10,80	15,00	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,33
1058	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Divina, tabl. , 2, 2+10 mg	21 tabl. (1 blist.po 21 szt.)	5909990661411	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	9,68	13,81	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,14
1059	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl. , 1+2,5 mg	28 tabl. (1 blist.po 28 tabl.)	5909991070915	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	33,50	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	23,83
1060	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl. , 1+5 mg	28 tabl. (1 blist.po 28 tabl.)	5909991071011	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	33,50	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	23,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1061	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl. , 2+5 mg	28 tabl. (1 blist.po 28 tabl.)	5909991071110	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	33,50	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	23,83
1062	Estradiolum + Norethisteronum	Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg	28 tabl.	5909990451210	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	22,17	27,05	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	17,38
1063	Estradiolum + Norethisteronum	Cliovelle, tabl. , 1+0,5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990067794	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,41	23,06	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,39
1064	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,5+4,8 mg	8 szt.	5909990816514	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,70	41,34	41,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,40
1065	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,6+2,7 mg	8 szt.	5909990816613	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,70	41,34	41,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,40
1066	Estradiolum + Norethisteronum	Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg	28 tabl.	5909990329717	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,70	26,56	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	16,89
1067	Estradiolum + Norethisteronum	System Conti, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h)+11,2 mg (170 mcg noretysteronu octanu/24h)	8 szt. (4 + 4)	5909990444717	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	36,72	46,66	42,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	16,81
1068	Estradiolum + Norethisteronum	System Sequi, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz 3,2 mg +11,2 mg (50 mcg estradiolu/24h+170 mcg noretysteronu octanu/24h)	8 szt. (4 + 4)	5909990444816	2012-01-01	2 lata	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,94	42,65	42,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,80
1069	Estradiolum + Norgestrelum	Cyclo Prognova, tabl. powl., 2; 2+0,5 mg	21 tabl.	5909990304219	2012-01-01	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	5,62	9,51	9,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,85
1070	Ethambutoli hydrochloridum	Ethambutol Teva, kaps., 250 mg	250 kaps.	5909990227310	2013-03-01	2 lata	240.0, Leki przeciwpr tkowe - inne - etambutol	45,86	57,97	57,97	Gru lica, w tym równie gru lica lekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	0,00
1071	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	63 tabl.	5909990879465	2012-03-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,28	23,59	23,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,08
1072	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	21 tabl.	5909990060016	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,72	12,69	8,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,05
1073	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	63 tabl.	5909990060023	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,82	24,17	24,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1074	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909997010366	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,22	11,09	8,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,45
1075	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909997010373	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	21,71	28,29	24,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,37
1076	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. dra owane, 0,03+0,15 mg	63 tabl.	5909997011875	2012-09-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,01	23,30	23,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,99
1077	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	21 tabl.	5909990873319	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,63	11,54	8,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,90
1078	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Stediril 30, tabl. dra owane, 0,03+0,15 mg	21 tabl.	5909990072514	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	5,72	8,45	8,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,81
1079	Ethosuximidum	Petinimid, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990244911	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid	31,72	41,16	41,16	Padaczka	Padaczka z napadami nie wiadomo ci dla dzieci do 3 roku ycia	ryczałt	3,20
1080	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,5 mg	60 tabl.	5909990211357	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - everolimus	853,20	939,50	939,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
1081	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,25 mg	60 tabl.	5909990211654	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - everolimus	426,58	475,98	469,75	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	9,43
1082	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,75 mg	60 tabl.	5909990211845	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - everolimus	1 280,03	1 402,28	1 402,28	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
1083	Exemestanum	Etadron, tabl. powl., 25 mg	30	5909990798094	2013-03-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1084	Exemestanum	Glandex, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990812202	2012-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	90,30	107,35	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	24,47
1085	Exemestanum	Symex, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990853090	2012-07-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	81,00	97,49	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	14,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1086	Ezetimibum	Ezetrol, tabl., 10 mg	28 szt.	5909990221066	2012-01-01	2 lata	48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	122,67	145,03	145,03	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymujca się mimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej		30%	43,51
1087	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990014729	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,67	12,29	11,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,72
1088	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990014736	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,33	6,33	5,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,64
1089	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990014828	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	15,87	21,78	21,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	6,40
1090	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990014835	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,43	12,04	11,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,47
1091	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 20 mg	20 tabl.	5909990273225	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	2,40	3,70	3,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1092	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 20 mg	30	5909990273232	2013-03-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	2,92	4,84	4,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1093	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 40 mg	20 tabl.	5909990286225	2012-01-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	3,89	6,35	6,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1094	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 40 mg	30	5909990286232	2013-03-01	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	5,83	9,28	9,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1095	Felodipinum	Plendil, tabl. o przedłuonym uwalnianiu, 5 mg	28 tabl.	5909990344819	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	23,22	26,79	7,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	21,36
1096	Felodipinum	Plendil, tabl. o przedłuonym uwalnianiu, 10 mg	28 tabl.	5909990344918	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	32,40	38,09	15,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	27,23
1097	Fenofibratum	Apo-Feno 100, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990909315	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	7,44	13,15	13,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,95
1098	Fenofibratum	Apo-Feno 200 M, kaps., 200 mg	30 kaps.	5909990909414	2012-01-01	2 lata	47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	15,80	22,63	22,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	6,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1099	Fenofibratum	Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990754496	2012-03-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	16,20	23,05	23,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,92
1100	Fenofibratum	Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990754526	2012-05-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	21,60	29,91	29,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,97
1101	Fenofibratum	Fenardin, kaps. twarde, 267 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990611065	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	24,73	33,22	33,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	9,97
1102	Fenofibratum	Fenardin, kapsułki twarde, 160 mg	30 sztuk (3 blistry po 10)	5909990713974	2013-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	17,50	23,66	22,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,10
1103	Fenofibratum	Grofibrat, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990109814	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	8,42	14,19	14,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,26
1104	Fenofibratum	Grofibrat 200, kaps., 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990492114	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	16,85	23,74	23,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,12
1105	Fenofibratum	Lipanthyl , kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990258611	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	13,24	19,29	19,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,79
1106	Fenofibratum	Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg	30 kaps. (2 blist.po 15szt.)	5909990687947	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	22,96	30,22	27,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,77
1107	Fenofibratum	Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg	30 kaps. (2 blist.po 15szt.)	5909990492817	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	28,39	37,10	37,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,13
1108	Fenofibratum	Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg	30 kaps.	5909997069852	2012-07-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	28,29	37,00	37,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,10
1109	Fenofibratum	Lipanthyl 267M, kapsułki twarde, 267 mg	30 szt.	5909997204659	2013-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	27,00	35,63	35,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,69
1110	Fenofibratum	Lipanthyl Supra 215, tabl. powl., 215 mg	30 tabl.	5909990431342	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	28,62	37,35	37,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,38
1111	Fenofibratum	Lipanthyl Supra160, tabl. powl., 160 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903917	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty	23,14	30,41	27,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,96
1112	Fenoterolum	Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 g/dawk	200 daw. (10 ml)	5909990376414	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	12,20	17,01	17,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,56
1113	Fenoterolum	Fenoterol GSK, tabl. , 5 mg	100 tabl. (pojem.)	5909990148318	2012-01-01	2 lata	61.0. Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - hamujące skórcze macicy - fenoterol	12,87	17,87	17,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1114	Fenoterolum + Ipratropii bromidum	Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml	20 ml (but.)	5909990101917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,36	22,97	12,79	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek., ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	13,38
1115	Fentanylum	Dolforin, system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990674961	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	43,20	54,10	45,01	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	12,29
1116	Fentanylum	Dolforin, system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990674992	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	75,60	92,38	90,02	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	5,56
1117	Fentanylum	Dolforin, system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990675074	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	102,03	122,46	122,46	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	3,20
1118	Fentanylum	Dolforin, system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990675081	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	126,37	150,20	150,20	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	3,20
1119	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 12,5 g/h	5 szt.	5909990053605	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	21,60	28,27	22,51	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	8,96
1120	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990765416	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	41,04	51,81	45,01	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1121	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990765515	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	77,76	94,67	90,02	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wielooobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	7,85
1122	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990765614	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	116,64	137,95	135,03	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wielooobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	6,12
1123	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990765713	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	155,52	181,10	180,04	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wielooobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	4,26
1124	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643004	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	122,69	122,69	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20
1125	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643028	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	122,69	122,69	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1126	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643042	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	122,69	122,69	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20
1127	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643066	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	122,69	122,69	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20
1128	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643080	2012-01-01	2 lata	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego	102,60	122,69	122,69	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20
1129	Fentanylum	Fenta MX 100, system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990054695	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	139,89	164,53	164,53	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	3,20
1130	Fentanylum	Fenta MX 25, system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990054589	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	43,44	54,36	45,01	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	12,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1131	Fentanylum	Fenta MX 50, system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990054626	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	81,04	98,15	90,02	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	11,33
1132	Fentanylum	Fenta MX 75, system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990054664	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	104,80	125,40	125,40	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	3,20
1133	Fentanylum	Fentanyl Actavis 100 g/h, system transdermalny, 100 g/h	5 szt.	5909990000098	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	147,87	172,99	172,99	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	3,20
1134	Fentanylum	Fentanyl Actavis 25 g/h, system transdermalny, 25 g/h	5 szt.	5909990000036	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	40,42	51,16	45,01	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	9,35
1135	Fentanylum	Fentanyl Actavis 50 g/h, system transdermalny, 50 g/h	5 szt.	5909990000050	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	77,76	94,67	90,02	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	7,85
1136	Fentanylum	Fentanyl Actavis 75 g/h, system transdermalny, 75 g/h	5 szt.	5909990000081	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	108,93	129,78	129,78	Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1137	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,05 mg/dawk	1,8 ml (10 daw.)	5909990699643	2012-01-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	205,71	235,85	232,71	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	6,34
1138	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,1 mg/dawk	2,9 ml (20 daw.)	5909990699735	2012-01-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	419,04	467,27	465,43	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	5,04
1139	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,2 mg/dawk	5 ml (40 daw.)	5909990699889	2012-01-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	846,72	931,20	930,85	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,55
1140	Fentanylum	Matrifen 100, system transdermalny, 100 g/h	5 sas.	5909990043330	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	149,04	174,23	174,23	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	3,20
1141	Fentanylum	Matrifen 12 , system transdermalny, 12 g/h	5 sas.	5909990043163	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	21,60	28,27	22,51	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	8,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1142	Fentanylum	Matrifen 25, system transdermalny, 25 g/h	5 sas.	5909990043279	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	43,20	54,10	45,01	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	12,29
1143	Fentanylum	Matrifen 50, system transdermalny, 50 g/h	5 sas.	5909990043385	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	75,60	92,38	90,02	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	5,56
1144	Fentanylum	Matrifen 75, system transdermalny, 75 g/h	5 sas.	5909990043224	2012-01-01	2 lata	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego	108,00	128,79	128,79	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia		ryczałt	3,20
1145	Fentanylum	PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 g/dawk	1,55 ml (1 butelka)	5909990955503	2012-11-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	159,84	186,17	186,17	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20
1146	Fentanylum	PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 g/dawk	1,55 ml (1 butelka)	5909990955541	2012-11-01	2 lata	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego	159,84	186,17	186,17	Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1147	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 300 mcg/ml	5 fioł.a 1 ml	5909990312214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	637,20	705,72	705,72	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
1148	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 600 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990830510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,13	153,55	153,55	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
1149	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 960 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990830619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	214,38	245,43	245,43	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1150	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 30 mln j./0,5ml	5 amp.-strz. po 0,5ml	5909990904778	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	621,00	688,55	688,55	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
1151	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 48 mln j./0,5ml	5 amp.-strz. po 0,5ml	5909990904808	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	1 026,00	1 128,52	1 128,52	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
1152	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml	1 amp.-strz z osłon zabezpieczającą igłę	5909990739387	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,13	153,55	153,55	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
1153	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml	1 amp.-strz z osłon zabezpieczającą igłę	5909990739448	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	214,79	245,87	245,87	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1154	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln. j/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990687763	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	127,44	150,70	150,70	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
1155	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990687800	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	246,39	245,87	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,72
1156	Finasteridum	Androster, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990055470	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,46	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1157	Finasteridum	Androster, tabletki powlekane, 5 mg	90 tabl.	5909990906154	2012-09-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	70,20	86,47	86,47	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60
1158	Finasteridum	Antiprost, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990067770	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,98	31,70	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,44
1159	Finasteridum	Antiprost, tabl. powł., 5 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990067787	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	88,19	106,18	104,87	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	11,98
1160	Finasteridum	Apo-Fina, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990048670	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	32,61	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1161	Finasteridum	Finagen, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990692781	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,68	30,07	29,36	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,91
1162	Finasteridum	Finamef, Finasteryd Teva, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990713127	2012-03-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,46	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1163	Finasteridum	Finamef, Finasteryd Teva, tabl. powl., 5 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990713141	2012-03-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	71,28	87,61	87,61	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60
1164	Finasteridum	Finanorm, tabl. powl., 5 mg	30 tabl.	5909990670130	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	31,32	39,48	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	11,22
1165	Finasteridum	Finaran, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990082391	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,24	38,33	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	10,07
1166	Finasteridum	Finaride, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991069315	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,60	29,17	29,17	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1167	Finasteridum	Finaster, tabl. powl., 5 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990811045	2012-05-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	74,52	91,05	91,05	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60
1168	Finasteridum	Finaster, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991151218	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,81	33,63	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	5,37
1169	Finasteridum	Finasterid Stada, tabl. powl., 5 mg	30 tabl.	5909990055098	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,68	30,32	30,32	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1170	Finasteridum	Finpros, tabl. powl., 5 mg	60 szt.	5909991025595	2013-05-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	46,44	58,76	58,76	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	6,40
1171	Finasteridum	Finpros 5, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990017973	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,59	29,16	29,16	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1172	Finasteridum	Finxta, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990050895	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,90	33,48	29,36	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	7,32
1173	Finasteridum	Hyplafin, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990017997	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	32,61	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,35
1174	Finasteridum	Lifin, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990586158	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	42,98	51,59	29,36	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	25,43
1175	Finasteridum	Penester, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990077267	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,63	30,26	30,26	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1176	Finasteridum	Penester, tabl. powl., 5 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990077274	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	74,52	91,05	91,05	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1177	Finasteridum	Proscar, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990362110	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,36	36,08	29,36	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,92
1178	Finasteridum	Symasteride, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990074105	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,39	28,95	28,95	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
1179	Finasteridum	Ulgafen, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057870	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,92	33,75	31,46	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	5,49
1180	Finasteridum	Zasterid, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991053710	2012-01-01	2 lata	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,21	29,36	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	5,05
1181	Fluconazolom	Flucofast, kaps., 50 mg	7 kaps.	5909990490516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,73	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,61
1182	Fluconazolom	Flucofast, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990490523	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	28,43	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,18
1183	Fluconazolom	Flucofast, kaps., 150 mg	1 kaps.	5909990490615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,32	5,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,70
1184	Fluconazolom	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	7 kaps. (blist.)	5909990662371	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	22,14	29,00	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1185	Fluconazolum	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662388	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	91,80	109,85	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	60,84
1186	Fluconazolum	Fluconazin, syrop, 5 mg/ml	150 ml (but.)	5909991097219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,10	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,74
1187	Fluconazolum	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg	1 tabl. (blist.)	5909990017874	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,84	5,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,22
1188	Fluconazolum	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg	3 tabl. (blist.)	5909990017881	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,60	16,40	15,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,53
1189	Fluconazolum	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg	28 tabl.	5909990780181	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	72,18	89,05	89,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	44,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1190	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml	150 ml (but.)	5909990859511	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	24,79	32,72	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,36
1191	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990859610	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	19,09	25,77	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	13,52
1192	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg	7 tabl. (blist.)	5909990859672	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,02	13,08	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	6,96
1193	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg	7 tabl. (blist.)	5909990859719	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	19,09	25,77	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	13,52
1194	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg	7 szt. (1 blist.po 7)	5909991022549	2013-03-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	36,50	47,23	47,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	23,62
1195	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg	14 szt. (2 blist.po 7)	5909991022556	2013-03-01	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	72,36	89,25	89,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	44,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1196	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990356010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	24,08	31,05	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,80
1197	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 100 mg	7 kaps.	5909990356119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	26,67	33,81	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	21,56
1198	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990356126	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	80,72	98,10	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	49,09
1199	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 50 mg	7 kaps. (blist.)	5909990652273	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,56	13,65	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,53
1200	Fluconazolum	Flumycon, syrop, 5 mg/ml	150 ml	5909990841707	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	32,77	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1201	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 150 mg	1 kaps. (blis.)	5909991034115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,58	6,59	5,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,97
1202	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 200 mg	7 kaps.	5909991034214	2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	38,18	49,01	49,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	24,51
1203	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 100 mg	7 kaps. (blis.)	5909990642533	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,57	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,32
1204	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 50 mg	7 kaps. (blis.)	5909990980512	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,89	14,00	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,88
1205	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 100 mg	28 kaps. (blis.)	5909990980611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	90,72	108,71	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	59,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1206	Fluconazolom	Mycosyst, kaps., 200 mg	7 kaps. (blis.)	5909991118914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	36,72	47,47	47,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	23,74
1207	Fludrocortisonum	Cortineff, tabl., 100 g	20 tabl.	5909990170319	2012-01-01	2 lata	80.0, Kortykosteroidy do stosowania do oczu - produkty mineralokortykoidy - fludrokortyzon	4,75	7,06	7,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1208	Fludrocortisonum	Cortineff ophtalm. 0,1%, Ma do oczu, 1 mg/g	3 g	5909990104918	2012-01-01	2 lata	209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złoż one	4,38	5,91	4,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,70
1209	Fluorouracilum	Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	1 fiol. po 20 ml	5909990477913	2012-01-01	2 lata	122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	14,57	20,03	20,03	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
1210	Fluorouracilum	Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	1 fiol. po 10 ml	5909990477814	2012-01-01	2 lata	122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	7,56	10,83	10,02	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,81
1211	Fluoxetinum	Andepin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blis.po 10 szt.)	5909991065515	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	14,02	18,42	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	8,72
1212	Fluoxetinum	Bioxetin, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blis.po 10 szt.)	5909990372317	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,52	27,43	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	17,73
1213	Fluoxetinum	Deprexetin, kaps., 20 mg	30 kaps.	5909990747610	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	23,22	28,17	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	18,47
1214	Fluoxetinum	Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990776955	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	12,53	16,67	12,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	7,61
1215	Fluoxetinum	Fluoxetin Polpharma, Fluoxetin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blis.po 10 szt.)	5909990770311	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	15,44	19,93	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	10,23
1216	Fluoxetinum	Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blis.po 10 szt.)	5909990742509	2012-05-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	10,37	14,56	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	4,86
1217	Fluoxetinum	Seronil, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blis.po 10 szt.)	5909990374311	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	13,63	16,50	6,93	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	11,65
1218	Fluoxetinum	Seronil, tabl. powl., 10 mg	10 blis. po 10szt.	5909990374328	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	40,65	48,03	23,10	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	31,86
1219	Fluoxetinum	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blis.po 10 szt.)	5909990374410	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,56	24,29	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	14,59
1220	Fluoxetinum	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	100 kaps. (10 blis.po 10 szt.)	5909990374427	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	56,56	67,60	46,20	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	35,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1221	Flupentixolum	Fluanxol, tabl. dra owane, 0,5 mg	50 dra . (pojem.)	5909990127016	2012-01-01	2 lata	179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,01	13,83	6,78	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		ryczałt	10,25
1222	Flupentixolum	Fluanxol, tabl. dra owane, 3 mg	50 dra .	5909990127115	2012-01-01	2 lata	179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	40,68	40,68	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		ryczałt	3,20
1223	Flupentixolum	Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml	1 amp.a 1 ml	5909990127214	2012-01-01	2 lata	179.2, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego	10,56	14,93	14,93	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		ryczałt	3,20
1224	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg	30 tabl.	5909990941612	2012-01-01	2 lata	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	17,50	23,76	21,71	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,05
1225	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg	90 tabl.	5909990941629	2012-01-01	2 lata	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	52,77	66,00	65,13	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,87
1226	Flutamidum	Flutamid EGIS, tabl. , 250 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990139217	2012-01-01	2 lata	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	58,21	72,37	72,37	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
1227	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (g + g)/dawk inhalacyjn	1 inhalator (60 dawek)	5909991034870	2013-03-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty zło one z kortykosteroidami w niskich dawkach	64,20	79,36	79,36	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1228	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (g + g)/dawk inhalacyjn	1 inhalator (60 dawek)	5909991034887	2013-03-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach	81,60	99,32	99,32	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1229	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (g + g)/dawk inhalacyjn	1 inhalator (60 dawek)	5909991034894	2013-03-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	109,13	129,96	129,96	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1230	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (g + g)/dawk inhalacyjn	1 inhalator (60 dawek)	5909991034900	2013-03-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty zło one z kortykosteroidami w niskich dawkach	64,20	79,36	79,36	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1231	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (g + g)/dawk inhalacyjn	1 inhalator (60 dawek)	5909991034924	2013-03-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach	81,60	99,32	99,32	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1232	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (g + g)/dawk inhalacyjn	1 inhalator (60 dawek)	5909991034931	2013-03-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	109,13	129,96	129,96	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1233	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 g	1 szt. (120 daw.)	5909990907014	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach	101,65	120,58	99,32	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	24,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1234	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 g	1 szt. (120 daw.)	5909990907113	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	155,15	178,75	129,96	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc; eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	51,99
1235	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 g	1 poj.a 120 daw.	5909990906918	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	78,00	93,99	79,36	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc; eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	17,83
1236	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990832422	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	85,60	102,05	79,36	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	25,89
1237	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990832521	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach	108,82	128,18	99,32	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	32,06
1238	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990832620	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	145,52	168,53	129,96	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	41,77
1239	Fluticasonum	Cutivate, krem, 0,5 mg/g	15 g	5909990365012	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,64	10,74	5,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,05
1240	Fluticasonum	Cutivate, ma , 0,05 mg/g	15 g	5909990365111	2012-01-01	2 lata	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,64	10,74	5,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,05
1241	Fluticasonum	Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw.	1 poj.a 120 daw.	5909990570720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,30	8,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	17,04
1242	Fluticasonum	Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw.	1 op.a 120 daw. (10 ml)	5909990294817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	22,14	25,88	8,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	21,62
1243	Fluticasonum	Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina , 400 g	28 poj.	5909990933822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,38	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	43,42
1244	Fluticasonum	Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 g	120 daw. (1 poj.)	5909990851317	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	34,14	40,01	14,16	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	29,05
1245	Fluticasonum	Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 g	60 daw. (1 poj.)	5909990851416	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,56	42,09	17,70	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	27,59
1246	Fluticasonum	Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 g	120 daw. (1 poj.)	5909990851423	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	76,68	88,12	35,39	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	55,93
1247	Fluticasonum	Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 g	60 daw. (1 poj.)	5909990851515	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,82	72,38	35,39	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	40,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1248	Fluticasonum	Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 g	120 daw. (1 poj.)	5909990851522	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	113,92	131,05	70,78	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	65,60
1249	Fluticasonum	Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 500 g/2ml	10 poj.a 2 ml	5909990956517	2012-01-01	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w rednich dawkach	30,24	38,23	29,20	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	12,23
1250	Fluticasonum	Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatorem, 2 mg/2ml	10 poj.a 2 ml	5909990956616	2012-01-01	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	73,44	89,84	86,98	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,06
1251	Fluticasonum	Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 500 g/2ml	10 poj. (5 blist.po2)	5909997012186	2012-03-01	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w rednich dawkach	30,23	38,22	29,20	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	12,22
1252	Fluticasonum	Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 g	1 poj.a 60 daw.	5909990484522	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	21,60	25,13	7,08	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	21,25
1253	Fluticasonum	Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 g	1 poj.a 60 daw.	5909990484621	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,64	41,59	14,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	30,63
1254	Fluticasonum	Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 g	1 poj.a 60 daw.	5909990484720	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	67,00	77,86	35,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	45,67
1255	Fluticasonum	Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 g	1 poj.a 60 daw.	5909990484829	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	111,20	128,16	70,78	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	62,71
1256	Fluticasonum	Flutixon, proszek do inhalacji w kaps., 125 g	60 kaps. (60 daw.)	5909990785858	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	33,26	42,11	35,39	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	9,92
1257	Fluticasonum	Flutixon, proszek do inhalacji w kaps., 250 g	60 kaps. (60 daw.)	5909990785889	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,41	75,38	70,78	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	9,93
1258	Fluticasonum	Flutixon, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 125 g	120 kaps.	5909990938001	2013-03-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,41	75,38	70,78	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	9,93
1259	Fluticasonum	Flutixon, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 250 g	120 kaps.	5909990938025	2013-03-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	122,82	144,49	141,57	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	13,59
1260	Fluvastatinum	Lescol, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990360314	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	28,43	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	26,15
1261	Fluvastatinum	Lescol, tabl. powl., 40 mg	28 kaps.	5909990360413	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	40,83	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	36,27
1262	Fluvastatinum	Lescol XL, tabl. o przedl. uwalnianiu, 80 mg	28 tabl.	5909990504244	2012-03-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	48,60	54,87	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	45,74
1263	Fluvastatinum	Lescol XL, tabl. o przedl. onym uwalnianiu, 80 mg	28 tabl.	5909990887217	2012-01-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	52,92	59,45	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	50,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1264	Fluvoxaminum	Fevarin, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990347728	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	49,73	56,28	13,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	46,58
1265	Fluvoxaminum	Fevarin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990347827	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	49,73	56,28	13,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	46,58
1266	Formoterolum	Atimos, aeroszol wziewny, roztwór, 12 mcg	1 poj.a 120 daw.	5909990620777	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	101,65	121,40	121,40	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,40
1267	Formoterolum	Diffumax Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg	1 poj. (120 daw.) (+ op. ochr.)	5909990337446	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	102,60	122,41	122,32	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,49
1268	Formoterolum	Foradil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps.	5909990792924	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	58,21	71,35	61,16	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	13,39
1269	Formoterolum	Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909991109523	2012-05-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,60	61,17	61,16	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,21
1270	Formoterolum	Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990614400	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,60	61,17	61,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,21
1271	Formoterolum	Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg	1 poj. (120 daw.) (+ op. ochr.)	5909990337446	2013-07-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	97,09	116,57	116,57	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,40
1272	Formoterolum	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 mcg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990445219	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	32,83	41,16	30,58	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	13,78
1273	Formoterolum	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 mcg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990445318	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	41,90	54,06	54,06	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1274	Formoterolum	Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990849000	2012-05-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,59	61,16	61,16	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
1275	Formoterolum	Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg	120 kaps.	5909990937981	2012-11-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	97,15	116,63	116,63	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,40
1276	Formoterolum	Zafiron, proszek w kaps., 12 mcg	60 kaps.	5909990975914	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	50,49	63,18	61,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	5,22
1277	Furaginum	Furaginum Teva, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990988235	2012-01-01	2 lata	108.0, Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	4,95	7,32	7,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	3,66
1278	Furosemidum	Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990223794	2012-01-01 - dla kolumny 12, 2012-03-01 - dla kolumny 13	2 lata	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,66	3,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Postępowanie wspomagające przy objawowych przerzutach w ośrodkowym układzie nerwowym; Leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca u dzieci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1279	Furosemidum	Furosemidum Polpharma, Furosemidum, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990135028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	37.0, Leki moczop. dne - p. tlowe	2,46	3,66	3,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Post powanie wspomagaj. ce przy objawowych przerzutach w o. rdokowym ukkladzie nerwowym; Leczenie nadci. nienia t. tniczego i niewydolno. ci serca u dzieci	ryczałt	3,20
1280	Gabapentinum	Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990714322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,45	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	15,93
1281	Gabapentinum	Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990714452	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,20	83,06	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	36,09
1282	Gabapentinum	Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990714605	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,40	101,62	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	37,93
1283	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990338542	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,30	99,89	99,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
1284	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990338658	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,39	134,23	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	5,18
1285	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990339495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,16	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,64
1286	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990339600	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	53,62	66,88	66,88	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
1287	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990339709	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	39,17	50,17	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1288	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990676088	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,16	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,64
1289	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990676170	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,80	77,34	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	30,37
1290	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990676248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	98,18	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	34,49
1291	Gabapentinum	Gabatem, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990768035	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	98,51	98,51	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
1292	Gabapentinum	Gabatem, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990768059	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108,00	128,52	128,52	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	4,74
1293	Gabapentinum	Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990651535	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,38	26,93	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,41
1294	Gabapentinum	Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990651566	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	39,10	50,10	50,10	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
1295	Gabapentinum	Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990651603	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	52,92	66,13	66,13	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
1296	Gabapentinum	Neuran 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990055081	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	98,51	98,51	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1297	Gabapentinum	Neuran 800, tabl. powl., 800 mg	100 tabl. (blis.)	5909990651696	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,40	134,24	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	5,19
1298	Gabapentinum	Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990769216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,17	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	35,65
1299	Gabapentinum	Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990769315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	103,24	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	56,27
1300	Gabapentinum	Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990769414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	137,11	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	73,42
1301	Gabapentinum	Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909991017422	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	169,36	100,34	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	72,58
1302	Gabapentinum	Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909991017521	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,50	164,03	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	34,98
1303	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990678747	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	108,57	100,34	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	11,79
1304	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990678792	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	147,85	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	18,80
1305	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps. (10 blis.po 10 szt.)	5909990685554	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26,00	31,83	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	18,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1306	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685561	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	63,72	76,19	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia	ryczałt	29,22
1307	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685660	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	113,75	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia	ryczałt	50,06
1308	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990095711	2012-01-01	2 lata	103.2, Antibiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	5,40	7,94	7,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	4,13
1309	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp.a 2 ml	5909990095728	2012-01-01	2 lata	103.2, Antibiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	7,62
1310	Gentamicinum	Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml	5 ml	5909990092413	2012-01-01	2 lata	208.0, Antibiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu	3,52	5,22	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	2,61
1311	Gliclazidum	Diabrezide, tabl., 80 mg	40 tabl.	5909990359912	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	11,02	13,64	6,42	Cukrzyca		ryczałt	10,42
1312	Gliclazidum	Diagen, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990795093	2012-11-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	14,53	18,12	9,63	Cukrzyca		ryczałt	11,69
1313	Gliclazidum	Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990443017	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	27,00	31,34	9,63	Cukrzyca		ryczałt	24,91
1314	Gliclazidum	Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl.	5909990774746	2012-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	21,60	25,62	9,63	Cukrzyca		ryczałt	19,19
1315	Gliclazidum	Diazidan, tabl. powł., 80 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990911127	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	14,58	18,17	9,63	Cukrzyca		ryczałt	11,74
1316	Gliclazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990647224	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	19,12	22,99	9,63	Cukrzyca		ryczałt	16,56
1317	Gliclazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990647231	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	22,39	27,45	14,45	Cukrzyca		ryczałt	17,80
1318	Gliclazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	30 szt.	5909991056100	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	14,53	18,12	9,63	Cukrzyca		ryczałt	11,69
1319	Gliclazidum	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 szt.	5909991056131	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	29,05	35,25	19,26	Cukrzyca		ryczałt	22,39
1320	Gliclazidum	Symazide MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 szt.	5909990828340	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	14,36	17,94	9,63	Cukrzyca		ryczałt	11,51
1321	Glimepiridum	AMARYL 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909997070414	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	13,86	19,15	19,15	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1322	Glimepiridum	Amaryl 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990744817	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	4,61	6,37	4,82	Cukrzyca		ryczałt	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1323	Glimepiridum	Amaryl 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990744916	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,08	11,28	9,63	Cukrzyca		ryczałt	4,85
1324	Glimepiridum	Amaryl 3, tabl. , 3 mg	30 tabl.	5909990745012	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,74	18,28	14,45	Cukrzyca		ryczałt	8,63
1325	Glimepiridum	Amaryl 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990745111	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,96	19,26	19,26	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1326	Glimepiridum	Amaryl 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909997076775	2012-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,94	19,24	19,24	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1327	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990674893	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,93	19,23	19,23	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1328	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990674909	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	10,15	14,48	14,45	Cukrzyca		ryczałt	4,83
1329	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990674947	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	6,75	9,88	9,63	Cukrzyca		ryczałt	3,45
1330	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990674954	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,35	5,03	4,82	Cukrzyca		ryczałt	3,41
1331	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090715	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,69	4,82	Cukrzyca		ryczałt	4,07
1332	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 2 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090814	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,29	9,63	Cukrzyca		ryczałt	4,86
1333	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 3 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090913	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,32	16,78	14,45	Cukrzyca		ryczałt	7,13
1334	Glimepiridum	Avaron, tabl. , 4 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991091019	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,72	22,18	19,26	Cukrzyca		ryczałt	9,32
1335	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566082	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	4,89	6,67	4,82	Cukrzyca		ryczałt	5,05
1336	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566105	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,91	12,16	9,63	Cukrzyca		ryczałt	5,73
1337	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566129	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,74	17,22	14,45	Cukrzyca		ryczałt	7,57
1338	Glimepiridum	Diaril, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566143	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,56	22,01	19,26	Cukrzyca		ryczałt	9,15
1339	Glimepiridum	Glibetic 1 mg, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097615	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,69	4,82	Cukrzyca		ryczałt	4,07
1340	Glimepiridum	Glibetic 2 mg, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097516	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,29	9,63	Cukrzyca		ryczałt	4,86
1341	Glimepiridum	Glibetic 3 mg, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097417	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,88	16,31	14,45	Cukrzyca		ryczałt	6,66
1342	Glimepiridum	Glibetic 4 mg, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097318	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,96	19,26	19,26	Cukrzyca		ryczałt	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1343	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430536	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,56	5,25	4,82	Cukrzyca		ryczałt	3,63
1344	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430543	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,88	11,07	9,63	Cukrzyca		ryczałt	4,64
1345	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430550	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,20	16,65	14,45	Cukrzyca		ryczałt	7,00
1346	Glimepiridum	Glidiamid, tabl. powl., 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430567	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,20	21,63	19,26	Cukrzyca		ryczałt	8,77
1347	Glimepiridum	GlimeHexal 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337453	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,40	5,08	4,82	Cukrzyca		ryczałt	3,46
1348	Glimepiridum	GlimeHexal 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337521	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,51	10,68	9,63	Cukrzyca		ryczałt	4,25
1349	Glimepiridum	GlimeHexal 3, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338078	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,56	15,97	14,45	Cukrzyca		ryczałt	6,32
1350	Glimepiridum	GlimeHexal 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338146	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	15,93	21,35	19,26	Cukrzyca		ryczałt	8,49
1351	Glimepiridum	GlimeHexal 6, tabl. , 6 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338207	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	23,87	31,13	28,89	Cukrzyca		ryczałt	11,84
1352	Glimepiridum	Glimepiride Accord, tabl., 1 mg	30 szt.	5909990718566	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	2,16	3,77	3,77	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1353	Glimepiridum	Glimepiride Accord, tabl., 2 mg	30 szt.	5909990719501	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	2,97	5,87	5,87	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1354	Glimepiridum	Glimepiride Accord, tabl., 3 mg	30 szt.	5909990719570	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	4,32	8,30	8,30	Cukrzyca		ryczałt	4,80
1355	Glimepiridum	Glimepiride Accord, tabl., 4 mg	30 szt.	5909990719648	2013-07-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,94	10,76	10,76	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1356	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420179	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,52	5,21	4,82	Cukrzyca		ryczałt	3,59
1357	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420186	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,79	8,86	8,86	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1358	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420193	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,78	11,97	11,97	Cukrzyca		ryczałt	4,80
1359	Glimepiridum	Glipid, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420209	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,15	18,40	18,40	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1360	Glimepiridum	Glitoprel, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990085903	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,13	4,80	4,80	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1361	Glimepiridum	Glitoprel, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990085927	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	6,43	9,53	9,53	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1362	Glimepiridum	Glitoprel, tabl. , 3 mg	30 tabl.	5909990085934	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	9,67	13,97	13,97	Cukrzyca		ryczałt	4,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1363	Glimepiridum	Glitoprel, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990085941	2012-03-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,91	18,14	18,14	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1364	Glimepiridum	Pemidal, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990570553	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,46	5,15	4,82	Cukrzyca		ryczałt	3,53
1365	Glimepiridum	Pemidal, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990570577	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	6,91	10,04	9,63	Cukrzyca		ryczałt	3,61
1366	Glimepiridum	Pemidal, tabl. , 3 mg	30 tabl.	5909990570591	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	10,37	14,71	14,45	Cukrzyca		ryczałt	5,06
1367	Glimepiridum	Pemidal, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990570614	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,82	19,10	19,10	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1368	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570348	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,21	4,88	4,82	Cukrzyca		ryczałt	3,26
1369	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570355	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,21	10,36	9,63	Cukrzyca		ryczałt	3,93
1370	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 3 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570362	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,24	15,63	14,45	Cukrzyca		ryczałt	5,98
1371	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 6 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570379	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	22,14	29,30	28,89	Cukrzyca		ryczałt	10,01
1372	Glimepiridum	Symglic, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573196	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,96	18,20	18,20	Cukrzyca		ryczałt	6,40
1373	Glipizidum	Glipizide BP, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990791712	2012-01-01	2 lata	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,40	7,21	4,82	Cukrzyca		ryczałt	5,59
1374	Glucagonum	GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1 mg	1 fiol. (+1 rozp.)	5909990693313	2012-01-01	2 lata	85.0, Hormony trzuski - glukagon	51,82	64,92	64,92	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1375	Gliceryli trinitras	Nitromint, aerozol podj zykowy, 0,4 mg/dawk	11 g (200 daw.)	5909990156825	2012-01-01	2 lata	33.2, Leki rozszerzajace naczynia krwiono ne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu	12,85	17,84	17,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,41
1376	Gliceryli trinitras	Sustonit, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 6,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990183036	2012-01-01	2 lata	33.1, Leki rozszerzaj ce naczynia krwiono ne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego	3,24	4,81	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,16
1377	Gonadotrophinum chorionicum	Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 5000 j.m.	1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml)	5909990713530	2012-01-01	2 lata	69.0, Hormony płciowe - gonadotropiny i inne leki stymulujace owulacj	18,93	25,58	25,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,67
1378	Goserelinum	Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg	1 amp.-strz.	5909990082315	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin	238,79	271,78	265,08	Nowotwory zło liwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	9,90
1379	Goserelinum	Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg	1 amp.-strz.	5909990783212	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin	773,63	852,36	852,04	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	9,92
1380	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990239412	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,39	3,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1381	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990239412	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,39	3,39	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe		bezpłatny	0,00
1382	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909990104017	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,88	1,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,73
1383	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909990104017	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,88	1,65	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe		bezpłatny	3,23
1384	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,17	6,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	choroba Huntingtona	30%	1,85
1385	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,17	6,17	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe		bezpłatny	0,00
1386	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990969319	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	4,32	5,55	3,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,18
1387	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909990969319	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	4,32	5,55	3,39	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe		bezpłatny	2,16
1388	Hydrocortisonum	Hydrocortisonum AFP, krem, 0,01 g/1 g	15 g	5909990950317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania	1,77	2,63	2,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory	50%	1,32
1389	Hydrocortisonum	Laticort 0,1%, plyn na skór , 1 mg/ml	20 ml	5909990229215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania	4,62	5,91	3,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory	50%	4,16
1390	Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B	Atecartin, krople do oczu i uszu, zawiesina , (5mg+10000 j.m.+ 15mg) /ml mg/ml, j.m./ml	5 ml	5909990124718	2012-01-01	2 lata	209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	4,97	7,35	7,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1391	Hydroxycarbamidum	Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg	100 kaps.	5909990836758	2012-03-01	2 lata	126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik	64,58	79,80	79,80	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
1392	Hydroxycarbamidum	Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg	100 kaps.	5909990944927	2012-01-01	2 lata	126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik	86,12	102,64	79,80	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	22,84
1393	Ibuprofenum	Ibuprofen AFL, tabl. dra owane, 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990673988	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,48	6,38	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,36
1394	Ibuprofenum	Ibuprofen Hasco, kaps. mi kkie, 200 mg	60 kaps.	5909990853540	2012-03-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,48	6,38	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1395	Ibuprofenum	Ibuprofen Polfarmex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990830732	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,22	7,16	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	5,14
1396	Ibuprofenum	Ibuprofen-Pabi, tabl. dra owane, 200 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990132928	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,25	7,20	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	5,18
1397	Imidaprilum	Tanatril, tabl. , 5 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069810	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,96	16,65	2,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	16,65
1398	Imidaprilum	Tanatril, tabl. , 10 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069919	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,22	21,93	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	19,83
1399	Imidaprilum	Tanatril, tabl. , 20 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991070014	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,94	37,75	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	33,13
1400	Indapamidum	Apo-Indap, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990988716	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,62	10,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,19
1401	Indapamidum	Diuresin SR, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990975815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,41	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,29
1402	Indapamidum	Indap, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991162917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,89	10,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,27
1403	Indapamidum	Indapamide KRKA, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 szt.	5909990957125	2013-07-01	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,03	8,81	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,69
1404	Indapamidum	Indapamide SR, tabl. o przedfuzonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl	5909990644933	2012-09-01	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,89	8,66	8,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,60
1405	Indapamidum	Indapamide SR Arrow, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990223077	2012-07-01	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,18	7,90	7,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,37
1406	Indapamidum	Indapamidum 123ratio (Indapamidum Farmacom), tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990586806	2012-05-01	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,40	8,14	8,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,44
1407	Indapamidum	Indapen, tabl. powł., 2,5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990863013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	9,72	9,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1408	Indapamidum	Indapen SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665907	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,83	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,71
1409	Indapamidum	Indapres, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990223121	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	10,72	10,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,22
1410	Indapamidum	Indipam SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990702534	2012-07-01	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,38	8,12	8,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,44
1411	Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990012688	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,41	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,29
1412	Indapamidum	Opamid, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770182	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,23	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,11
1413	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990424801	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,81	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,69
1414	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	60 tabl.	5909990424849	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	18,83	17,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,58
1415	Indapamidum	Symapamid SR, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990734993	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,08	7,80	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,34
1416	Indapamidum	Tertensif SR, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990738212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,01	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,89
1417	Insulini c. zincu suspensio compositum	Insulinum Lente Wo-S Alto Depuratum TZF, zawiesina do wstrzykiwa , 80 j.m/ml	1 fiol.a 10 ml	5909990339815	2012-01-01	2 lata	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierz ce	34,73	44,83	44,83	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1418	Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum	Insuman Comb 25 , zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990915613	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	85,68	103,61	98,57	Cukrzyca		ryczałt	9,04
1419	Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum	Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990238323	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	109,19	98,57	Cukrzyca		ryczałt	14,62
1420	Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum	Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990347124	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	109,19	98,57	Cukrzyca		ryczałt	14,62
1421	Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum	Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml	5 x 3 ml	5909990348121	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	109,19	98,57	Cukrzyca		ryczałt	14,62
1422	Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum	Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909991022921	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1423	Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum	Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909991023027	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1424	Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum	Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909991023126	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1425	Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum	Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909991023324	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1426	Insulini injectio neutralis	Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwa , we wkładzie , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990237920	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	90,94	109,19	98,57	Cukrzyca		ryczałt	14,62
1427	Insulini injectio neutralis	Insulinum Maxirapid Wo-S Alto Depuratum TZF, roztwór do wstrzykiwa , 80 j.m/ml	1 fioł. po 10 ml	5909990292219	2012-01-01	2 lata	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierz ce	34,73	44,83	44,83	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1428	Insulini injectio neutralis	Insulinum Solutio Neutralis Wo-S Alto Depuratum TZF, roztwór do wstrzykiwa , 80 j.m/ml	1 fioł. po 10 ml	5909990292318	2012-01-01	2 lata	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierz ce	34,73	44,83	44,83	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1429	Insulini injectio neutralis	Insuman Rapid , roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990914715	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	85,68	103,61	98,57	Cukrzyca		ryczałt	9,04
1430	Insulinum aspartum	NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990879915	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	117,77	137,63	98,57	Cukrzyca		ryczałt	43,06
1431	Insulinum aspartum	NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml	5 wkł.po 3ml	5909990614981	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	117,77	137,63	98,57	Cukrzyca		ryczałt	43,06
1432	Insulinum aspartum	NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml	5 wkł.a 3 ml	5909990451814	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	117,77	137,63	98,57	Cukrzyca		ryczałt	43,06
1433	Insulinum detemirum	Levemir, roztwór do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml	5 wkł.a 3ml (Penfil)	5909990005741	2012-07-01	2 lata	14.3, Hormony trzuski - długodziałaj ce analogi insuliny	229,45	261,38	244,84	Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzie y i dzieci w wieku od 2 lat i powy ej		30%	89,99
1434	Insulinum glargine	Lantus, roztwór do wstrzykiwa , 100 j/ml	5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3ml	5909990617555	2012-07-01	2 lata	14.3, Hormony trzuski - długodziałaj ce analogi insuliny	213,84	244,84	244,84	Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzie y i dzieci od 6 roku ycia		30%	73,45
1435	Insulinum glargine	Lantus, roztwór do wstrzykiwa , 100 j/ml	5 wkładów po 3ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar)	5909990895717	2012-07-01	2 lata	14.3, Hormony trzuski - długodziałaj ce analogi insuliny	213,84	244,84	244,84	Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzie y i dzieci od 6 roku ycia		30%	73,45
1436	Insulinum glulisinum	Apidra, roztwór do wstrzykiwa , 100 j./ml	5 wkł. a 3 ml OPTIPEN	5909990008575	2012-05-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	108,15	127,43	98,57	Cukrzyca		ryczałt	32,86
1437	Insulinum glulisinum	Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m/ml	5 wstrz.a 3 ml	5909990617197	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	108,15	127,43	98,57	Cukrzyca		ryczałt	32,86
1438	Insulinum humanum	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	1 fioł.a 10 ml	5909990853014	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	56,73	70,35	65,71	Cukrzyca		ryczałt	7,84
1439	Insulinum humanum	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990853113	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	98,57	98,57	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1440	Insulinum humanum	Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990853311	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	98,57	98,57	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1441	Insulinum humanum	Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990853519	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	98,57	98,57	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1442	Insulinum humanum	Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	1 fioł.a 10 ml	5909990852314	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	56,73	70,35	65,71	Cukrzyca		ryczałt	7,84
1443	Insulinum humanum	Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990852413	2012-01-01	2 lata	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	98,57	98,57	Cukrzyca		ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1444	Insulinum humanum	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	1 fiol. po 10 ml	5909990852017	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	56,73	70,35	65,71	Cukrzyca		ryczałt	7,84
1445	Insulinum humanum	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990852116	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,92	98,57	98,57	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1446	Insulinum humanum	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990246014	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	82,78	100,54	98,57	Cukrzyca		ryczałt	5,97
1447	Insulinum humanum	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990246717	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	82,78	100,54	98,57	Cukrzyca		ryczałt	5,97
1448	Insulinum humanum	Humulin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990247011	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	82,78	100,54	98,57	Cukrzyca		ryczałt	5,97
1449	Insulinum humanum	Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml	5909990672448	2012-03-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1450	Insulinum humanum	Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml	5909990672585	2012-03-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1451	Insulinum humanum	Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml	5909990672363	2012-03-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1452	Insulinum humanum	Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909991022525	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1453	Insulinum humanum	Polhumin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909991022822	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	80,46	98,08	98,08	Cukrzyca		ryczałt	4,00
1454	Insulinum isophanum	Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990348923	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	90,94	109,19	98,57	Cukrzyca		ryczałt	14,62
1455	Insulinum isophanum	Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990915019	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	85,68	103,61	98,57	Cukrzyca		ryczałt	9,04
1456	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990455010	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	135,06	98,57	Cukrzyca		ryczałt	40,49
1457	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990455614	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	135,06	98,57	Cukrzyca		ryczałt	40,49
1458	Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	5 wkł.a 3 ml	5909990692422	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkich	115,35	135,06	98,57	Cukrzyca		ryczałt	40,49
1459	Ipratropii bromidum	Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 mcg/ml	20 ml	5909990322114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,03	12,79	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	3,44
1460	Ipratropii bromidum	Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 mcg	10 ml (200 daw.)	5909990999019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,93	25,58	25,58	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1461	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 1 ml	5909990977710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	12,04	16,26	12,79	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	6,67
1462	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 2 ml	5909990977727	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	24,06	31,01	25,58	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	8,99
1463	Irbesartanum	Ifirmasta, tabl. powł., 150 mg	28 szt.	5909990706280	2013-05-01	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,04	14,31	14,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,29
1464	Irbesartanum	Ifirmasta, tabl. powł., 300 mg	28 szt.	5909990706297	2013-05-01	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,09	27,06	27,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,12
1465	Irbesartanum	Irbesartan Pfizer, tabl., 150 mg	28 szt.	5909990914050	2013-01-01	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,25	14,54	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,36
1466	Irbesartanum	Irprestan, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990747054	2012-05-01	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,76	14,60	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,51
1467	Irbesartanum	Irprestan, tabl. powł., 150 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990747085	2012-05-01	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,66	18,16	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,98
1468	Irbesartanum	Irprestan, tabl. powł., 300 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990747122	2012-05-01	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,65	35,07	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	14,71
1469	Isosorbidi mononitras	Effox 10, tabl., 10 mg	60 tabl.	5909990368334	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	5,13	4,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,56
1470	Isosorbidi mononitras	Effox 20, tabl., 20 mg	50 tabl.	5909990368426	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,38	7,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,63
1471	Isosorbidi mononitras	Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl.	5909990368624	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	13,08	11,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,16
1472	Isosorbidi mononitras	Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl.	5909990452118	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,88	17,88	17,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1473	Isosorbidi mononitras	Mono Mack Depot, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	14 tabl.	5909990669011	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,87	11,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	6,47
1474	Isosorbidi mononitras	Mono Mack Depot, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	28 tabl.	5909990669028	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,17	25,21	22,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,43
1475	Isosorbidi mononitras	Mononit 10, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990010516	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,00	5,70	4,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,13
1476	Isosorbidi mononitras	Mononit 100 retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991011727	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,42	22,55	22,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	8,00
1477	Isosorbidi mononitras	Mononit 20 , tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990010622	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,33	10,45	9,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,11
1478	Isosorbidi mononitras	Mononit 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010714	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,77	9,87	9,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,53
1479	Isosorbidi mononitras	Mononit 60 retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991011529	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,44	15,81	14,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	6,31
1480	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991133511	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,75	4,37	4,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1481	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 20 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991133528	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,46	7,05	7,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1482	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991133610	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,89	8,93	8,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1483	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl. , 40 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991133627	2012-01-01	2 lata	34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,70	15,27	15,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	5,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1484	Itraconazolum	Itragen, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990617463	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	79,92	97,26	97,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	48,63
1485	Itraconazolum	Itrax, kaps. twarde, 100 mg	4 kaps.	5909990858255	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,28	15,77	14,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,77
1486	Itraconazolum	Itrax, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990858262	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	78,90	96,18	96,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	48,09
1487	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909990004317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	17,89	14,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	10,89
1488	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990004331	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	102,99	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	53,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1489	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909991053819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,90	19,60	14,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	12,60
1490	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909991053826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	102,99	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	53,98
1491	Kalii chloridum	Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 391 mg	30 tabl.	5909990257515	2012-01-01	2 lata	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	3,47	5,15	5,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,34
1492	Kalii chloridum	Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 391 mg	60 tabl.	5909990257539	2012-01-01	2 lata	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	6,90	10,01	10,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1493	Kalii citras + Kalii hydrocarbonas	Kalium Effervescens Bezcukrowy, granulaty musuj cy, 0,782 g/3g	20 sasz.	5909990269310	2012-01-01	2 lata	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	17,66	20,66	6,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	15,99
1494	Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum	Citrolyt, granulaty do sporz dzania roztworu doustnego, 14,5+46,4+39,1 g/100g	220 g	5909990210817	2012-01-01	2 lata	74.0, Leki urologiczne zmieniajace pH moczu - cytryniany do sprz dzania roztworu doustnego	42,80	54,41	54,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	16,32
1495	Ketoconazolum	Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg	10 tabl.	5909991045418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	4,68
1496	Ketoconazolum	Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909991042615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	4,68
1497	Ketoconazolum	Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991042639	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	18,90	18,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	9,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1498	Ketoprofenum	Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990412112	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	13,85	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	8,63
1499	Ketoprofenum	Febrofen, kaps. o przedlu onym uwalnianiu, 200 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990413317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	18,52	13,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	11,57
1500	Ketoprofenum	Ketonal, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps.	5909990046492	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	6,78	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	4,17
1501	Ketoprofenum	Ketonal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg	10 amp.a 2 ml	5909990659524	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	4,72
1502	Ketoprofenum	Ketonal DUO, kaps. o przedlu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990064694	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	22,02	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	14,20
1503	Ketoprofenum	Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg	30 tabl.	5909990046485	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,02	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	9,80
1504	Ketoprofenum	Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps.	5909990794522	2012-09-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,02	4,28	3,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	2,54
1505	Ketoprofenum	Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg	20 kaps.	5909990794553	2012-09-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,05	8,54	6,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,06
1506	Ketoprofenum	Ketoprofen-SF, roztwór do wstrzykiwa , 0,05 g/ml	10 amp po 2ml	5909990794607	2012-09-01	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,05	8,98	8,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,49
1507	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 100 mg	14 kaps.	5909990813315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	9,87	4,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1508	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 100 mg	20 kaps.	5909990813322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,03	6,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	10,55
1509	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 200 mg	20 kaps.	5909990813421	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	18,45	13,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	11,50
1510	Ketoprofenum	Profenid, czopki, 100 mg	10 czop.	5909990098514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	7,94	9,13	2,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,90
1511	Ketoprofenum	Profenid, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990760718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,05	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,83
1512	Ketoprofenum	Profenid, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990790418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	13,75	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	8,88
1513	Ketoprofenum	Refastin, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675593	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	14,96	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	9,74
1514	Konestat alfa	Ruconest, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 2100 j.	1 fiołka	5909990796090	2013-03-01	2 lata	241.0, Leki stosowane w dziedzicznym obrz ku naczyńoruchowym - konestat alfa	3 780,00	4 085,39	4 085,39	Przerwanie ostrego, zagra aj cego yciu ataku dziedzicznego obrz ku naczyńoruchowego, obejmuj cego gardło, krta lub jam brzusz		ryczałt	3,20
1515	Lacidipinum	Lacipil, tabl. powl., 6 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990625697	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	25,92	30,50	11,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	22,36
1516	Lacidipinum	Lacipil, tabl. powl., 2 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990650521	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	14,86	3,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	12,14
1517	Lacidipinum	Lacipil, tabl. powl., 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990650620	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	18,90	22,22	7,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	16,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1518	Lamotriginum	Epitrigine 100 Mg, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334766	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	31,91	28,72	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	6,39
1519	Lamotriginum	Epitrigine 100 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	32,61	31,46	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,35
1520	Lamotriginum	Epitrigine 25 Mg, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334742	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	8,62	7,18	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,64
1521	Lamotriginum	Epitrigine 25 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334933	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	8,97	7,87	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,30
1522	Lamotriginum	Epitrigine 50 Mg, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334759	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	16,72	14,36	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,56
1523	Lamotriginum	Epitrigine 50 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,18	15,73	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1524	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,025 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990224661	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,26	7,87	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	6,59
1525	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,1 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225149	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,46	31,46	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
1526	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,05 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225170	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	12,96	17,76	15,73	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,23
1527	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038480	2012-01-01/2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	19,44	26,19	26,19	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
1528	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038565	2012-01-01/2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	9,72	13,86	13,86	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
1529	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038701	2012-01-01/2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	4,85	7,18	7,18	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1530	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346219	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	27,60	14,36	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	16,44
1531	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346318	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	33,06	28,72	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	7,54
1532	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990346325	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	64,71	57,44	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	10,47
1533	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990354818	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	15,78	7,18	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	11,80
1534	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787111	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,36	1,57	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	8,36
1535	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787210	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	19,56	7,87	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	14,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1536	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787319	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	64,80	74,97	31,46	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	46,71
1537	Lamotriginum	Lamotrix, tabl., 100 mg	90 tabl.	5909990961092	2012-09-01	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	77,76	93,09	86,16	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	10,13
1538	Lamotriginum	Lamotrix, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909991006419	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,59	11,16	7,18	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	7,18
1539	Lamotriginum	Lamotrix, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909991006518	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	17,98	22,61	14,31	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	11,50
1540	Lamotriginum	Lamotrix, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909991006617	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	25,92	33,06	28,72	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	7,54
1541	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 25 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057382	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	9,89	14,07	13,11	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,16
1542	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 100 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057566	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	39,59	50,67	50,67	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1543	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057597	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	19,80	26,64	26,22	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	3,62
1544	Lamotriginum	Plexxo 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990972616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	29,75	37,12	28,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	11,60
1545	Lamotriginum	Plexxo 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990972418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	20,36	7,18	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	16,38
1546	Lamotriginum	Plexxo 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990972517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	26,45	14,36	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	15,29
1547	Lamotriginum	Symla 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990045303	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,89	30,90	28,72	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	5,38
1548	Lamotriginum	Symla 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990045280	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,10	8,51	7,18	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1549	Lamotriginum	Symla 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990045266	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,31	16,60	14,36	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,44
1550	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079292	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	8,62	7,18	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,64
1551	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	16,72	14,36	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,56
1552	Lamotriginum	Trogine , tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990079438	2012-05-01	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,89	30,90	28,72	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	5,38
1553	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079483	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	54,62	66,51	57,44	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	12,27
1554	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg	1 amp.-strz	5909991094416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0. Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2 703,73	2 924,36	2 437,04	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	490,52
1555	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg	1 amp.-strz	5909991094515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0. Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3 604,62	3 894,27	3 655,55	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	241,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1556	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909991094614	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	4 514,86	4 874,07	4 874,07	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,27
1557	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055135	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	13,55	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksova, zapalenie błony łuzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	8,83
1558	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055173	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	26,15	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksova, zapalenie błony łuzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	16,72
1559	Lansoprazolum	Lansoprazolum 123ratio (Lansoprazolum Farmacom), kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990079933	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	10,68	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,96
1560	Lansoprazolum	Lansoprazolum 123ratio (Lansoprazolum Farmacom), kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990080021	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	15,12	20,42	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,99
1561	Lansoprazolum	Lantrea, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (but.)	5909990017898	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	16,29	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksova, zapalenie błony łuzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	11,57
1562	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990339365	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,12	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksova, zapalenie błony łuzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	9,40
1563	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps.	5909990339402	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,12	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksova, zapalenie błony łuzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	9,40
1564	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990609970	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	22,71	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksova, zapalenie błony łuzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	13,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1565	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	7 kaps.	5909990727018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	15,97	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,61
1566	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	14 kaps.	5909990727025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,07	21,82	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,10
1567	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	28 kaps.	5909990727032	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	29,37	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,94
1568	Lansoprazolum	Lanzul S, kaps., 15 mg	28 kaps.	5909990869817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	20,53	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,81
1569	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623358	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	17,32	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,60
1570	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990623440	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	17,32	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,60
1571	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623457	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	33,59	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	24,16
1572	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064045	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	10,84	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1573	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990064069	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	10,84	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,12
1574	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064076	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	21,40	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,97
1575	Latanoprostum	Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 g/ml	1 but. Po 2,5ml	5909990995479	2013-05-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,79	34,61	34,61	Jaskra		ryczałt	3,20
1576	Latanoprostum	Apo-Lataprox, krople do oczu, roztwór, 50 mcg/ml	2,5 ml	5909990859177	2012-03-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	30,24	40,39	40,39	Jaskra		ryczałt	3,20
1577	Latanoprostum	Arulatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml	2,5ml (0,005%)	5909990841943	2012-11-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,84	34,67	34,67	Jaskra		ryczałt	3,20
1578	Latanoprostum	Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml	1 but. a 2,5 ml	5909990813582	2012-05-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	29,70	39,82	39,82	Jaskra		ryczałt	3,20
1579	Latanoprostum	Latano-POS, krople do oczu, 50 g/ml	1 poj. z kropłomierzem zawieraj cy 2,5ml roztw.	5909990969753	2013-03-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	29,16	39,25	39,25	Jaskra		ryczałt	3,20
1580	Latanoprostum	Latano-POS, krople do oczu, 50 g/ml	3 poj. z kropłomierzem zawieraj ce 2,5ml roztw.	5909990969760	2013-03-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	87,48	107,07	107,07	Jaskra		ryczałt	8,00
1581	Latanoprostum	Latanoprost Arrow, krople do oczu, 50 mikrogramów/ml	2,5 ml (but.)	5909990713158	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	30,22	40,37	40,37	Jaskra		ryczałt	3,20
1582	Latanoprostum	Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml	2,5 ml (but.)	5909990859702	2012-03-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	29,70	39,82	39,82	Jaskra		ryczałt	3,20
1583	Latanoprostum	Monoprost, krople do oczu, roztwór, 50 g/ml	30 szt. (6 saszetek po 5 poj. jednodawkowych)	5909991019693	2013-05-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	43,20	54,96	54,96	Jaskra		ryczałt	3,20
1584	Latanoprostum	Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml	2,5 ml	5909990841448	2012-05-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	29,65	39,77	39,77	Jaskra		ryczałt	3,20
1585	Latanoprostum	Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%)	2,5 ml (but.)	5909990411818	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	46,44	57,56	47,26	Jaskra		ryczałt	13,50
1586	Latanoprostum	Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ ml	2,5 ml (but.)	5909990741311	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	36,72	47,26	47,26	Jaskra		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1587	Latanoprostum + Timololum	Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 g/ml + mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990879687	2012-11-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	37,04	47,60	47,26	Jaskra		ryczałt	3,54
1588	Latanoprostum + Timololum	Latanoprost + Timolol STADA, krople do oczu, roztwór, 50 + 5 g/ml + mg/ml	2,5ml	5909990872824	2013-05-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	46,12	46,12	Jaskra		ryczałt	3,20
1589	Latanoprostum + Timololum	Tilaprox, krople do oczu, 50+5 g/ml + mg/ml	2,5ml	5909990946587	2013-03-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	36,72	47,26	47,26	Jaskra		ryczałt	3,20
1590	Latanoprostum + Timololum	Timlatan, krople do oczu, 50 + 5 g/ml + mg/ml	2,5ml	5909990919505	2013-05-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	33,48	43,83	43,83	Jaskra		ryczałt	3,20
1591	Latanoprostum + Timololum	Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5,0 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909991057213	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	49,50	60,80	47,26	Jaskra		ryczałt	16,74
1592	Latanoprostum + Timololum	Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50 +5 mcg/ml + mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990894543	2012-03-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	37,29	47,87	47,26	Jaskra		ryczałt	3,81
1593	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (but.)	5909990977826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	59,71	73,81	67,45	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	Młódzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	9,56
1594	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (but.)	5909990977925	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	122,84	144,72	134,90	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	Młódzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	13,02
1595	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 100 mg	3 tabl. (blis.)	5909990978014	2012-01-01	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	59,71	73,81	67,45	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów		ryczałt	9,56
1596	Leflunomidum	Leflunomide Sandoz, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990858651	2012-11-01	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	113,57	134,90	134,90	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów		ryczałt	3,20
1597	Leflunomidum	Leflunomide Sandoz, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990858682	2012-11-01	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	63,07	77,37	67,45	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów		ryczałt	13,12
1598	Leflunomidum	Leflunomide medac, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	4037353010604	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	59,71	73,81	67,45	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	Młódzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	9,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1599	Leflunomidum	Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	4037353010628	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	113,57	134,90	134,90	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	Młode idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	3,20
1600	Lenograstinum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909990742059	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	113,21	134,74	134,71	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,23
1601	Lenograstinum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	5 fiol. z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G	5909990742066	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	608,76	673,38	673,38	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
1602	Letrozolum	Apo-Letro, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (blister)	5909990794492	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,07	82,71	82,71	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1603	Letrozolum	Arogen, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990779840	2012-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	86,40	103,21	82,88	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	20,33
1604	Letrozolum	Aromek, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909991060718	2012-01-01/2012-11-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1605	Letrozolum	Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990799923	2012-03-01/2012-11-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1606	Letrozolum	Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990710201	2012-01-01/2012-09-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1607	Letrozolum	Femara, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990768516	2012-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	243,00	269,21	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	186,33
1608	Letrozolum	Lametta, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991061111	2012-01-01/2013-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1609	Letrozolum	Letralan, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990750627	2012-01-01/2013-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1610	Letrozolum	Letromedac, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990891788	2012-03-01/2013-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	65,09	80,63	80,63	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1611	Letrozolum	Letrozole Accord, tabl. powł., 2,5 mg	28 szt.	5909990730872	2013-07-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	54,00	68,39	68,39	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1612	Letrozolum	Letrozole Apotex, tabl. powł., 2,5 mg	30 szt. (blister)	5909990908608	2013-03-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,07	82,71	82,71	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1613	Letrozolum	Letrozole Bluefish, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990794683	2012-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	75,60	91,76	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	8,88
1614	Letrozolum	Lortanda, tabl. powł., 2,5 mg	30 szt.	5909991039158	2013-05-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	64,80	80,31	80,31	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1615	Letrozolum	Lostar, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990730353	2012-01-01/2012-11-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1616	Letrozolum	Symletrol, tabl. powł., 2,5 mg	30 szt.	5909990956395	2013-01-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	67,23	82,88	82,88	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii; Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1617	Letrozolum	Trozebax, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990924585	2012-07-01	2 lata	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	62,10	77,45	77,45	Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii		bezpłatny	0,00
1618	Leuprorelinum	Eligard 22,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 22,5 mg	1 zest. (tacki)	5909990075751	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin	786,28	865,76	852,04	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	23,32
1619	Leuprorelinum	Eligard 45 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 45 mg	1 zest. (2 strz.napeł.)	5909990634057	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin	1 571,30	1 713,88	1 704,09	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	28,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1620	Leuprorelinum	Eligard 7,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 7,5 mg	1 zest. (tacki)	5909990075768	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj. cego gonadotropin	260,98	295,74	284,01	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	14,93
1621	Leuprorelinum	Leuprostin, implant podskórny, 3,6 mg	1 szt. (impl.)	5909990836246	2012-05-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj. cego gonadotropin	217,49	249,20	249,20	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	3,20
1622	Leuprorelinum	Leuprostin, implant podskórny, 5 mg	1 szt. (impl.)	5909990836277	2012-05-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj. cego gonadotropin	652,47	722,60	722,60	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	8,96
1623	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosfery do sporz. dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 11,25 mg	1 zest.	5909990418015	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj. cego gonadotropin	895,48	980,19	795,24	Nowotwory zło liwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	193,91
1624	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosfery do sporz. dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 3,75 mg	1 zest.	5909990686117	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj. cego gonadotropin	297,60	334,12	265,08	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	72,24
1625	Levetiracetamum	Cezarius, roztwór doustny , 100 mg/ml	300 ml	5909990928149	2012-07-01	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	117,64	139,43	139,43	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
1626	Levetiracetamum	Cezarius, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990928200	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	14,63	20,11	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	3,20
1627	Levetiracetamum	Cezarius, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990928224	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	31,40	40,43	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	3,41
1628	Levetiracetamum	Cezarius, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990928231	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	48,90	60,98	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	3,85
1629	Levetiracetamum	Cezarius, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990928248	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,42
1630	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powł., 250 mg	50 szt.	5909990935130	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	16,63	22,23	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	5,32
1631	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powł., 250 mg	100 szt.	5909990935147	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	33,26	42,41	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	5,39
1632	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powł., 500 mg	50 szt.	5909990935161	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	33,26	42,41	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	5,39
1633	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powł., 500 mg	100 szt.	5909990935178	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,62	81,32	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,44
1634	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powł., 750 mg	50 szt.	5909990935192	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,90	62,04	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1635	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powl., 750 mg	100 szt	5909990935208	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	99,79	118,93	118,93	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	5,33
1636	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powl., 1000 mg	50 szt	5909990935239	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,53	81,23	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,35
1637	Levetiracetamum	Eliptus, tabl. powl., 1000 mg	100 szt	5909990935246	2012-09-01/2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	133,06	155,74	155,74	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	7,11
1638	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 750 mg	50 tabl.	5909990006649	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	162,00	180,87	60,33	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	123,74
1639	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 750 mg	100 tabl.	5909990006670	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	324,00	356,59	120,66	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	241,26
1640	Levetiracetamum	Keppra , roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml (but.)	5909990006755	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	129,60	152,11	139,43	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	15,88
1641	Levetiracetamum	Keppra , koncentrat do sporz dzenia roztworu do infuzji, 100 mg/ml	10 fiol.a 5 ml	5909990610891	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - lewetiracetam	595,03	659,00	659,00	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1642	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 250 mg	50 tabl.	5909990901111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	60,70	20,11	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	43,79
1643	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 250 mg	100 tabl.	5909990901128	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	121,63	40,22	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	84,61
1644	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990901210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	121,63	40,22	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	84,61
1645	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 500 mg	100 tabl.	5909990901227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	216,00	239,66	80,44	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	162,78
1646	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 1000 mg	50 tabl.	5909990901319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	216,00	239,66	80,44	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	162,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1647	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990901326	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	432,00	472,62	160,88	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	318,85
1648	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990900695	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	15,94	21,50	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,59
1649	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990900701	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,28
1650	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990900725	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,28
1651	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990900732	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,42
1652	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990900749	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,14	61,24	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,11
1653	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 750 mg	100 tabl.	5909990900756	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	103,24	122,58	120,66	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	7,25
1654	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990900763	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,42
1655	Levetiracetamum	Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990900770	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	140,34	163,46	160,88	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	9,69
1656	Levetiracetamum	Levetiracetam Apotex, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990949281	2013-01-01/2013-05-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	21,06	26,93	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	10,02
1657	Levetiracetamum	Levetiracetam Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990949304	2013-01-01/2013-05-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	51,80	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	14,78
1658	Levetiracetamum	Levetiracetam Apotex, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990949359	2013-01-01/2013-05-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	63,18	76,12	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	18,99
1659	Levetiracetamum	Levetiracetam Apotex, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990949373	2013-01-01/2013-05-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	81,00	96,56	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	19,68
1660	Levetiracetamum	Levetiracetam Bluefish, tabl. powł., 250 mg	50 szt.	5909990956180	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	16,42	22,01	20,11	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	5,10
1661	Levetiracetamum	Levetiracetam Bluefish, tabl. powł., 500 mg	50 szt.	5909990956197	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	30,24	39,21	39,21	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1662	Levetiracetamum	Levetiracetam Bluefish, tabl. powł., 750 mg	50 szt.	5909990956203	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,23	57,23	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
1663	Levetiracetamum	Levetiracetam Bluefish, tabl. powł., 1000 mg	50 szt.	5909990956258	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	60,48	74,81	74,81	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,56
1664	Levetiracetamum	Levetiracetam GSK, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990945139	2012-09-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	28,13	34,42	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	17,51
1665	Levetiracetamum	Levetiracetam GSK, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990945221	2012-09-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	56,88	67,44	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	30,42
1666	Levetiracetamum	Levetiracetam GSK, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990945306	2012-09-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	85,59	99,88	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	42,75
1667	Levetiracetamum	Levetiracetam GSK, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990945405	2012-09-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	114,29	131,86	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	54,98
1668	Levetiracetamum	Levetiracetam Orion, tabl. powł., 250 mg	50 szt.	5909990946440	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	16,31	21,89	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,98
1669	Levetiracetamum	Levetiracetam Orion, tabl. powł., 500 mg	50 szt.	5909990946471	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,62	41,73	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,71
1670	Levetiracetamum	Levetiracetam Orion, tabl. powł., 500 mg	100 szt.	5909990946495	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	65,23	79,85	79,85	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	3,56
1671	Levetiracetamum	Levetiracetam Orion, tabl. powł., 750 mg	50 szt.	5909990946501	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,95	62,11	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,98
1672	Levetiracetamum	Levetiracetam Orion, tabl. powł., 1000 mg	50 szt.	5909990946556	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	65,23	79,85	79,85	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	3,56
1673	Levetiracetamum	Levetiracetam Orion, tabl. powł., 1000 mg	100 szt.	5909990946570	2013-07-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	131,76	154,37	154,37	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	7,11
1674	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990879076	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	21,40	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce odpornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,49
1675	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990879106	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce odpornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1676	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990879168	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,28
1677	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990879199	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,42
1678	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990879250	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,14	61,24	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,11
1679	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg	100 tabl.	5909990879281	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	103,24	122,58	120,66	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	7,25
1680	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990879342	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,42
1681	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990879373	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	140,34	163,46	160,88	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	9,69
1682	Levetiracetamum	Levetiracetam Zdrovit, tabl. powł., 500 mg	50 szt.	5909990968725	2013-03-01/2013-05-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	48,34	58,39	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	21,37
1683	Levetiracetamum	Levetiracetam Zdrovit, tabl. powł., 1000 mg	50 szt.	5909990968824	2013-03-01/2013-05-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	96,68	113,18	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	36,30
1684	Levetiracetamum	Symetra, tabl. powł., 250 mg	50 szt.	5909990973361	2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	15,77	21,32	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,41
1685	Levetiracetamum	Symetra, tabl. powł., 500 mg	50 szt.	5909990973446	2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,18	41,26	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,24
1686	Levetiracetamum	Symetra, tabl. powł., 750 mg	50 szt.	5909990973583	2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,03	61,12	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	3,99
1687	Levetiracetamum	Symetra, tabl. powł., 1000 mg	50 szt.	5909990973682	2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,53	81,23	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,35
1688	Levetiracetamum	Trund, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml	5909990925841	2012-05-01	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	117,64	139,43	139,43	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1689	Levetiracetamum	Trund, tabl. powl., 250 mg	50 tabl.	5909990925858	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	21,40	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,49
1690	Levetiracetamum	Trund, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990925872	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,28
1691	Levetiracetamum	Trund, tabl. powl., 500 mg	100 tabl.	5909990925889	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,64	81,35	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,47
1692	Levetiracetamum	Trund, tabl. powl., 750 mg	50 tabl.	5909990925926	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,14	61,24	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,11
1693	Levetiracetamum	Trund, tabl. powl., 1000 mg	50 tabl.	5909990925940	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,64	81,35	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	4,47
1694	Levetiracetamum	Trund, tabl. powl., 1000 mg	100 tabl.	5909990925957	2012-05-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	140,34	163,46	160,88	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	9,69
1695	Levetiracetamum	Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml	300 ml	5909990935901	2012-07-01	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	117,64	139,43	139,43	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
1696	Levetiracetamum	Vetira, tabl. powl., 250 mg	50 tabletek	5909990935956	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	25,38	31,50	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	14,59
1697	Levetiracetamum	Vetira, tabl. powl., 500 mg	50 tabletek	5909990936052	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	60,96	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	23,94
1698	Levetiracetamum	Vetira, tabl. powl., 750 mg	50 tabletek	5909990936151	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	76,14	89,86	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	32,73
1699	Levetiracetamum	Vetira, tabl. powl., 1000 mg	50 tabletek	5909990936250	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	118,31	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka		ryczałt	41,43
1700	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powl., 5 mg	20 tabl.	5909990656929	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	16,98	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	9,87
1701	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	5909990656936	2013-07-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,47	21,10	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,15
1702	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powl., 5 mg	30 tabl.	5909990656943	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,65	22,50	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	11,83
1703	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, roztwór doustny , 0,5 mg/ml	200 ml	5909990904099	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	18,14	23,59	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	10,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1704	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990904129	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,47	21,10	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	11,15
1705	Levocetirizini dihydrochloridum	Votrezin, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	5909990961269	2013-07-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,09	20,70	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,75
1706	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	7 tabl.	5909990918041	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	9,65	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	7,16
1707	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990918072	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,43	32,72	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	22,77
1708	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal 0,5 , roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	200 ml (but.)	5909990619627	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	24,19	29,99	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	16,96
1709	Levocetirizini dihydrochloridum	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,77	23,54	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	13,59
1710	Levocetirizini dihydrochloridum	Zyx, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	5907695215014	2013-07-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	38,91	28,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	19,00
1711	Levocetirizini dihydrochloridum	Zyx, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765034	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,53	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	12,58
1712	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 12,5+50 mg	100 kaps.	5909990094912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,16	25,78	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,58
1713	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 100+25 mg	100 kaps.	5909990095018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	57,84	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,48
1714	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. , 50+200 mg	100 tabl.	5909990095117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85,00	103,11	103,11	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
1715	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 50+200 mg	100 kaps.	5909990095216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85,00	103,11	103,11	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
1716	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 12,5+50 mg	100 tabl.	5909990748624	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,16	25,78	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1717	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg	100 tabl.	5909990748723	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	57,84	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,48
1718	Levodopum + Benserazidum	Madopar HBS, kaps., 100+25 mg	100 kaps.	5909990377510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	57,84	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,48
1719	Levodopum + Carbidopum	Nakom, tabl. , 250+25 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990175215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	69,08	69,08	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,44
1720	Levodopum + Carbidopum	Nakom Mite, tabl. , 100+25 mg	100 tabl.	5909990175314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	43,20	54,80	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,44
1721	Levodopum + Carbidopum	Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	100 tabl. (but.)	5909990020416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	95,94	95,94	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
1722	Levomepromazinum	Lewomezin, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990896677	2012-05-01	2 lata	173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego	3,69	5,47	5,47	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
1723	Levomepromazinum	Lewomezin, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990896691	2012-05-01	2 lata	173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego	7,39	10,68	10,68	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
1724	Levomepromazinum	Tisercin, roztwór do wstrzykiwa , 25 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990183418	2012-01-01	2 lata	173.2, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania pozajelitownego	8,93	12,81	12,81	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
1725	Levomepromazinum	Tisercin, tabl. powl., 25 mg	50 tabl.	5909990193912	2012-01-01	2 lata	173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego	8,21	11,16	9,12	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	2,04
1726	Levothyroxinum natricum	Eltroxin, tabl. , 50 mcg	100 tabl. (pojem.)	5909990001613	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,64	15,64	7,88	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	11,32
1727	Levothyroxinum natricum	Eltroxin, tabl. , 100 mcg	100 tabl. (pojem.)	5909990001712	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	13,39	18,01	15,76	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	9,36
1728	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N 100, tabl. , 100 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051419	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,89	9,54	7,88	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	5,22
1729	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N 100, tabl. , 100 mcg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051426	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,24	16,79	15,76	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	8,14
1730	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N 112 , tabl. , 112 mcg	50 tabl.	5909990719006	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,70	9,55	8,83	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	4,70
1731	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N 112 , tabl. , 112 mcg	100 tabl.	5909990719020	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,67	17,54	17,54	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	7,96
1732	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N 125, tabl. , 125 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051518	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	7,19	10,30	9,85	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	4,89
1733	Levothyroxinum natricum	Euthyrox N 125, tabl. , 125 mcg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051525	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	14,44	19,72	19,70	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1734	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 137 , tabl. , 137 mcg	50 tabl.	5909990719037	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	7,31	10,64	10,64	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	4,87
1735	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 137 , tabl. , 137 mcg	100 tabl.	5909990719044	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	13,86	19,37	19,37	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	9,74
1736	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 150, tabl. , 150 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051617	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,21	11,82	11,82	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	5,33
1737	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 150, tabl. , 150 mcg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051624	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	14,73	20,59	20,59	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	10,67
1738	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 175, tabl. , 175 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051716	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	9,03	13,10	13,10	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	6,22
1739	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 200, tabl. , 200 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051815	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	9,71	14,11	14,11	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	7,11
1740	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 25, tabl. , 25 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051112	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,65	6,57	1,97	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	6,57
1741	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 25, tabl. , 25 mcg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051129	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,21	9,87	3,94	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	9,13
1742	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 50, tabl. , 50 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051211	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,92	7,44	3,94	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	6,70
1743	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 50, tabl. , 50 mcg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051228	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	10,66	13,54	7,88	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	9,22
1744	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 75, tabl. , 75 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051310	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,33	8,45	5,91	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	5,74
1745	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 75, tabl. , 75 mcg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051327	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	11,46	15,26	11,82	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	8,77
1746	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 88 , tabl. , 88 mcg	50 tabl.	5909990718986	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,29	8,71	6,93	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	4,98
1747	Levothyroxinum natriicum	Euthyrox N 88 , tabl. , 88 mcg	100 tabl.	5909990718993	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	11,25	15,48	13,87	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	7,87
1748	Levothyroxinum natriicum	Letrox 100, tabl. , 100 mcg	50 tabl.	5909990168910	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,61	8,19	7,88	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	3,87
1749	Levothyroxinum natriicum	Letrox 150, tabl. , 150 mcg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990820610	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,08	11,68	11,68	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	5,33
1750	Levothyroxinum natriicum	Letrox 50, tabl. , 50 mcg	50 tabl.	5909990374014	2012-01-01	2 lata	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,26	6,75	3,94	Niedoczynno tarczycy		ryczałt	6,01
1751	Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalinii tartras	Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwa , (20+0,025) mg/ml	10 amp.a 2 ml	5909990092819	2012-01-01	2 lata	148.0, Leki znieczulające miejscowo - lidokaina w poł czeniu z norepinefryn - roztwór do wstrzykiwa	8,59	12,35	12,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1752	Lisinoprilum	LisiHEXAL 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013417	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,54	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1753	Lisinoprilum	LisiHEXAL 20, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013516	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,20	20,18	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	15,23
1754	Lisinoprilum	LisiHEXAL 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013318	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	9,18	10,57	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,57
1755	Lisinoprilum	Lisinoratio 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939817	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,07	13,40	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,92
1756	Lisinoprilum	Lisinoratio 20, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939916	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	18,37	22,48	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	17,53
1757	Lisinoprilum	Lisinoratio 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939718	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,65	8,95	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	8,95
1758	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682409	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	8,42	9,71	2,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,71
1759	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682447	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,66	13,91	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,81
1760	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682461	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	17,39	21,26	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	16,64
1761	Lisinoprilum	Ranopril, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991132927	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	3,78	4,79	2,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,79
1762	Lisinoprilum	Ranopril, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133023	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	14,04	17,72	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	13,10
1763	Lisinoprilum	Ranopril, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133122	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,56	9,57	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	7,47
1764	Lisinoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl. , 10+5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990701803	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	22,65	25,68	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	23,20
1765	Lisinoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl. , 0,02+0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990761685	2012-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,76	28,19	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	23,24
1766	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl. , 10+12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708352	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	12,96	15,41	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	12,93
1767	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl. , 20+12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708369	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	20,52	24,76	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	19,81
1768	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl. , 20+25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991167714	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	17,50	21,39	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	16,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1769	Lithium	Lithium Carbonicum GSK, tabl. , 250 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990148714	2012-01-01	2 lata	180.0, Leki przeciwpyschotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci w glanu	5,78	8,47	8,47	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe		bezpłatny	0,00
1770	Loperamidi hydrochloridum	Loperamid WZF, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990038220	2012-01-01	2 lata	10.0, Leki przeciwbiegunkowe - loperamid	5,18	7,63	7,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	3,82
1771	Loratadinum	Aleric, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990880836	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stale postaci farmaceutyczne	15,98	20,73	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,06
1772	Loratadinum	Aleric, tabl. , 10 mg	60 tabl.	5909990944361	2012-11-01	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stale postaci farmaceutyczne	24,84	32,26	30,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,92
1773	Loratadinum	Claritime, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990121526	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stale postaci farmaceutyczne	25,92	31,26	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	20,59
1774	Loratadinum	Claritime, syrop, 1 mg/ml	120 ml	5909990355419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postaci farmaceutyczne	12,96	16,81	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	8,99
1775	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990223343	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stale postaci farmaceutyczne	26,87	34,41	30,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	13,07
1776	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990223350	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stale postaci farmaceutyczne	40,31	50,38	45,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	18,38
1777	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990739233	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stale postaci farmaceutyczne	16,20	20,96	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,29
1778	Loratadinum	Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml	120 ml	5909990739318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postaci farmaceutyczne	9,72	13,37	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1779	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990670253	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,42	33,95	30,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	12,61
1780	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990670260	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,38	45,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	18,38
1781	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990795420	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,39	22,21	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	11,54
1782	Loratadinum	Loratan, syrop, 5 mg/5ml	125 ml (but.)	5909990839018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,93	12,65	11,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,50
1783	Loratadinum	Loratan, kaps. mi kkie, 10 mg	30 kaps. (2 blist.po 15 szt.)	5909990909049	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,02	21,83	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	11,16
1784	Losartanum	Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990702886	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,04	20,67	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,49
1785	Losartanum	Cozaar, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990674411	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,35	21,01	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,83
1786	Losartanum	Cozaar, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	32,40	40,10	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,74
1787	Losartanum	Lakea, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991108212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	20,52	25,58	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,67
1788	Losartanum	Loreblok, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990770601	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,56	11,69	11,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1789	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990638659	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	40,61	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	20,25
1790	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	56 tabl.	5909990649112	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
1791	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	84 tabl. (6 blist.po 14 szt.)	5909990649129	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,92	34,86	34,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,46
1792	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990818914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	20,84	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,66
1793	Losartanum	Losacor, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991055110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	18,71	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	7,80
1794	Losartanum	Losagen, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639885	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,94
1795	Losartanum	Losagen, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639908	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,22	30,37	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,01
1796	Losartanum	Losargamma, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. powl.	5909990947164	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,83	12,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	3,85
1797	Losartanum	Losartan Arrow, tabl. powl., 50 mg	28 szt.	5909990769452	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,32	12,50	12,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,75
1798	Losartanum	Losartan Arrow, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990769469	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,08	15,57	15,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,67
1799	Losartanum	Losartan Bluefish, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990760770	2012-09-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,13	11,23	11,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,37
1800	Losartanum	Losartan Pfizer, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990809790	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,07	13,44	13,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,03
1801	Losartanum	Losartic, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621439	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	20,84	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1802	Losartanum	Lozap 50, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990573905	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,82	22,72	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	11,81
1803	Losartanum	Presartan, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724345	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	19,86	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,95
1804	Losartanum	Presartan, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724352	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	38,62	31,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,81
1805	Losartanum	Rasoltan 50, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990085644	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,83	12,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	3,85
1806	Losartanum	Sarve 50 mg, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990045594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,32	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,14
1807	Losartanum	Sortabax, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990766673	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,53	12,71	12,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,81
1808	Losartanum	Sortabax, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990766680	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,06	23,84	23,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,15
1809	Losartanum	Stadazar, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990079575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,94
1810	Losartanum	Xartan, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990481118	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,16	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	19,25
1811	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Hyzaar, tabl. powl., 100+12,5 mg	28 szt.	5909990904365	2013-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	27,51	27,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,25
1812	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990970513	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,40	40,10	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,74
1813	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Loreblok HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl.	5909990778843	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	14,55	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,37
1814	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg	56 tabl.	5909990686339	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
1815	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg	84 tabl.	5909990686360	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	45,17	43,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	14,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1816	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645565	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	32,88	40,61	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	20,25
1817	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Lorista HL, tabl. powl., 100+12,5 mg	28 tabl.	5909990816484	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,59
1818	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729685	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,77	16,16	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,98
1819	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losagen Combi, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl.	5909990833924	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,34	15,69	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,51
1820	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losargamma HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl. powl.	5909990857784	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	13,50	17,98	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,80
1821	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losargamma HCT, tabl. powl., 100+25 mg	28 tabl. powl.	5909990858088	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	27,00	34,38	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,02
1822	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losartan Hydrochlorothiazyd KRKA, tabl. powl., 50 + 12,5 mg + mg	28 szt.	5909990822980	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,08	14,35	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,31
1823	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losartan+HCT Arrow, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl.	5909990752447	2012-11-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,15	14,43	14,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,33
1824	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losartan+HCT Arrow, tabl. powl., 50+12,5 mg	30 tabl.	5909990752461	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	12,96	17,57	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,66
1825	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721641	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	17,28	22,15	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,24
1826	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721894	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	34,56	42,63	31,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	20,82
1827	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Rasoltan HCT, tabl. powl., 50 + 12,5 mg	28 sztuk	5909990926220	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	9,72	13,98	13,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,19
1828	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Rasoltan HCT, tabl. powl., 100 + 25 mg	28 sztuk	5909990926350	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	19,44	26,37	26,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,91
1829	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Sortabax HCT, tabl. powl., 0,05+0,0125 g	28 tabl.	5909990806195	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,94
1830	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Sortabax HCT, tabl. powl., 100+25 mg	28 tabl.	5909990806201	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,60
1831	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990433612	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,35	21,01	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1832	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg	28 tabl.	5909990337392	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,61	18,10	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,92
1833	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 50+12,5 mg+mg	30 szt.	5909990952106	2013-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,28	15,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,58
1834	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Losartan HCT Pfizer, tabl. powl., 100+25 mg+mg	30 szt.	5909990952373	2013-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,89	28,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,67
1835	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990611980	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,09	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,18
1836	Lovastatinum	Liprox, tabl. , 20 mg	28 tabl.	5909990842315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	16,15	4,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,11
1837	Lovastatinum	Lovasterol, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990422159	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,60	24,17	4,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,13
1838	Lovastatinum	Lovasterol, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990828425	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	17,85	2,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,22
1839	Lovastatinum	Lovastin, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990756629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	17,30	4,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,26
1840	Lynestrenolum	Orgametril, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990342617	2012-01-01	2 lata	67.0, Hormony płciowe - progestageny - lynestrenol	5,17	7,62	7,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	2,29
1841	Magnesii valproas	Dipromal, tabl. powl., 200 mg	40 tabl.	5909990167111	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	9,94	12,83	7,51	Padaczka		ryczałt	8,52
1842	Mebendazolum	Vermox, tabl. , 100 mg	6 tabl.	5909990250615	2012-01-01	2 lata	194.1, Leki przeciwwrobacze - mebendazol	8,42	12,11	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1843	Mebendazolum	Vermox, tabl. do ucia, 100 mg	6 tabl.	5909990500949	2012-01-01	2 lata	194.1, Leki przeciwwrobacze - mebendazol	6,48	10,05	10,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1844	Mebendazolum	Vermox, tabl. , 100 mg	6 tabl.	5909997012339	2012-07-01	2 lata	194.1, Leki przeciwwrobacze - mebendazol	6,46	10,03	10,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,20
1845	Medroxyprogesteroni acetat	Provera, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990236411	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	6,73	9,65	8,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1846	Medroxyprogesteronum	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwa , 150 mg/ml	1 fiol.a 3,3 ml	5909990236510	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,78	15,78	Nowotwory zło liwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	Limfangioleiomiomatoza	ryczałt	3,20
1847	Medroxyprogesteronum	Provera, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990155514	2012-01-01	2 lata	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	13,76	18,79	17,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,71
1848	Megestrolu acetat	Cachexan, zawiesina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909990614608	2012-01-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie plynne	124,20	146,73	146,73	Nowotwory zło liwe		ryczałt	6,40
1849	Megestrolu acetat	Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909990437627	2012-01-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie plynne	124,20	146,73	146,73	Nowotwory zło liwe		ryczałt	6,40
1850	Megestrolu acetat	Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909991054519	2012-01-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie plynne	124,20	146,73	146,73	Nowotwory zło liwe		ryczałt	6,40
1851	Megestrolu acetat	Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909990895977	2012-07-01	2 lata	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie plynne	119,88	142,16	142,16	Nowotwory zło liwe		ryczałt	6,40
1852	Meloxicamum	Aglan 15, tabl. , 15 mg	10 tabl.	5909990224876	2012-07-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,40	7,35	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,74
1853	Meloxicamum	Aglan 15, tabl. , 15 mg	20 tabl.	5909990224883	2012-07-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,26	13,82	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,60
1854	Meloxicamum	Aglan 15, tabl. , 15 mg	30 tabl.	5909990610006	2012-07-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,33	15,95	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,13
1855	Meloxicamum	Aspicam, tabl. , 15 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990997527	2012-03-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,21	13,76	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1856	Meloxicamum	Lorned, tabl. , 15 mg	20 tabl.	5909990573073	2012-11-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,48	9,81	9,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,91
1857	Meloxicamum	Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg	20 tabl.	5909990042401	2012-07-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,94	13,48	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,26
1858	Meloxicamum	Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg	30 tabl.	5909990042425	2012-07-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,80	15,39	15,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,70
1859	Meloxicamum	Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg	10 tabl.	5909990637034	2012-07-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,18	7,12	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,51
1860	Meloxicamum	Meloxistad, tabl. powl., 15 mg	10 tabl.	5909990431151	2012-03-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,67	7,63	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,02
1861	Meloxicamum	Meloxistad, tabl. powl., 15 mg	20 tabl.	5909990431168	2012-03-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,80	14,39	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,17
1862	Meloxicamum	Movalis, tabl. , 15 mg	20 tabl.	5909990464418	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,23	19,08	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,86
1863	Meloxicamum	Movalis, tabl. , 15 mg	10 tabl.	5909990464425	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	9,98	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,37
1864	Meloxicamum	Trosicam, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	20 tabl.	5909990866625	2012-11-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,51	10,90	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,68
1865	Melphalanum	Alkeran, tabl.powl., 2 mg	25 tabl.	5909990283514	2012-11-01	2 lata	235.0, Leki przeciwnowotworowe - leki alkiluj ce - melfalan	292,05	329,81	329,81	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1866	Mercaptopurinum	Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01/2012-03-01	2 lata	230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	21,22	28,36	28,36	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
1867	Mercaptopurinum	Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01/2012-03-01	2 lata	230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	21,22	28,36	28,36	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego		ryczałt	3,20
1868	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	56,57	50,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,52
1869	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	56,57	50,25	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	9,52
1870	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,08	40,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	22,49
1871	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,08	40,85	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	13,43
1872	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	111,94	100,50	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	14,64
1873	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	111,94	100,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	14,64
1874	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	86,36	81,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	29,18
1875	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	86,36	81,69	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	8,23
1876	Mesalazinum	Crohnax, czopki, 250 mg	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,07	34,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1877	Mesalazinum	Crohnax, czopki, 250 mg	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,07	34,07	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
1878	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1000 mg	28 czop. (blist.)	5909990656813	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	191,74	187,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1879	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1000 mg	28 czop. (blis.)	5909990656813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	191,74	187,60	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	7,34
1880	Mesalazinum	Pentasa , czopki, 1000 mg	14 czop. (blis.)	5909990656820	2012-01-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	100,17	93,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,57
1881	Mesalazinum	Pentasa , czopki, 1000 mg	14 czop. (blis.)	5909990656820	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	100,17	93,80	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	9,57
1882	Mesalazinum	Pentasa , tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blis.)	5909990662111	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	153,40	81,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	96,22
1883	Mesalazinum	Pentasa , tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blis.)	5909990662111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	153,40	81,69	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	75,27
1884	Mesalazinum	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szt.a 100 ml	5909990818815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81,00	93,27	36,48	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	59,99
1885	Mesalazinum	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szt.a 100 ml	5909990818815	2012-01-01	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81,00	93,27	36,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	59,99
1886	Mesalazinum	Pentasa, granulat o przedfu onym uwalnianiu, 1 g	50 sasz.	5909990855315	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	153,40	81,69	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	75,27
1887	Mesalazinum	Salofalk , zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml	7 but.a 60 ml	5909990970117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	123,47	145,93	145,93	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
1888	Mesalazinum	Salofalk 1 g, czopki, 1 g	30 czop.	5909990806430	2012-05-01	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	192,04	192,04	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego		ryczałt	3,20
1889	Mesalazinum	Salofalk 250, czopki, 250 mg	30 czop.	5909990088829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	47,73	59,47	50,25	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	12,42
1890	Mesalazinum	Salofalk 250, tabl. dojel., 250 mg	50 tabl.	5909990400010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	33,33	20,42	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	16,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1891	Mesalazinum	Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990400119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	53,26	40,85	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	15,61
1892	Mesalazinum	Salofalk 500, czopki, 500 mg	30 czop.	5909990422227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postaci farmaceutyczne	82,66	100,50	100,50	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
1893	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,11	4,52	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,53
1894	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990765386	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,38	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1895	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765393	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,47	6,79	6,79	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1896	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990765409	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,77	13,92	13,92	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1897	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,50	8,15	8,15	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1898	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 1000 mg	60 kaps. (6 blist.po 10)	5909990765430	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,56	16,17	16,17	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1899	Metforminum	Etform 500, tabl. powl., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698141	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,85	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,67
1900	Metforminum	Etform 500, tabl. powl., 500 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990698172	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	8,42	12,16	12,16	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1901	Metforminum	Etform 850, tabl. powl., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698257	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	7,99	12,03	12,03	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1902	Metforminum	Etform 850, tabl. powl., 850 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990698271	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,96	18,33	18,33	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,08
1903	Metforminum	Formetic, tabl. powl., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078943	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,85	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,86
1904	Metforminum	Formetic, tabl. powl., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078950	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,60	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,42
1905	Metforminum	Formetic, tabl. powl., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078974	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,78	8,45	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1906	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078981	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,88	16,52	16,52	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1907	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079001	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,09	7,09	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1908	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990079025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,61	13,76	13,76	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1909	Metforminum	Glucophage, tabl. powł., 850 mg	blister 60 sztuk	5909990789306	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,91	14,06	14,06	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1910	Metforminum	Glucophage 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990717248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,36	9,06	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,88
1911	Metforminum	Glucophage 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990789276	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,05	5,50	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,51
1912	Metforminum	Glucophage 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990789290	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,83	8,22	7,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1913	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 750 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990213429	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	14,04	16,70	6,29	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	13,61
1914	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 750 mg	blister 60 sztuk	5909990213436	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	27,22	32,07	12,57	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	22,70
1915	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990624751	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	10,31	12,14	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	11,15
1916	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg	blister 60 sztuk	5909990624768	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	18,14	21,55	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	16,37
1917	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1000 mg	60 tabl.	5909990864461	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	36,29	42,39	16,76	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	28,83
1918	Metforminum	Metfogamma 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl.	5909990654598	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,40	8,04	8,04	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1919	Metforminum	Metfogamma 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909991033019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,02	4,41	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1920	Metforminum	Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg	30 tabl.	5909991032913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,00	6,29	6,29	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1921	Metforminum	Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053056	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,38	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1922	Metforminum	Metformax 500, tabl. , 500 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990126316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,85	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,86
1923	Metforminum	Metformax 850, tabl. , 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,40	7,77	7,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,85
1924	Metforminum	Metformax SR 500, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652112	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,07	10,83	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	9,84
1925	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705474	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,48	3,85	3,85	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1926	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705726	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,56	5,81	5,81	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1927	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705894	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,48	7,07	7,07	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1928	Metforminum	Metformin Galena, tabl. , 500 mg	30 tabl.	5909990462018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,19	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1929	Metforminum	Metformin Galena, tabl. , 850 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990928019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,09	7,09	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1930	Metforminum	Metifor, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,19	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1931	Metforminum	Metral, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,19	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1932	Metforminum	Metral, tabl. , 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,89	6,16	6,16	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
1933	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990220984	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,85	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1934	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	60 tabl. (4 blist.po 15 szt.)	5909990220991	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,73	17,41	16,76	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,85
1935	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990221004	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	19,09	25,37	25,14	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	5,03
1936	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	120 tabl. (8 blist.po 15 szt.)	5909990221028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	25,46	33,12	33,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	6,40
1937	Metforminum	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	30 tabl.	5909990457212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,35	4,77	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,78
1938	Metforminum	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	60 tabl.	5909990457229	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,60	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,42
1939	Metforminum	Siofor 850, tabl. powl., 850 mg	30 tabl.	5909990457311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,18	7,53	7,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,61
1940	Metforminum	Siofor 850, tabl. powl., 850 mg	60 szt.	5909990457328	2013-07-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,72	13,86	13,86	Cukrzyca		ryczałt	3,20
1941	Methadonum	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	20 ml (but.)	5909990718917	2012-01-01	2 lata	150.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - metadon	5,18	7,08	5,08	Nowotwory zło liwe		ryczałt	5,20
1942	Methadonum	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	10 ml (but.)	5909990719013	2012-01-01	2 lata	150.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - metadon	4,86	5,95	2,54	Nowotwory zło liwe		ryczałt	5,95
1943	Methadonum	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	100 ml	5909990792016	2012-01-01	2 lata	150.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - metadon	18,79	25,40	25,40	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1944	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (0,375 ml)	5907626701852	2013-07-01	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	20,16	27,08	25,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,52
1945	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (0,5 ml)	5907626701913	2013-07-01	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	26,89	35,28	34,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,13
1946	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (0,75 ml)	5907626702033	2013-07-01	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	40,33	51,52	51,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1947	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (1 ml)	5909990735235	2013-07-01	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	53,77	67,20	67,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1948	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (1,25 ml)	5909990735266	2013-07-01	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	67,23	82,88	82,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1949	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (1,5 ml)	5909990735297	2013-07-01	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	80,67	98,29	98,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
1950	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,2 ml	5909990791309	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	49,68	59,44	34,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	28,29
1951	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,3 ml	5909990791361	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	58,15	70,41	51,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	22,09
1952	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,4 ml	5909990791446	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	77,52	92,37	68,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	26,88
1953	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,5 ml	5909990791491	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	89,64	106,64	85,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	23,97
1954	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5 mg	50 tabl.	5909990453726	2012-03-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	8,09	11,65	10,49	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,16
1955	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5 mg	50 tabl.	5909990453726	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	8,09	11,65	10,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziairniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	6,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1956	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5 mg	50 tabl.	5909990453825	2012-03-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,18	22,08	20,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,10
1957	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5 mg	50 tabl.	5909990453825	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,18	22,08	20,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziaarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	11,77
1958	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg	50 tabl.	5909990453924	2012-03-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	32,36	41,95	41,95	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
1959	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg	50 tabl.	5909990453924	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	32,36	41,95	41,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziaarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	21,33
1960	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 2,5 mg	100 tabl. (but.)	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,09	20,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,11
1961	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 2,5 mg	100 tabl. (but.)	5909990111619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,09	20,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziaarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	11,78
1962	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 10 mg	100 tabl. (1 poj.po100 szt)	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	64,80	80,05	80,05	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
1963	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 10 mg	100 tabl. (1 poj.po100 szt)	5909990730346	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	64,80	80,05	80,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziaarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	42,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1964	Methoxsalenum	Oxsoralen, kaps. mi kkie, 10 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244713	2012-01-01	2 lata	52.0. Leki przeciwluszczycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metoksalen	12,79	17,78	17,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,33
1965	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 18 mg	30 tabl. (but.)	5909990655021	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	85,00	102,61	88,39	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	17,42
1966	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 36 mg	30 tabl. (but.)	5909990655038	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	151,20	176,78	176,78	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,84
1967	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046652	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	17,71	25,72	25,72	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1968	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046669	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	43,20	57,71	57,71	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1969	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990046676	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	105,21	105,21	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,56
1970	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652198	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	25,92	36,43	36,43	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1971	Methylphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046683	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	105,21	105,21	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972	Methylphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652204	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	51,84	67,90	67,90	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1973	Methylphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046638	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	7,56	12,48	12,48	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1974	Methylphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046645	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	21,60	30,96	30,96	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1975	Methylphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652181	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	12,53	19,12	19,12	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1976	Methylphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047888	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	76,92	93,46	81,84	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	14,82
1977	Methylphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652235	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	44,56	56,18	49,11	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	10,27
1978	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047970	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	161,69	187,31	163,69	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	27,18
1979	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652242	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	92,83	111,35	98,21	Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	16,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1980	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048052	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	140,42	166,91	166,91	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	5,33
1981	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652259	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	81,14	101,19	101,19	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	3,20
1982	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048083	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	190,75	222,12	222,12	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	7,11
1983	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652266	2012-01-01	2 lata	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	110,24	133,80	133,80	Zespół nadpobudliwo ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia		ryczałt	4,27
1984	Methylprednisolonum	Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwa , 40 mg/ml	1 fiol.a 1 ml	5909990154814	2012-01-01	2 lata	82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedlu onym uwalnianiu	5,51	8,10	8,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,05
1985	Methylprednisolonum	Medrol, tabl. , 4 mg	30 tabl. (blist.)	5909990683123	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	7,30	10,19	8,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	5,29
1986	Methylprednisolonum	Medrol, tabl. , 16 mg	50 tabl. (blist.)	5909990683215	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	51,68	63,61	53,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	21,02
1987	Methylprednisolonum	Meprelon, tabl. , 8 mg	30 szt.	5909990834464	2013-05-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	11,02	15,77	15,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,41
1988	Methylprednisolonum	Meprelon, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990834501	2012-03-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	5,51	8,29	8,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,39
1989	Methylprednisolonum	Meprelon, tabl. , 16 mg	30 tabl.	5909990835539	2012-03-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	22,03	29,75	29,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	6,83
1990	Methylprednisolonum	Metypred, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990316519	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	6,46	9,30	8,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,40
1991	Methylprednisolonum	Metypred, tabl. , 16 mg	30 tabl.	5909990316618	2012-01-01	2 lata	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	24,51	32,38	32,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1992	Methylprednisolonum	Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwa, 500 mg	1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem	5909990236718	2012-07-01	2 lata	82.1. Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon	35,05	45,22	45,22	Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego		ryczałt	3,20
1993	Methylprednisolonum	Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwa, 1000 mg	1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem	5909990236817	2012-07-01	2 lata	82.1. Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon	84,49	101,49	90,44	Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego		ryczałt	14,25
1994	Methylprednisolonum + Lidocainum	Depo-Medrol z Lidokain, zawiesina do wstrzykiwa, 40+10 mg/ml	1 fiolka 1 ml	5909990236312	2012-01-01	2 lata	82.2. Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłużonym uwalnianiu	5,56	8,14	8,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	4,09
1995	Metildigoxinum	Bemecor, tabl., 0,1 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990174614	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy naparstnicy	4,47	5,23	1,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,23
1996	Metoprololum	Metocard, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990034420	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	3,95	5,34	3,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,63
1997	Metoprololum	Metocard, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990034529	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,38	8,99	7,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,37
1998	Mianserinum	Deprexolet, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909991120948	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6,59	9,79	9,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	3,03
1999	Mianserinum	Deprexolet, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (blist.)	5909991121051	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	22,14	29,42	28,97	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	9,14
2000	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990157716	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	9,07	12,41	9,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	5,65
2001	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990157822	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	26,46	34,00	28,97	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	13,72
2002	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 60 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990157914	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	47,63	59,59	57,94	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	19,03
2003	Mianserinum	Miansec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990796618	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	7,56	10,81	9,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	4,05
2004	Mianserinum	Miansec, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990796625	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,38	28,61	28,61	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	8,58
2005	Mianserinum	Miansec 30, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (1 blist. po 20 szt.)	5909991124311	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14,58	20,02	19,31	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	6,50
2006	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990713462	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	28,97	28,97	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	8,69
2007	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990764242	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	28,97	28,97	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	8,69
2008	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990883813	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6,75	9,96	9,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	3,20
2009	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990883820	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	28,97	28,97	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	8,69
2010	Mianserinum	Miansegen, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990883929	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14,58	20,02	19,31	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe		30%	6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2011	Miconazolom	Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg	15 tabl.	5909990281312	2012-01-01	2 lata	59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodnie imidazolu o działaniu przeciwrzybiczym	6,05	8,77	8,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,45
2012	Miconazolom + Mazipredonum	Mycosolon, ma , 20+2,5 mg/g	15 g	5909990129812	2012-01-01	2 lata	49.0. Miconazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skór	7,21	10,43	10,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,22
2013	Mieszanki wyci gów alergenowych (pochodzenia ro linnego, zwierz cego, roztoczy, grzybów)	Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub st enie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fiol.a 5 ml	5909990820511	2012-01-01	2 lata	214.5. Alergeny ró ne mieszane - produkty do leczenia podstawowego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
2014	Mieszanki wyci gów alergenowych (pochodzenia ro linnego, zwierz cego, roztoczy, grzybów)	Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , 10 IR/ml	1 fiol.a 5 ml	5909990820528	2012-01-01	2 lata	214.6. Alergeny ró ne mieszane - produkty do leczenia podtrzymuj cego	133,56	157,14	157,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
2015	Moclobemidum	Aurorix, tabl. powl., 150 mg	30 tabl.	5909990094813	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	18,68	23,93	17,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	11,82
2016	Moclobemidum	Aurorix, tabl. powl., 300 mg	30 tabl.	5909990419814	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	42,34	51,33	34,60	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	27,11
2017	Moclobemidum	Mobemid, tabl. powl., 150 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990966813	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	12,96	17,87	17,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	5,76
2018	Moclobemidum	Moklar, tabl. powl., 150 mg	30 tabl.	5909990953714	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	12,42	17,30	17,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	5,19
2019	Mometasonum	Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 g/dawk	1 poj.a 60 daw.	5909991106638	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	101,52	119,06	84,94	Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	40,52
2020	Mometasonum	Elosone, krem, 1 mg/g	15 g	5909990949816	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	8,64	10,74	5,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,05
2021	Mometasonum	Elosone, krem, 1 mg/g	30 g	5909990949823	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	17,06	20,95	10,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,57
2022	Mometasonum	Momederm, ma , 1 mg/g	15 g	5909991041014	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania	9,29	11,43	5,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,74
2023	Montelukastum	Astmodil, tabl. powl., 10 mg	28 tabs.	5909990881734	2012-05-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	21,49	28,71	28,71	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	8,61
2024	Montelukastum	Astmodil, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabs.	5909990881758	2012-07-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	14,47	18,58	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	10,51
2025	Montelukastum	Astmodil, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabs.	5909990881772	2012-07-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,20	20,96	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	10,87
2026	Montelukastum	Drimon, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663095	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	27,00	31,87	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	23,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2027	Montelukastum	Drimon, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663149	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	27,00	32,41	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	22,32
2028	Montelukastum	Drimon, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663231	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	39,42	47,72	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	27,54
2029	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719709	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	27,00	31,87	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	23,80
2030	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719754	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	27,00	32,41	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	22,32
2031	Montelukastum	Eonic, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719778	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	27,00	34,55	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	14,37
2032	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668120	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,32	21,09	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	11,00
2033	Montelukastum	Milukante, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668137	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	25,60	33,07	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	12,89
2034	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668144	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	14,58	18,70	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	10,63
2035	Montelukastum	Monkasta, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662647	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	20,47	25,49	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	15,40
2036	Montelukastum	Monkasta, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662685	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	17,06	21,33	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	13,26
2037	Montelukastum	Monkasta, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990671243	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	26,46	33,98	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	13,80
2038	Montelukastum	Montelukast Arrow, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	5909991000745	2013-07-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	19,39	26,49	26,49	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	7,95
2039	Montelukastum	Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl.	5909990871650	2012-09-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	8,53	12,29	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040	Montelukastum	Montelukast Bluefish, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl.	5909990871766	2012-09-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	10,58	15,00	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	4,91
2041	Montelukastum	Montelukast Bluefish, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990871858	2012-09-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	19,44	26,54	26,54	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	7,96
2042	Montelukastum	Montelukast STADA, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl.	5909990702206	2012-03-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	17,11	21,39	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	13,32
2043	Montelukastum	Montelukast STADA, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl.	5909990702220	2012-03-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	20,52	25,54	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	15,45
2044	Montelukastum	Montelukast STADA, tabl. do rozgryzania i ucia, 10 mg	28 tabl.	5909990702251	2012-03-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	35,64	43,71	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	23,53
2045	Montelukastum	Montelukast Sandoz, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990780266	2012-05-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	30,24	37,99	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	17,81
2046	Montelukastum	Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl.	5909990803743	2012-03-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	17,11	21,39	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	13,32
2047	Montelukastum	Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl.	5909990803767	2012-03-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	21,38	26,45	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	16,36
2048	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (pojem.HDPE)	5909990736683	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	18,36	23,25	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	13,16
2049	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (pojem.HDPE)	5909990736690	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,20	20,42	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	12,35
2050	Montelukastum	Montespir, tabl. powł., 10 mg	28 tabl., (poj. HDPE)	5909990787487	2012-05-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	23,76	31,12	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	10,94
2051	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690336	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	15,55	19,73	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	11,66
2052	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690343	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	20,52	25,54	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	15,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2053	Montelukastum	Montessan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690350	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	35,64	43,71	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	23,53
2054	Montelukastum	Montest , tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671182	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	17,11	21,39	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	13,32
2055	Montelukastum	Montest , tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671205	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	20,52	25,54	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	15,45
2056	Montelukastum	Montest , tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671229	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	27,00	34,55	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	14,37
2057	Montelukastum	Orilukast, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl.	5909990893188	2012-07-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	14,69	18,82	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	10,75
2058	Montelukastum	Orilukast, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl.	5909990893263	2012-07-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,42	21,20	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	11,11
2059	Montelukastum	Orilukast, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990893294	2012-07-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	22,68	29,98	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	9,80
2060	Montelukastum	Promonta, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (blist.)	5909990671052	2012-05-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,47	20,71	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	12,64
2061	Montelukastum	Promonta, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990671076	2012-05-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,47	21,25	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	11,16
2062	Montelukastum	Promonta, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blist.)	5909990671090	2012-05-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	21,60	28,83	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	8,65
2063	Montelukastum	Spirokast, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990801442	2012-05-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	42,01	50,46	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	30,28
2064	Montelukastum	Symlukast 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697939	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	21,50	28,72	28,72	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	8,62
2065	Montelukastum	Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697762	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,41	20,64	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	12,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2066	Montelukastum	Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697892	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	16,41	21,18	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	11,09
2067	Montelukastum	Vizendo 10 mg, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990760398	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	36,72	44,86	28,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	24,68
2068	Montelukastum	Vizendo 4 mg, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765737	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	29,16	34,16	11,53	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	26,09
2069	Montelukastum	Vizendo 5 mg, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765751	2012-01-01	2 lata	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych	29,16	34,70	14,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		30%	24,61
2070	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	9,90	12,67	6,62	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	6,05
2071	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	9,90	12,67	6,62	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	9,25
2072	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	14,04	19,75	19,75	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2073	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	14,04	19,75	19,75	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	3,20
2074	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	25,92	35,02	35,02	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2075	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	25,92	35,02	35,02	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia		ryczałt	3,20
2076	Morphinum	Doltard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedfu onym uwalnianiu	52,92	66,20	66,20	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2077	Morphinum	Doltard, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	52,92	66,20	66,20	Neuralgia popólpa cowa przewlekla, Wieloobjawowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspólczulna oraz typu II - kaulgalgia		ryczałt	3,20
2078	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	28,08	34,63	19,86	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	14,77
2079	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	28,08	34,63	19,86	Neuralgia popólpa cowa przewlekla, Wieloobjawowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspólczulna oraz typu II - kaulgalgia		ryczałt	17,97
2080	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	50,76	63,35	59,58	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	3,77
2081	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	50,76	63,35	59,58	Neuralgia popólpa cowa przewlekla, Wieloobjawowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspólczulna oraz typu II - kaulgalgia		ryczałt	6,97
2082	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	109,62	129,75	119,16	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	10,59
2083	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	109,62	129,75	119,16	Neuralgia popólpa cowa przewlekla, Wieloobjawowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspólczulna oraz typu II - kaulgalgia		ryczałt	14,43
2084	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	172,80	199,88	198,60	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,28
2085	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	172,80	199,88	198,60	Neuralgia popólpa cowa przewlekla, Wieloobjawowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspólczulna oraz typu II - kaulgalgia		ryczałt	7,68
2086	Morphinum	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedlu onym uwalnianiu	334,80	375,80	375,80	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2087	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	334,80	375,80	375,80	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	12,80
2088	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,80	13,84	8,30	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	5,54
2089	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,80	13,84	8,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	8,74
2090	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,61	16,61	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2091	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,61	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
2092	Morphinum	Sevredol, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu	64,80	80,06	80,06	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2093	Morphinum	Sevredol, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu	64,80	80,06	80,06	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	3,20
2094	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	16,20	20,20	9,93	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	10,27
2095	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	16,20	20,20	9,93	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	13,47
2096	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743926	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	19,44	26,89	26,89	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2097	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743926	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	19,44	26,89	26,89	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	3,20
2098	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	30,67	42,06	42,06	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2099	Morphinum	Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	30,67	42,06	42,06	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia		ryczałt	3,20
2100	Morphinum	Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	56,16	72,24	72,24	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2101	Morphinum	Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	56,16	72,24	72,24	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia		ryczałt	3,20
2102	Morphinum	Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	90,72	112,87	112,87	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2103	Morphinum	Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	90,72	112,87	112,87	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia		ryczałt	6,40
2104	Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl. , 500 mg	50 tabl.	5909990707515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	367,12	367,12	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odpomo ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2105	Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990707614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	367,12	367,12	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2106	Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	110 g (175 ml)	5909990980918	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	456,95	508,98	508,98	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2107	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990752003	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	143,22	143,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2108	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	300 kaps. (30 blist.po 10 szt.)	5909990752034	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	313,34	313,34	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2109	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powl., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990752355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	178,20	210,04	210,04	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2110	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powl., 500 mg	150 tabl. (15 blist.po 10 szt.)	5909990752362	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,60	605,12	605,12	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Mycophenolas mofetil	Mycofenor, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990915163	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	135,00	164,25	164,25	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2112	Mycophenolas mofetil	Mycofenor, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990918584	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	114,48	142,50	142,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2113	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg	50 szt.	5909990750993	2013-07-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	109,08	136,77	136,77	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku		ryczałt	3,20
2114	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg	100 szt.	5909990754472	2013-07-01	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	109,08	136,77	136,77	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku		ryczałt	3,20
2115	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990718375	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	315,94	315,94	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2116	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990718405	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	315,94	315,94	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2117	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 250, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10)	5909990074563	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	114,48	142,50	142,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2118	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 500, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990715268	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	140,40	169,97	169,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2119	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990807703	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	162,00	192,87	192,87	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990807741	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	162,00	192,87	192,87	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2121	Mycophenolas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990638185	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,16	366,88	366,88	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2122	Mycophenolas mofetil	Myfenax, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990638208	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,16	366,88	366,88	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2123	Mycophenolas mofetil	Nolfemic, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990885091	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	297,00	335,97	335,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2124	Mycophenolas mofetil	Nolfemic, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990885107	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	297,00	335,97	335,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
2125	Nabumetonum	Nabuton VP, tabl. , 0,5 g	20 tabl.	5909990962419	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	16,20	18,80	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,19
2126	Nabumetonum	Nabuton VP, tabl. , 0,5 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990962426	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	44,28	50,88	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	43,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2127	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3 ml	5909990075621	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,14	53,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	10,23

												<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2128	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990075720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	103,47	122,97	106,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	19,94

													ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2129	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990075829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	160,54	186,65	177,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	13,17

												<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml	10 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990716821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	64,39	79,13	70,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	11,51

												<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2131	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990716920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128,00	150,57	141,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	12,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2132	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990836932	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	183,88	212,20	212,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążymy po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	4,27

												<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2133	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990837038	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	263,00	297,67	283,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	20,09

													<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2134	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990837137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	307,17	346,08	346,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	7,11

													ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwiazane jest to ze wzrostem ryzyka wystapienia ylnej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dlu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2135	Naproxenum	Anapran, tabl. powl., 275 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990615438	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,72	12,10	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,23
2136	Naproxenum	Anapran, tabl. powl., 550 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990624515	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,82	22,08	11,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,34
2137	Naproxenum	Anapran, tabl. powl., 275 mg	60 tabl.	5909990948536	2012-11-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	18,63	23,94	17,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,33
2138	Naproxenum	Anapran, tabl. powl., 550 mg	60 tabl.	5909990948543	2012-11-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	33,80	42,36	34,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	25,14
2139	Naproxenum	Apo-Napro, tabl. , 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990661404	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,55	11,40	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,49
2140	Naproxenum	Apo-Napro, tabl. , 250 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990661435	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	26,21	32,94	23,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	21,20
2141	Naproxenum	Apo-Napro, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990661442	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,17	22,14	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,32
2142	Naproxenum	Naproxen 250 Hasco, tabl. , 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991040529	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,73	11,58	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,67
2143	Naproxenum	Naproxen 250 Hasco, tabl. , 250 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991040536	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,44	18,85	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2144	Naproxenum	Naproxen 500 Hasco, tabl. , 500 mg	15 tabl. (blist.)	5909990644179	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,56	11,41	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,50
2145	Naproxenum	Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg	30 tabl.	5909990644186	2013-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,23	20,08	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,26
2146	Naproxenum	Naproxen Hasco, czopki, 250 mg	10 czop.	5909990914319	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	6,48	7,40	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,48
2147	Naproxenum	Naproxen Hasco, czopki, 500 mg	10 czop.	5909990914418	2012-01-01	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	9,72	11,36	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,52
2148	Naproxenum	Naproxen Polfarmex, tabl. , 250 mg	50 tabl. (5 blister po 10 szt.)	5909990466726	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,36	18,75	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,23
2149	Naproxenum	Naproxen Polfarmex, tabl. , 500 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909990466818	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	16,31	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,09
2150	Naproxenum	Naproxen Polfarmex, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blistry x10)	5909990860685	2012-09-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	16,96	21,92	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,10
2151	Naproxenum	Naproxen Polfarmex, tabl. , 250 mg	30 tabl. (3 blistry x10)	5909990860692	2012-09-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,48	11,32	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,41
2152	Naproxenum	Pabi-Naproxen, tabl. , 250 mg	50 tabl.	5909990133215	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,00	19,43	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,91
2153	Naproxenum	Pabi-Naproxen, tabl. , 500 mg	20 tabl.	5909990133314	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	16,31	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	11,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2154	Naproxenum	Pabi-Naproxen, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	100 ml	5909990170814	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,64	19,48	19,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,74
2155	Natrii chloridum	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwa , 9 mg/ ml	100 amp.a 5 ml (tworz.)	5909990248452	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	22,93	28,72	17,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	19,73
2156	Natrii chloridum	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwa , 9 mg/ ml	100 amp.a 10 ml (tworz.)	5909990248469	2012-01-01	2 lata	218.1, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	27,43	35,95	35,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	17,98
2157	Natrii cromoglicas	Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml	50 amp.a 2 ml	5909990375318	2012-01-01	2 lata	202.0, Wziewne kromony	33,48	43,31	43,31	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,20
2158	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	56,16	70,33	70,33	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
2159	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	56,16	70,33	70,33	Padaczka		ryczałt	3,56
2160	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	32,40	42,51	42,51	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
2161	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	32,40	42,51	42,51	Padaczka		ryczałt	3,20
2162	Natrii valproas	Convulex , syrop, 50 ml	100 ml	5909990023912	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	8,59	10,60	4,69	Padaczka		ryczałt	9,11
2163	Natrii valproas	Depakine , syrop, 288,2 mg/5ml	150 ml	5909990307418	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	12,84	16,04	8,12	Padaczka		ryczałt	11,12
2164	Natrii valproas	Orfiril 150, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990414116	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	10,29	13,08	7,04	Padaczka		ryczałt	9,24
2165	Natrii valproas	Orfiril 300, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990414314	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,06	18,64	14,09	Padaczka		ryczałt	7,75
2166	Natrii valproas	Orfiril 300 retard, tabl. retard, 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu	25,10	31,89	24,17	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	7,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2167	Natrii valproas	Orfiril 300 retard, tabl. retard, 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	25,10	31,89	24,17	Padaczka		ryczałt	10,92
2168	Natrii valproas	Orfiril 600, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990414512	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o normalnym uwalnianiu	23,64	30,90	28,17	Padaczka		ryczałt	5,93
2169	Natrii valproas	Orfiril long 1000, minisaszetki, 1000 mg	50 minisasz.	5909990987719	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	59,08	73,41	73,41	Padaczka		ryczałt	3,56
2170	Natrii valproas	Orfiril long 150, kaps., 150 mg	50 kaps.	5909990987412	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	12,53	16,62	12,09	Padaczka		ryczałt	7,73
2171	Natrii valproas	Orfiril long 300, kaps., 300 mg	50 kaps.	5909990987511	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	25,10	31,89	24,17	Padaczka		ryczałt	10,92
2172	Natrii valproas	Orfiril long 500, minisaszetki, 500 mg	50 minisasz.	5909990987610	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o przedłu onym uwalnianiu	35,10	44,43	40,28	Padaczka		ryczałt	7,35
2173	Natrii valproas	Orfiril roztwór doustny , roztwór doustny , 300 mg/5ml	250 ml	5909990414215	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaciach farmaceutycznych o normalnym uwalnianiu	21,44	26,47	14,09	Padaczka		ryczałt	15,58
2174	Nebivololum	Nebicard, tabl., 5 mg	28 szt.	5909990685189	2013-07-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	14,21	17,97	10,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,22
2175	Nebivololum	Nebilenin, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990689774	2012-05-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	16,74	20,66	10,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	12,91
2176	Nebivololum	Nebilet, tabl., 5 mg	28 szt.	5909990670185	2013-05-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	14,26	18,04	10,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,29
2177	Nebivololum	Nebispes, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990673865	2012-05-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,23	19,05	10,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,30
2178	Nebivololum	NebivoLEK, tabl., 5 mg	28 szt.	5909990653300	2013-03-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,12	18,94	10,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,19
2179	Nebivololum	Nedal, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blistry po 14szt.)	5909990642809	2012-11-01	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,34	19,18	10,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,43
2180	Nicotinamidum	Vitaminum PP GSK, tabl., 200 mg	20 szt. (1 blist.po 20)	5909990150717	2013-07-01	2 lata	19.0, Witaminy - nikotynamid	1,24	1,83	1,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2181	Nimesulidum	Aulin, tabl. , 100 mg	15 tabl.	5909990411320	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,02	8,66	3,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,71
2182	Nimesulidum	Aulin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990411337	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,50	16,64	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,73
2183	Nimesulidum	Aulin, granulát do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 szaszetek	5909990411436	2013-07-01	2 lata	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,18	18,34	18,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,17
2184	Nimesulidum	Minesulin, tabl. , 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990997114	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,05	6,16	2,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,86
2185	Nimesulidum	Minesulin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990997138	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,23	16,35	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,44
2186	Nimesulidum	Minesulin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 sasz.a 2g	5909990997220	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,23	18,38	18,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,19
2187	Nimesulidum	Nimesil, granulát do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 sasz.a 2g	5909991040338	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,50	18,67	18,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,34
2188	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990139613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
2189	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990139620	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,40
2190	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990277216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,26	4,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2191	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990277223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,46	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	5,35
2192	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694754	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,40
2193	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694761	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
2194	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694778	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,26	4,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,30
2195	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694785	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,46	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	5,35
2196	Norfloxacinum	Nolicin, tabl. powl., 400 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990085323	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,40	16,00	16,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,00
2197	Norfloxacinum	Norsept, tabl. powl., 400 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991102838	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	10,58	15,13	15,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,57
2198	Ocreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 50 g/ml	5 amp.a 1 ml	5909990042715	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	37,80	50,29	50,29	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
2199	Ocreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 100 g/ml	5 amp.a 1 ml	5909990042913	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	48,60	65,74	65,74	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
2200	Ocreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 30 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459513	2012-07-01	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	6 480,00	6 983,16	6 983,16	Akromegalia		ryczałt	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2201	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 20 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459612	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotydy	4 320,00	4 664,94	4 655,44	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,70
2202	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 10 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459711	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotydy	2 160,00	2 346,72	2 327,72	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	22,20
2203	Ofloxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990111213	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,04	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	12,04
2204	Ofloxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990111213	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,04	8,00	Grupa, tym również grupa wielolekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	8,04
2205	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990806751	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,16	40,66	40,66	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2206	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990806799	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	58,32	75,57	75,57	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2207	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	5909990806843	2012-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	91,80	113,69	113,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,48
2208	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990806881	2012-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	116,64	141,39	141,39	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97
2209	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (blist.)	5909990703302	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,81	67,16	63,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,69
2210	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990703685	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	107,61	128,20	127,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,06
2211	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990697526	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	62,42	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2212	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (blis. Alu/Alu)	5909990697649	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,36	119,08	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,43
2213	Olanzapinum	Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	5909990896738	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,04	53,26	53,26	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2214	Olanzapinum	Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	5909990896745	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	82,08	100,76	100,76	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2215	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990793341	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,13	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,90
2216	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990793365	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	114,50	114,50	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2217	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990793389	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	114,50	114,50	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2218	Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	5909990865901	2012-11-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,04	53,26	53,26	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2219	Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	5909990865956	2012-11-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	82,08	100,76	100,76	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2220	Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	5909990866021	2012-11-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	123,12	146,89	146,89	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,48
2221	Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	5909990866045	2012-11-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	164,16	191,76	191,76	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97
2222	Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt. (4 blis. po 7)	5909990763443	2013-07-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,44	58,98	58,98	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2223	Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt. (4 blis. po 7)	5909990763467	2013-07-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	92,88	112,21	112,21	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2224	Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt. (4 blis. po 7)	5909990763481	2013-07-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	139,32	164,06	164,06	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,48
2225	Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt. (4 blis. po 7)	5909990763498	2013-07-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	185,76	214,66	214,66	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2226	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990638444	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,13	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,90
2227	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990638482	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	122,51	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,86
2228	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blis.)	5909990638543	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	156,60	182,38	178,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	8,58
2229	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blis.)	5909990638581	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	210,60	240,99	237,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	9,26
2230	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990766895	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	43,20	55,55	55,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2231	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990766901	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	86,40	105,34	105,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2232	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990767045	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	43,20	55,55	55,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2233	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990767052	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	86,40	105,34	105,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2234	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blis.po 7 szt.)	5909990637126	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,57	62,30	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,07
2235	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blis.po 7 szt.)	5909990637218	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,14	118,85	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2236	Olanzapinum	Olasyn 10 mg , tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990769094	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	97,20	116,79	116,79	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2237	Olanzapinum	Olasyn 5 mg , tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990768950	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	69,86	59,43	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	13,63
2238	Olanzapinum	Olazax, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990782239	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	54,40	54,40	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2239	Olanzapinum	Olazax, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990782246	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	84,24	103,05	103,05	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2240	Olanzapinum	Olazax, tabl., 20 mg	28 tabl.	5909990925179	2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	168,48	196,34	196,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97
2241	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990782253	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	54,40	54,40	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2242	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990782260	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	84,24	103,05	103,05	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2243	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990925186	2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	168,48	196,34	196,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97
2244	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990781782	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,66	59,22	59,22	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2245	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990781805	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	98,77	118,45	118,45	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
2246	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335343	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	63,56	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,33
2247	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335367	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	123,66	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	8,01
2248	Olanzapinum	Olzapin 10mg x56 tabletek, tabl. powl., 10 mg	56 szt. (8 blistr. po 7)	5909990335374	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,40	223,82	223,82	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97
2249	Olanzapinum	Olzapin 5mg x56 tabletek, tabl. powl., 5 mg	56 szt. (8 blistr. po 7)	5909990335350	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	97,20	116,79	116,79	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2250	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729081	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,25	118,97	118,85	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,32
2251	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729159	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,43	58,97	58,97	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2252	Olanzapinum	Ranofren, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640287	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,36	119,08	118,85	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,43
2253	Olanzapinum	Sanza 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692668	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	100,44	120,22	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,57
2254	Olanzapinum	Sanza 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692590	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,22	62,99	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,76
2255	Olanzapinum	Synza 10 mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704866	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,06	121,94	118,85	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,29
2256	Olanzapinum	Synza 5 mg, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704750	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,60	61,27	59,43	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,04
2257	Olanzapinum	Zalasta, tabl., 5 mg	35 szt.	5909990069279	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,56	76,32	74,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,24
2258	Olanzapinum	Zalasta, tabl., 5 mg	70 szt.	5909990069293	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	123,12	145,58	145,58	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,73
2259	Olanzapinum	Zalasta, tabl., 10 mg	35 szt.	5909990069347	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	123,12	145,58	145,58	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,73
2260	Olanzapinum	Zalasta, tabl., 10 mg	70 szt.	5909990069361	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	246,24	280,08	280,08	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,47
2261	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069705	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,63	62,36	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,13
2262	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	35 szt.	5909990069736	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,56	76,32	74,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,24
2263	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	70 szt.	5909990069750	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	123,12	145,58	145,58	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,73
2264	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069866	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,33	122,23	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pł sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2265	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	35 szt.	5909990069873	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	123,12	145,58	145,58	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,73
2266	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	70 szt.	5909990069897	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	246,24	280,08	280,08	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,47
2267	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909990069958	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	156,60	182,38	178,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	8,58
2268	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	35 szt.	5909990069965	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	184,68	213,19	213,19	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,60
2269	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	70 szt.	5909990069989	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	369,36	413,87	413,87	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	11,20
2270	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990070008	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	212,76	243,28	237,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	11,55
2271	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	35 szt.	5909990070022	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	246,24	280,08	280,08	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,47
2272	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	70 szt.	5909990070046	2013-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	492,48	547,67	547,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	14,93
2273	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081812	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,63	62,36	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,13
2274	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081911	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,33	122,23	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,58
2275	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990916917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	69,66	63,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,19
2276	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990917013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	134,33	127,34	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	10,19
2277	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	69,66	63,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,19
2278	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064617	2012-01-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	81,00	98,58	95,50	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia		ryczałt	6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2279	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064716	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	134,33	127,34	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	10,19
2280	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990775675	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,35	65,25	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,02
2281	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990775682	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	127,09	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	11,44
2282	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	5909990775712	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	156,61	182,39	178,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	8,59
2283	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990775729	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	211,68	242,14	237,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	10,41
2284	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 15 mg	30 tabl.	5909990849581	2012-11-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	167,79	194,59	191,01	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	8,38
2285	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990849635	2012-11-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	223,56	255,10	254,68	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	6,82
2286	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991096816	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	69,66	63,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,19
2287	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991097011	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	134,33	127,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	10,19
2288	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990892082	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,35	65,25	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,02
2289	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990892129	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	127,09	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	11,44
2290	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	5909990892150	2012-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	156,60	182,38	178,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	8,58
2291	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990892303	2012-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	211,68	242,14	237,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	10,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2292	Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	5909990914630	2013-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,80	49,82	49,82	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2293	Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	5909990914647	2013-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	76,68	95,04	95,04	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2294	Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	5909990914654	2013-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	133,02	157,39	157,39	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,48
2295	Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	5909990914661	2013-03-01	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	143,12	169,46	169,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,97
2296	Olanzapinum	ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa o przedłu onym uwalnianiu, 210 mg	1 fiol.pr.a 0,21g (+1 fiol.roz.3 ml)	5909990686803	2012-01-01	2 lata	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	583,20	646,15	646,15	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni stabilizację podczas leczenia olanzapin w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		ryczałt	3,20
2297	Olanzapinum	ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	1 fiol.pr.a 0,3g (+1 fiol.roz.3 ml)	5909990686827	2012-01-01	2 lata	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	885,84	973,57	923,07	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni stabilizację podczas leczenia olanzapin w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		ryczałt	53,70
2298	Olanzapinum	ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa o przedłu onym uwalnianiu, 405 mg	1 fiol.pr.a 0,405g (+1fiol.roz.3 ml)	5909990686834	2012-01-01	2 lata	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłu onym uwalnianiu	1 177,44	1 290,40	1 246,15	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni stabilizację podczas leczenia olanzapin w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		ryczałt	48,57
2299	Olanzapinum	Zyprexa, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990743117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,19	100,05	59,43	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	43,82
2300	Olanzapinum	Zyprexa, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990743315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,39	194,36	118,85	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	78,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2301	Omeprazolom	Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990068401	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,45	10,57	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,85
2302	Omeprazolom	Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990068425	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,60	17,75	17,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,88
2303	Omeprazolom	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	13,55	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,83
2304	Omeprazolom	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	22,71	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,28
2305	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990420513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,90	17,24	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,88
2306	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990420520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	24,54	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,82
2307	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990420537	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	25,42	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,99
2308	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	56 kaps.	5909990420544	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	28,84	37,42	37,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,71
2309	Omeprazolom	Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps.	5909990077656	2012-09-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,30	10,41	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2310	Omeprazolom	Goprazol 20mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990077663	2012-09-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,84	16,94	16,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,47
2311	Omeprazolom	HELICID 20, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps.	5909997014852	2012-11-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,74	22,14	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,71
2312	Omeprazolom	Helicid 10, kaps., 10 mg	14 kaps.	5909990877317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	11,75	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,39
2313	Omeprazolom	Helicid 10, kaps., 10 mg	28 kaps.	5909990877324	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,13	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,41
2314	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	14 kaps. (but.)	5909990420612	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,20	19,84	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,12
2315	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	28 kaps. (but.)	5909990420629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	23,86	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,43
2316	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	90 kaps. (but.)	5909990422654	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	40,19	51,75	51,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	25,88
2317	Omeprazolom	Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909997014555	2012-07-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	22,71	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	13,28
2318	Omeprazolom	Helicid 20, kaps. dojel., 20 mg	90 kaps.	5909997070384	2012-09-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	45,36	57,23	57,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	28,62
2319	Omeprazolom	Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps.	5909990921324	2012-07-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,32	31,56	31,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2320	Omeprazolom	Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 tabl.	5909990889600	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,69	17,84	17,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,92
2321	Omeprazolom	Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 tabl.	5909990891351	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,38	33,74	33,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,87
2322	Omeprazolom	Losec, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990193721	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	33,95	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	29,23
2323	Omeprazolom	Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909991100926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,58	17,72	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,86
2324	Omeprazolom	Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg	28 szt. (4 blist.po 7)	5909990668779	2013-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,75	15,80	15,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,90
2325	Omeprazolom	Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613205	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	23,86	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,43
2326	Omeprazolom	Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg	56 kaps. (8 blist.po 7 szt.)	5909990615230	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	41,19	37,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	22,32
2327	Omeprazolom	Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613359	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	41,19	37,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	22,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2328	Omeprazolom	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990772629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	24,99	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	20,27
2329	Omeprazolom	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990772667	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	29,01	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,58
2330	Omeprazolom	Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990077731	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	43,48	37,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	24,61
2331	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990772919	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	16,41	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,69
2332	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990772926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,32	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,96
2333	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990772933	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,87	20,15	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	10,72
2334	Omeprazolom	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps. (but.)	5909990635450	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	18,48	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,24
2335	Omeprazolom	Tulzol, Omeprazolom 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps.	5909990659449	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,69	10,82	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	6,10
2336	Omeprazolom	Tulzol, Omeprazolom 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990659456	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,58	17,72	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	8,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2337	Omeprazolom	Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg	28 kaps.	5909990796205	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,64	11,83	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	7,11
2338	Omeprazolom	Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990796298	2012-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,95	19,18	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,75
2339	Omeprazolom	Ultop, kapsulki dojelitowe, 20 mg	56 tabl.	5909990796359	2013-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,98	32,26	32,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,13
2340	Omeprazolom	Ultop, kapsulki dojelitowe, 40 mg	28 tabl.	5909990796533	2013-01-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,98	32,26	32,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,13
2341	Ondansetronum	Atossa, tabl. powl., 8 mg	10 tabl.	5909990744510	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	37,26	47,70	46,21	Nowotwory zło liwe		ryczałt	4,69
2342	Ondansetronum	OndaLEK 8, tabl. powl., 8 mg	10 tabl. (blist.)	5909990573219	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	59,40	71,16	46,21	Nowotwory zło liwe		ryczałt	28,15
2343	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	10 tabl.	5909990777044	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	15,12	21,33	21,33	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20
2344	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg	10 tabl.	5909990777150	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	20,52	29,95	29,95	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20
2345	Ondansetronum	Setronon, tabl. powl., 8 mg	10 tabl.	5909990994717	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	35,86	46,21	46,21	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20
2346	Ondansetronum	Zofran, tabl. powl., 4 mg	10 tabl.	5909990001811	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	31,86	39,07	23,11	Nowotwory zło liwe		ryczałt	19,16
2347	Ondansetronum	Zofran, tabl. powl., 8 mg	10 tabl.	5909990001910	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	64,80	76,89	46,21	Nowotwory zło liwe		ryczałt	33,88
2348	Ondansetronum	Zofran, czopki, 16 mg	2 czop.	5909990810529	2012-01-01	2 lata	7.2, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doodbytniczego	55,08	68,72	68,72	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20
2349	Ondansetronum	Zofran, syrop, 4 mg/5ml	50 ml	5909990810611	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	72,65	82,31	23,11	Nowotwory zło liwe		ryczałt	62,40
2350	Ondansetronum	Zofran Zydys, liofilizat doustny, 4 mg	10 szt.	5909990887910	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	31,86	39,07	23,11	Nowotwory zło liwe		ryczałt	19,16
2351	Ondansetronum	Zofran Zydys, liofilizat doustny, 8 mg	10 szt.	5909990888016	2012-01-01	2 lata	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postaci do podawania doustnego	64,80	76,89	46,21	Nowotwory zło liwe		ryczałt	33,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2352	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048809	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,90	33,36	33,36	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
2353	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 300 mg	50 tabl.	5909990048823	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,11	63,11	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
2354	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 600 mg	50 tabl.	5909990048854	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	118,63	118,63	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
2355	Oxcarbazepinum	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	250 ml	5909990747115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	104,92	104,92	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
2356	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990825516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,80	38,55	33,38	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	8,37
2357	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990825615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,13	66,76	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	7,57
2358	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl., 600 mg	50 tabl.	5909990825714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	133,51	133,51	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
2359	Oxybutyninum	Ditropan, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990163519	2012-01-01	2 lata	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	11,34	15,76	14,11	Stwardnienie rozsiane		30%	5,88
2360	Oxybutyninum	Ditropan, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blistry po 15 szt.)	5909997013947	2012-11-01	2 lata	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	10,54	14,90	14,11	Stwardnienie rozsiane		30%	5,02
2361	Oxybutyninum	Driptane, tabl., 5 mg	60 tabl.	5909990783816	2012-01-01	2 lata	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	21,09	28,21	28,21	Stwardnienie rozsiane		30%	8,46
2362	Oxybutyninum	Driptane, tabl., 5 mg	60 tabl.	5909997065892	2012-11-01	2 lata	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	18,90	25,89	25,89	Stwardnienie rozsiane		30%	7,77
2363	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - oksykodon	46,44	57,80	42,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	18,42
2364	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - oksykodon	46,44	57,80	42,58	Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólwy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalia		ryczałt	18,42
2365	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbólwe - oksykodon	92,88	111,03	85,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	29,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2366	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	111,03	85,17	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	29,06
2367	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	169,06	195,78	170,34	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	28,64
2368	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	169,06	195,78	170,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	28,64
2369	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324,00	364,10	340,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	26,83
2370	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324,00	364,10	340,68	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	26,83
2371	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	615,60	681,35	681,35	Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		ryczałt	6,83
2372	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	615,60	681,35	681,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	6,83
2373	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	14,69	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,97
2374	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621040	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,09	21,46	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2375	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl. (blist.)	5909991128418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,30	13,59	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,87
2376	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128432	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,92	23,39	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,96
2377	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl. (blist.)	5909991128814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	6,91	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	4,55
2378	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,00	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,28
2379	Pantoprazolum	Contraacid, tabl. powl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736706	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	12,38	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,66
2380	Pantoprazolum	Contraacid, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	23,83	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,40
2381	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl. (blist.)	5909990478767	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	8,89	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,53
2382	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478774	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	17,55	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2383	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl. (blist.)	5909990689842	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,97	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,25
2384	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990689859	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	25,00	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,57
2385	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990653409	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	10,68	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,96
2386	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990653508	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	10,68	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,96
2387	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990653539	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,50	18,70	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,35
2388	Pantoprazolum	IPP 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990085033	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	13,67	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,95
2389	Pantoprazolum	IPP 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (blist.)	5909990082643	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,43	24,99	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,56
2390	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645640	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,60	14,97	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	10,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2391	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645732	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,50	26,12	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,69
2392	Pantoprazolum	Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg	90 szt.	5909990845521	2013-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	22,68	30,03	30,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,02
2393	Pantoprazolum	Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg	90 szt.	5909990845552	2013-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	45,36	57,23	57,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	28,62
2394	Pantoprazolum	Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075003	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,14	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,42
2395	Pantoprazolum	Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg	56 tabl.	5909990075041	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,65	18,87	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,44
2396	Pantoprazolum	Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075089	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	25,25	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,82
2397	Pantoprazolum	Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg	56 tabl.	5909990075126	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	36,03	36,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	18,02
2398	Pantoprazolum	Ozzion, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990892761	2012-11-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	9,54	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,82
2399	Pantoprazolum	Ozzion, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990892853	2012-11-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	18,13	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,07
2400	Pantoprazolum	Panogastin, tabl. dojel., 20 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	14,69	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2401	Pantoprazolum	Panogastin, tabl. dojel., 40 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646272	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	26,72	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,29
2402	Pantoprazolum	Panrazol, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698974	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,36	9,41	9,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	4,71
2403	Pantoprazolum	Panrazol, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990699209	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,62	18,83	18,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,42
2404	Pantoprazolum	Pantogen 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990780549	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,87	9,95	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,23
2405	Pantoprazolum	Pantogen 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990780587	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,45	18,65	18,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,33
2406	Pantoprazolum	Pantoprazol 40 mg, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990889167	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,09	21,46	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,03
2407	Pantoprazolum	Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg	28 szt.	5909990943890	2013-07-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,88	9,96	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	5,24
2408	Pantoprazolum	Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 20 mg	56 szt.	5909990943944	2013-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	19,28	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,85
2409	Pantoprazolum	Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg	28 szt.	5909990944095	2013-07-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,76	18,99	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,56
2410	Pantoprazolum	Pantoprazol KRKA, tabl. dojel., 40 mg	56 szt.	5909990944125	2013-05-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	28,08	36,61	36,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	18,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2411	Pantoprazolum	Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990866793	2012-07-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,35	9,40	9,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,70
2412	Pantoprazolum	Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990867066	2012-07-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,07	18,24	18,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,12
2413	Pantoprazolum	Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990793907	2012-09-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	9,54	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	4,82
2414	Pantoprazolum	Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990794188	2012-09-01	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	18,13	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	9,07
2415	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990652334	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,82	12,02	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,30
2416	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990652372	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	23,23	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,80
2417	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl.	5909990730094	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,12	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	2,76
2418	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 20 mg	28 szt.	5909990730100	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	9,99	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,27
2419	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990730162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	9,99	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,27
2420	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 40 mg	28 szt.	5909990730179	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	19,04	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2421	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059546	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,06	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,34
2422	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059591	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	23,40	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,97
2423	Paroxetinum	Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990047109	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	18,90	23,59	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	13,89
2424	Paroxetinum	Parogen, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990425877	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,44	24,17	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	14,47
2425	Paroxetinum	Parogen, tabl. powl., 20 mg	60 tabl.	5909990425884	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	38,88	46,80	27,72	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	27,40
2426	Paroxetinum	Paroxinor, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990798346	2012-05-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	9,18	13,29	13,29	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	3,99
2427	Paroxetinum	Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010189	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,22	23,93	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	14,23
2428	Paroxetinum	Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010202	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	37,80	45,66	27,72	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	26,26
2429	Paroxetinum	Rexetin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991006310	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,85	24,60	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	14,90
2430	Paroxetinum	Seroxat, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990640515	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,82	56,37	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	46,67
2431	Paroxetinum	Xetanor 20 mg, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990570515	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,14	27,03	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	17,33
2432	Pegfilgrastinum	Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml	1 amp.-strz.a 0,6 ml (z zab.igly)	5909990007523	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	3 286,98	3 554,20	3 554,20	Nowotwory zło liwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych	Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem, w szczegóno ci u chorych poddawanych chemioterapii o zao leniu radykalnym	ryczałt	3,20
2433	Penicillaminum	Cuprenil, tabl. powl., 250 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990126217	2013-03-01	2 lata	239.0, Leki chelatuj ce mied - penicylamina	21,15	28,28	28,28	Choroba Wilsona		ryczałt	3,20
2434	Perazinum	Peragal, tabl., 25 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990826018	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyina	1,43	1,86	1,18	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,68
2435	Perazinum	Peragal, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990826117	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyina	4,75	7,06	7,06	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
2436	Perazinum	Perazin 100 mg , tabl., 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990858514	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyina	4,75	7,06	7,06	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2437	Perazinum	Perazin 200mg, tabl., 200 mg	30 szt.	5909991033453	2013-03-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	9,50	13,58	13,58	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
2438	Perazinum	Perazin 25 mg, tabl. , 25 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990858415	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,18	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,68
2439	Perazinum	Perazin 25mg, tabl., 25 mg	50 tabl.	5909990914838	2013-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,99	2,94	2,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
2440	Perazinum	Perazin 50mg, tabl., 50 mg	30 szt.	5909991033422	2013-03-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	2,38	3,52	3,52	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
2441	Perazinum	Pernazinum, tabl. , 100 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990199518	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,06	7,06	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,00
2442	Perazinum	Pernazinum, tabl. , 25 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990202614	2012-01-01	2 lata	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,44	1,87	1,18	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		bezpłatny	0,69
2443	Perindoprilum	Erbugen, tabl., 4 mg	30 szt.	5909990984954	2013-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,56	9,68	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	7,20
2444	Perindoprilum	Prenessa, tabl. , 4 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990569311	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	12,20	14,60	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	12,12
2445	Perindoprilum	Prenessa, tabl. , 8 mg	30 tabl.	5909990662494	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	22,03	26,35	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	21,40
2446	Perindoprilum	Prestarium 10mg, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990336081	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	35,32	41,03	14,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	34,84
2447	Perindoprilum	Prestarium 5mg, tabl. powl., 5 mg	30 tabl.	5909990337774	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,30	27,82	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,73
2448	Perindoprilum	Vidotin, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653614	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,26	12,54	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	10,06
2449	Perindoprilum	Vidotin, tabl. , 8 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653621	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	17,71	21,77	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	16,82
2450	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl. , 4+5 mg	30 tabl.	5909990908134	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	15,55	18,15	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	15,67
2451	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl. , 4+10 mg	30 tabl.	5909990908165	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	15,55	18,15	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	15,67
2452	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl. , 8+5 mg	30 tabl.	5909990908196	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,49	28,97	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,02
2453	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl. , 8+10 mg	30 tabl.	5909990908240	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,49	28,97	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,02
2454	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 5+5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669301	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,30	27,82	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2455	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 10+5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669332	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	38,88	44,80	14,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	38,61
2456	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 5+10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669387	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,30	27,82	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,73
2457	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl. , 8+10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669400	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	38,88	44,80	14,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	38,61
2458	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa , tabl. , 8+2,5 mg	30 tabl.	5909990850167	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	22,01	26,33	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	21,38
2459	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg, tabl. , 4+1,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990641086	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,20	18,84	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	16,36
2460	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg, tabl. , 4+1,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990746569	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,20	18,84	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	16,36
2461	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10+2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990707782	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	38,88	44,80	14,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	38,61
2462	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990055029	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,30	27,82	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,73
2463	Perindoprilum + Indapamidum	Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10+2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990715206	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	38,88	44,80	14,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	38,61
2464	Perindoprilum + Indapamidum	Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990055678	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	24,30	27,82	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,73
2465	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powl., 2 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661206	2012-01-01	2 lata	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazy na do podawania doustnego	16,08	19,13	6,70	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	12,43
2466	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powl., 4 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661237	2012-01-01	2 lata	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazy na do podawania doustnego	17,91	22,59	13,40	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	9,19
2467	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powl., 8 mg	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661244	2012-01-01	2 lata	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazy na do podawania doustnego	19,92	26,79	26,79	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
2468	Perphenazinum	Trilafon Enanthate, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990122516	2012-01-01	2 lata	174.2, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazy na do podawania pozajelitowego	104,64	124,96	124,96	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
2469	Phenobarbitalum	Luminalum, czopki, 15 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doodbytniczego	2,15	3,19	3,19	Padaczka	Padaczka u dzieci do 30 miesi ca ycia	ryczałt	3,19
2470	Phenobarbitalum	Luminalum, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990260614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	4,40	6,51	6,50	Padaczka	Padaczka u dzieci	ryczałt	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2471	Phenobarbitalum	Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990812615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	4,38	6,50	6,50	Padaczka	Padaczka u dzieci	ryczałt	3,20
2472	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 U	12 tabl.	5909990070916	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postaci farmaceutyczne	4,54	6,49	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,90
2473	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powł., 1500000 j.m.	12 tabl.	5909990071012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postaci farmaceutyczne	5,94	8,69	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,20
2474	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml	60 ml (but.)	5909990363216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - plynne postaci farmaceutyczne	7,02	10,17	10,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,20
2475	Phenytoinum	Phenytoinum WZF, tabl. , 100 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990093519	2012-01-01	2 lata	156.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina	10,80	15,24	15,24	Padaczka		ryczałt	3,20
2476	Phytomenadionum (vit. K1)	Vitacon, tabl. dra owane, 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990772810	2012-01-01	2 lata	25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion	16,05	21,91	21,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
2477	Pilocarpinum	Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	10 ml (2x5 ml)	5909990237524	2012-01-01	2 lata	211.0, Leki przeciwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina	6,06	8,84	8,84	Jaskra		30%	2,65
2478	Piribedilum	Pronoran, tabl. powł. o przedlu onym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990846320	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	24,84	33,06	32,83	Choroba i zespół Parkinsona		30%	10,08
2479	Prednisolonum	Encortolon, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990170715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	4,54	6,73	6,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
2480	Prednisonum	Encorton, tabl. , 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,50	3,96	0,80	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2481	Prednisonum	Encorton, tabl. , 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,50	3,96	0,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespolo miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby pluc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komorek i szpiku	ryczaft	3,96
2482	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,54	6,01	3,98	Nowotwory zlo liwe		bezpłatny	2,03
2483	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,54	6,01	3,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespolo miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby pluc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komorek i szpiku	ryczaft	5,23
2484	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	15,44	20,88	19,90	Nowotwory zlo liwe		bezpłatny	0,98
2485	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	15,44	20,88	19,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespolo miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby pluc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komorek i szpiku	ryczaft	6,31
2486	Prednisonum	Encorton, tabl. , 10 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	8,53	11,34	7,96	Nowotwory zlo liwe		bezpłatny	3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2487	Prednisonum	Encorton, tabl. , 10 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	8,53	11,34	7,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespy miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	6,58
2488	Prednisonum	Encorton, tabl. , 20 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	2012-01-01	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	11,34	15,92	15,92	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
2489	Prednisonum	Encorton, tabl. , 20 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespy miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	4,27
2490	Primidonum	Mizodin, tabl. , 250 mg	60 tabl.	5909990274413	2012-01-01	2 lata	155.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - primidon	15,88	21,69	21,69	Padaczka		ryczałt	3,20
2491	Progesteronum	Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569380	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	65.1. Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	21,60	28,83	28,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka i leczenie ci y zagro onej porodem przedwczesnym	ryczałt	3,20
2492	Progesteronum	Luteina 50, tabl. podj zykowe, 50 mg	30 tabl.	5909990267422	2012-01-01	2 lata	65.1. Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	11,58	14,83	8,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2493	Propafenonum	Polfenon, tabl. powł., 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034123	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon	5,29	7,63	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,96
2494	Propafenonum	Polfenon, tabl. powł., 300 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon	9,61	13,73	13,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
2495	Propranololum	Propranolol WZF, tabl., 10 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,17	2,62	1,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolności serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia; Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste	ryczałt	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2496	Propranololum	Propranolol WZF, tabl. , 40 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112210	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	3,03	4,49	4,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw eniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia; Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste	ryczałt	3,20
2497	Pyrantelum	Pyrantelum Medana, Pyrantelum, zawiesina doustna, 250 mg/5ml	15 ml	5909990276417	2012-01-01	2 lata	194.3, Leki przeciwbacze - pyrantel - płynne postacie farmaceutyczne	3,18	4,72	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
2498	Pyrantelum	Pyrantelum Polpharma,Pyrantelum, tabl. , 250 mg	3 tabl. (blist.)	5909990206414	2012-01-01	2 lata	194.2, Leki przeciwbacze - pyrantel - stałe postacie farmaceutyczne	2,67	3,96	3,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
2499	Pyrazinamidum	Pyrazinamid Farmapol, tabl. , 500 mg	250 tabl.	5909990263516	2012-01-01	2 lata	113.0, Leki przeciwpr tkowe - inne - pyrazinamid	62,10	76,91	76,91	Gru lica, tym równie gru lica wielolekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	0,00
2500	Pyridostigmini bromidum	Mestinon, tabl. dra owane, 60 mg	150 tabl.	5909991014421	2012-01-01	2 lata	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pyridostygminy	108,54	129,31	129,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	38,79
2501	Pyridostigmini bromidum	Mestinon, tabl. dra owane, 60 mg	150 tabl.	5909991014421	2012-01-01	2 lata	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pyridostygminy	108,54	129,31	129,31	Miastenia		ryczałt	5,33
2502	Quetiapinum	ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990897780	2012-09-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,16	8,98	7,69	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,49
2503	Quetiapinum	ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg	60 tabl.	5909990910762	2012-09-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,57	62,23	61,55	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,88
2504	Quetiapinum	ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg	60 tabl.	5909990910779	2012-09-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,14	118,78	118,78	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2505	Quetiapinum	Bonogren, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990719389	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,53	11,48	7,69	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	6,99
2506	Quetiapinum	Bonogren, tabl. powl., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990719853	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,92	61,55	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2507	Quetiapinum	Bonogren, tabl. powl., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990720163	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	121,30	121,30	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2508	Quetiapinum	Bonogren, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990720309	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	152,28	177,70	177,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2509	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990806355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	9,77	7,69	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	5,28
2510	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990806362	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,44	58,91	58,91	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2511	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990806386	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	97,20	116,72	116,72	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2512	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990713646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,29	7,69	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	7,80
2513	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 100 miligram	60 tabl.	5909990713653	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,03	63,77	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,42
2514	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 300 miligram	60 tabl.	5909990713929	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,40	222,34	184,65	Schizofrenia		ryczałt	42,49
2515	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powł., 200 miligram	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990730636	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,06	121,87	121,87	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2516	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990722198	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,67	9,52	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	5,03
2517	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722327	2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	145,80	170,83	170,83	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2518	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722365	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,60	61,20	61,20	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2519	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722426	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	97,20	116,72	116,72	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2520	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990055531	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	12,75	7,69	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	8,26
2521	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055562	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,55	59,03	59,03	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia		ryczałt	3,20
2522	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055593	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	98,82	118,44	118,44	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2523	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055630	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	152,17	177,58	177,58	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia		ryczałt	4,80
2524	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990058754	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2525	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 200 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990058761	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	167,40	194,27	194,27	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,33
2526	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990058778	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	30,43	30,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2527	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 100 mg	10 blist. po 10szt.	5909990058785	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	83,70	101,54	101,54	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2528	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 25 mg	10 blist. po 10szt.	5909990058808	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,11	28,12	25,65	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	5,67
2529	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990081196	2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	114,43	114,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2530	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990081233	2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,06	60,06	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2531	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990779062	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	149,04	174,26	174,26	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2532	Quetiapinum	Ketrel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990430840	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,60	7,69	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	7,11
2533	Quetiapinum	Ketrel, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990430857	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	63,49	61,55	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia		ryczałt	5,14
2534	Quetiapinum	Ketrel, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990430888	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	122,44	122,44	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia		ryczałt	3,20
2535	Quetiapinum	Kventiax 100, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990074143	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,92	61,55	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2536	Quetiapinum	Kventiax 200, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990074235	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	101,41	121,18	121,18	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2537	Quetiapinum	Kventiax 25, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990074068	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,64	9,49	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pniem	ryczałt	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2538	Quetiapinum	Kventiax 300, tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	5909990074280	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	152,28	177,70	177,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2539	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990688234	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	63,49	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,14
2540	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990688241	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,65	9,50	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,01
2541	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688265	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	154,48	180,03	180,03	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2542	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688272	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	75,95	92,79	92,33	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,66
2543	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688296	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	122,44	122,44	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2544	Quetiapinum	Kwetax, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990692804	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,62	8,41	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,92
2545	Quetiapinum	Kwetax, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990692873	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,96	61,59	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,24
2546	Quetiapinum	Kwetax, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990692996	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	121,30	121,30	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2547	Quetiapinum	Kwetax, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990693061	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	152,28	177,70	177,70	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2548	Quetiapinum	Nantarid, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634941	2012-01-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	147,96	170,52	123,10	Schizofrenia		ryczałt	50,62
2549	Quetiapinum	Pinexet 100 mg, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990788590	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,28	66,17	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,82
2550	Quetiapinum	Pinexet 200 mg, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990788651	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,56	126,63	123,10	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	6,73
2551	Quetiapinum	Pinexet 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990788583	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,64	8,43	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,94
2552	Quetiapinum	Pinexet 300 mg, tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	5909990788675	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	159,84	185,71	184,65	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2553	Quetiapinum	Poetra, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990742547	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,53	8,31	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,82
2554	Quetiapinum	Poetra, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990742752	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,30	64,06	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,71
2555	Quetiapinum	Poetra, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (10 blist.po 6 szt.)	5909990743063	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,74	123,64	123,10	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,74
2556	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990717606	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	39,96	50,69	46,16	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,73
2557	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990717651	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	78,30	95,28	92,33	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	6,15
2558	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990717705	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,66	9,51	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,02
2559	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990717903	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	100,44	120,15	120,15	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2560	Quetiapinum	Quentapil, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990718009	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	62,35	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,00
2561	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 100 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990718047	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	79,92	96,99	92,33	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,86
2562	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990718108	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	150,12	175,41	175,41	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2563	Quetiapinum	Setinin, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990736393	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	62,35	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,00
2564	Quetiapinum	Setinin, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990736461	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	101,95	121,75	121,75	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2565	Quetiapinum	Setinin, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990736492	2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	149,04	174,26	174,26	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	4,80
2566	Quetiapinum	Stadaquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990727056	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,97	9,83	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,34
2567	Quetiapinum	Stadaquel, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990727094	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,03	63,77	61,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2568	Quetiapinum	Stadaquel, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990727261	2012-03-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,06	121,87	121,87	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2569	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990635368	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,60	61,20	61,20	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2570	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990635382	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,33	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,84
2571	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990635429	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	97,20	116,72	116,72	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	3,20
2572	Quetiapinum	Vorta, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909990778072	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,63	8,42	7,69	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,93
2573	Quetiapinum	Vorta, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990778096	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	65,78	61,55	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	7,43
2574	Quetiapinum	Vorta, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909990778157	2012-01-01/2012-05-01	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	105,84	125,88	123,10	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa		ryczałt	5,98
2575	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990707010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,57	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	19,99
2576	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990707119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,21	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	22,91
2577	Quinaprilum	Accupro 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909991080129	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,36	14,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	35,20
2578	Quinaprilum	Accupro 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990706914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,80	16,25	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	16,25
2579	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990953882	2012-09-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,30	31,60	15,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	25,00
2580	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,58	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2581	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,57	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,99
2582	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,24	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,94
2583	Quinaprilum	Aprilgen 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014439	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,70	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,12
2584	Quinaprilum	Aprilgen 20mg, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014460	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	19,34	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	16,04
2585	Quinaprilum	Aprilgen 40mg, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014507	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,49	15,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	26,89
2586	Quinaprilum	Aprilgen 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014354	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,86	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	10,86
2587	Quinaprilum	Pulsaren 20, tabl. powł., 20 mg	30 szt.	5909991165710	2013-07-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,95	15,90	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	12,60
2588	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215737	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,86	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	10,86
2589	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215805	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,70	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,12
2590	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215898	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,24	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,94
2591	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215980	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,49	15,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	26,89
2592	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990571468	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,44	21,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
2593	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	60 tabl.	5909990571475	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	33,84	33,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	25,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2594	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990571499	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,16	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,21
2595	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	60 tabl.	5909990571505	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,77	19,44	19,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
2596	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,60	5,38	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,28
2597	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653362	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,60	10,89	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,27
2598	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,55	20,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
2599	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337958	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,29	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,81
2600	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337972	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,22	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,27
2601	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337989	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,16	22,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,26
2602	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990770397	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	16,06	16,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,95
2603	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,89	5,78	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,30
2604	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
2605	Ramiprilum	Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990661756	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	19,83	19,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
2606	Ramiprilum	Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212170	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,54	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2607	Ramiprilum	Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,61	13,20	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	8,25
2608	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694631	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,18	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,56
2609	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694655	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	21,68	21,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,44
2610	Ramiprilum	Polpril, tabl., 2,5 mg	28 szt.	5909990924608	2013-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,67	5,45	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	3,35
2611	Ramiprilum	Polpril, tabl., 5 mg	28 szt.	5909990924646	2013-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,35	10,62	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	6,00
2612	Ramiprilum	Polpril, tabl., 10 mg	28 szt.	5909990924653	2013-03-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,71	20,21	20,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,95
2613	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990052653	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,98	27,08	22,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	17,18
2614	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644551	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,49	8,55	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,07
2615	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,88	16,66	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,71
2616	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990763542	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	5,35	8,51	8,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,97
2617	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990763559	2012-05-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,69	15,95	15,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,95
2618	Ramiprilum	Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990796601	2012-07-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	10,61	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	5,99
2619	Ramiprilum	Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990796649	2012-07-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,70	20,20	20,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,95
2620	Ramiprilum	Ramistad 10, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990017461	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	16,06	16,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2621	Ramiprilum	Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl.	5909990017447	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,24	4,99	4,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
2622	Ramiprilum	Ramistad 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990017454	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	9,70	9,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	5,97
2623	Ramiprilum	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047987	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,88	20,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
2624	Ramiprilum	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047949	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,46	5,23	5,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
2625	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047963	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,09	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,47
2626	Ramiprilum	Tritace 10, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990916016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,79	23,47	21,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	14,23
2627	Ramiprilum	Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,79	15,12	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,02
2628	Ramiprilum	Tritace 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990478316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,77	17,44	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,82
2629	Ramiprilum	Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610532	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	21,90	21,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
2630	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610440	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,00	5,91	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,43
2631	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,35	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
2632	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 2,5, tabl. powł., 2,5+2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990973118	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,59	15,97	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	13,87
2633	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 5, tabl. powł., 5+5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990973217	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,44	21,33	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	16,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2634	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HD, tabl. , 5+25 mg	30 tabl.	5909990573233	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	16,74	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	11,79
2635	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HL, tabl. , 2,5+12,5 mg	30 tabl.	5909990573226	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	13,12	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	10,64
2636	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 2,5 Comb, tabl. , 2,5+12,5 mg + mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885312	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,18	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	13,08
2637	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 5 Comb, tabl. , 5+25 mg+mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885411	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,34	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		ryczałt	15,72
2638	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powl., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990206728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,18	11,77	11,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapalenie błony łożowej od urodzenia do 18 roku życia	ryczałt	3,20
2639	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 50 mg	21 tabl.	5909990852222	2013-05-01	2 lata	243.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	15,72	21,50	19,45	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	5,25
2640	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 50 mg	84 tabl.	5909990852239	2013-05-01	2 lata	243.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	62,86	77,79	77,79	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	3,20
2641	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 100 mg	84 tabl.	5909990852598	2013-05-01	2 lata	243.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	125,76	148,48	148,48	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	3,20
2642	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 200 mg	84 tabl.	5909990852628	2013-05-01	2 lata	243.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	251,47	285,72	285,72	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	3,20
2643	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 300 mg	84 tabl.	5909990852642	2013-05-01	2 lata	243.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	377,22	422,34	422,34	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2644	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 400 mg	84 tabl.	5909990852666	2013-05-01	2 lata	243.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	502,93	558,93	558,93	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	3,98
2645	Retigabinum	Trobalt, tabl. powl., 21 tabl. po 50mg + 42 tabl po 100mg mg	63 tabl. (21 tabl. po 50mg + 42 tabl po 100mg)	5909990852680	2013-05-01	2 lata	243.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - retygabina	78,62	96,01	96,01	Terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej		ryczałt	3,20
2646	Rifampicinum	Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990084913	2012-01-01	2 lata	111.1. Leki przeciwpródkowe - antybiotyki - ryfampicyna	75,60	92,64	92,64	Gruczniki, tym również gruczniki wielolekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	0,00
2647	Rifampicinum	Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg	100 kaps.	5909990085019	2012-01-01	2 lata	111.1. Leki przeciwpródkowe - antybiotyki - ryfampicyna	45,36	56,59	46,32	Gruczniki, tym również gruczniki wielolekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	10,27
2648	Rifampicinum + Isoniazidum	Rifamazid, kaps. twarde, 0,15+0,1 g	100 kaps.	5909990086115	2012-01-01	2 lata	111.2. Leki przeciwpródkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	48,60	60,60	52,33	Gruczniki, tym również gruczniki wielolekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	8,27
2649	Rifampicinum + Isoniazidum	Rifamazid, kaps. twarde, 0,3+0,15 g	100 kaps.	5909990086214	2012-01-01	2 lata	111.2. Leki przeciwpródkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	86,40	104,66	104,66	Gruczniki, tym również gruczniki wielolekooporna i inne mykobakteriozy		bezpłatny	0,00
2650	Riluzolum	Rilutek, tabl. powl., 50 mg	56 tabl.	5909990760619	2012-01-01	2 lata	191.0. Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	878,28	949,18	246,01	Stwardnienie zanikowe boczne		ryczałt	706,37
2651	Riluzolum	Riluzol PMCS, tabl., 50 mg	56 tabl.	5909990928156	2013-01-01	2 lata	191.0. Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	214,92	246,01	246,01	Stwardnienie zanikowe boczne		ryczałt	3,20
2652	Riluzolum	Sclefic, tabl. powl., 50 mg	56 sztuk	5909990740529	2013-07-01	2 lata	191.0. Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	213,84	244,87	244,87	Stwardnienie zanikowe boczne		ryczałt	3,20
2653	Riluzolum	Zolerilis, tabl. powl., 50 mg	56 szt.	5909990845705	2013-03-01	2 lata	191.0. Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	213,84	244,87	244,87	Stwardnienie zanikowe boczne		ryczałt	3,20
2654	Risedronatum natricum	Risendros 35, tabl. powl., 35 mg	4 tabl.	5909990082599	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,68	19,12	13,86	Osteoporoza	Profilaktyka osteoporozy posterydowej	30%	9,42
2655	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637515	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,71	11,11	10,23	Schizofrenia		ryczałt	4,08
2656	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637522	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,48	28,94	28,94	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2657	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637577	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	13,86	19,46	19,46	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2658	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637584	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	42,12	54,05	54,05	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2659	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637690	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	28,19	37,29	37,29	Schizofrenia		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2660	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637706	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	84,24	102,70	102,70	Schizofrenia		ryczałt	5,12
2661	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637713	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	23,13	30,69	30,69	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2662	Risperidonum	Apo-Risperid, tabl. powl., 3 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637720	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	69,34	85,36	85,36	Schizofrenia		ryczałt	3,84
2663	Risperidonum	Apo-Risperid, roztwór doustny , 1 mg/ml	100 ml (but.)	5909990637850	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,50	49,40	49,40	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2664	Risperidonum	Disaperid, tabl. powl., 3 mg	20 tabl.	5909990023660	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,76	35,61	30,69	Schizofrenia		ryczałt	8,12
2665	Risperidonum	Disaperid, tabl. powl., 1 miligram	20 tabl.	5909990023677	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,40	10,79	10,23	Schizofrenia		ryczałt	3,76
2666	Risperidonum	Disaperid, tabl. powl., 4 miligram	20 tabl.	5909990023684	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,02	47,70	40,92	Schizofrenia		ryczałt	9,98
2667	Risperidonum	Disaperid, tabl. powl., 2 miligram	20 tabl.	5909990023691	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,20	21,94	20,46	Schizofrenia		ryczałt	4,68
2668	Risperidonum	Orizon, roztwór doustny , 1 mg/ml	100 ml (but.)	5909990690138	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,40	42,93	42,93	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2669	Risperidonum	Orizon, tabl. powl., 1 mg	20 tabl.	5909990831258	2012-03-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,48	9,82	9,82	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2670	Risperidonum	Orizon, tabl. powl., 1 mg	60 tabl.	5909990831265	2012-03-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,20	23,35	23,35	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2671	Risperidonum	Orizon, tabl. powl., 2 mg	60 tabl.	5909990831272	2012-03-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,40	43,75	43,75	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2672	Risperidonum	Orizon, tabl. powl., 3 mg	60 tabl.	5909990831289	2012-03-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	48,60	63,37	63,37	Schizofrenia		ryczałt	3,84
2673	Risperidonum	Orizon, tabl. powl., 4 mg	60 tabl.	5909990831296	2012-03-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	64,80	82,09	82,09	Schizofrenia		ryczałt	5,12
2674	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	30 tabl.	5909990075157	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	10,80	15,40	15,35	Schizofrenia		ryczałt	3,25
2675	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	30 tabl.	5909990075164	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,60	29,07	29,07	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2676	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	30 tabl.	5909990075171	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,40	42,36	42,36	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2677	Risperidonum	Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	30 tabl.	5909990075188	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	43,20	55,20	55,20	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2678	Risperidonum	Risperidon Vipham, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044146	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	31,32	40,60	40,60	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2679	Risperidonum	Risperidon Vipham , tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044252	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	23,04	30,60	30,60	Schizofrenia		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2680	Risperidonum	Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044344	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	14,85	20,50	20,46	Schizofrenia		ryczałt	3,24
2681	Risperidonum	Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044481	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,13	10,51	10,23	Schizofrenia		ryczałt	3,48
2682	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336487	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,66	21,37	20,46	Schizofrenia		ryczałt	4,11
2683	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 2 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336500	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	46,98	59,20	59,20	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2684	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336524	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,44	10,84	10,23	Schizofrenia		ryczałt	3,81
2685	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 1 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336548	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,32	29,84	29,84	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2686	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336555	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,30	31,94	30,69	Schizofrenia		ryczałt	4,45
2687	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 3 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336579	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	80,30	96,97	92,07	Schizofrenia		ryczałt	8,74
2688	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336586	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	33,05	42,44	40,92	Schizofrenia		ryczałt	4,72
2689	Risperidonum	Risperon, tabl. powl., 4 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336609	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	108,22	128,11	122,76	Schizofrenia		ryczałt	10,47
2690	Risperidonum	Rispolept, roztwór doustny , 1 mg/ml	30 ml	5909990423811	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	12,31	17,00	15,35	Schizofrenia		ryczałt	4,85
2691	Risperidonum	Rispolept, roztwór doustny , 1 mg/ml	100 ml	5909990423828	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	41,04	52,09	51,15	Schizofrenia		ryczałt	4,14
2692	Risperidonum	Rispolept, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670413	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	8,26	11,71	10,23	Schizofrenia		ryczałt	4,68
2693	Risperidonum	Rispolept, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670512	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,52	22,27	20,46	Schizofrenia		ryczałt	5,01
2694	Risperidonum	Rispolept, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670611	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,73	32,39	30,69	Schizofrenia		ryczałt	4,90
2695	Risperidonum	Rispolept, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670710	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,94	42,32	40,92	Schizofrenia		ryczałt	4,60
2696	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłu onym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 50 mg	1 fiol. + 1 strzykawka + 1 urz dzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykni cia domi niowego (1-calowa do wstrzykni cia do mi nia naramiennego, 2-calowa do wstrzykni cia do mi nia po ladowego)	5909991058029	2012-01-01	2 lata	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	577,80	640,28	640,28	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2697	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłu onym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporz dzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 37,5 mg	1 fiol. + 1 strzykawka + 1 urz dzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwa ciadomi niowego (1-calowa do wstrzykiwa ciado mi nia naramiennego, 2-calowa do wstrzykiwa ciado mi nia po ladowego)	5909991058128	2012-01-01	2 lata	178.6. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	433,35	483,33	483,33	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		ryczałt	3,20
2698	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłu onym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporz dzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 25 mg	1 fiol. + 1 strzykawka + 1 urz dzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwa ciadomi niowych (1-calowa do wstrzykiwa ciado mi nia naramiennego, 2-calowa do wstrzykiwa ciado mi nia po ladowego)	5909991058227	2012-01-01	2 lata	178.6. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu	288,90	326,39	322,22	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		ryczałt	7,37
2699	Risperidonum	Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996414	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,07	10,44	10,23	Schizofrenia		ryczałt	3,41
2700	Risperidonum	Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996421	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,27	29,79	29,79	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2701	Risperidonum	Risset 2 mg, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996513	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,43	21,13	20,46	Schizofrenia		ryczałt	3,87
2702	Risperidonum	Risset 2 mg, tabl. powl., 2 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996520	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	47,71	59,97	59,97	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2703	Risperidonum	Risset 3 mg, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996612	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,08	31,70	30,69	Schizofrenia		ryczałt	4,21
2704	Risperidonum	Risset 3 mg, tabl. powl., 3 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996629	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	78,51	95,08	92,07	Schizofrenia		ryczałt	6,85
2705	Risperidonum	Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996711	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,89	42,27	40,92	Schizofrenia		ryczałt	4,55
2706	Risperidonum	Risset 4 mg, tabl. powl., 4 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996728	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	106,98	126,80	122,76	Schizofrenia		ryczałt	9,16
2707	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567683	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,18	10,56	10,23	Schizofrenia		ryczałt	3,53
2708	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567737	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,43	21,13	20,46	Schizofrenia		ryczałt	3,87
2709	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567935	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,08	31,70	30,69	Schizofrenia		ryczałt	4,21
2710	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990568031	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,89	42,27	40,92	Schizofrenia		ryczałt	4,55
2711	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny , 1 mg/ ml	30 ml (but.)	5909990721399	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	10,69	15,28	15,28	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2712	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny , 1 mg/ ml	100 ml (but.)	5909990721405	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	36,86	47,66	47,66	Schizofrenia		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2713	Risperidonum	Speridan, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567836	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,80	10,16	10,16	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2714	Risperidonum	Speridan, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567881	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	14,04	19,65	19,65	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2715	Risperidonum	Speridan, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567980	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	20,52	27,93	27,93	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2716	Risperidonum	Speridan, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990568147	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	25,92	34,88	34,88	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2717	Risperidonum	Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034932	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,47	9,81	9,81	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2718	Risperidonum	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990680849	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	13,49	19,86	19,86	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2719	Risperidonum	Torendo Q-Tab 2, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034994	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	13,85	19,45	19,45	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2720	Risperidonum	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990680863	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	26,99	37,19	37,19	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2721	Risperidonum	Ziperid, tabl. powl., 1 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990016952	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,45	10,84	10,23	Schizofrenia		ryczałt	3,81
2722	Risperidonum	Ziperid, tabl. powl., 2 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990016983	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,20	21,94	20,46	Schizofrenia		ryczałt	4,68
2723	Risperidonum	Ziperid, tabl. powl., 3 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990017003	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,76	35,61	30,69	Schizofrenia		ryczałt	8,12
2724	Risperidonum	Ziperid, tabl. powl., 4 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990017041	2012-01-01	2 lata	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,02	47,70	40,92	Schizofrenia		ryczałt	9,98
2725	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. , 10 mg	10 tabl. (PP/alu.)	5909990658145	2012-01-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	92,00	106,81	53,11	ylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna		ryczałt	56,90
2726	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powl., 15 mg	14 szt.	5909990910601	2013-03-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	128,82	150,08	111,54	Leczenie zakrzepicy ył gł bokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy ył gł bokich i zatorowo ci płucnej po ostrej zakrzepicy ył gł bokich u osób powy ej 18 roku ycia		30%	72,00
2727	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powl., 15 mg	42 szt.	5909990910663	2013-03-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	386,47	429,70	334,61	Leczenie zakrzepicy ył gł bokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy ył gł bokich i zatorowo ci płucnej po ostrej zakrzepicy ył gł bokich u osób powy ej 18 roku ycia		30%	195,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2728	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 20 mg	14 szt.	5909990910700	2013-03-01	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128,82	151,76	148,72	Leżenie zakrzepicy żył gł. bocznych oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył gł. bocznych i zatorowość płucną po ostrej zakrzepicy żył gł. bocznych u osób powyżej 18 roku życia		30%	47,66
2729	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h	30 saasz.	5909990066704	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	287,85	16,17	Choroba Alzheimera		30%	276,53
2730	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h	30 saasz.	5909990066766	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	290,30	33,41	Choroba Alzheimera		30%	266,91
2731	Rivastigminum	Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml	5909990454310	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	343,86	370,63	29,67	Choroba Alzheimera		30%	349,86
2732	Rivastigminum	Exelon, kaps., 1,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	114,66	123,24	5,19	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	119,61
2733	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	129,39	10,38	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	122,12
2734	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781225	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	259,00	20,77	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	244,46
2735	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	130,39	15,58	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	119,48
2736	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781324	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	260,42	31,16	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	238,61
2737	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	131,23	20,77	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	116,69
2738	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	261,69	41,54	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	232,61
2739	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990700646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,81	34,36	5,19	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	30,73
2740	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990700660	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,81	34,36	5,19	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	30,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2741	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990700684	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	39,41	44,82	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	37,55
2742	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	28 tabl.	5909990700691	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	35,67	40,86	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	33,59
2743	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990700707	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	80,90	90,65	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,11
2744	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990700738	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	44,67	51,39	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	40,48
2745	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	28 tabl.	5909990700745	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	40,93	47,44	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,53
2746	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990700752	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	92,25	104,11	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	82,30
2747	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990700790	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
2748	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	28 tabl.	5909990700806	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
2749	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990700844	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	103,84	117,67	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	88,59
2750	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990782048	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	11,58	13,97	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,34
2751	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg	56 kaps.	5909990782055	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,16	27,60	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,33
2752	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990782079	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,16	27,60	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,33
2753	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990782086	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2754	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990782147	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,74	40,86	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,95
2755	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990782154	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,48	79,96	31,16	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,15
2756	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990782178	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
2757	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990782185	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,64	105,80	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,72
2758	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990816255	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,31	53,98	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,44
2759	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990816262	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,73	40,85	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,94
2760	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990816279	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,47	79,96	31,16	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,15
2761	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990816286	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
2762	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990816293	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,62	105,77	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,69
2763	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990778898	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	11,56	13,94	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,31
2764	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990778935	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	23,13	27,56	10,38	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,29
2765	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990778942	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
2766	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990778966	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,71	40,83	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2767	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990778973	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	69,42	79,91	31,16	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,10
2768	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990778997	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
2769	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990779000	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	92,53	105,67	41,54	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,59
2770	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990768202	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	18,63	21,45	5,19	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	17,82
2771	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990768264	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	34,56	39,68	10,38	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	32,41
2772	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990768288	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	56,16	64,42	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	49,88
2773	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990768301	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	42,12	48,69	15,58	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	37,78
2774	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990768332	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	84,24	95,61	31,16	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	73,80
2775	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990768363	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	56,16	64,42	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	49,88
2776	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990768370	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	112,32	126,65	41,54	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	97,57
2777	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990886258	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	11,56	13,94	5,19	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,31
2778	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990886296	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	23,11	27,55	10,38	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,28
2779	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990886302	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,33	54,00	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2780	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990886364	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,67	40,80	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,89
2781	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990886371	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,34	79,82	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,01
2782	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990886401	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,22	53,88	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,34
2783	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990886425	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	95,80	109,14	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	80,06
2784	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803156	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	11,51	13,90	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,27
2785	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803545	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	22,68	27,09	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	19,82
2786	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps. (blis.)	5909990803569	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	45,36	52,97	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,43
2787	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803781	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,56	40,68	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,77
2788	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps. (blis.)	5909990803804	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,12	79,59	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	57,78
2789	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. (blis.)	5909990804085	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	45,36	52,97	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,43
2790	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps. (blis.)	5909990804108	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	91,80	104,90	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	75,82
2791	Rivastigminum	Rivastigmine Teva, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml (but.)	5909990764143	2012-01-01	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	79,53	90,44	29,67	Choroba Alzheimerera		30%	69,67
2792	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990866250	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	18,63	21,45	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	17,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2793	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990866304	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,23	37,21	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,94
2794	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990866366	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	65,67	74,50	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	59,96
2795	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990866397	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	36,44	42,68	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	31,77
2796	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990866427	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	71,51	82,12	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	60,31
2797	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990866458	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	43,74	51,26	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,72
2798	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990866472	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	86,51	99,29	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	70,21
2799	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps. twardych	5909990795307	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	11,57	13,96	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,33
2800	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps. twardych	5909990795376	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,13	27,56	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,29
2801	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990795383	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
2802	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. twardych	5909990795567	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,70	40,83	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,92
2803	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990795574	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,40	79,88	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,07
2804	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. twardych	5909990795598	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
2805	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990795604	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	92,53	105,67	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2806	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860883	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,56	40,68	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,77
2807	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990860890	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,12	79,59	31,16	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	57,78
2808	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860937	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	45,36	52,97	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,43
2809	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990860944	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	90,72	103,75	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	74,67
2810	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg	28 tabl.	5909990808199	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	14,23	16,77	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	13,14
2811	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 3 mg	28 tabl.	5909990808397	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	14,23	18,12	10,38	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,85
2812	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 tabl.	5909990808427	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	22,32	27,71	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	16,80
2813	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 6 mg	28 tabl.	5909990808441	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	29,81	36,49	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	21,95
2814	Ropinirolum	Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg	21 tabl.	5909990877676	2012-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	27,54	35,64	30,64	Choroba i zespół Parkinsona		30%	14,19
2815	Ropinirolum	Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg	28 tabl.	5909990877683	2012-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	36,72	46,69	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	18,09
2816	Ropinirolum	Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	28 tabl.	5909990878000	2012-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	73,44	89,37	81,72	Choroba i zespół Parkinsona		30%	32,17
2817	Ropinirolum	Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg	28 tabl.	5909990878086	2012-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	146,88	171,21	163,44	Choroba i zespół Parkinsona		30%	56,80
2818	Ropinirolum	Aropilo , tabl. powl., 0,25 mg	210 tabl. (10 blist.po 21szt.)	5909990731954	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	35,10	44,64	38,31	Choroba i zespół Parkinsona		30%	17,82
2819	Ropinirolum	Aropilo , tabl. powl., 0,5 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990731985	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	8,10	11,06	7,66	Choroba i zespół Parkinsona		30%	5,70
2820	Ropinirolum	Aropilo , tabl. powl., 1 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732074	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	13,93	18,91	15,32	Choroba i zespół Parkinsona		30%	8,19
2821	Ropinirolum	Aropilo , tabl. powl., 2 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732227	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	27,92	36,05	30,64	Choroba i zespół Parkinsona		30%	14,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2822	Ropinirolum	Aropilo , tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732333	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	69,82	85,09	76,61	Choroba i zespół Parkinsona		30%	31,46
2823	Ropinirolum	Aropilo SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 2 mg	28 szt.	5909990998586	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	33,03	42,78	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	14,18
2824	Ropinirolum	Aropilo SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 4 mg	28 szt.	5909990998982	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	66,10	81,59	81,59	Choroba i zespół Parkinsona		30%	24,48
2825	Ropinirolum	Aropilo SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 8 mg	28 szt.	5909990999156	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	129,30	152,58	152,58	Choroba i zespół Parkinsona		30%	45,77
2826	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 0,25 mg	1 poj. po 21 szt.	5909990734078	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	4,43	6,02	3,83	Choroba i zespół Parkinsona		30%	3,34
2827	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl.	5909990734092	2012-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	6,80	9,69	7,66	Choroba i zespół Parkinsona		30%	4,33
2828	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 1 mg	21 tabl.	5909990734115	2012-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	13,61	18,56	15,32	Choroba i zespół Parkinsona		30%	7,84
2829	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 2 mg	1 poj. po 21 szt.	5909990734139	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	24,84	32,78	30,64	Choroba i zespół Parkinsona		30%	11,33
2830	Ropinirolum	Ceuronex, tabl. powł., 5 mg	1 poj. po 21 szt.	5909990734153	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	69,66	84,92	76,61	Choroba i zespół Parkinsona		30%	31,29
2831	Ropinirolum	Nironovo SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 2 mg	28 szt.	5909990990085	2013-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	33,11	42,87	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	14,27
2832	Ropinirolum	Nironovo SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 4 mg	28 szt.	5909990990092	2013-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	66,23	81,72	81,72	Choroba i zespół Parkinsona		30%	24,52
2833	Ropinirolum	Nironovo SR, tabl. o przedl. uwalnianiu, 8 mg	28 szt.	5909990990108	2013-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	132,45	155,92	155,92	Choroba i zespół Parkinsona		30%	46,78
2834	Ropinirolum	Parnirol, tabl. powł., 0,25 mg	21 tabl.	5909990775033	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	4,43	6,02	3,83	Choroba i zespół Parkinsona		30%	3,34
2835	Ropinirolum	Parnirol, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blist.)	5909990775231	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	29,38	37,58	30,64	Choroba i zespół Parkinsona		30%	16,13
2836	Ropinirolum	Parnirol, tabl. powł., 5 mg	21 tabl.	5909990775262	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	73,44	88,93	76,61	Choroba i zespół Parkinsona		30%	35,30
2837	Ropinirolum	Raponer, tabl. o przedl. uwalnianiu, 4 mg	28 szt.	5909990984299	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	64,80	80,21	80,21	Choroba i zespół Parkinsona		30%	24,06
2838	Ropinirolum	Raponer, tabl. o przedl. uwalnianiu, 8 mg	28 szt.	5909990984398	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	129,60	152,90	152,90	Choroba i zespół Parkinsona		30%	45,87
2839	Ropinirolum	Repirol SR, tabl. doustne o przedl. onym uwalnianiu, 2 mg	28 szt.	5909990983582	2013-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	33,10	42,85	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	14,25
2840	Ropinirolum	Repirol SR, tabl. doustne o przedl. onym uwalnianiu, 4 mg	28 szt.	5909990983803	2013-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	66,20	81,69	81,69	Choroba i zespół Parkinsona		30%	24,51
2841	Ropinirolum	Repirol SR, tabl. doustne o przedl. onym uwalnianiu, 8 mg	28 szt.	5909990983971	2013-05-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	132,41	155,87	155,87	Choroba i zespół Parkinsona		30%	46,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2842	Ropinirolum	Requip, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blist.)	5909990013586	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	37,80	46,52	30,64	Choroba i zespół Parkinsona		30%	25,07
2843	Ropinirolum	Requip, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (blist.)	5909990013685	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	8,96	11,98	7,66	Choroba i zespół Parkinsona		30%	6,62
2844	Ropinirolum	Requip, tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (blist.)	5909990013890	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	18,22	23,44	15,32	Choroba i zespół Parkinsona		30%	12,72
2845	Ropinirolum	Requip, tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990013968	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	99,79	116,86	76,61	Choroba i zespół Parkinsona		30%	63,23
2846	Ropinirolum	Requip Modutab, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644612	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	92,30	109,36	81,72	Choroba i zespół Parkinsona		30%	52,16
2847	Ropinirolum	Requip Modutab, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644636	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	184,58	211,17	163,44	Choroba i zespół Parkinsona		30%	96,76
2848	Ropinirolum	Requip Modutab, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644728	2012-01-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	46,82	57,39	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	28,79
2849	Ropinirolum	Rolpryna SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg	28 tabl.	5909990855766	2012-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	36,72	46,69	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	18,09
2850	Ropinirolum	Rolpryna SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	28 tabl.	5909990855773	2012-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	73,44	89,37	81,72	Choroba i zespół Parkinsona		30%	32,17
2851	Ropinirolum	Rolpryna SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg	28 tabl.	5909990855780	2012-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	146,88	171,21	163,44	Choroba i zespół Parkinsona		30%	56,80
2852	Ropinirolum	Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 2 mg	84 szt.	5909991033781	2013-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	99,36	119,09	119,09	Choroba i zespół Parkinsona		30%	35,73
2853	Ropinirolum	Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg	84 szt.	5909991033798	2013-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	198,72	228,41	228,41	Choroba i zespół Parkinsona		30%	68,52
2854	Ropinirolum	Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg	84 szt.	5909991033804	2013-03-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	397,44	444,32	444,32	Choroba i zespół Parkinsona		30%	133,30
2855	Ropinirolum	Ropodrin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg	28 szt.	5909990963874	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	33,11	42,87	40,86	Choroba i zespół Parkinsona		30%	14,27
2856	Ropinirolum	Ropodrin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg	28 szt.	5909990964239	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	66,23	81,72	81,72	Choroba i zespół Parkinsona		30%	24,52
2857	Ropinirolum	Ropodrin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg	28 szt.	5909990964321	2013-07-01	2 lata	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych	132,45	155,92	155,92	Choroba i zespół Parkinsona		30%	46,78
2858	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	5909991000103	2013-03-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,37	5,00	4,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	1,58
2859	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909991000141	2013-03-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,74	9,78	9,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,93
2860	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powł., 20 mg	28 szt.	5909991000158	2013-03-01	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,48	18,64	18,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2861	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909991000165	2013-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	26,96	35,36	35,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,61
2862	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990895106	2012-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,75	11,77	4,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,35
2863	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990895250	2012-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,10	20,77	9,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	13,92
2864	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. , 15 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990895380	2012-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	21,96	14,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	11,69
2865	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. powl., 15 mg	56 szt.	5909990895403	2013-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27,00	34,33	29,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	13,79
2866	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990895533	2012-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,00	30,86	19,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,17
2867	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. , 30 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990895663	2012-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27,00	34,33	29,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	13,79
2868	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. powl., 30 mg	56 szt.	5909990895687	2013-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	54,00	66,02	58,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	24,94
2869	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. , 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990895786	2012-03-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	41,90	51,19	39,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	23,81
2870	Roxithromycinum	Renicin, tabl. powl., 0,15 g	10 tabl. (1 blist.po 10)	5909990467419	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,98	19,63	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	15,13
2871	Roxithromycinum	Rolicyn, tabl. powl., 50 mg	10 tabl. (blist.)	5909990847815	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,56	15,35	3,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	13,85
2872	Roxithromycinum	Rolicyn, tabl. powl., 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990847914	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,02	18,92	6,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	15,92
2873	Roxithromycinum	Rolicyn, tabl. powl., 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990848010	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,52	22,32	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	17,82
2874	Roxithromycinum	Roxitron, tabl. powl., 0,15 g	10 tabl.	5909991032319	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,44	19,06	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	14,56
2875	Roxithromycinum	Rulid, tabl. powl., 150 mg	10 tabl.	5909990085910	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,30	28,45	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	23,95
2876	Roxithromycinum	Rulid, tabl. powl., 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990354115	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,76	19,71	6,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		50%	16,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2877	Roxithromycinum	Rulid, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 50 mg	10 tabl. (blis.)	5909990785919	2012-01-01	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	12,42	16,64	11,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	10,82
2878	Roxithromycinum	Xitrocin, tabl. powl., 150 mg	10 tabl. (blis.)	5909990971718	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stae postacie farmaceutyczne	17,50	21,24	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,74
2879	Salbutamolom	Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200 daw. (+poj.ochron.)	5909991106928	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,24	26,98	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	17,42
2880	Salbutamolom	Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+poj.ochron.)	5909991107826	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	37,30	44,92	25,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,73
2881	Salbutamolom	Sabumalin, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mcg	1 poj. (200 dawek)	5909990764150	2012-05-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	8,86	12,79	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,23
2882	Salbutamolom	Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml	100 ml	5909990317516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	3,00	4,45	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
2883	Salbutamolom	Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5 ml	5909990727414	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,66	24,80	2,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	24,80
2884	Salbutamolom	Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5 ml	5909990727513	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	33,49	37,05	5,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	35,15
2885	Salbutamolom	Velaspir, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 op. (2 poj.po 200 daw.)	5909990917211	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	46,60	54,78	25,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	34,59
2886	Salbutamolom	Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 g/dawk	1 poj.a 200 daw.	5909990442010	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	9,94	13,95	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	4,39
2887	Salbutamolom	Ventolin, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5 ml	5909990454013	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	14,04	15,66	2,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	15,66
2888	Salbutamolom	Ventolin, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5 ml	5909990454112	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	17,25	19,85	5,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	17,95
2889	Salbutamolom	Ventolin Dysk, proszek do inhalacji, 200 g	1 poj.a 60 daw.	5909990911912	2012-01-01	2 lata	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	16,30	19,53	7,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	15,08
2890	Salmeterolum	Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	60 kaps. (+ inh.)	5909991109424	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	49,14	61,74	61,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	3,78
2891	Salmeterolum	Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	90 kaps. (+ inh.)	5909991109431	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	75,60	92,36	91,74	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2892	Salmeterolum	Pulveril, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 g/dawk	120 dawek	5909990867653	2013-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	52,02	64,80	61,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	6,84
2893	Salmeterolum	Serevent, aerozol wziewny, zawiesina, 25 g	120 daw. (1 poj.)	5909990623099	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	69,36	83,17	61,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	25,21
2894	Salmeterolum	Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 g	1 szt. (60 daw.)	5909990437825	2012-01-01	2 lata	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	71,32	85,25	61,16	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli		ryczałt	27,29
2895	Selegilinum	Segan, tabl. , 5 mg	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990746026	2012-01-01	2 lata	171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	15,99	21,83	21,83	Choroba i zespół Parkinsona		ryczałt	6,40
2896	Selegilinum	Selgres, tabl. powł., 5 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990404315	2012-01-01	2 lata	171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	13,82	18,97	18,19	Choroba i zespół Parkinsona		ryczałt	6,11
2897	Sertindolum	Serdolect, tabl. powł., 4 mg	30 tabl.	5909991089214	2012-01-01	2 lata	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	90,67	109,41	109,41	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2898	Sertindolum	Serdolect, tabl. powł., 0,012 g	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991089313	2012-01-01	2 lata	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	271,45	306,97	306,35	Schizofrenia		ryczałt	3,82
2899	Sertindolum	Serdolect, tabl. powł., 16 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991089412	2012-01-01	2 lata	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	361,91	405,09	405,09	Schizofrenia		ryczałt	3,20
2900	Sertralinum	Asentra, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990963218	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	25,92	30,86	12,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	21,80
2901	Sertralinum	Asentra, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990963317	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	46,44	54,57	25,87	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	36,46
2902	Sertralinum	Asertin 100, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422685	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,06	27,72	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	9,66
2903	Sertralinum	Asertin 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422692	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,88	16,15	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	6,45
2904	Sertralinum	Miravil, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990804344	2012-05-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	9,18	13,29	13,29	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	3,99
2905	Sertralinum	Miravil, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990804368	2012-05-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,36	25,05	25,05	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	7,52
2906	Sertralinum	Sertagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990046621	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,60	28,24	25,87	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	10,13
2907	Sertralinum	Sertagen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990046690	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,80	14,83	12,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	5,77
2908	Sertralinum	Sertralina KRKA, tabl. powł., 50 mg	30 szt.	5909990919888	2013-03-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	8,10	12,15	12,15	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	3,65
2909	Sertralinum	Sertralina KRKA, tabl. powł., 100 mg	30 szt.	5909990919987	2013-03-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	16,20	22,76	22,76	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	6,83
2910	Sertralinum	Sertraline Arrow, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990641925	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	7,56	11,40	11,40	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	3,42
2911	Sertralinum	Sertralinum 123ratio, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990049943	2012-01-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,34	15,58	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	5,88
2912	Sertralinum	Sertralinum 123ratio, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990049981	2012-05-01	2 lata	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,36	25,05	25,05	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	7,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2913	Sertralinum	Sertranorm, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990663040	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,04	14,20	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	4,50
2914	Sertralinum	Sertranorm, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990663163	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,06	27,91	27,72	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	8,51
2915	Sertralinum	Setalof, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571925	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	9,72	13,86	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	4,16
2916	Sertralinum	Setalof, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571963	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,06	27,72	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	9,66
2917	Sertralinum	Stimuloton, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990994816	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	27,00	32,18	13,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	22,48
2918	Sertralinum	Zolof, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990753116	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	29,16	34,30	12,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	25,24
2919	Sertralinum	Zolof, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990753215	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	58,32	67,17	25,87	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	49,06
2920	Sertralinum	Zotral, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990013982	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	16,20	20,56	12,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	11,50
2921	Sertralinum	Zotral, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990569472	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	30,24	37,40	25,87	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	19,29
2922	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990673742	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	12,45	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,89
2923	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990673759	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	24,31	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,18
2924	Simvastatinum	Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618279	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	8,45	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,01
2925	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618286	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,80	14,54	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,65
2926	Simvastatinum	Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618293	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	27,23	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	17,45
2927	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023608	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	9,77	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,49
2928	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływajace na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	19,77	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2929	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990023653	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	37,07	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,94
2930	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649532	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,86	9,17	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,61
2931	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649655	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,25	18,46	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,33
2932	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	12,85	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,57
2933	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,74	19,65	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,09
2934	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,78	35,98	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	26,85
2935	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (blister)	5909990793853	2012-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,62	4,80	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	2,52
2936	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 10 mg	98 tabl.	5909990793860	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,69	16,44	11,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,45
2937	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990794089	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,47	18,69	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,56
2938	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 40 mg	98 tabl.	5909990794096	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	50,76	61,30	45,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	29,35
2939	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 80 mg	28 tabl.	5909990794102	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,03	36,08	26,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,82
2940	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 80 mg	98 tabl.	5909990794133	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	101,52	118,77	91,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	54,87
2941	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990794140	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,26	9,61	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,05
2942	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 20 mg	98 tabl.	5909990794157	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,38	31,74	22,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	15,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2943	Simvastatinum	Simratio 10 , tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019723	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	12,37	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,09
2944	Simvastatinum	Simratio 20 , tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	19,08	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,52
2945	Simvastatinum	Simratio 40 , tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019945	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	36,55	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,42
2946	Simvastatinum	SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623273	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	9,61	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,17
2947	Simvastatinum	SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623297	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	20,35	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,46
2948	Simvastatinum	SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 0,04 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623334	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	31,01	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,23
2949	Simvastatinum	Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	11,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,97
2950	Simvastatinum	Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	18,39	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,83
2951	Simvastatinum	Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27,00	31,97	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	22,84
2952	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	6,67	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,39
2953	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	11,64	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,08
2954	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	21,67	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,54
2955	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336623	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,40	8,86	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2956	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336630	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	16,22	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,33
2957	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	25,29	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,51
2958	Simvastatinum	Simvagama 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909991146016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,10	5,37	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,93
2959	Simvastatinum	Simvagama 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909991146115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	10,62	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,73
2960	Simvastatinum	Simvagama 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909991146214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	22,43	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,65
2961	Simvastatinum	Simvagen 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,63	4,80	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,52
2962	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,23	11,81	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,92
2963	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743650	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,73	9,03	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,47
2964	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	84 szt.	5909990818365	2013-03-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,61	21,97	19,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,28
2965	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037964	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,93	24,66	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,88
2966	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743667	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,38	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,25
2967	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623082	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,62	4,86	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,42
2968	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623105	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,80	9,24	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2969	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623136	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,15	18,54	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,76
2970	Simvastatinum	Simvastatin 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990037698	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,48	8,77	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,21
2971	Simvastatinum	Simvastatin 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990037704	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,70	9,12	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,23
2972	Simvastatinum	Simvastatin 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990037582	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,58	18,99	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,21
2973	Simvastatinum	Simvastatin 40 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990037575	2012-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,96	17,09	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,96
2974	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990723591	2012-09-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,24	4,38	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	2,10
2975	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990723812	2012-09-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,91	7,10	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	2,54
2976	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990723829	2012-09-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,26	8,67	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,78
2977	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990724031	2012-09-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,83	13,78	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,65
2978	Simvastatinum	Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist. po 14szt.)	5907553016012	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	7,63	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	3,07
2979	Simvastatinum	Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist. po 14szt.)	5907553016029	2013-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,85	14,86	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,73
2980	Simvastatinum	Simvastatin Krka (Vasilip), tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990436316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	11,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,97
2981	Simvastatinum	Simvastatin Krka (Vasilip), tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990436415	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	17,93	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,37
2982	Simvastatinum	Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990810871	2012-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,62	4,80	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2983	Simvastatinum	Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990810895	2012-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,23	9,56	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,00
2984	Simvastatinum	Simvastatin Pfizer, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990810949	2012-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,46	18,68	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,55
2985	Simvastatinum	Simvastatinum 123ratio (SimvaTeva), tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990635597	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,89	9,21	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,65
2986	Simvastatinum	Simvastatinum 123ratio (SimvaTeva), tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990635658	2012-05-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,15	18,36	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,23
2987	Simvastatinum	Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	5909990706396	2013-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	1,62	2,67	2,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	0,80
2988	Simvastatinum	Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990706532	2013-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,46	5,58	5,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	1,67
2989	Simvastatinum	Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990706631	2013-07-01	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,54	8,16	8,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	2,45
2990	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,50	15,26	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,98
2991	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	20,22	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,66
2992	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990927838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	36,55	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,42
2993	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990914012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	11,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,97
2994	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990914111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	17,93	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,37
2995	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990982714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	27,17	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,04
2996	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2997	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,10	14,74	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,18
2998	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	13,93	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,37
2999	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,32	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,88
3000	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	14,51	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,62
3001	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	24,15	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,37
3002	Simvastatinum	Zocor 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990365913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	21,65	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	19,37
3003	Simvastatinum	Zocor 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990366026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,61	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,05
3004	Simvastatinum	Zocor 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990769124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	37,13	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	28,00
3005	Simvastatinum	Zocor 80, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990846627	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	80,97	26,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	62,71
3006	Sirolimusum	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml	60 ml (but.+30 strzyk.)	5909990893645	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,50	1 083,93	1 080,56	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	ryczałt	6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3007	Sirolimusum	Rapamune, tabl. powl., 1 mg	30 tabl.	5909990985210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	540,28	540,28	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku limfoproliferacyjnym (ALPS) oporne na stosowanie sterydów lub przy zbyt nasilonych objawach niepo danych przewlekłej sterydoterapii w wysokich dawkach	ryczałt	3,20
3008	Solifenacinum	Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 miligram	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215584	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	112,75	130,59	76,68	Zespół p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	76,91
3009	Solifenacinum	Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 miligram	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215553	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	112,75	126,95	38,34	Zespół p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	100,11
3010	Sotalolum	Biosotal 160, tabl. , 160 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,55	10,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,00
3011	Sotalolum	Biosotal 40, tabl. , 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990365715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,58	9,57	5,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,80
3012	Sotalolum	Biosotal 80, tabl. , 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,25	5,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,48
3013	Sotalolum	SotaHEXAL 160, tabl. , 160 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,78	7,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,75
3014	Sotalolum	SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991014711	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,10	1,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	1,84
3015	Sotalolum	SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,47	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,96
3016	Spiramycinum	Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m.	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990098613	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,09	19,83	14,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	12,63
3017	Spiramycinum	Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m.	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990692118	2012-01-01	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,47	24,00	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	14,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3018	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990110216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	5,40	6,83	3,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	4,26
3019	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	100 tabl.	5909990110223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	19,44	24,85	18,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	12,00
3020	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990673124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	10,37	14,69	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	4,41
3021	Spironolactonum	Verospiron, tabl. , 25 mg	20 tabl.	5909990117215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	5,89	7,34	3,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	4,77
3022	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	10,90	14,52	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	6,81
3023	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	16,38	22,15	22,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	6,73
3024	Sucralfatum	Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml	250 ml	5909990164615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.2, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - plynne postacie farmaceutyczne	10,89	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	7,68
3025	Sucralfatum	Ulgastran, tabl. , 1 g	50 tabl.	5909990223619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.1, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stale postacie farmaceutyczne	10,89	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	7,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3026	Sucralfatum	Venter, tabl. powł., 1 g	50 tabl.	5909990242818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.1, Leki działające ochronnie na luzówki ołdka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	15,57	20,31	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroba wrzodowa ołdka i dwunastnicy u dzieci	50%	12,64
3027	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	100 ml	5909990312610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poćczeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	9,80	13,73	12,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	7,33
3028	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, zawiesina doustna, (0,2 g+0,04 g)/5 ml ml	100 ml	5909997198927	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poćczeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	9,72	13,64	12,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	7,24
3029	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5ml	100 ml	5909990117819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poćczeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	8,93	12,81	12,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	6,41
3030	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg	20 tabl. (blist.)	5909990117529	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w poćczeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	8,64	10,76	5,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	8,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3031	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol 480, tabl. , 400+80 mg	20 tabl.	5909990117611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,73	20,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	10,37
3032	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol 960, tabl. , 800+160 mg	10 tabl. (blist.)	5909990117710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,73	20,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	10,37
3033	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	33,85	30,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	12,40
3034	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	33,85	30,64	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	6,41
3035	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990864423	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,67	61,25	61,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	18,38
3036	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990864423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,67	61,25	61,25	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
3037	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909997012001	2012-03-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	44,82	57,17	57,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,15
3038	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909997012001	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	44,82	57,17	57,17	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3039	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN , tabl. dojel., 500 mg	100 szt.	5909997012759	2013-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,15	55,40	55,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	16,62
3040	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN , tabl. dojel., 500 mg	100 szt.	5909997012759	2013-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,15	55,40	55,40	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Mikroskopowe zapalenie jelita; 2. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
3041	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,15	30,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,70
3042	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,15	30,64	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	7,71
3043	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,27	61,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	18,38
3044	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,27	61,27	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
3045	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	30,80	30,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	9,35
3046	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	30,80	30,64	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,36
3047	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg	24 kaps. (blist.)	5909990159314	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,48	6,65	6,65	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
3048	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, tabl. , 200 mg	12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)	5909990159413	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,89	6,02	6,02	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
3049	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, tabl. , 200 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990159437	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,32	12,70	12,70	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
3050	Sulpiridum	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg	24 kaps. (blist.)	5909990159512	2012-01-01	2 lata	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	4,62	3,33	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3051	Sultamicillinum	Unasyn, tabl. powł., 375 mg	12 tabl.	5909990065110	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postaci farmaceutyczne	34,56	39,06	8,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	35,06
3052	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990051052	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,20	118,46	85,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	36,05
3053	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990051076	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	171,22	171,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3054	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990051137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1 086,74	856,10	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	233,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3055	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg	30 kaps.	5909990699957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	652,41	513,66	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	141,95
3056	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990783489	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,12	85,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	8,71
3057	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990783533	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729,00	804,61	804,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3058	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990783571	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	165,07	165,07	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3059	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	171,22	171,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3060	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447312	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	820,13	820,13	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3061	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991148713	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,12	85,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	8,71
3062	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990821006	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	66,96	83,23	83,23	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3063	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990821228	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	171,22	171,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3064	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990821280	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	669,60	741,65	741,65	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3065	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 0,5 mg	30 kaps.	5909990881352	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	68,85	85,22	85,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3066	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg	30 kaps.	5909990881406	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	165,07	165,07	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3067	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg	90 kaps.	5909990881475	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	421,20	470,59	470,59	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3068	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836857	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	59,40	75,21	75,21	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3069	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836888	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	112,32	135,31	135,31	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3070	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836949	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - takrolimus	540,00	604,27	604,27	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
3071	Tafluprostum	Taflotan, krople do oczu, roztwór, 0,015 mg/ml	30 szt. (3sasz.po 10pojem.)	5909990675944	2012-07-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	55,73	68,24	56,71	Obni anie podwy szonego ci nienia ródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym k tem przez czania lub nadci nienia ocznego: 1) w monoterapii u pacjentów, którzy: a) mog odnie korzy ze stosowania kropli do oczu bez rodka konserwuj cego, b) niewystarczaj co reaguj na leczenie pierwszego rzutu, c) nie toleruj lub nie mog stosowa leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania; 2) jako leczenie wspomagaj ce do terapii beta-adrenolitykami u pacjentów, którzy: a) mog odnie korzy ze stosowania kropli do oczu bez rodka konserwuj cego, b) niewystarczaj co reaguj na leczenie pierwszego rzutu, c) nie toleruj lub nie mog stosowa leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania.	30%	28,54	
3072	Tamoxifenum	Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990127412	2012-01-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	17,28	21,94	14,21	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	7,73
3073	Tamoxifenum	Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990331017	2012-01-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	12,42	16,78	14,21	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,57
3074	Tamoxifenum	Tamoxifen-EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990775316	2012-01-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	10,00	14,21	14,21	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3075	Tamoxifenum	Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg	30 tabl.	5909990722419	2012-03-01	2 lata	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	10,00	14,21	14,21	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3076	Tamsulosinum	Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990045006	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,30	27,10	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,24
3077	Tamsulosinum	Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565894	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,70	26,45	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,59
3078	Tamsulosinum	Bazetham Retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 mg	30 tabl.	5909990894598	2012-05-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,30	27,10	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,24
3079	Tamsulosinum	Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573585	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,69	26,44	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,58
3080	Tamsulosinum	Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	90 kaps. (9 blist.po 10 szt.)	5909990573592	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	63,18	77,62	77,62	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60
3081	Tamsulosinum	Omnis 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990716418	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	34,56	42,21	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	19,35
3082	Tamsulosinum	Omnis Ocas 0,4, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990219070	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	36,72	44,50	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	21,64
3083	Tamsulosinum	Omsal 0,4 mg , kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990586196	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,03	25,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
3084	Tamsulosinum	Prostaminic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573257	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,28	27,08	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,22
3085	Tamsulosinum	Ranlosin, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048007	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,33	26,06	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
3086	Tamsulosinum	Symlosin SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990044382	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,00	24,66	24,66	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
3087	Tamsulosinum	TamisPras, tabl. o przedłu onym działaniu, 0,4 mg	30 szt.	5909990980451	2013-07-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,66	26,42	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,56
3088	Tamsulosinum	TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570386	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,32	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,46
3089	Tamsulosinum	Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565948	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,69	26,44	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,58
3090	Tamsulosinum	Tamsudil, kaps. twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	90 kaps. (9 blist.po 10)	5909990565962	2012-03-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	56,65	70,69	70,69	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	9,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3091	Tamsulosinum	Tamsugen 0,4mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990570690	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,87	26,63	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,77
3092	Tamsulosinum	Tamsugen 0,4mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps.	5909990570706	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	39,74	50,72	50,72	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	6,40
3093	Tamsulosinum	Tamsunorm, kaps. o przedlu onym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990843602	2012-03-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,90	25,61	25,61	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
3094	Tamsulosinum	Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990430895	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	31,71	39,18	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	16,32
3095	Tamsulosinum	Tanyz ERAS, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 0,4 mg	30 tabl.	5909990847808	2012-05-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,03	25,03	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	3,20
3096	Tamsulosinum	Tanyz Eras, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 0,4 mg	60 szt.	5909990847822	2013-05-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	38,88	49,81	49,81	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	6,40
3097	Tamsulosinum	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566068	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,93	27,77	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	4,91
3098	Tamsulosinum	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990566075	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	40,95	52,00	52,00	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	6,40
3099	Tamsulosinum	Urostad, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	30 tabl.	5909990566280	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	21,60	28,47	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	5,61
3100	Telmisartanum	Actelsar, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990891863	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	27,00	34,38	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	14,02
3101	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 40 mg	28 tabl.	5909990440726	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	40,48	46,58	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia; Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	36,40
3102	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 80 mg	14 tabl.	5909990440818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	26,18	31,42	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia; Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	21,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3103	Telmisartanum	Micardis, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990440825	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	54,02	63,02	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia; Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	42,66
3104	Telmisartanum	Polsart, tabl., 40 mg	28 szt.	5909990936670	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,23	17,69	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,51
3105	Telmisartanum	Polsart, tabl., 80 mg	28 szt.	5909990936700	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	33,81	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	13,45
3106	Telmisartanum	Pritor, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990463428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,43	53,96	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia; Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	43,78
3107	Telmisartanum	Pritor, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990463510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,70	38,33	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia; Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	28,15
3108	Telmisartanum	Pritor, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990463527	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	65,29	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia; Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	44,93
3109	Telmisartanum	Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg	28 szt.	5909991018429	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,37	14,67	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,49
3110	Telmisartanum	Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg	28 szt.	5909991018436	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,74	27,74	27,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,32
3111	Telmisartanum	Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990840472	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,23	17,69	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	7,51
3112	Telmisartanum	Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990840557	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	33,81	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	13,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3113	Telmisartanum	Telmix, tabl., 40 mg	28 szt	5909990974863	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	17,41	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	7,23
3114	Telmisartanum	Telmix, tabl., 80 mg	28 szt	5909990974979	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,92	33,23	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	12,87
3115	Telmisartanum	Telmizek, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990902002	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,56	19,11	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	8,93
3116	Telmisartanum	Telmizek, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990902095	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,30	34,70	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	14,34
3117	Telmisartanum	Tezeo, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990818082	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,57	19,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	8,94
3118	Telmisartanum	Tezeo, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990818150	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,32	33,66	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	13,30
3119	Telmisartanum	Tolura, tabl., 40 mg	56 tabl.	5909997077628	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	33,81	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	13,45
3120	Telmisartanum	Tolura, tabl., 80 mg	56 tabl.	5909997077697	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	52,92	64,94	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	24,23
3121	Telmisartanum	Tolura 40 mg tabletki, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909997077604	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,63	24,48	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	14,30
3122	Telmisartanum	Tolura 80 mg tabletki, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909997077673	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	36,67	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	16,31
3123	Telmisartanum	Zanacodar, tabl., 40 mg	28 szt.	5909990941841	2013-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,95	17,40	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,22
3124	Telmisartanum	Zanacodar, tabl., 80 mg	28 szt.	5909990941926	2013-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,27	29,37	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	9,01
3125	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80+25 mg	14 tabl. (blist.PA/ALU/PVC)	5909990653010	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	40,31	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	30,13
3126	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80+25 mg	28 tabl. (blist.PA/ALU/PVC)	5909990653027	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	70,85	80,86	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	60,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3127	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl. , 80+12,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991020026	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,18	72,73	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	52,37
3128	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	PritorPlus, tabl. , 80/25 mg	14 tabl.	5909990644827	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,08	37,67	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	27,49
3129	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	PritorPlus, tabl. , 80/25 mg	28 tabl.	5909990644834	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,72	73,30	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	52,94
3130	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	PritorPlus, tabl. , 40/12,5 mg	28 tabl.	5909991068325	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	52,92	59,77	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	49,59
3131	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	PritorPlus, tabl. , 80/12,5 mg	28 tabl.	5909991068424	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,72	73,30	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	52,94
3132	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Tolucombi, tabl., 40 + 12,5 mg + mg	28 szt.	5909991045180	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	23,13	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	12,95
3133	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Tolucombi, tabl., 40 + 12,5 mg + mg	56 szt.	5909991045203	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	42,39	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	22,03
3134	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Tolucombi, tabl., 80 + 12,5 mg + mg	28 szt.	5909991045692	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,40	40,10	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,74
3135	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Tolucombi, tabl., 80 + 12,5 mg + mg	56 szt.	5909991045722	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	68,38	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	27,67
3136	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Tolucombi, tabl., 80 + 25 mg + mg	28 szt.	5909991045807	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,40	40,10	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	19,74
3137	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Tolucombi, tabl., 80 + 25 mg + mg	56 szt.	5909991045852	2013-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	68,38	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	27,67
3138	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują ce receptory alfa-adrenergiczne	32,09	36,81	9,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	30,00
3139	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują ce receptory alfa-adrenergiczne	32,09	36,81	9,73	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	30,28
3140	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują ce receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,10	24,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	26,08
3141	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują ce receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,10	24,32	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	21,98
3142	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują ce receptory alfa-adrenergiczne	66,96	79,21	48,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	45,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3143	Terazosinum	Hytrin, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	66,96	79,21	48,65	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	36,53
3144	Terazosinum	Kornam, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,14	10,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	20,85
3145	Terazosinum	Kornam, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,14	10,42	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	20,92
3146	Terazosinum	Kornam, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	32,94	40,49	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	22,25
3147	Terazosinum	Kornam, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	32,94	40,49	26,06	Przerost gruczołu krokowego		ryczałt	17,63
3148	Terbinafinum	Erfin, tabl. , 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990621057	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	32,27	40,41	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	25,75
3149	Terbinafinum	Erfin, tabl. , 250 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990621064	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	61,68	74,81	58,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	45,49
3150	Terbinafinum	Lamisil, tabl. , 125 mg	14 tabl.	5909990173112	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	29,98	35,75	14,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	28,42
3151	Terbinafinum	Lamisil, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990173211	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	55,49	65,01	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	50,35
3152	Terbinafinum	Myconafine, tabl. , 250 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990419036	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	23,28	30,87	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,21
3153	Terbinafinum	Myconafine, tabl. , 250 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990419050	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	46,57	58,78	58,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	29,46
3154	Terbinafinum	Terbigen, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990224845	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	29,42	37,38	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	22,72
3155	Terbinafinum	Terbinafina 250, tabl. , 250 mg	14 tabl. (blist.)	5909990623051	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	23,22	30,81	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	16,15
3156	Terbinafinum	Terbinafina 250, tabl. , 250 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990623068	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	46,44	58,65	58,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	29,33
3157	Terbinafinum	Terbisil, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990950515	2012-01-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,32	39,39	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	24,73
3158	Terbinafinum	Zelefion, tabl. , 250 mg	14 tabl.	5909990645497	2013-07-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	23,00	30,57	29,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	15,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3159	Terbinafinum	Zelefion, tabl. , 250 mg	28 tabl.	5909990645503	2013-07-01	2 lata	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	45,90	58,08	58,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		50%	29,04
3160	Testosteronum	Undestor Testocaps, kaps., 40 mg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990665082	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	63.0, Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	44,63	44,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Opó nione dojrzewanie płciowe przy hipogonady mie m skim - terapia substytucyjna	30%	13,39
3161	Tetrabenazinum	Tetmodis , tabl., 25 mg	112 tabl.	5909990805594	2013-01-01	2 lata	238.0, Inne leki działaj ce na układ nerwowy - tetrabenazyna	575,64	637,93	637,93	Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona		ryczałt	3,20
3162	Theophyllinum	Euphyllin CR retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	5,94	8,04	5,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	5,32
3163	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	7,02	8,84	4,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	7,31
3164	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	9,18	11,80	7,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	7,90
3165	Theophyllinum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl.	5909990261215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	8,23	11,83	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,00
3166	Theophyllinum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990803910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	6,31	8,43	5,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	5,71
3167	Theophyllinum	Theovent 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990149926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	8,51	12,13	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,30
3168	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,21	14,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,26
3169	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,21	14,21	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20
3170	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	6,17	9,01	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,70
3171	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	6,17	9,01	9,01	Nowotwory zło liwe		ryczałt	3,20
3172	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 5 mg	50 tabl.	5909990058822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	96,45	96,45	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3173	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powl., 10 mg	50 tabl.	5909990058839	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	190,07	190,07	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia	ryczałt	3,20
3174	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powl., 15 mg	50 tabl.	5909990058846	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	282,03	282,03	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia	ryczałt	3,20
3175	Tianeptinum	Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990370214	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,92	26,60	12,16	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	18,09
3176	Tianeptinum	Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg	30 tabl.	5909990875245	2012-11-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,44	20,79	12,16	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	12,28
3177	Ticlopidinum	Aclotin, tabl. powl., 0,25 g	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990334971	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	31,32	40,08	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	13,45
3178	Ticlopidinum	Aclotin, tabl. powl., 0,25 g	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990667116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	16,20	20,59	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,71
3179	Ticlopidinum	Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg	60 tabl. (but.)	5909990646616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	27,27	35,79	35,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	10,74
3180	Ticlopidinum	Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg	30 tabl. (but.)	5909990938315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	13,77	19,02	19,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	5,71
3181	Ticlopidinum	Iclopid, tabl. powl., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990044986	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	29,70	38,36	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,73
3182	Ticlopidinum	Iclopid, tabl. powl., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991029333	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	11,45	15,56	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	6,68
3183	Ticlopidinum	Ifapidin, tabl. powl., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990694846	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	32,18	40,99	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	14,36
3184	Ticlopidinum	Ifapidin, tabl. powl., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990694853	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	16,63	21,04	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	12,16
3185	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powl., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990450510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	17,82	22,31	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	13,43
3186	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powl., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990450534	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	37,80	46,95	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	20,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3187	Timololum	Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	1 fl.a 5 ml	5909990187713	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	4,91	6,59	4,87	Jaskra		30%	3,18
3188	Timololum	Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml	5 ml (flakon)	5909990073610	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,49	5,10	4,87	Jaskra		30%	1,69
3189	Timololum	Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	1 fl.a 5 ml	5909990073719	2012-01-01	2 lata	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,28	4,87	4,87	Jaskra		30%	1,46
3190	Tioguaninum	Lanvis, tabl., 40 mg	25 tabl.	5909990185214	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	234.0, Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity - analogi puryn - tioguanina	677,70	748,82	748,82	Nowotwory zło liwe	Choroba Le niowskiego - Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	bezpłatny	0,00
3191	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjn	30 kaps. (blist.)	5909990985111	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	141,88	141,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	42,56
3192	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjn	30 kaps. (blist.)	5909990985111	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	141,88	141,88	Ci ka posta POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z warto ci wska nika FEV1<50% oraz ujemn prób rozkurczow		ryczałt	3,20
3193	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjn	30 kaps. (blist. + Handihaler)	5909990985128	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	147,55	141,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	48,23
3194	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjn	30 kaps. (blist. + Handihaler)	5909990985128	2012-01-01	2 lata	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	147,55	141,88	Ci ka posta POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z warto ci wska nika FEV1<50% oraz ujemn prób rozkurczow		ryczałt	8,87
3195	Tizanidinum	Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	144.0, Leki działające rozkurczowo na mi nie szkieletowe - tizanidyna	44,24	54,67	44,19	Stwardnienie rozsiane	Stany spastyczne ci zwi zane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci	30%	23,74
3196	Tizanidinum	Tizanor, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990784486	2012-05-01	2 lata	144.0, Leki działające rozkurczowo na mi nie szkieletowe - tizanidyna	22,12	29,46	29,46	Stwardnienie rozsiane		30%	8,84
3197	Tolterodinum	Urimper, kaps. przedl. uwalnianiu, twarde, 2 mg	60 szt.	5909991008642	2013-03-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	30,95	40,23	38,34	Zespól p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	13,39
3198	Tolterodinum	Urimper, kaps. przedl. uwalnianiu, twarde, 4 mg	30 szt.	5909991008666	2013-03-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	30,95	40,23	38,34	Zespól p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	13,39
3199	Tolterodinum	Urimper, kaps. przedl. uwalnianiu, twarde, 4 mg	60 szt.	5909991008680	2013-03-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	61,91	76,68	76,68	Zespól p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	23,00
3200	Tolterodinum	Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990648559	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	16,05	19,81	8,95	Zespól p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	13,55
3201	Tolterodinum	Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990648641	2012-01-01	2 lata	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	16,05	21,57	17,89	Zespól p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		30%	9,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3202	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017652	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,32	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,61
3203	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990017669	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	24,12	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,49
3204	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017676	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	41,79	41,79	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3205	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990017751	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	75,35	75,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3206	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990649556	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	7,99	11,51	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,80
3207	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990649570	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	15,98	21,83	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3208	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990649594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,46	39,88	39,88	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3209	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990649617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,99	75,93	75,93	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3210	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	9,14	12,73	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,02
3211	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644148	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	17,45	23,39	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,76
3212	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644155	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	35,19	44,89	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,43
3213	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	72,00	87,60	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,48
3214	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990061464	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	83,16	99,43	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	15,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3215	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990061471	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	22,68	28,93	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	10,30
3216	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990061488	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,34	15,06	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,35
3217	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990061495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	44,28	54,52	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	14,06
3218	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 25 mg	1 but. po 60szt.	5909990715084	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	16,20	22,30	22,30	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3219	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 50 mg	1 but. po 60szt.	5909990715145	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,24	40,00	40,00	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3220	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 100 mg	1 but. po 60szt.	5909990715169	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	56,70	71,86	71,86	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3221	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990644056	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	75,35	75,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3222	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990644070	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	41,79	41,79	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3223	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990644094	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	24,12	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,49
3224	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990644124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,32	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,61
3225	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (but.)	5909990758814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,72	15,46	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,75
3226	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (but.)	5909990758913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,44	29,74	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	11,11
3227	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (but.)	5909990759019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	46,87	57,26	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	16,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3228	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (but.)	5909990759118	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	93,64	110,54	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	26,42
3229	Topiramatum	Topamax, kaps., 15 mg	60 kaps. (poj.)	5909990861514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	15,67	20,29	14,03	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	9,46
3230	Topiramatum	Topamax, kaps., 25 mg	60 kaps. (poj.)	5909990861613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	26,13	32,83	23,39	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	12,64
3231	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 25 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743377	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,32	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,61
3232	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 50 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743384	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	24,12	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,49
3233	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 100 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743391	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	41,79	41,79	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3234	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 200 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743407	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	75,35	75,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3235	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676545	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,85	16,66	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	8,95
3236	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676552	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,54	29,84	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	11,21
3237	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676569	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,18	53,35	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	12,89
3238	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676576	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	80,46	96,57	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	12,45
3239	Topiramatum	Topiramat Bluefish, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990779925	2012-05-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	6,43	9,85	9,85	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3240	Topiramatum	Topiramat Bluefish, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990779970	2012-05-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,91	18,57	18,57	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3241	Topiramatum	Topiramat Bluefish, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990780068	2012-05-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,87	35,00	35,00	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3242	Topiramatum	Topiramat Bluefish, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990780136	2012-05-01	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,79	66,17	66,17	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3243	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 25 mg	60 tabl.	5909990744978	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	18,87	18,87	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3244	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 50 mg	60 tabl.	5909990744985	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	35,42	35,42	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3245	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 100 mg	60 tabl.	5909990744992	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	66,71	66,71	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3246	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 200 mg	60 tabl.	5909990745005	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	103,68	125,66	125,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,27
3247	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	5909990763344	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	66,71	66,71	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3248	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990763351	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	18,87	18,87	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3249	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 100 mg	30 tabl.	5909990763368	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	35,42	35,42	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3250	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990763375	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	6,48	10,09	10,09	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3251	Topiramatum	Toramat, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671472	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,88	15,82	11,69	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,33
3252	Topiramatum	Toramat, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671489	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,44	25,74	23,39	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,55
3253	Topiramatum	Toramat, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671496	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	34,56	44,58	44,58	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
3254	Topiramatum	Toramat, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671502	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	64,80	80,45	80,45	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3255	Tramadolum	Adamon SR 100, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,19	39,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	17,20
3256	Tramadolum	Adamon SR 100, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,19	39,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	5,21
3257	Tramadolum	Adamon SR 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,33	59,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	23,34
3258	Tramadolum	Adamon SR 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,33	59,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	5,35
3259	Tramadolum	Adamon SR 200, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	82,81	79,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	26,83
3260	Tramadolum	Adamon SR 200, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	82,81	79,97	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,84
3261	Tramadolum	Adamon SR 50, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,48	19,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,49
3262	Tramadolum	Adamon SR 50, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,48	19,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	4,49
3263	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	26,96	23,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,17
3264	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	26,96	23,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,97
3265	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,25	71,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	24,87
3266	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,25	71,97	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	3,28
3267	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,74	23,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,95
3268	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,74	23,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,75
3269	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	18,88	15,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,69
3270	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	18,88	15,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3271	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,80	48,19	47,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,60
3272	Tramadolum	Noax Uno , tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,80	48,19	47,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,21
3273	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990634354	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,26	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,66
3274	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990634354	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,26	8,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,26
3275	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,45	23,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,04
3276	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,45	23,45	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3277	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,52	37,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,26
3278	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,52	37,52	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3279	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990634231	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,04	12,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,64
3280	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990634231	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,04	12,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,04
3281	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	35,67	35,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	10,70
3282	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	35,67	35,67	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3283	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,27	57,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	17,18
3284	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,27	57,27	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3285	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990634293	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,02	15,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,83
3286	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990634293	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,02	15,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3287	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,18	44,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,25
3288	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,18	44,18	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3289	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990634330	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,28	70,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	21,08
3290	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990634330	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,28	70,28	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3291	Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blist.)	5909990968718	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,84	9,62	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,02
3292	Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blist.)	5909990968718	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,84	9,62	8,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,62
3293	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	10 ml	5909990969012	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,53	8,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,65
3294	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	10 ml	5909990969012	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,53	8,40	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	3,13
3295	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990969029	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,28	80,62	80,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	24,19
3296	Tramadolum	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990969029	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,28	80,62	80,62	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3297	Tramadolum	Poltram 100, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 2 ml	5909990968916	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	6,08	8,87	8,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,66
3298	Tramadolum	Poltram 100, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 2 ml	5909990968916	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	6,08	8,87	8,87	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3299	Tramadolum	Poltram 50, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 1 ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	4,17	5,70	4,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,60
3300	Tramadolum	Poltram 50, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 1 ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	4,17	5,70	4,43	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,27
3301	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,95	8,68	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,08
3302	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,95	8,68	8,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3303	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,68	23,99	23,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,20
3304	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,68	23,99	23,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3305	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,33	42,51	39,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,52
3306	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,33	42,51	39,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,53
3307	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,11	14,04	12,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,64
3308	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,11	14,04	12,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,04
3309	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,07	36,47	35,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,28
3310	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,07	36,47	35,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,48
3311	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,43	65,82	59,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	23,83
3312	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,43	65,82	59,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	5,84
3313	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,53	17,28	15,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,09
3314	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,53	17,28	15,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,29
3315	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,00	45,22	45,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,57
3316	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,00	45,22	45,22	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3317	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,36	74,72	74,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	22,42
3318	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,36	74,72	74,72	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3319	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	10,96	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,36
3320	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	10,96	8,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,96
3321	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,39	8,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,51
3322	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,39	8,40	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	4,99
3323	Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,63	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,03
3324	Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,63	8,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,63
3325	Tramadolum	Tramal, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doodbytniczego	5,16	7,60	7,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,28
3326	Tramadolum	Tramal, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doodbytniczego	5,16	7,60	7,60	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3327	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 1 ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	4,17	5,70	4,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,60
3328	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 1 ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	4,17	5,70	4,43	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,27
3329	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 2 ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	6,08	8,87	8,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	2,66
3330	Tramadolum	Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	5 amp.a 2 ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	6,08	8,87	8,87	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3331	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253913	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,54	8,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,66
3332	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253913	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,54	8,40	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	3,14
3333	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	80,63	80,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	24,20
3334	Tramadolum	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920	2012-01-01	2 lata	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	80,63	80,62	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3335	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	5,96	8,69	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,09
3336	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blist.)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	5,96	8,69	8,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,69
3337	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	17,69	24,00	23,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	7,21
3338	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	17,69	24,00	23,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,01
3339	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	33,34	42,52	39,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	14,53
3340	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	33,34	42,52	39,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,54
3341	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,12	14,05	12,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	5,65
3342	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,12	14,05	12,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	2,05
3343	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	28,08	36,48	35,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	11,29
3344	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	28,08	36,48	35,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,49
3345	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	53,44	65,83	59,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	23,84
3346	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	53,44	65,83	59,98	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	5,85
3347	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	12,54	17,29	15,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,10
3348	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	12,54	17,29	15,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	1,30
3349	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	35,01	45,23	45,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,57
3350	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	35,01	45,23	45,23	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3351	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	74,74	74,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	22,42
3352	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	74,74	74,74	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,00
3353	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg	10 tabl.	5909990780303	2012-03-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,18	4,62	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	1,82
3354	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg	10 tabl.	5909990780303	2012-03-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,18	4,62	4,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,62
3355	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg	30 tabl.	5909990780334	2012-03-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,75	12,59	12,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,19
3356	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg	30 tabl.	5909990780334	2012-03-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,75	12,59	12,00	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,59
3357	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg	50 tabl.	5909990780341	2012-03-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,58	20,08	19,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	6,09
3358	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg	50 tabl.	5909990780341	2012-03-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,58	20,08	19,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	0,09
3359	Tramadolum	Tramundin, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,43	23,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	13,64
3360	Tramadolum	Tramundin, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,43	23,99	Nowotwory zło liwe		bezpłatny	6,44
3361	Trandolaprilum	Trandolapril Arrow, kaps. twarde, 2 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990641123	2012-01-01	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	9,55	11,68	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	9,58
3362	Travoprostum	Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990942619	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	46,01	57,11	47,26	Jaskra		ryczałt	13,05
3363	Travoprostum + Timololum	DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990586172	2012-01-01	2 lata	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one	46,01	57,11	47,26	Jaskra		ryczałt	13,05
3364	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990715497	2012-03-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54,00	64,03	36,49	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	38,49
3365	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990918621	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,15	17,65	9,12	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	11,27
3366	Trazodonum	Trittico CR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990918720	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,90	23,39	12,16	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		30%	14,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3367	Triamcinolonum	Polcortolon, tabl. , 4 mg	20 tabl.	5909990171316	2012-01-01	2 lata	82.6. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	7,38	10,66	10,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	3,20
3368	Triptorelinum	Decapeptyl Depot, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 3,75 mg	1 zest. (1 amp. strz. proszku + 1 amp. strz. rozpuszczalnika)	5909990366118	2012-11-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin	232,47	265,08	265,08	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	3,20
3369	Triptorelinum	Diphereline SR 11,25, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny o przedłu onym uwalnianiu do wstrzykiwa , 11,25 mg	1 fiol. prosz. + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły	5909990894413	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin	786,28	865,76	852,04	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	23,32
3370	Triptorelinum	Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny o przedłu onym uwalnianiu do wstrzykiwa , 3,75 mg	Pudełko zawieraj ce 1 fiolk , i 1 ampułk z 1 strzykawk (z polipropylenu) i 2 igłami	5909990486915	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin	289,98	326,04	265,08	Nowotwory zło liwe - Rak prostaty		ryczałt	64,16
3371	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	10 ml (2x5 ml)	5909990125524	2012-01-01	2 lata	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	6,48	10,43	10,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
3372	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	10 ml (2x5 ml)	5909990125623	2012-01-01	2 lata	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	9,72	13,86	13,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20
3373	Valganciclovirum	Valcyte, tabl. powl., 450 mg	60 tabl. (but.)	5909990727407	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego	5 562,00	5 997,92	5 997,92	Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narz dów mi szowych - profilaktyka po zaka czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 110 dni po przeszczepie, Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zaka czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 200 dni po przeszczepie	Zapobieganie i leczenie zaka enia wirusem cytomegalii po transplantacji narz dów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku ycia; Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom ko czyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zaka czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	3,20
3374	Valsartanum	Apo-Valsart, tabl. powl., 80 mg	28 tabl.	5909990870561	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,57	14,87	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,69
3375	Valsartanum	Apo-Valsart, tabl. powl., 160 mg	28 tabl.	5909990870905	2013-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	21,15	28,18	28,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,45
3376	Valsartanum	Avasart, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990773695	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	4,94
3377	Valsartanum	Avasart, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990773763	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		30%	8,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3378	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 0,08 g	28 tabl.	5909990830961	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,58	15,94	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	5,76
3379	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 0,16 g	28 tabl.	5909990831067	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
3380	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 320 mg	28 szt.	5909990831159	2012-09-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	50,06	50,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	15,02
3381	Valsartanum	Bespres, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	6,09
3382	Valsartanum	Bespres, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751877	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,50	30,66	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,30
3383	Valsartanum	Diovan, tabl. powl., 80 mg	28 tabl.	5909990929115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,20	49,46	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	39,28
3384	Valsartanum	Diovan, tabl. powl., 160 mg	28 tabl.	5909990929214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	54,99	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	34,63
3385	Valsartanum	Diovan, tabl. powl., 160 mg	14 tabl.	5909990929238	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	28,86	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	18,68
3386	Valsartanum	Nortivan, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726776	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	6,09
3387	Valsartanum	Nortivan, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726844	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
3388	Valsartanum	Tensart, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990681877	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,82	19,39	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	9,21
3389	Valsartanum	Tensart, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990682065	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,38	30,53	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,17
3390	Valsartanum	Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074969	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3391	Valsartanum	Valsacor 160, tabl. powł., 160 mg	60 tabl.	5909990818983	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,52	59,53	59,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	17,86
3392	Valsartanum	Valsacor 320, tabl. powł., 320 mg	28 tabl.	5909990779147	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,00	58,67	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,96
3393	Valsartanum	Valsacor 80, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074945	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	21,99	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	11,81
3394	Valsartanum	Valsacor 80, tabl. powł., 80 mg	60 tabl.	5909990818853	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,16	32,66	31,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,85
3395	Valsartanum	Valsargen, kaps. twarde, 80 mg	28 kaps.	5909990856954	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,94
3396	Valsartanum	Valsargen, kaps. twarde, 160 mg	28 kaps.	5909990857081	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,60
3397	Valsartanum	Valsartan Arrow, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990917266	2012-09-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	14,55	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,37
3398	Valsartanum	Valsartan Arrow, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990917365	2012-09-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	24,08	24,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,22
3399	Valsartanum	Valsartan Ranbaxy, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990959952	2012-11-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	14,55	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,37
3400	Valsartanum	Valsartan Ranbaxy, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990959976	2012-11-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	24,08	24,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,22
3401	Valsartanum	Valsotens, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990693276	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	25,22	25,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,57
3402	Valsartanum	Valtap, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990804542	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,94
3403	Valsartanum	Valtap, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990804580	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,60
3404	Valsartanum	Valzek, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990681761	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	6,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3405	Valsartanum	Valzek, tabl. , 160 mg	28 tabl.	5909990681785	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
3406	Valsartanum	Vanatex, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990827459	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,94
3407	Valsartanum	Vanatex, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990827480	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,60
3408	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688531	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,76	33,10	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	22,92
3409	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,84	36,33	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	15,97
3410	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Axudan HCT, tabl. powł., 80+12,5 mg	28 tabl.	5909990829927	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,58	15,94	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	5,76
3411	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Axudan HCT, tabl. powł., 160+12,5 mg	28 tabl.	5909990829989	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3412	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Axudan HCT, tabl. powł., 160+25 mg	28 tabl.	5909990830107	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3413	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Axudan HCT, tabl. powł., 0,32+0,0125 g	28 tabl.	5909990830176	2012-09-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	50,06	50,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	15,02
3414	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Axudan HCT, tabl. powł., 320+25 mg	28 szt.	5909990830244	2012-09-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	50,06	50,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	15,02
3415	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 80+12,5 mg	28 tabl. (2 blistry po 14szt.)	5909990740833	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,94
3416	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160+25 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990740857	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	6,09
3417	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160+25 mg	28 tabl.	5909990740864	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,50	30,66	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,30
3418	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160+12,5 mg	28 tabl.	5909990874255	2012-03-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,60	32,90	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	12,54
3419	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Diovan, tabl. powł., 160+25 mg	14 tabl. (blist.)	5909991062927	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,44	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	23,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3420	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg	28 tabl.	5909990772292	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	18,56	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,38
3421	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg	28 tabl.	5909990772452	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,60	32,90	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	12,54
3422	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl.	5909990772506	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3423	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powl., 80 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990740192	2013-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,68	13,93	13,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,18
3424	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powl., 80 + 12,5 mg	56 tabl.	5909990740208	2013-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,35	26,27	26,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,88
3425	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg	28 tabl. (blis.)	5909990740246	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3426	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powl., 160 + 12,5 mg	56 tabl.	5909990740253	2013-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,71	49,88	49,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	14,96
3427	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl.	5909990740277	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3428	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powl., 160 + 25 mg	56 tabl.	5909990740284	2013-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,71	49,88	49,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	14,96
3429	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-valsacor, tabl. powl., 320+12,5 mg	28 tabl.	5909990847464	2012-05-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,00	58,67	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,96
3430	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-valsacor, tabl. powl., 320+25 mg	28 tabl.	5909990847501	2012-05-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,00	58,67	58,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	17,96
3431	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg	28 tabl. (2 blis.po 14 szt.)	5909990704132	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,38	30,53	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,17
3432	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl. (2 blis.po 14 szt.)	5909990704262	2012-01-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,38	30,53	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,17
3433	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160 + 12,5 mg	28 szt.	5909990847600	2013-07-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,48	26,41	26,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,92
3434	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, tabl. powl., 160 + 25 mg	28 szt.	5909990847655	2013-07-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,48	26,41	26,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,92
3435	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valsartan+HCT Arrow, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl.	5909990917082	2012-09-01	2 lata	45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,44	26,37	26,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3436	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl. powl.	5909990877201	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,55	28,60	28,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,58
3437	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg	28 tabl. powl.	5909990877386	2012-07-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,55	28,60	28,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,58
3438	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg	28 tabl.	5909990801961	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,60
3439	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl.	5909990802005	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	8,60
3440	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg	14 tabl.	5909990813995	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	4,94
3441	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg	28 tabl.	5909990862351	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	6,09
3442	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Vanatex HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg	28 tabl.	5909990862375	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3443	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Vanatex HCT, tabl. powl., 160+25 mg	28 tabl.	5909990862399	2012-05-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	10,59
3444	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Zelvarthancombo, tabl. powl., 160/25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990761302	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,30	35,76	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji		30%	15,40
3445	Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047895	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	32,98	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,10
3446	Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047956	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	49,68	61,17	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	25,41
3447	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660636	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,69	14,83	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	5,89
3448	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660643	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,71	28,52	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	10,64
3449	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660650	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,94	47,67	47,67	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	14,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3450	Venlafaxinum	Efectin ER 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990494019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	75,60	88,64	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	52,88
3451	Venlafaxinum	Efectin ER 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990493913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	50,98	59,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	41,67
3452	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990715299	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,72	13,81	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	4,87
3453	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990715350	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,90	25,54	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	7,66
3454	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990715374	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,25	50,12	50,12	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,04
3455	Venlafaxinum	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721528	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	37,80	48,57	48,57	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	14,57
3456	Venlafaxinum	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721498	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,10	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	7,16
3457	Venlafaxinum	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721504	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	11,67
3458	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990691760	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,69	13,78	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	4,84
3459	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990691883	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	38,59	49,42	49,42	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	14,83
3460	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990691906	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,06	24,64	24,64	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	7,39
3461	Venlafaxinum	Jarvis 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077359	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,76	27,36	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	10,61
3462	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,76	24,46	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3463	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673766	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	31,18	38,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	20,67
3464	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673803	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,35	70,36	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	34,60
3465	Venlafaxinum	Olwexya, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, 75 mg	28 szt.	5909990663507	2013-07-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,89	25,53	25,53	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne		30%	7,66
3466	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990795789	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	12,96	19,24	19,24	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	5,77
3467	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	98 kaps.	5909990795796	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	43,20	57,30	57,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	17,19
3468	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990795802	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	6,48	10,37	10,37	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	3,11
3469	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	98 kaps.	5909990795819	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,14	31,23	31,23	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	9,37
3470	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990795826	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	32,55	32,55	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	9,77
3471	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	98 kaps.	5909990795833	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	78,84	99,08	99,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	29,72
3472	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727490	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,34	15,52	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	6,58
3473	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727506	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	11,67
3474	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	45,36	56,59	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	20,83
3475	Venlafaxinum	Symfaxin ER, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048106	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54,00	65,75	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	29,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3476	Venlafaxinum	Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048397	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,06	27,83	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	9,95
3477	Venlafaxinum	Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990048403	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,41	20,04	9,12	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	13,66
3478	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 37,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	17,60	22,17	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	13,23
3479	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 37,5 mg	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,02	43,68	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	25,80
3480	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	32,62	40,09	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	22,21
3481	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 75 mg	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093921	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	67,77	80,35	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	44,59
3482	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (blist.)	5909990626670	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,51	37,84	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	19,96
3483	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (blist.)	5909990626724	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,61	70,64	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	34,88
3484	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055982	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,54	24,22	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,28
3485	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056279	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	29,44	36,72	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	18,84
3486	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056293	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	59,86	71,96	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	36,20
3487	Venlafaxinum	Venlabax MR 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719327	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,00	40,30	40,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	12,09
3488	Venlafaxinum	Venlabax MR 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719259	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	15,00	21,40	21,40	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3489	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990767601	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,58	20,96	20,96	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	6,29
3490	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990767625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	35,98	35,98	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	10,79
3491	Venlafaxinum	Venlectine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040971	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,26	14,38	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	5,44
3492	Venlafaxinum	Venlectine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040995	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,98	26,68	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	8,80
3493	Venlafaxinum	Venlectine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps.	5909990424672	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,96	50,86	50,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,26
3494	Verapamilum	Staveran 120, tabl. powł., 120 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil	2,08	3,08	3,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,08
3495	Verapamilum	Staveran 40, tabl. powł., 40 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990045211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil	2,08	2,50	1,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	2,50
3496	Verapamilum	Staveran 80, tabl. powł., 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil	2,08	2,79	2,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	2,79
3497	Vigabatrinum	Sabril, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990312818	2012-01-01	2 lata	162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - stałe postacie farmaceutyczne	221,40	253,05	253,05	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3498	Vigabatrinum	Sabril, granulat do sporz dzania roztworu doustnego, 500 mg	50 sasz.	5909990832712	2012-01-01	2 lata	162.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postacie farmaceutyczne	120,96	143,13	143,13	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3499	Vigabatrinum	Sabril, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909997198040	2012-03-01	2 lata	162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - stałe postacie farmaceutyczne	203,04	233,59	233,59	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3500	Vigabatrinum	Sabril, tabl. powł., 500 mg	100 szt.	5909997215129	2013-05-01	2 lata	162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - stałe postacie farmaceutyczne	183,60	212,98	212,98	Padaczka oporna na leczenie		ryczałt	3,20
3501	Warfarinum	Warfin, tabl. , 3 mg	100 tabl. (słoik)	5909990622368	2012-01-01	2 lata	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	14,02	17,57	9,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	11,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3502	Warfarinum	Warfin, tabl. , 5 mg	100 tabl. (słoik)	5909990622382	2012-01-01	2 lata	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	22,47	27,78	16,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	18,26
3503	Ziprasidonum	Zipragen, kaps. twarde, 80 mg	56 kaps. twardych	5909990773350	2012-03-01	2 lata	178.9, Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon	230,93	263,02	247,18	Schizofrenia		ryczałt	21,81
3504	Ziprasidonum	Zypsila, kaps. twarde, 80 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990681228	2012-01-01	2 lata	178.9, Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon	216,00	247,18	247,18	Schizofrenia		ryczałt	5,97
3505	Zuclopenthixolum	Clopixol, tabl. powl., 10 mg	100 tabl.	5909990126729	2012-01-01	2 lata	179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,44	34,07	20,94	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	13,13
3506	Zuclopenthixolum	Clopixol, tabl. powl., 25 mg	100 tabl.	5909990126828	2012-01-01	2 lata	179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,04	52,35	52,35	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
3507	Zuclopenthixolum	Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwa , 200 mg/ml	1 amp.a 1 ml	5909990189212	2012-01-01	2 lata	179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego	14,40	19,38	14,63	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	4,75
3508	Zuclopenthixolum	Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwa , 200 mg/ml	10 amp.a 1 ml	5909990189229	2012-01-01	2 lata	179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego	123,77	146,26	146,26	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe		bezpłatny	0,00
3509	sole rehydracyjne	Gastrolit, proszek do sporz dzania roztworu,	15 sasz.	5909990012312	2012-01-01	2 lata	9.0, Elektrolyty do podawania doustnego	6,65	9,67	9,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji		ryczałt	3,20

A 1a. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę we wskazaniach pozarejestacyjnych

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Zakres wskazań pozarejestacyjnych objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acebutololum	Sectral 200, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990109920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,18	11,46	5,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	8,79
2	Acebutololum	Sectral 400, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990110018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,28	21,41	11,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,88
3	Aciclovirum	Hascovir, tabl., 800 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990835782	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	32,40	42,97	42,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	21,49
4	Aciclovirum	Hascovir, tabl., 200 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909991049515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	9,90	14,05	12,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytarnej; Leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	7,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Aciclovirum	Hascovir, tabl. , 400 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991052218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	16,76	23,36	23,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	11,68
6	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840014	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	12,10	16,39	12,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	10,16
7	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	21,60	28,49	24,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	16,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Aciclovirum	Heviran, tabl. powł., 800 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840229	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	38,88	49,83	49,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej.Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	24,92
9	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990109210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,95	0,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	1,95
10	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl. , 15 mg	30 tabl.	5909990109319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,00	2,96	2,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	2,96
11	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,95	0,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	1,95
12	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 15 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,01	2,97	2,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	2,97
13	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 360 mg	120 tabl.	5909990219209	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	821,66	904,21	881,09	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	26,32
14	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 180 mg	120 tabl.	5909990219797	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	397,87	444,62	440,54	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	7,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Allopurinolum	Allupol, tabl. , 100 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990109418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	5,94	8,69	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
16	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 100 mg	50 tabl.	5909990163212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	5,94	8,69	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
17	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 300 mg	30 tabl.	5909990414819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	10,80	15,21	15,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
18	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, tabl. , 5+50 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990206025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,09	9,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Moczówka nerkopochodna	30%	2,73
19	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid mite, tabl. , 2,5+25 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990373819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,27	6,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Moczówka nerkopochodna	30%	3,01
20	Amiodaronum	Opacorden, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990086818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	31.0, Leki przeciwyrytmiczne klasy III - amiodaron	17,63	23,93	23,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, cz stoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
21	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	7,02	8,41	3,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Neuralgie, ból neuropatyczny	30%	6,23
22	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	3,89	4,50	1,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Neuralgie, ból neuropatyczny	30%	3,63
23	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642267	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
24	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,14	8,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Amlodipinum	Agen 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991099022	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,10	16,73	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,10
26	Amlodipinum	Agen 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991098926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,60	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,78
27	Amlodipinum	Aldan, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008635	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,10	10,89	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,07
28	Amlodipinum	Aldan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008734	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,55	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,92
29	Amlodipinum	Amlodipine Arrow 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057399	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,91	13,34	13,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,00
30	Amlodipinum	Amlodipine Arrow 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057351	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,64	7,23	7,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,17
31	Amlodipinum	Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721580	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,97	7,57	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,27
32	Amlodipinum	Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721603	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Amlodipinum	Amlomyl, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990842476	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,08	7,68	7,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,30
34	Amlodipinum	Amlomyl, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990842698	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
35	Amlodipinum	Amlonor, tabl. , 5 mg	30 tabl. (blist.)	5909990642618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,79	7,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,34
36	Amlodipinum	Amlonor, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990642625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,61
37	Amlodipinum	Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048977	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	15,12	19,93	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	8,30
38	Amlodipinum	Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048939	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,64	11,46	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,64
39	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	16,04	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,22
40	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	17,82	22,79	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	11,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Amlodipinum	Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565993	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,80	16,41	16,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,92
42	Amlodipinum	Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565986	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,48	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,66
43	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,95	6,45	4,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,54
44	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,94	12,84	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	7,02
45	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,46	21,35	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	9,72
46	Amlodipinum	Finamlox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990794461	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,23	15,80	15,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,74
47	Amlodipinum	Lofral 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636075	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,54	17,20	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Amlodipinum	Lofral 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636068	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,60	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,78
49	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990993017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	6,24	8,91	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,09
50	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990993116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,78
51	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	90 tabl.	5909990421824	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	26,46	33,15	24,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	15,70
52	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,18	12,03	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	6,21
53	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,74	21,65	16,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,02
54	Amlodipinum	Vilpin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990621217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,48	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Amlodipinum	Vilpin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991042912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,99	16,61	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t micze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,98
56	Amoxicillinum	Amotaks, tabl. , 1 g	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	11,79	16,22	14,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,55
57	Amoxicillinum	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,70	10,34	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,10
58	Amoxicillinum	Amotaks, granulata do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml (39,2 g)	5909990794379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.2, Penicyliny pól syntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	11,88	16,61	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
59	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl. , 500 mg	16 tabl.	5909991043520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,78	8,31	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,07
60	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl. , 750 mg	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,55	12,07	11,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,12
61	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl. , 1 g	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,52	14,87	14,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
62	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 250 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,79	7,54	4,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,09
63	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 500 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,00	12,13	9,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,04
64	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 1000 miligram	20 tabl.	5909990063413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	13,15	18,23	18,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
65	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 375 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,27	9,78	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	6,01
66	Amoxicillinum	Duomox, tabl. , 750 miligram	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny pól syntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,26	14,47	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 kaps.	5909990066018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	3,24	4,55	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,03
68	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps.	5909990066117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,80	8,32	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,08
69	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990083619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	5,80	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
70	Amoxicillinum	Ospamox, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml	60 ml (5,1 g)	5909990086580	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	3,78	5,27	4,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	4,32
71	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,5 g	16 tabl.	5909990293124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,23	7,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,99
72	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,75 g	16 tabl.	5909990293223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,42	11,94	11,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,99
73	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 1 g	16 tabl.	5909990293322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,03	14,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
74	Amoxicillinum	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg	20 tabl.	5909990778041	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	18,02	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	ryczałt	3,20
75	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoclan, tabl. powł., 875+125 g	14 tabl. (but.)	5909990572991	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,27	33,24	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,88
76	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,25+0,125 g	21 tabl.	5909990077120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	20,92	14,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,91
77	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,5+0,125 g	14 tabl. (blis.)	5909990081912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	20,53	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	11,18
78	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,5+0,125 g	21 tabl. (but.)	5909990081929	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	27,06	27,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,53
79	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, tabl. powł., 0,875+0,125 g	14 tabl. (2 blis.po 7 szt.)	5909990411115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	32,77	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	35 ml (8,75 g)	5909990894819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	9,18	12,10	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	8,20
81	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	70 ml (17,5 g)	5909990894826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	15,93	20,89	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,09
82	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	140 ml (35 g)	5909990894833	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,43	31,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	15,84
83	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej /tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 0,875+0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990649747	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	21,60	29,49	29,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	14,75
84	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksyklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej /tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 0,5+0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990646906	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,78	17,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	8,89
85	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg	21 tabl. (3 blist.po 7 szt.)	5909990064120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	15,66	20,35	14,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,34
86	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990368235	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	17,28	22,82	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,47
87	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5ml	35 ml (5,3 g)	5909990419319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	11,34	14,39	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,49
88	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml	70 ml (10,6 g)	5909990419326	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	20,52	25,75	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	17,95
89	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml	140 ml (21 g)	5909990419333	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	27,00	34,86	31,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	19,27
90	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990717521	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	28,62	36,78	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	20,42
91	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg	14 tabl.	5909997198385	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stale postacie farmaceutyczne	24,84	32,77	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg	14 tabl.	5909997199702	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,21	19,56	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,21
93	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg	14 tabl.	5909997200576	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,15	19,51	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,16
94	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin ES, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5ml	50 ml (but.)	5909990614288	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	20,52	25,93	16,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	17,58
95	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin ES, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5ml	100 ml (but.)	5909990614318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	32,94	41,43	33,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	24,72
96	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Augmentin SR, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1000+62,5 mg	28 tabl. (7 blist.po 4 szt.)	5909990041985	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	50,67	64,21	64,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	32,11
97	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 1000, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990219087	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	33,92	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	17,56
98	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 312, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg	20 tabl. (5 blist.po 4 szt.)	5909990968015	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,50	21,13	13,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	14,45
99	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 625, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990968114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,20	19,56	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,21
100	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, tabl. powl., 0,5+0,125 g	21 tabl.	5909990430611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,87	26,94	26,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	13,47
101	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, tabl. powl., 0,5+0,125 g	14 tabl.	5909990430628	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,15	19,51	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	10,16
102	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	140 ml (25,2 g)	5909990793587	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	23,54	31,19	31,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	15,60
103	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	35 ml (6,3 g)	5909990793594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	8,96	11,88	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	7,98
104	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml	70 ml (12,6 g)	5909990793600	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne	15,71	20,65	15,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	12,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Taromentin, tabl. powl., 0,875+0,125 g	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909991087715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,79	32,72	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e w pierwotnych niedoborach odporno ci	50%	16,36
106	Aprepitant	Emend, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007387	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant	199,80	229,58	229,58	Wczesne albo opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka	Wczesne lub opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka	ryczałt	3,20
107	Atenololum	Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990370610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	4,95	7,48	7,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
108	Atenololum	Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990011414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	4,95	7,48	7,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
109	Atorvastatinum	ATORVOX, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573547	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,18	38,67	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	24,00
110	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787586	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	10,15	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,48
111	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787609	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	20,05	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,71
112	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787647	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	39,06	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	24,39
113	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990792290	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,83	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	4,16
114	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990792573	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,88	15,39	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,05
115	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990792887	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	23,76	29,75	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,08
116	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990336647	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	35,85	15,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	24,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990419173	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	54,02	31,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	32,01
118	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990623464	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	36,04	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,37
119	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	13,55	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,88
120	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	19,39	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,05
121	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	13,38	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,71
122	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077939	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	21,68	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,34
123	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	42,34	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,67
124	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573400	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,04	12,17	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,50
125	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	19,00	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,66
126	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 80 mg	30 tabl.	5909990849390	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	67,61	78,76	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	49,42
127	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078141	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	10,81	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,14
128	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078264	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	19,39	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,05
129	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (blist.)	5909990078356	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	36,04	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Atorvastatinum	Atrox 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	10,69	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,02
131	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124717	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,85	18,53	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,19
132	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	26,89	33,06	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,39
133	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991150914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	10,69	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,02
134	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,74	17,35	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,01
135	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,83	31,94	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	17,27
136	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990905508	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,91	6,72	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,05
137	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990905638	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,88	13,26	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,92
138	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990905782	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,74	26,54	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,87
139	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	11,26	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,59
140	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078707	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	19,97	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,63
141	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078790	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,80	44,63	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	29,96
142	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755547	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	7,49	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powl., 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755554	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	54,72	41,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	25,38
144	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755561	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	14,70	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,36
145	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755578	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	28,37	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,70
146	Atorvastatinum	Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338290	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	14,69	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,02
147	Atorvastatinum	Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338368	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,68	17,30	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,96
148	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338436	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,48	31,57	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,90
149	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990338443	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	66,34	79,41	62,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	35,40
150	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053179	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,80	12,98	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,31
151	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053230	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,96	16,53	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,19
152	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053278	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,38	31,46	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,79
153	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	16,41	5,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,74
154	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	32,56	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	25,22
155	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	48,44	15,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	37,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	22,26	10,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,92
157	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	43,48	20,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	28,81
158	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998937	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	66,62	31,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	44,61
159	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,15	30,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; różni szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL;	ryczałt	3,20
160	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,70	18,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; różni szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL;	ryczałt	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	Azathioprinum	Imuran, tabl. powl., 25 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,19	30,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczenie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	12,24
162	Azathioprinum	Imuran, tabl. powl., 50 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	62,54	60,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczenie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Sarkoidoza; ródmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	5,80
163	Azithromycinum	Azibiot, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909991054816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	21,58	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	17,08
164	Azithromycinum	Azigen, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909990859887	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,55	21,28	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,78
165	Azithromycinum	Azigen, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990859955	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,55	21,28	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,78
166	Azithromycinum	Azimycin, tabl. powl., 125 mg	6 tabl.	5909991034313	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,58	21,15	4,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	Azithromycinum	Azimycin, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909991034412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	23,87	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	19,37
168	Azithromycinum	Azimycin, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909991035518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	25,93	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	21,43
169	Azithromycinum	Aziteva, Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990609925	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	21,00	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,50
170	Azithromycinum	Azitrin, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909990635641	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,55	21,28	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,78
171	Azithromycinum	Azitrin, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990635702	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	19,48	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,98
172	Azithromycinum	AzitroLEK, tabl. powl., 0,25 g	6 tabl. (1 blist.po 6 szt.)	5909990573738	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	32,45	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	27,95
173	Azithromycinum	AzitroLEK, tabl. powl., 0,5 g	3 tabl. (blist.)	5909990573752	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,44	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	19,94
174	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	butelka 20ml (400mg)	5909990635320	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	15,12	18,90	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,25
175	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	butelka 20ml (800mg)	5909990635337	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,14	18,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,83
176	Azithromycinum	AzitroLEK, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	butelka 30ml (1200mg)	5909990635344	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	27,00	34,68	27,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	20,71
177	Azithromycinum	Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg	3 tabl. (blist.)	5909991087319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	23,17	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,67
178	Azithromycinum	Azycyna, tabl. powl., 250 mg	6 tabl.	5909991098421	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,63	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	25,13
179	Azithromycinum	Azycyna, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909991098520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	19,48	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	Azithromycinum	Bactrazol, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	20 ml	5909990073559	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	11,07	14,60	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	9,95
181	Azithromycinum	Bactrazol, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	20 ml	5909990073566	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,14	18,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	18,83
182	Azithromycinum	Bactrazol, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990664672	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	17,28	21,00	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	16,50
183	Azithromycinum	Canbiox, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990740543	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	19,98	23,87	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	19,37
184	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 125 mg	6 tabl. (blíst.)	5909991108625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	26,35	29,39	4,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	27,14
185	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 250 mg	6 tabl. (blíst.)	5909991108724	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	26,14	30,40	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	25,90
186	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 500 mg	2 tabl. (blíst.)	5909991108830	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	14,25	17,05	6,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,05
187	Azithromycinum	Nobaxin, tabl. powl., 500 mg	3 tabl. (blíst.)	5909991108847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	15,82	19,46	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	14,96
188	Azithromycinum	Sumamed, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	1 but.a 20 ml (HDPE)	5909990742110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	17,93	21,88	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	17,23
189	Azithromycinum	Sumamed, kaps. twarde, 250 mg	6 kaps.	5909990742318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	29,46	33,92	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	29,42
190	Azithromycinum	Sumamed, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990742417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	29,01	33,43	9,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	28,93
191	Azithromycinum	Sumamed, tabl. powl., 500 mg	2 tabl.	5909990742424	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	21,71	24,96	6,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	21,96
192	Azithromycinum	Sumamed, tabl. powl., 125 mg	6 tabl.	5909990846214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	27,32	30,41	4,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	28,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	Azithromycinum	Sumamed Forte, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 but.a 20 ml (HDPE)	5909990742219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,49	33,81	18,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	24,50
194	Azithromycinum	Sumamed Forte, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 but.a 30 ml (HDPE)	5909990742226	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	36,29	44,53	27,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	30,56
195	Azithromycinum	Zetamax, granulaty o przedłużonym uwalnianiu do sporządzenia zawiesiny doustnej, 2 g	1 but.a 2g	5909990707577	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	34,82	45,36	45,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Mukowiscydoza	50%	22,68
196	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	18,21	3,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	17,88
197	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118915	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,13	7,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	22,05
198	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990119011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,76	34,07	14,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	27,91
199	Bisoprololum	Bisoratio 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,15	11,73	11,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolność serca w przypadkach innych niż wymienione w CHPL	ryczałt	3,20
200	Bisoprololum	Bisoratio 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015015	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	7,11	5,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolność serca w przypadkach innych niż wymienione w CHPL	ryczałt	4,44
201	Bisoprololum	Coronal 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633852	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,42	10,97	10,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolność serca w przypadkach innych niż wymienione w CHPL	ryczałt	3,20
202	Bisoprololum	Coronal 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633791	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	7,11	5,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe; Niewydolność serca w przypadkach innych niż wymienione w CHPL	ryczałt	4,44
203	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	72,38	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtań u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	22,83
204	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.)	5909990335176	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	74,40	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtań u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	24,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	11.0. Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	280,04	280,04	Choroba Le niowskiego-Crohna	Choroba Le niowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku ycia; Posta jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; Mikroskopowe zapalenie jelita	ryczałt	3,56
206	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,31	21,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	10,44
207	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,47	42,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	12,74
208	Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp. po 2 ml	5909990826773	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w rednich dawkach	46,23	58,40	58,40	Astma, przewlekła obturacyjna choroba pduc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	ryczałt	3,20
209	Budesonidum	Neplit Easyhaler 100, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337354	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,49	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	26,72
210	Budesonidum	Neplit Easyhaler 200, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337323	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	77,84	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	28,29
211	Budesonidum	Neplit Easyhaler 400, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100 daw. (zest. startowy)	5909990337286	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,24	65,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	19,57
212	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	88,85	88,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	ryczałt	3,20
213	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w rednich dawkach	65,10	78,41	58,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	ryczałt	23,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	112,54	86,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	51,65
215	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 200 daw.	5909990677313	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	44,88	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	20,11
216	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 100 daw.	5909990677412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,04	35,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	16,27
217	Budesonidum	Ribuspil, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	72,38	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	22,83
218	Budesonidum	Ribuspil, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komor inhal.)	5909990335190	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	74,40	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	24,85
219	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	78,41	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	28,86
220	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw.	5909991033248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	74,97	70,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci; Ostre obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci; Nawracaj ce obturacyjne zapalenie oskrzeli u dzieci	30%	25,42
221	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	14 tabl. (blis.)	5909990430017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	21,17	24,57	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,48
222	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	28 tabl. (blis.)	5909990430024	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	40,48	46,58	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	36,40
223	Candesartanum	Atacand, tabl. , 16 mg	28 tabl. (2 blis.po 14 szt.)	5909990430123	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	40,24	48,41	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	28,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl. , 8 mg	28 tabl.	5909990772162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	26,57	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,39
225	Candesartanum cilexetilum	Karbis, tabl. , 16 mg	28 tabl.	5909990772193	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	36,67	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,31
226	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495238	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,52	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,52
227	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495337	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	6,94	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,46
228	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990830817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,39	1,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	2,39
229	Carbamazepinum	Amizepin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,46	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	7,22
230	Carbamazepinum	Finlepsin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	13,98	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	13,98	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,74
232	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,80	16,01	12,53	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,68
233	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,51	20,89	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	8,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,74	15,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	5,27
235	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,33	31,33	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	3,20
236	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,74	8,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	4,32
237	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,55	21,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,72	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	8,48
239	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,36	12,53	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	7,03
240	Carbamazepinum	Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,54	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
241	Carbamazepinum	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	17,98	15,67	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	5,51
242	Carbamazepinum	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	31,99	31,33	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Bólowa polineuropatia cukrzycowa	ryczałt	3,86
243	Carbocisteinum	Mukolina, syrop, 50 mg/ml	120 ml	5909990032211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina	4,42	6,56	6,56	Mukowiscydoza , Pierwotna dyskineza rz sek	Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku ycia	30%	1,97
244	Carvedilolum	Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570454	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,79	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,42
245	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074051	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,79	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,42
246	Carvedilolum	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419685	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,32	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,95
247	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727100	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,39	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,02
248	Carvedilolum	Carvedilolum 123ratio, Carvedilol Teva, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338788	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,32	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
249	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 3,125 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,10	0,98	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,41
250	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,48	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,11
251	Carvedilolum	Coryol , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (blist.)	5909990983315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	17,04	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,67
252	Carvedilolum	Coryol 3,125, tabl. , 3,125 mg	30 tabl.	5909990216604	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,80	12,80	0,98	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,11
253	Carvedilolum	Dilatrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl.	5909990716111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,82	17,35	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,98
254	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl.	5909990048465	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,83	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,46
255	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	100 tabl.	5909990048472	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	26,10	6,52	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	21,54
256	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074792	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,79	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,42
257	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687886	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,50	1,96	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,13
258	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687893	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	33,02	3,91	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	30,28
259	Cetirizinum	Alermed, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990910793	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńoruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,57
260	Cetirizinum	Alermed, tabl. powl., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991075224	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,24	10,46	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńoruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	Cetirizinum	Allertec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569441	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,57
262	Cetirizinum	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 but.a 100 ml	5909990851119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,08	13,32	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,80
263	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w but. z kropłomierzem	5909991103811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	6,84	9,89	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,37
264	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w but. z kropłomierzem	5909991103835	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,14	17,23	17,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,17
265	Cetirizinum	Amertil, roztwór doustny, 1 mg/ml	200 ml (but.)	5909990215393	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	21,53	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	8,50
266	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990410729	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,48	9,66	9,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	2,90
267	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990410736	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,24	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,57
268	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	75 ml	5909990857012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,99	10,57	6,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
269	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	150 ml	5909990857029	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,90	19,43	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	9,65
270	Cetirizinum	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	10 ml	5909990857111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,21	11,34	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,82
271	Cetirizinum	CetAlergin, tabl. powl., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990872626	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,78	11,04	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,93
272	Cetirizinum	Cetigran, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990044559	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	13,94	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,18
273	Cetirizinum	Letizen, tabl. powl., 10 mg	20 tabl.	5909990869725	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,37	10,60	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,49
274	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990184620	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,42	13,84	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,73
275	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990184637	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	20,96	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,29
276	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	10 ml	5909990184712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,50	10,59	9,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
277	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	5909990184736	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,46	18,62	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,59
278	Cetirizinum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	5909990781515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,16	11,81	6,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,92
279	Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg	25 tabl.	5909990345618	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	233.0, Leki przeciwnowotworowe - leki alkiluj ce - chlorambucyl	241,48	274,87	274,87	Nowotwory zło liwe	Amyloidoza	bezpłatny	0,00
280	Chloroquinum	Arechin, tabl. , 250 mg	30 tabl.	5909990061914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,05	20,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Porfiria skórna pó na	30%	6,02
281	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 25 mg	50 kaps.	5909990787289	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,08	73,60	72,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonego krwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 50 mg	50 kaps.	5909990787357	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	120,96	143,20	143,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
283	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 100 mg	50 kaps.	5909990787463	2012-05-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	254,34	288,59	288,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946426	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,10	73,64	72,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	4,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
285	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946525	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	144,68	144,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytozowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
286	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946624	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	255,04	289,32	289,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
287	Ciclosporinum	Equoral, roztwór doustny , 100 mg/ml	50 ml	5909990946716	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01/2012-07- 01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	277,61	314,12	314,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespólów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
288	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps.	5909990336616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	121,99	72,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	52,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps.	5909990336715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	172,37	197,70	144,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	56,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps.	5909990336814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	343,44	383,03	289,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonerwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości szpikowej, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	96,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
291	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, roztwór doustny , 100 mg/ml	50 ml	5909990336913	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	398,08	441,81	314,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	130,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
292	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	60 kaps.	5909990406111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	50,38	60,56	34,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytozowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	29,04
293	Ciprofloxacinum	Ciphin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990499113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,78	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	6,78
294	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990066216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,50	16,62	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	12,62
295	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990066414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,37	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	8,37
296	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990308514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,22	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	7,22
297	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990334964	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,75	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	6,75
298	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990308712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,51	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	7,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
299	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990729012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,33	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	10,33
300	Ciprofloxacinum	Cyprofloksacyna 500 mg, tabl., 500 mg	10 tabl.	5909990338030	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,32	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	6,32
301	Ciprofloxacinum	Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909991033514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,81	4,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	4,81
302	Ciprofloxacinum	Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909991033613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,04	8,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	8,04
303	Clonazepamum	Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	8,10	11,66	11,66	Padaczka	Padaczka u dzieci do 1 roku ycia	ryczałt	3,20
304	Clonazepamum	Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,10	5,21	2,92	Padaczka	Padaczka u dzieci do 1 roku ycia	ryczałt	5,21
305	Colecalciferolum (vit. D3)	Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ ml	10 ml	5909990260218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	2,92	4,34	4,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,20
306	Colecalciferolum (vit. D3)	Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml	10 ml	5909991047818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,05	5,94	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,35
307	Colecalciferolum (vit. D3)	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml	10 ml (but.)	5909990178513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,01	5,91	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,32
308	Colistinum	Colistin TZF, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , infuzji lub inhalacji, 1000000 U	20 fiol.s.subs.	5909990366514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	106.0, Antybiotyki peptydowe - kolistyna	135,11	158,88	158,88	Mukowiscydoza	Pierwotna dyskineza rz sek	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
309	Cyclophosphamidum	Endoxan, dra etki, 50 mg	50 dra .	5909990240814	2012-03-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkiluj ce - cyklofosfamid	72,36	88,87	88,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza; Zespół aktywacji makrofagów (MAS); Zespół hemofagocytowy (HLH); Małopłytkowo ci i anemie hemolityczne oporne na leczenie sterydami; Zespół POEMS; Sarkoidoza; różmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Złazniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
310	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990776412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	44,38	56,33	53,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronien nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	6,42

												<p> ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) </p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
311	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990776511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	92,01	110,82	106,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	7,79

													<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłuższe niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
312	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	10 amp.a 1 ml	5909990776610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	202,93	202,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	4,27

														<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kości dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
313	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	10 amp.a 4 ml	5909990776719	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	202,93	202,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
314	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3 ml	5909990949410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	161,84	159,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	5,70

													<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwiazane jest to ze wzrostem ryzyka występienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłuższymi niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
315	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	5 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990949519	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	113,38	134,67	132,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr ęenia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniej cymi czynnikami ryzyka wyst pienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ci arnych po wszczępieniu zastawki i z wad zastawkow ; Ostre zespoły wie cowe - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Schorzenia wymagaj ce przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow ocen mo liwo ci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalaj ce z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikła , w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) cz ste nieterapeutyczne lub nadmierne podwy szone warto ci INR, c) obiektywne trudno ci z odpowiednio cz st kontrol INR, nawroty ylniej choroby zakrzepowo-zatorwej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagaj cych czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze wzgl du na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
316	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	5 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990949618	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	137,89	161,84	159,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr ęenia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniej cymi czynnikami ryzyka wyst pienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ci arnych po wszczępieniu zastawki i z wad zastawkow ; Ostre zespoły wie cowe - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Schorzenia wymagaj ce przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow ocen mo liwo ci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalaj ce z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikła , w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) cz ste nieterapeutyczne lub nadmierne podwy szone warto ci INR, c) obiektywne trudno ci z odpowiednio cz st kontrol INR, nawroty ylniej choroby zakrzepowo-zatorwej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagaj cych czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze wzgl du na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	5,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
317	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	5 amp.-strz z igłami po 0,72 ml	5909990949717	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	156,11	182,29	182,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
318	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml	5 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990958818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	101,22	101,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążym po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319	Danazolium	Danazol Jelfa, tabl. , 200 mg	100 tabl.	5909990282517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	122,87	122,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)	ryczałt	3,74
320	Danazolium	Danazol Polfarmex, tabl. , 200 mg	100 tabl. (fiol.)	5909990925339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,60	122,69	122,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)	ryczałt	3,56
321	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068494	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórze – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	76,87	94,04	89,52	Moczówka prosta przysadkowa	Choroba von Willebrandta	ryczałt	7,72
322	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068548	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórze – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	153,27	179,04	179,04	Moczówka prosta przysadkowa	Choroba von Willebrandta	ryczałt	3,20
323	Dexamethasonum	Pabi-Dexamethason, tabl. , 0,5 mg	20 tabl.	5909990170418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,73	4,99	3,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych; Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory	ryczałt	4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
324	Dexamethasonum	Pabi-Dexamethason, tabl. , 1 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990170517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	4,86	7,20	7,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Premedykacja przed stosowaniem taksonidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych; Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory	ryczałt	3,20
325	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg	5 wlew.a 2,5 ml	5909990709212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,14	24,58	24,58	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	3,20
326	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg	5 wlew.a 2,5 ml	5909990709311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,74	21,13	12,29	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	12,04
327	Diazepamum	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml	5 wlew.a 2,5 ml	5909990751518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,09	20,45	12,29	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	11,36
328	Diazepamum	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml	5 wlew.a 2,5 ml	5909990751617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,58	25,04	24,58	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	3,66
329	Diclofenacum	DICLAC 150 DUO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl.	5909997199627	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,96	17,68	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	9,86
330	Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwa domi niowych, 75 mg/3ml	5 amp.a 3 ml	5909990753017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,72	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	5,07
331	Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwa domi niowych, 75 mg/3ml	10 amp.a 3 ml	5909990753024	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	11,77	15,30	10,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	10,00
332	Diclofenacum	Diclac 100, czopki doodbytnicze , 100 mg	10 czop.	5909990420018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	3,78	5,06	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
333	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	20,21	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	12,39
334	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990957828	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	10,47	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	6,56
335	Diclofenacum	Diclac 50, czopki doodbytnicze, 50 mg	10 czop. (blist.)	5909990419913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,92	3,63	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	2,71
336	Diclofenacum	Diclac 50, tabl. dojel., 50 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990716623	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,29	9,14	9,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	4,57
337	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	11,49	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	7,58
338	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	10 tabl. (blist.)	5909990957729	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,40	3,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	3,45
339	Diclofenacum	Dicloduo, kaps., 75 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990752010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,56	15,49	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	9,62
340	Diclofenacum	Diclofenac GSK, czopki, 50 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	1,91	2,55	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	1,63
341	Diclofenacum	Diclofenac GSK, czopki, 100 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,48	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	1,85
342	Diclofenacum	Majamil prolongatum, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990033614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,13	8,39	8,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólwe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
343	Diclofenacum	Naklofen, roztwór do wstrzykiwa, 25 mg/ml	5 amp.a 3 ml	5909990241910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,72	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	5,07
344	Diclofenacum	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	10,40	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	6,49
345	Diclofenacum	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedtu onym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990974122	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	15,73	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	9,86
346	Diclofenacum	Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990457113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	9,47	7,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	5,56
347	Diclofenacum	Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990457120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	23,48	23,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie; Leczenie przeciwbólowe u pacjentów z chorob nowotworow	50%	11,74
348	Diltiazemum	Diltiazem Polfarmex, tabl. , 30 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,05	9,10	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,76
349	Diltiazemum	Dilzem, tabl. , 60 mg	100 tabl.	5909990205011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	14,58	19,67	18,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,42
350	Diltiazemum	Dilzem 120 retard, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl.	5909990482917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,41	11,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,54
351	Diltiazemum	Dilzem 180 retard, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl.	5909990483310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,88	16,53	16,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
352	Diltiazemum	Dilzem Retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	5909990213214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,02	9,77	8,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,67
353	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,41	11,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,54
354	Diltiazemum	Oxycardil 180, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,99	16,65	16,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,24
355	Diltiazemum	Oxycardil 240, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 240 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	16,74	22,50	22,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,56
356	Diltiazemum	Oxycardil 60, tabl. powł., 60 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990121120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,67	11,07	11,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
357	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (but.)	5909990029815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas klodronowy	270,00	305,86	303,78	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
358	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (blist.)	5909990029822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas klodronowy	270,00	305,86	303,78	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
359	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990421879	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas klodronowy	269,98	305,83	303,78	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,25
360	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990953523	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas klodronowy	270,00	305,86	303,78	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
361	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	120 kaps.	5909990953530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas klodronowy	324,00	364,53	364,53	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	3,20
362	Donepezilum	Alzdone, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990712847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	40,64	47,97	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Levy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	33,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
363	Donepezilum	Alzdone, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990713097	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	45,62	55,95	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	26,87
364	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724369	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	56,16	64,42	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	49,88
365	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724383	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	86,49	99,27	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	70,19
366	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990770038	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	26,89	33,39	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	18,85
367	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990770045	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	30,78	40,22	40,22	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,07
368	Donepezilum	Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	60,25	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,17
369	Donepezilum	Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	44,96	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,42
370	Donepezilum	Cogezil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	44,96	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,42
371	Donepezilum	Cogezil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657346	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	60,25	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,17
372	Donepezilum	Cognezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990798964	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	39,24	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	24,70
373	Donepezilum	Cogezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990799053	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	60,25	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,17
374	Donepezilum	DONECTIL, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990683581	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	39,24	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	24,70
375	Donepezilum	Donecept, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689781	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	27,11	33,63	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	19,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
376	Donepezilum	Donecept, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689873	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,02	41,54	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,46
377	Donepezilum	Donectil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990683666	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	30,00	39,39	39,39	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	11,82
378	Donepezilum	Donectil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	30 tabl.	5909990851478	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	31,86	38,91	22,25	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	23,34
379	Donepezilum	Donectil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	30 tabl.	5909990851492	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	31,17	40,99	40,99	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,30
380	Donepezilum	Donepex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909991055912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	44,96	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,42
381	Donepezilum	Donepex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909991056018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	43,20	53,38	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	24,30
382	Donepezilum	Donepezil Bluefish, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990814077	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	24,84	31,22	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	16,68
383	Donepezilum	Donepezil Bluefish, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990814138	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	36,35	46,13	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	17,05
384	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990776870	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	28,08	34,66	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	20,12
385	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990776900	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	33,48	43,08	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	14,00
386	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657353	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	42,12	49,54	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	35,00
387	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657360	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,14	59,68	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,60
388	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726929	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	30,24	36,95	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	22,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
389	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726936	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	32,34	41,87	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,79
390	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990743940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	69,00	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	54,46
391	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990744008	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	83,15	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	54,07
392	Donepezilum	Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990798933	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	28,45	35,06	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	20,52
393	Donepezilum	Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990798940	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	33,66	43,27	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	14,19
394	Donepezilum	Symepezil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990662104	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	28,05	34,63	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	20,09
395	Donepezilum	Symepezil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990662203	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	32,40	41,94	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	12,86
396	Donepezilum	Yasnal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,44	54,12	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	39,58
397	Donepezilum	Yasnal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,80	76,28	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	47,20
398	Donepezilum	Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990850075	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	27,00	33,51	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	18,97
399	Donepezilum	Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990850204	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	33,66	43,27	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	14,19
400	Dornasum alfa	Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	30 amp.a 2,5 ml	5909990375813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	205.2, Leki mukolityczne - dornaza alfa	2 381,40	2 584,34	2 584,34	Mukowiscydoza	Pierwotna dyskineza rz sek	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990969517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,64	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,08
402	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990969616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,34	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,22
403	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990969715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,33	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,09
404	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,11	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,87
405	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	57,24	69,27	52,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	32,79
406	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedtlu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,04	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,80
407	Doxazosinum	Doxalong, tabl. o przedtlu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990790951	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,09	26,87	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,63
408	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,46	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	22,90
409	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,31	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	24,19
410	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	32,40	39,92	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	21,68
411	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,62	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	28,97	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,85
413	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,38	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,14
414	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,32	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,20
415	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,10	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,86
416	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,00	32,17	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,05
417	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,32	34,53	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,29
418	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,70	34,94	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,70
419	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,34	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,78
420	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,15	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	11,03
421	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,43	34,66	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
422	Doxazosinum	Zoxon 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,52	23,79	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,23
423	Doxazosinum	Zoxon 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,98	24,73	13,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,61
424	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	62,64	77,04	77,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,11
425	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	24,30	31,33	26,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	13,09
426	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014934	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	2,91	3,92	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,92
427	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014958	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	5,31	7,29	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,81
428	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990015030	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	4,26	6,19	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,71
429	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990015054	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	8,37	11,87	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,92
430	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990020829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	14,58	20,29	20,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	12,80
431	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990020836	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,88	11,35	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
432	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	2,54	3,53	2,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
433	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374243	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,29	10,74	10,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
434	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422364	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,62	6,57	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,09
435	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422371	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,63	18,23	18,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
436	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422388	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,08	10,50	10,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
437	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990440535	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,94	5,85	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
438	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990048328	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,14	53,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet w ciąży; wszczepienie zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	10,23

												<p> i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze) </p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
439	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990048427	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	115,48	106,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążymy po wszczęciu zastawki i z wad zastawkowymi; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	12,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
440	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990774821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	135,53	159,34	159,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet w ciąży w czasie wszczepienia zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	3,20

												<p> i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecnicze) </p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990774920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	265,39	299,79	265,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	39,55

												<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
442	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990775026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,12	202,92	202,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet w ciąży w czasie powstąpienia zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
443	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwa , 120 mg/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990891429	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	292,08	329,29	318,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr ęenia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespól antyfosfolipidowy w ci y; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespól antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wyst pienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ci arnych po wszczepieniu zastawki i z wad zastawkow ; Ostre zespoły wie cowe - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Schorzenia wymagaj ce przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresow ocen mo liwo ci powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalaj ce z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikła , w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) cz ste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwy szone warto ci INR, c) obiektywne trudno ci z odpowiednio cz st kontrol INR, nawroty ylniej choroby zakrzepowo-zatorwej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagaj cych czasowego zaprzestania doustnymi antykoagulantami ze wzgl du na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	17,01

													<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecnicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
444	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml	10 amp.-strza 1 ml	5909990891528	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	345,84	388,07	388,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresami ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania doustnych antykoagulantów ze względu na planowane procedury terapeutyczne	ryczałt	8,00

																			<p>i diagnostyczne; Unieruchomienie ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylnej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecnicze)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
445	Estradiolum + Dydrogesteronum	Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990973316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11- 01 – dla kolumny 13	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,59	26,44	13,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hipogonadyzm hipergonadotropowy i hipogonadotropowy u dziewcz t do 18 r. . - terapia substytucyjna	30%	16,77
446	Ethosuximidum	Petinimid, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990244911	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid	31,72	41,16	41,16	Padaczka	Padaczka z napadami nie wiadomo ci dla dzieci do 3 roku ycia	ryczałt	3,20
447	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,5 mg	60 tabl.	5909990211357	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05- 01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus	853,20	939,50	939,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
448	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,25 mg	60 tabl.	5909990211654	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus	426,58	475,98	469,75	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	9,43
449	Everolimusum	Certican, tabl. , 0,75 mg	60 tabl.	5909990211845	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus	1 280,03	1 402,28	1 402,28	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
450	Fenoterolum + Ipratropii bromidum	Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml	20 ml (but.)	5909990101917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11- 01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,36	22,97	12,79	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo- płucna, dyskineza rz sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacyjnych dróg oddechowych	ryczałt	13,38
451	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 300 mcg/ml	5 fioła 1 ml	5909990312214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	637,20	705,72	705,72	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporno ci z neutropeni (agranulocytos) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
452	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 600 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990830510	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,13	153,55	153,55	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
453	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 960 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990830619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	214,38	245,43	245,43	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
454	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 30 mln j./0,5ml	5 amp.-strz. po 0,5ml	5909990904778	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	621,00	688,55	688,55	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
455	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 48 mln j./0,5ml	5 amp.-strz. po 0,5ml	5909990904808	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	1 026,00	1 128,52	1 128,52	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
456	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml	1 amp.-strz z osłon zabezpieczaj c igl	5909990739387	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	130,13	153,55	153,55	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporno ci z neutropeni (agranulocytóz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
457	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml	1 amp.-strz z osłon zabezpieczaj c igl	5909990739448	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	214,79	245,87	245,87	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporno ci z neutropeni (agranulocytóz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20
458	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 60 mln. j/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990687763	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	127,44	150,70	150,70	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporno ci z neutropeni (agranulocytóz) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
459	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990687800	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	246,39	245,87	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna; Niedobory odporności z neutropenią (agranulocytoza) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)	ryczałt	3,72
460	Fluconazolom	Flucostat, kaps., 50 mg	7 kaps.	5909990490516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,73	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakazę grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,61
461	Fluconazolom	Flucostat, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990490523	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	28,43	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakazę grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,18
462	Fluconazolom	Flucostat, kaps., 150 mg	1 kaps.	5909990490615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,32	5,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakazę grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
463	Fluconazolom	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	7 kaps. (blist.)	5909990662371	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	22,14	29,00	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,75
464	Fluconazolom	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662388	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	91,80	109,85	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	60,84
465	Fluconazolom	Fluconazin, syrop, 5 mg/ml	150 ml (but.)	5909991097219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,10	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,74
466	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg	1 tabl. (blist.)	5909990017874	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,84	5,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,22
467	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg	3 tabl. (blist.)	5909990017881	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,60	16,40	15,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
468	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg	28 tabl.	5909990780181	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	72,18	89,05	89,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	44,53
469	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml	150 ml (but.)	5909990859511	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	24,79	32,72	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,36
470	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990859610	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	19,09	25,77	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	13,52
471	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg	7 tabl. (blist.)	5909990859672	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,02	13,08	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	6,96
472	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg	7 tabl. (blist.)	5909990859719	2013-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	19,09	25,77	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	13,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
473	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990356010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	24,08	31,05	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,80
474	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 100 mg	7 kaps.	5909990356119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	26,67	33,81	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	21,56
475	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990356126	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	80,72	98,10	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	49,09
476	Fluconazolum	Flumycon, kaps., 50 mg	7 kaps. (blist.)	5909990652273	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,56	13,65	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,53
477	Fluconazolum	Flumycon, syrop, 5 mg/ml	150 ml	5909990841707	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	32,77	32,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
478	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 150 mg	1 kaps. (blis.)	5909991034115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,58	6,59	5,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,97
479	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 200 mg	7 kaps.	5909991034214	2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	38,18	49,01	49,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	24,51
480	Fluconazolom	Mycosyst, kaps., 100 mg	7 kaps. (blis.)	5909990642533	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,57	24,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,32
481	Fluconazolom	Mycosyst, kaps., 50 mg	7 kaps. (blis.)	5909990980512	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,89	14,00	12,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,88
482	Fluconazolom	Mycosyst, kaps., 100 mg	28 kaps. (blis.)	5909990980611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	90,72	108,71	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	59,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
483	Fluconazolom	Mycosyst, kaps., 200 mg	7 kaps. (blis.)	5909991118914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	36,72	47,47	47,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryny lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	23,74
484	Fluticasonum	Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw.	1 poj.a 120 daw.	5909990570720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,30	8,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	17,04
485	Fluticasonum	Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw.	1 op.a 120 daw. (10 ml)	5909990294817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	22,14	25,88	8,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	21,62
486	Fluticasonum	Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina , 400 g	28 poj.	5909990933822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,38	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	43,42
487	Furosemidum	Furosemidum Polfarmex, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blis.po 10 szt.)	5909990223794	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	37.0, Leki moczop dne - p łowe	2,46	3,66	3,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rodkowym układzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci	ryczałt	3,20
488	Furosemidum	Furosemidum Polpharma,Furosemidum, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blis.po 10 szt.)	5909990135028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	37.0, Leki moczop dne - p łowe	2,46	3,66	3,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rodkowym układzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci	ryczałt	3,20
489	Gabapentinum	Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990714322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,45	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	15,93
490	Gabapentinum	Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990714452	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,20	83,06	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	36,09
491	Gabapentinum	Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990714605	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,40	101,62	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	37,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
492	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990338542	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,30	99,89	99,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
493	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990338658	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,39	134,23	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	5,18
494	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990339495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,16	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,64
495	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990339600	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	53,62	66,88	66,88	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
496	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990339709	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	39,17	50,17	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
497	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990676088	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,16	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,64
498	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990676170	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,80	77,34	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	30,37
499	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990676248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	98,18	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	34,49
500	Gabapentinum	Gabatem, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990768035	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	98,51	98,51	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501	Gabapentinum	Gabatem, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990768059	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108,00	128,52	128,52	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	4,74
502	Gabapentinum	Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990651535	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,38	26,93	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,41
503	Gabapentinum	Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990651566	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	39,10	50,10	50,10	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
504	Gabapentinum	Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990651603	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	52,92	66,13	66,13	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
505	Gabapentinum	Neuran 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990055081	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	98,51	98,51	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
506	Gabapentinum	Neuran 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl. (blist.)	5909990651696	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,40	134,24	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	5,19
507	Gabapentinum	Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990769216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,17	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	35,65
508	Gabapentinum	Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990769315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	103,24	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	56,27
509	Gabapentinum	Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990769414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	137,11	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	73,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
510	Gabapentinum	Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909991017422	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	169,36	100,34	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	72,58
511	Gabapentinum	Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909991017521	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,50	164,03	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	34,98
512	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990678747	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	108,57	100,34	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	11,79
513	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990678792	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	147,85	133,79	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	18,80
514	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685554	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26,00	31,83	16,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	18,31
515	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685561	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	63,72	76,19	50,17	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	29,22
516	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685660	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	113,75	66,89	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	50,06
517	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	177.2, Leki przeciwpadaczkowe - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,17	6,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	choroba Huntingtona	30%	1,85
518	Hydrocortisonum	Hydrocortisonum AFP, krem, 0,01 g/1 g	15 g	5909990950317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania	1,77	2,63	2,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory	50%	1,32
519	Hydrocortisonum	Laticort 0,1%, plyn na skór , 1 mg/ml	20 ml	5909990229215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania	4,62	5,91	3,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory	50%	4,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520	Indapamidum	Apo-Indap, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990988716	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,62	10,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,19
521	Indapamidum	Diuresin SR, tabl. powł. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990975815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,41	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,29
522	Indapamidum	Indap, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991162917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,89	10,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,27
523	Indapamidum	Indapen, tabl. powł., 2,5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990863013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	9,72	9,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,92
524	Indapamidum	Indapen SR, tabl. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665907	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,83	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,71
525	Indapamidum	Indapres, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990223121	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	10,72	10,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,22
526	Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990012688	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,41	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,29
527	Indapamidum	Opamid, tabl. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770182	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,23	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,11
528	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powł. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990424801	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,81	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,69
529	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powł. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	60 tabl.	5909990424849	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	18,83	17,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,58
530	Indapamidum	Symapamid SR, tabl. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990734993	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,08	7,80	7,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,34
531	Indapamidum	Tertensif SR, tabl. powł. o przedftu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990738212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,01	8,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532	Ipratropii bromidum	Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 mcg/ml	20 ml	5909990322114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,03	12,79	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek., ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	3,44
533	Ipratropii bromidum	Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 mcg	10 ml (200 daw.)	5909990999019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,93	25,58	25,58	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek., ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	3,56
534	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 1 ml	5909990977710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	12,04	16,26	12,79	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek., ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	6,67
535	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 2 ml	5909990977727	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	24,06	31,01	25,58	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz. sek., ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	8,99
536	Itraconazolum	Itragen, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990617463	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	79,92	97,26	97,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	48,63
537	Itraconazolum	Itrax, kaps. twarde, 100 mg	4 kaps.	5909990858255	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,28	15,77	14,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,77
538	Itraconazolum	Itrax, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990858262	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	78,90	96,18	96,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	48,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
539	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909990004317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	17,89	14,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	10,89
540	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990004331	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	102,99	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	53,98
541	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909991053819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,90	19,60	14,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	12,60
542	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909991053826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	102,99	98,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	53,98
543	Ketoconazolum	Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg	10 tabl.	5909991045418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	4,68
544	Ketoconazolum	Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909991042615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
545	Ketoconazolum	Ketokonazol Polfarmex, tabl. , 200 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991042639	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	18,90	18,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	9,54
546	Ketoprofenum	Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990412112	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	13,85	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	8,63
547	Ketoprofenum	Febrofen, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990413317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	18,52	13,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	11,57
548	Ketoprofenum	Ketonal, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps.	5909990046492	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	6,78	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	4,17
549	Ketoprofenum	Ketonal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg	10 amp.a 2 ml	5909990659524	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	4,72
550	Ketoprofenum	Ketonal DUO, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990064694	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	22,02	15,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	14,20
551	Ketoprofenum	Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg	30 tabl.	5909990046485	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,02	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	9,80
552	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 100 mg	14 kaps.	5909990813315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	9,87	4,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,44
553	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 100 mg	20 kaps.	5909990813322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,03	6,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
554	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 200 mg	20 kaps.	5909990813421	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	18,45	13,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	11,50
555	Ketoprofenum	Profenid, czopki, 100 mg	10 czop.	5909990098514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doobytniczego	7,94	9,13	2,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,90
556	Ketoprofenum	Profenid, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990760718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,05	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,83
557	Ketoprofenum	Profenid, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990790418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	13,75	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	8,88
558	Ketoprofenum	Refastin, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675593	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	14,96	10,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	9,74
559	Lamotryginum	Epitrigine 100 Mg, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334766	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	31,91	28,72	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	6,39
560	Lamotryginum	Epitrigine 100 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	32,61	31,46	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,35
561	Lamotryginum	Epitrigine 25 Mg, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334742	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	8,62	7,18	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
562	Lamotriginum	Epitrigine 25 Mg, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334933	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	8,97	7,87	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,30
563	Lamotriginum	Epitrigine 50 Mg, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334759	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	16,72	14,36	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,56
564	Lamotriginum	Epitrigine 50 Mg, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,18	15,73	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,65
565	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,025 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990224661	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,26	7,87	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	6,59
566	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,1 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225149	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,46	31,46	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
567	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,05 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225170	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,96	17,76	15,73	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
568	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038480	2012-01-01/2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	19,44	26,19	26,19	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
569	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038565	2012-01-01/2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	13,86	13,86	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
570	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038701	2012-01-01/2013-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	4,85	7,18	7,18	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
571	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346219	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	27,60	14,36	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	16,44
572	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346318	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	33,06	28,72	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	7,54
573	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990346325	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	64,71	57,44	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	10,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
574	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990354818	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	15,78	7,18	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	11,80
575	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787111	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,36	1,57	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	8,36
576	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787210	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	19,56	7,87	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	14,89
577	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787319	2012-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	64,80	74,97	31,46	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	46,71
578	Lamotriginum	Lamotrix, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909991006419	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,59	11,16	7,18	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	7,18
579	Lamotriginum	Lamotrix, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909991006518	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	17,98	22,61	14,31	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	11,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
580	Lamotriginum	Lamotrix, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909991006617	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	33,06	28,72	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	7,54
581	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 25 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057382	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	9,89	14,07	13,11	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,16
582	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057566	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	39,59	50,67	50,67	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
583	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 50 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057597	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	19,80	26,64	26,22	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,62
584	Lamotriginum	Plexxo 100, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990972616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	29,75	37,12	28,72	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	11,60
585	Lamotriginum	Plexxo 25, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990972418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	20,36	7,18	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	16,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
586	Lamotriginum	Plexxo 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990972517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	26,45	14,36	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	15,29
587	Lamotriginum	Symla 100, tabl. , 100 mg	30 tabl.	5909990045303	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,89	30,90	28,72	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,38
588	Lamotriginum	Symla 25, tabl. , 25 mg	30 tabl.	5909990045280	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,10	8,51	7,18	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,53
589	Lamotriginum	Symla 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990045266	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,31	16,60	14,36	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,44
590	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079292	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	8,62	7,18	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,64
591	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	16,72	14,36	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
592	Lamotryginum	Trogine, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079483	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	54,62	66,51	57,44	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	12,27
593	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg	1 amp.-strz	5909991094416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2 703,73	2 924,36	2 437,04	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	490,52
594	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg	1 amp.-strz	5909991094515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3 604,62	3 894,27	3 655,55	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	241,92
595	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909991094614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	4 514,86	4 874,07	4 874,07	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,27
596	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055135	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	13,55	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,83
597	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055173	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	26,15	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,72
598	Lansoprazolum	Lantrea, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (but.)	5909990017898	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	16,29	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
599	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990339365	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,12	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,40
600	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps.	5909990339402	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,12	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,40
601	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990609970	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	22,71	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,28
602	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	7 kaps.	5909990727018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	15,97	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,61
603	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	14 kaps.	5909990727025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,07	21,82	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,10
604	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	28 kaps.	5909990727032	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	29,37	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,94
605	Lansoprazolum	Lanzul S, kaps., 15 mg	28 kaps.	5909990869817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	20,53	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,81
606	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623358	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	17,32	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
607	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990623440	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	17,32	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,60
608	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623457	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	33,59	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	24,16
609	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064045	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	10,84	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,12
610	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990064069	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	10,84	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,12
611	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064076	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	21,40	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,97
612	Leflunomidum	Arava, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (but.)	5909990977826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	59,71	73,81	67,45	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	9,56
613	Leflunomidum	Arava, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (but.)	5909990977925	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	122,84	144,72	134,90	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	13,02
614	Leflunomidum	Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	4037353010604	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	59,71	73,81	67,45	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	9,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
615	Leflunomidum	Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	4037353010628	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	113,57	134,90	134,90	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	Młodsze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	3,20
616	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909990742059	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	113,21	134,74	134,71	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,23
617	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	5 fiol. z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G	5909990742066	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	608,76	673,38	673,38	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
618	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 750 mg	50 tabl.	5909990006649	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	162,00	180,87	60,33	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	123,74
619	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 750 mg	100 tabl.	5909990006670	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	324,00	356,59	120,66	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	241,26
620	Levetiracetamum	Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml (but.)	5909990006755	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	129,60	152,11	139,43	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	15,88
621	Levetiracetamum	Keppra, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/ml	10 fiol. a 5 ml	5909990610891	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - levetiracetam	595,03	659,00	659,00	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
622	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 250 mg	50 tabl.	5909990901111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	60,70	20,11	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	43,79
623	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 250 mg	100 tabl.	5909990901128	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	121,63	40,22	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	84,61
624	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990901210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	121,63	40,22	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	84,61
625	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 500 mg	100 tabl.	5909990901227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	216,00	239,66	80,44	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	162,78
626	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 1000 mg	50 tabl.	5909990901319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	216,00	239,66	80,44	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	162,78
627	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powl., 1000 mg	100 tabl.	5909990901326	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	432,00	472,62	160,88	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	318,85
628	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg	50 tabl.	5909990879076	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	15,84	21,40	20,11	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,49
629	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg	100 tabl.	5909990879106	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,28
630	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990879168	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	32,22	41,30	40,22	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,28
631	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg	100 tabl.	5909990879199	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,42
632	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg	50 tabl.	5909990879250	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	49,14	61,24	60,33	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
633	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg	100 tabl.	5909990879281	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	103,24	122,58	120,66	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce odpornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	7,25
634	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990879342	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	66,60	81,30	80,44	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce odpornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	4,42
635	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990879373	2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	140,34	163,46	160,88	Padaczka oporna na leczenie; Padaczka	Napady miokloniczne w padaczce odpornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	9,69
636	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powł., 5 mg	20 tabl.	5909990656929	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	16,98	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	9,87
637	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990656943	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,65	22,50	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	11,83
638	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, roztwór doustny , 0,5 mg/ml	200 ml	5909990904099	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	18,14	23,59	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	10,56
639	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990904129	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,47	21,10	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	11,15
640	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	7 tabl.	5909990918041	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	9,65	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	7,16
641	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990918072	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,43	32,72	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	22,77
642	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal 0,5 , roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	200 ml (but.)	5909990619627	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	24,19	29,99	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	16,96
643	Levocetirizini dihydrochloridum	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,77	23,54	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	13,59
644	Levocetirizini dihydrochloridum	Zyx, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765034	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,53	14,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
645	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 12,5+50 mg	100 kaps.	5909990094912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,16	25,78	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,58
646	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 100+25 mg	100 kaps.	5909990095018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	57,84	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,48
647	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. , 50+200 mg	100 tabl.	5909990095117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85,00	103,11	103,11	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
648	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 50+200 mg	100 kaps.	5909990095216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85,00	103,11	103,11	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
649	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 12,5+50 mg	100 tabl.	5909990748624	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,16	25,78	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,58
650	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg	100 tabl.	5909990748723	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	57,84	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,48
651	Levodopum + Benserazidum	Madopar HBS, kaps., 100+25 mg	100 kaps.	5909990377510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	57,84	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,48
652	Levodopum + Carbidopum	Nakom, tabl. , 250+25 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990175215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	69,08	69,08	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,44
653	Levodopum + Carbidopum	Nakom Mite, tabl. , 100+25 mg	100 tabl.	5909990175314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	43,20	54,80	51,56	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,44
654	Levodopum + Carbidopum	Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	100 tabl. (but.)	5909990020416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	95,94	95,94	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
655	Loratadinum	Aleric, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990880836	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,98	20,73	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,06
656	Loratadinum	Claritine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990121526	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	31,26	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	20,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
657	Loratadinum	Claritime, syrop, 1 mg/ml	120 ml	5909990355419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,96	16,81	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	8,99
658	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990223343	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,87	34,41	30,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	13,07
659	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990223350	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,38	45,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	18,38
660	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990739233	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	20,96	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,29
661	Loratadinum	Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml	120 ml	5909990739318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,72	13,37	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,55
662	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990670253	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,42	33,95	30,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	12,61
663	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990670260	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,38	45,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	18,38
664	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990795420	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,39	22,21	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	11,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
665	Loratadinum	Loratan, syrop, 5 mg/5ml	125 ml (but.)	5909990839018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,93	12,65	11,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz. k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,50
666	Loratadinum	Loratan, kaps. mi kkie, 10 mg	30 kaps. (2 blist.po 15 szt.)	5909990909049	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,02	21,83	15,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz. k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	11,16
667	Losartanum	Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990702886	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,04	20,67	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,49
668	Losartanum	Cozaar, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990674411	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,35	21,01	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,83
669	Losartanum	Cozaar, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	32,40	40,10	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,74
670	Losartanum	Lakea, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991108212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	20,52	25,58	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,67
671	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990638659	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	32,88	40,61	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	20,25
672	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	56 tabl.	5909990649112	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,59
673	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	84 tabl. (6 blist.po 14 szt.)	5909990649129	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	25,92	34,86	34,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,46
674	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990818914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,20	20,84	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,66
675	Losartanum	Losacor, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991055110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	14,04	18,71	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,80
676	Losartanum	Losagen, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639885	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatonii ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
677	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639908	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,22	30,37	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,01
678	Losartanum	Losargamma, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. powł.	5909990947164	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,83	12,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	3,85
679	Losartanum	Losartan Arrow, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990769469	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,08	15,57	15,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,67
680	Losartanum	Losartic, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621439	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	20,84	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,66
681	Losartanum	Lozap 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990573905	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,82	22,72	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	11,81
682	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724345	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	19,86	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,95
683	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724352	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	38,62	31,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,81
684	Losartanum	Rasoltan 50, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990085644	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,83	12,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	3,85
685	Losartanum	Sarve 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990045594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,32	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,14
686	Losartanum	Stadazar, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990079575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,94
687	Losartanum	Xartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990481118	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,16	15,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	19,25
688	Lovastatinum	Liprox, tabl., 20 mg	28 tabl.	5909990842315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	16,15	4,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,11
689	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990422159	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,60	24,17	4,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
690	Lovastatinum	Lovasterol, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990828425	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	17,85	2,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,22
691	Lovastatinum	Lovastin, tabl. , 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990756629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	17,30	4,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,26
692	Medroxyprogesteronum	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwa , 150 mg/ml	1 fiol.a 3,3 ml	5909990236510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	127.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,78	15,78	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	Limfangioleiomiomatoza	ryczałt	3,20
693	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	56,57	50,25	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	9,52
694	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,08	40,85	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	13,43
695	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	111,94	100,50	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	14,64
696	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	86,36	81,69	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	8,23
697	Mesalazinum	Crohnax, czopki, 250 mg	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,07	34,07	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	3,20
698	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1000 mg	28 czop. (blist.)	5909990656813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	191,74	187,60	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	7,34
699	Mesalazinum	Pentasa , czopki, 1000 mg	14 czop. (blist.)	5909990656820	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	100,17	93,80	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	9,57
700	Mesalazinum	Pentasa , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blist.)	5909990662111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	153,40	81,69	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	75,27
701	Mesalazinum	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szt.a 100 ml	5909990818815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81,00	93,27	36,48	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	59,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702	Mesalazinum	Pentasa, granulaty o przedłużonym uwalnianiu, 1 g	50 sasz.	5909990855315	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	153,40	81,69	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	75,27
703	Mesalazinum	Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml	7 but.a 60 ml	5909990970117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	123,47	145,93	145,93	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	3,20
704	Mesalazinum	Salofalk 250, czopki, 250 mg	30 czop.	5909990088829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	47,73	59,47	50,25	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	12,42
705	Mesalazinum	Salofalk 250, tabl. dojel., 250 mg	50 tabl.	5909990400010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	33,33	20,42	Choroba Leśniwskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	16,11
706	Mesalazinum	Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990400119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	53,26	40,85	Choroba Leśniwskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia; Mikroskopowe zapalenie jelita; Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	15,61
707	Mesalazinum	Salofalk 500, czopki, 500 mg	30 czop.	5909990422227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,66	100,50	100,50	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	3,20
708	Metforminum	Avamina, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,11	4,52	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,53
709	Metforminum	Avamina, tabl. powł., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990765386	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,38	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
710	Metforminum	Avamina, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765393	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,47	6,79	6,79	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990765409	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,77	13,92	13,92	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
712	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,50	8,15	8,15	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
713	Metforminum	Avamina, tabl. powl., 1000 mg	60 kaps. (6 blist.po 10)	5909990765430	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,56	16,17	16,17	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
714	Metforminum	Etform 500, tabl. powl., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698141	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,85	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,67
715	Metforminum	Etform 500, tabl. powl., 500 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990698172	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	8,42	12,16	12,16	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
716	Metforminum	Etform 850, tabl. powl., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698257	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	7,99	12,03	12,03	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
717	Metforminum	Etform 850, tabl. powl., 850 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990698271	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,96	18,33	18,33	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
718	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078943	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,85	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,86
719	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078950	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,60	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,42
720	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078974	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,78	8,45	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,27
721	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078981	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,88	16,52	16,52	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
722	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079001	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,09	7,09	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
723	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990079025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,61	13,76	13,76	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
724	Metforminum	Glucophage, tabl. powł., 850 mg	blister 60 sztuk	5909990789306	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,91	14,06	14,06	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
725	Metforminum	Glucophage 1000, tabl. powl., 1000 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990717248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,36	9,06	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,88
726	Metforminum	Glucophage 500, tabl. powl., 500 mg	30 tabl.	5909990789276	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,05	5,50	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,51
727	Metforminum	Glucophage 850, tabl. powl., 850 mg	30 tabl.	5909990789290	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,83	8,22	7,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,30
728	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 750 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990213429	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	14,04	16,70	6,29	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	13,61
729	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 750 mg	blister 60 sztuk	5909990213436	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	27,22	32,07	12,57	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	22,70
730	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990624751	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	10,31	12,14	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	11,15
731	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 500 mg	blister 60 sztuk	5909990624768	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	18,14	21,55	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	16,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
732	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1000 mg	60 tabl.	5909990864461	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	36,29	42,39	16,76	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	28,83
733	Metforminum	Metfogamma 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl.	5909990654598	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,40	8,04	8,04	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
734	Metforminum	Metfogamma 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909991033019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,02	4,41	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,42
735	Metforminum	Metfogamma 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909991032913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,00	6,29	6,29	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
736	Metforminum	Metformax 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053056	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,38	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
737	Metforminum	Metformax 500, tabl. , 500 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990126316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,85	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,86
738	Metforminum	Metformax 850, tabl. , 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,40	7,77	7,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
739	Metforminum	Metformax SR 500, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652112	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,07	10,83	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	9,84
740	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705474	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,48	3,85	3,85	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
741	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705726	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,56	5,81	5,81	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
742	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705894	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,48	7,07	7,07	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
743	Metforminum	Metformin Galena, tabl. , 500 mg	30 tabl.	5909990462018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,19	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
744	Metforminum	Metformin Galena, tabl. , 850 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990928019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,09	7,09	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
745	Metforminum	Metifor, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,19	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
746	Metforminum	Metral, tabl. , 500 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,19	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
747	Metforminum	Metral, tabl. , 850 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,89	6,16	6,16	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,20
748	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990220984	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,85	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,67
749	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	60 tabl. (4 blist.po 15 szt.)	5909990220991	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,73	17,41	16,76	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,85
750	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990221004	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	19,09	25,37	25,14	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	5,03
751	Metforminum	Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg	120 tabl. (8 blist.po 15 szt.)	5909990221028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	25,46	33,12	33,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	6,40
752	Metforminum	Siofor 500, tabl. powl., 500 mg	30 tabl.	5909990457212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,35	4,77	4,19	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporno ci w przypadkach innych ni w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753	Metforminum	Siofor 500, tabl. powł., 500 mg	60 tabl.	5909990457229	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,60	8,38	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	4,42
754	Metforminum	Siofor 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990457311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,18	7,53	7,12	Cukrzyca	Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy); Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; Zespół policystycznych jajników	ryczałt	3,61
755	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,2 ml	5909990791309	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	49,68	59,44	34,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	28,29
756	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,3 ml	5909990791361	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	58,15	70,41	51,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	22,09
757	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,4 ml	5909990791446	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	77,52	92,37	68,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	26,88
758	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp-strzyk. a 0,5 ml	5909990791491	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego	89,64	106,64	85,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego	ryczałt	23,97
759	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg	50 tabl.	5909990453726	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	8,09	11,65	10,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; różni szczone zapalenia płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Złotyżaczki - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL	ryczałt	6,49
760	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg	50 tabl.	5909990453825	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,18	22,08	20,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; różni szczone zapalenia płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Złotyżaczki - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL	ryczałt	11,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
761	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg	50 tabl.	5909990453924	2012-03-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	32,36	41,95	41,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; różmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziairniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	21,33
762	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 2,5 mg	100 tabl. (but.)	5909990111619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,09	20,98	We wszystkich wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; różmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziairniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	11,78
763	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 10 mg	100 tabl. (1 poj.po100 szt.)	5909990730346	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	64,80	80,05	80,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Sarkoidoza; różmi szowe zapalenia płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL; Ziairniakowe choroby płuc - w przypadkach innych ni wymienione w CHPL	ryczałt	42,67
764	Metoprololum	Metocard, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034420	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	3,95	5,34	3,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadcii nienie t tnicze oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,63
765	Metoprololum	Metocard, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034529	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,38	8,99	7,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadcii nienie t tnicze oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
766	Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl. , 500 mg	50 tabl.	5909990707515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	367,12	367,12	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
767	Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990707614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	367,12	367,12	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
768	Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	110 g (175 ml)	5909990980918	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	456,95	508,98	508,98	Stan po przeszczepie narz. du unaczynionego b. d. szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz. du unaczynionego b. d. szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
769	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990752003	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	143,22	143,22	Stan po przeszczepie narz. du unaczynionego b. d. szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz. du unaczynionego b. d. szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
770	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	300 kaps. (30 blist.po 10 szt.)	5909990752034	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	313,34	313,34	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	4,00
771	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990752355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	178,20	210,04	210,04	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
772	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	150 tabl. (15 blist.po 10 szt.)	5909990752362	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,60	605,12	605,12	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	4,00
773	Mycophenolas mofetil	Mycofenor, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990915163	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	135,00	164,25	164,25	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
774	Mycophenolas mofetil	Mycofenor, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990918584	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	114,48	142,50	142,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
775	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990718375	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	315,94	315,94	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
776	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990718405	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	315,94	315,94	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
777	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 250, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10)	5909990074563	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	114,48	142,50	142,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
778	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 500, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990715268	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	140,40	169,97	169,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
779	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990807703	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	162,00	192,87	192,87	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
780	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990807741	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	162,00	192,87	192,87	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	Mycophenolas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990638185	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,16	366,88	366,88	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
782	Mycophenolas mofetil	Myfenax, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990638208	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,16	366,88	366,88	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
783	Mycophenolas mofetil	Nolfemic, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990885091	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	297,00	335,97	335,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20
784	Mycophenolas mofetil	Nolfemic, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990885107	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	297,00	335,97	335,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci; Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
785	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3 ml	5909990075621	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,14	53,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	10,23

													<p>ko czynny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kośćmi dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłuższymi niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
786	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990075720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	103,47	122,97	106,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	19,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
787	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990075829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	160,54	186,65	177,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	13,17

													<p> ko czynny dolnej w opatunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czynny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylniej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dtu ej ni 14 dni (dawki lecznicze) </p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
788	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml	10 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990716821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	64,39	79,13	70,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
789	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990716920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128,00	150,57	141,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążnych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstymi kontrolami INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	12,13

												ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylnej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dłu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
790	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990836932	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	183,88	212,20	212,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	4,27

													ko czynny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kośćmi dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłuższy niż 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
791	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990837038	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	263,00	297,67	283,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciążących po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	20,09

														<p>ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży; Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłuższą niż 14 dni (dawki lecznicze)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
792	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990837137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	307,17	346,08	346,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; Zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciążowych po wszczęciu zastawki i z wad zastawek; Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresów ocen możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie wskazane z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłania, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) czynniki nie terapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednim czynnikiem kontrolowania INR, nawroty choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA; Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; Unieruchomienie	ryczałt	7,11

														ko czyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obra e ko czyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile zwi zane jest to ze wzrostem ryzyka wyst pienia ylniej choroby zakrzepowo zatorowej); Profilaktyka i leczenie ylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ci y; Krytyczne niedokrwienie ko czyn dolnych - w okresie poprzedzaj cym hospitalizacj , nie dtu ej ni 14 dni (dawki lecznicze)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
793	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990139613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
794	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990139620	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,40
795	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990277216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,26	4,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,30
796	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990277223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,46	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	5,35
797	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694754	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,40
798	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694761	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
799	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694778	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,26	4,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,30
800	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694785	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,46	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	5,35
801	Octreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 50 g/ml	5 amp.a 1 ml	5909990042715	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	37,80	50,29	50,29	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
802	Octreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa, 100 g/ml	5 amp.a 1 ml	5909990042913	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotydy	48,60	65,74	65,74	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
803	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 20 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459612	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotydy	4 320,00	4 664,94	4 655,44	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,70
804	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 10 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459711	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotydy	2 160,00	2 346,72	2 327,72	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	22,20
805	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990806751	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,16	40,66	40,66	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
806	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990806799	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	58,32	75,57	75,57	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
807	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (blis.)	5909990703302	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,81	67,16	63,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,69
808	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (blis.)	5909990703685	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	107,61	128,20	127,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,06
809	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blis.)	5909990697526	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	62,42	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,19
810	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blis. Alu/Alu)	5909990697649	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,36	119,08	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
811	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990793341	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,13	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,90
812	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990793365	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	114,50	114,50	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
813	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990793389	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	114,50	114,50	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
814	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990638444	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,13	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,90
815	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990638482	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	122,51	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,86
816	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990766895	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	43,20	55,55	55,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
817	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990766901	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	86,40	105,34	105,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
818	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990767045	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	43,20	55,55	55,55	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
819	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990767052	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	86,40	105,34	105,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
820	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637126	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,57	62,30	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,07
821	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637218	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,14	118,85	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
822	Olanzapinum	Olasyn 10 mg , tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990769094	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	97,20	116,79	116,79	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
823	Olanzapinum	Olasyn 5 mg , tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990768950	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	69,86	59,43	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	13,63
824	Olanzapinum	Olazax, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990782239	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	54,40	54,40	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
825	Olanzapinum	Olazax, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990782246	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	84,24	103,05	103,05	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
826	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990782253	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	54,40	54,40	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
827	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990782260	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	84,24	103,05	103,05	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
828	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990781782	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,66	59,22	59,22	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
829	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990781805	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	98,77	118,45	118,45	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
830	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335343	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	63,56	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,33
831	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335367	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	123,66	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	8,01
832	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729081	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,25	118,97	118,85	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,32
833	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729159	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,43	58,97	58,97	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
834	Olanzapinum	Ranofren, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640287	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,36	119,08	118,85	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
835	Olanzapinum	Sanza 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692668	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	100,44	120,22	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,57
836	Olanzapinum	Sanza 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692590	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,22	62,99	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,76
837	Olanzapinum	Synza 10 mg, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704866	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,06	121,94	118,85	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,29
838	Olanzapinum	Synza 5 mg, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704750	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	48,60	61,27	59,43	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,04
839	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069705	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,63	62,36	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,13
840	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069866	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,33	122,23	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,58
841	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081812	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,63	62,36	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,13
842	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081911	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,33	122,23	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,58
843	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990916917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	69,66	63,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,19
844	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990917013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	134,33	127,34	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	10,19
845	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	69,66	63,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
846	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064716	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	134,33	127,34	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	10,19
847	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990775675	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,35	65,25	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,02
848	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990775682	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	127,09	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	11,44
849	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991096816	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	69,66	63,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,19
850	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991097011	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	134,33	127,34	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	10,19
851	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990892082	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,35	65,25	59,43	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,02
852	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990892129	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	127,09	118,85	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	11,44
853	Olanzapinum	Zyprexa, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990743117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,19	100,05	59,43	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	43,82
854	Olanzapinum	Zyprexa, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990743315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,39	194,36	118,85	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	78,71
855	Omeprazolom	Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990068401	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,45	10,57	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,85
856	Omeprazolom	Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990068425	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,60	17,75	17,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
857	Omeprazolom	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	13,55	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,83
858	Omeprazolom	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	22,71	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,28
859	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990420513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,90	17,24	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,88
860	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990420520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	24,54	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,82
861	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990420537	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	25,42	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,99
862	Omeprazolom	Helicid 10, kaps., 10 mg	14 kaps.	5909990877317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	11,75	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,39
863	Omeprazolom	Helicid 10, kaps., 10 mg	28 kaps.	5909990877324	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,13	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,41
864	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	14 kaps. (but.)	5909990420612	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,20	19,84	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
865	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	28 kaps. (but.)	5909990420629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	23,86	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,43
866	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	90 kaps. (but.)	5909990422654	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	40,19	51,75	51,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	25,88
867	Omeprazolom	Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 tabl.	5909990889600	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,69	17,84	17,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,92
868	Omeprazolom	Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 tabl.	5909990891351	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,38	33,74	33,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,87
869	Omeprazolom	Losec, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990193721	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	33,95	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	29,23
870	Omeprazolom	Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909991100926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,58	17,72	17,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,86
871	Omeprazolom	Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613205	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	23,86	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,43
872	Omeprazolom	Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg	56 kaps. (8 blist.po 7 szt.)	5909990615230	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	41,19	37,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	22,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
873	Omeprazolom	Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613359	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	41,19	37,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	22,32
874	Omeprazolom	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990772629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	24,99	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	20,27
875	Omeprazolom	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990772667	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	29,01	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,58
876	Omeprazolom	Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990077731	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	43,48	37,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	24,61
877	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990772919	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	16,41	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,69
878	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990772926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,32	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,96
879	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990772933	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,87	20,15	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	10,72
880	Omeprazolom	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps. (but.)	5909990635450	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	18,48	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
881	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048809	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,90	33,36	33,36	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
882	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 300 mg	50 tabl.	5909990048823	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,11	63,11	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
883	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powł., 600 mg	50 tabl.	5909990048854	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	118,63	118,63	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
884	Oxcarbazepinum	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	250 ml	5909990747115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	104,92	104,92	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
885	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990825516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,80	38,55	33,38	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	8,37
886	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990825615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,13	66,76	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	7,57
887	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990825714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	133,51	133,51	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
888	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	14,69	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,97
889	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621040	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,09	21,46	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,03
890	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl. (blist.)	5909991128418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,30	13,59	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
891	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128432	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,92	23,39	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,96
892	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl. (blist.)	5909991128814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	6,91	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	4,55
893	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,00	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,28
894	Pantoprazolum	Contracid, tabl. powl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736706	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	12,38	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,66
895	Pantoprazolum	Contracid, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	23,83	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,40
896	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl. (blist.)	5909990478767	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	8,89	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,53
897	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478774	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	17,55	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,83
898	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl. (blist.)	5909990689842	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,97	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
899	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990689859	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	25,00	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,57
900	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990653409	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	10,68	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,96
901	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990653508	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	10,68	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,96
902	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990653539	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,50	18,70	18,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,35
903	Pantoprazolum	IPP 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990085033	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	13,67	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,95
904	Pantoprazolum	IPP 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (blist.)	5909990082643	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,43	24,99	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,56
905	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645640	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,60	14,97	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	10,25
906	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645732	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,50	26,12	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
907	Pantoprazolum	Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075003	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,14	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,42
908	Pantoprazolum	Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg	56 tabl.	5909990075041	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,65	18,87	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,44
909	Pantoprazolum	Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075089	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	25,25	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,82
910	Pantoprazolum	Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg	56 tabl.	5909990075126	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	36,03	36,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	18,02
911	Pantoprazolum	Panogastin, tabl. dojel., 20 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	14,69	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,97
912	Pantoprazolum	Panogastin, tabl. dojel., 40 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646272	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	26,72	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,29
913	Pantoprazolum	Panrazol, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698974	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,36	9,41	9,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	4,71
914	Pantoprazolum	Panrazol, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990699209	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,62	18,83	18,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
915	Pantoprazolum	Pantogen 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (blis.Alu/Alu)	5909990780549	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,87	9,95	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,23
916	Pantoprazolum	Pantogen 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (blis.Alu/Alu)	5909990780587	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,45	18,65	18,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,33
917	Pantoprazolum	Pantopraz 40 mg, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blis.po 14 szt.)	5909990889167	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,09	21,46	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,03
918	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990652334	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,82	12,02	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,30
919	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990652372	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	23,23	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,80
920	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl.	5909990730094	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,12	4,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	2,76
921	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 20 mg	28 szt.	5909990730100	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	9,99	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,27
922	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990730162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	9,99	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
923	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 40 mg	28 szt.	5909990730179	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	19,04	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,61
924	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059546	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,06	9,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,34
925	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059591	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	23,40	18,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,97
926	Pegfilgrastimum	Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml	1 amp.-strz.a 0,6 ml (z zab.igly)	5909990007523	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	3 286,98	3 554,20	3 554,20	Nowotwory zło liwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych	Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem, w szczególności u chorych poddawanych chemioterapii o zało eniu radykalnym	ryczałt	3,20
927	Phenobarbitalum	Luminalum, czopki, 15 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doodbytniczego	2,15	3,19	3,19	Padaczka	Padaczka u dzieci do 30 miesi ca ycia	ryczałt	3,19
928	Phenobarbitalum	Luminalum, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990260614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	4,40	6,51	6,50	Padaczka	Padaczka u dzieci	ryczałt	3,21
929	Phenobarbitalum	Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990812615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	4,38	6,50	6,50	Padaczka	Padaczka u dzieci	ryczałt	3,20
930	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 U	12 tabl.	5909990070916	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postaci farmaceutyczne	4,54	6,49	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
931	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	12 tabl.	5909990071012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postaciace farmaceutyczne	5,94	8,69	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,20
932	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml	60 ml (but.)	5909990363216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - plynne postaciace farmaceutyczne	7,02	10,17	10,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,20
933	Prednisolonum	Encortolon, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990170715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	4,54	6,73	6,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
934	Prednisonum	Encorton, tabl. , 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,50	3,96	0,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	3,96
935	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,54	6,01	3,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	5,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
936	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	15,44	20,88	19,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	6,31
937	Prednisonum	Encorton, tabl. , 10 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	8,53	11,34	7,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	6,58
938	Prednisonum	Encorton, tabl. , 20 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	11,34	15,92	15,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	4,27
939	Progesteronum	Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569380	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	21,60	28,83	28,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka i leczenie ci y zagro onej porodem przedwczesnym	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
940	Propafenonum	Polfenon, tabl. powł., 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034123	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon	5,29	7,63	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburze rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadci nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,96
941	Propafenonum	Polfenon, tabl. powł., 300 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon	9,61	13,73	13,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburze rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadci nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
942	Propranololum	Propranolol WZF, tabl. , 10 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,17	2,62	1,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw niem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia; Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste	ryczałt	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
943	Propranololum	Propranolol WZF, tabl., 40 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	3,03	4,49	4,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw eniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia; Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste	ryczałt	3,20
944	Quetiapinum	Bonogren, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990719389	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,53	11,48	7,69	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	6,99
945	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990806355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	9,77	7,69	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,28
946	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990713646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,29	7,69	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	7,80
947	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990722198	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,67	9,52	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,03
948	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990055531	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	12,75	7,69	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	8,26
949	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powl., 25 mg	10 blist. po 10szt.	5909990058808	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,11	28,12	25,65	Schizofrenia. Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,67
950	Quetiapinum	Ketrel, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990430840	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,60	7,69	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	7,11
951	Quetiapinum	Kventiax 25, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990074068	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,64	9,49	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
952	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990688241	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,65	9,50	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,01
953	Quetiapinum	Kwetax, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990692804	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,62	8,41	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,92
954	Quetiapinum	Pinexet 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990788583	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,64	8,43	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,94
955	Quetiapinum	Poetra, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990742547	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,53	8,31	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,82
956	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990717705	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,66	9,51	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,02
957	Quetiapinum	Stadaquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990727056	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,97	9,83	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,34
958	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909990635382	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,33	7,69	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,84
959	Quetiapinum	Vorta, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909990778072	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,63	8,42	7,69	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,93
960	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990707010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,57	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	19,99
961	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990707119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,21	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	22,91
962	Quinaprilum	Accupro 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909991080129	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,36	14,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	35,20
963	Quinaprilum	Accupro 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990706914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,80	16,25	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	16,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
964	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,58	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,58
965	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,57	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,99
966	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,24	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,94
967	Quinaprilum	Aprilgen 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014439	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,70	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,12
968	Quinaprilum	Aprilgen 20mg, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014460	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	19,34	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	16,04
969	Quinaprilum	Aprilgen 40mg, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014507	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,49	15,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	26,89
970	Quinaprilum	Aprilgen 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014354	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,86	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	10,86
971	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215737	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,86	1,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	10,86
972	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215805	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,70	3,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,12
973	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215898	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,24	7,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,94
974	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215980	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,49	15,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	26,89
975	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990571468	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,44	21,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
976	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	60 tabl.	5909990571475	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	33,84	33,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	25,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
977	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990571499	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,16	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,21
978	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	60 tabl.	5909990571505	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,77	19,44	19,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
979	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,60	5,38	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,28
980	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653362	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,60	10,89	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,27
981	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,55	20,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
982	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337958	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,29	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,81
983	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337972	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,22	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,27
984	Ramiprilum	Axtil, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337989	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,16	22,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,26
985	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,89	5,78	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,30
986	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
987	Ramiprilum	Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990661756	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	19,83	19,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
988	Ramiprilum	Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212170	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,54	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,06
989	Ramiprilum	Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,61	13,20	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	8,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
990	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694631	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,18	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,56
991	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694655	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	21,68	21,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,44
992	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990052653	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,98	27,08	22,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	17,18
993	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644551	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,49	8,55	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,07
994	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,88	16,66	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,71
995	Ramiprilum	Ramistad 10, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990017461	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	16,06	16,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
996	Ramiprilum	Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl.	5909990017447	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,24	4,99	4,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
997	Ramiprilum	Ramistad 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990017454	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	9,70	9,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	5,97
998	Ramiprilum	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047987	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,88	20,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
999	Ramiprilum	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047949	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,46	5,23	5,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
1000	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047963	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,09	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,47
1001	Ramiprilum	Tritace 10, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990916016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,79	23,47	21,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	14,23
1002	Ramiprilum	Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,79	15,12	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1003	Ramiprilum	Tritace 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990478316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,77	17,44	10,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,82
1004	Ramiprilum	Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610532	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	21,90	21,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
1005	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610440	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,00	5,91	5,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,43
1006	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,35	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
1007	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990206728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,18	11,77	11,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapalenie błony łożyskowej u dziecka do 18 roku życia	ryczałt	3,20
1008	Risedronatum natricum	Risendros 35, tabl. powł., 35 mg	4 tabl.	5909990082599	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryfendronowy	14,68	19,12	13,86	Osteoporoza	Profilaktyka osteoporozy posterydowej	30%	9,42
1009	Rivastigminum	Exelon, kaps., 1,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	114,66	123,24	5,19	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	119,61
1010	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	129,39	10,38	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	122,12
1011	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781225	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	259,00	20,77	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	244,46
1012	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	130,39	15,58	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	119,48
1013	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781324	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	260,42	31,16	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	238,61
1014	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	131,23	20,77	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	116,69
1015	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	261,69	41,54	Choroba Alzheimera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	232,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1016	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990700646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,81	34,36	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	30,73
1017	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990700660	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,81	34,36	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	30,73
1018	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990700684	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	39,41	44,82	10,38	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	37,55
1019	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	28 tabl.	5909990700691	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	35,67	40,86	10,38	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	33,59
1020	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990700707	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	80,90	90,65	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,11
1021	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990700738	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	44,67	51,39	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	40,48
1022	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	28 tabl.	5909990700745	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	40,93	47,44	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,53
1023	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990700752	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,25	104,11	31,16	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	82,30
1024	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990700790	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
1025	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	28 tabl.	5909990700806	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
1026	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990700844	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	103,84	117,67	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	88,59
1027	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990782048	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	11,58	13,97	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,34
1028	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg	56 kaps.	5909990782055	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	23,16	27,60	10,38	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1029	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990782079	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,16	27,60	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,33
1030	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990782086	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
1031	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990782147	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,74	40,86	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,95
1032	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990782154	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,48	79,96	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,15
1033	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990782178	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
1034	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990782185	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	92,64	105,80	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,72
1035	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990816255	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,31	53,98	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,44
1036	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990816262	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,73	40,85	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,94
1037	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990816279	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,47	79,96	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,15
1038	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990816286	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	53,99	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,45
1039	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990816293	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	92,62	105,77	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,69
1040	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990778898	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	11,56	13,94	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,31
1041	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990778935	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,13	27,56	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1042	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990778942	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
1043	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990778966	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,71	40,83	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,92
1044	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990778973	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,42	79,91	31,16	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,10
1045	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990778997	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
1046	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990779000	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,53	105,67	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,59
1047	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990768202	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	18,63	21,45	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	17,82
1048	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990768264	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,56	39,68	10,38	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	32,41
1049	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990768288	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	56,16	64,42	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	49,88
1050	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990768301	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	42,12	48,69	15,58	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	37,78
1051	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990768332	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	84,24	95,61	31,16	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	73,80
1052	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990768363	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	56,16	64,42	20,77	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	49,88
1053	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990768370	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	112,32	126,65	41,54	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	97,57
1054	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990886258	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	11,56	13,94	5,19	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1055	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990886296	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	23,11	27,55	10,38	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,28
1056	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990886302	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,33	54,00	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,46
1057	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990886364	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	34,67	40,80	15,58	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,89
1058	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990886371	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	69,34	79,82	31,16	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,01
1059	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990886401	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,22	53,88	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,34
1060	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990886425	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	95,80	109,14	41,54	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	80,06
1061	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803156	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	11,51	13,90	5,19	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,27
1062	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803545	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	22,68	27,09	10,38	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	19,82
1063	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps. (blis.)	5909990803569	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	45,36	52,97	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,43
1064	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803781	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	34,56	40,68	15,58	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,77
1065	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps. (blis.)	5909990803804	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	69,12	79,59	31,16	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	57,78
1066	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. (blis.)	5909990804085	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	45,36	52,97	20,77	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,43
1067	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps. (blis.)	5909990804108	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	91,80	104,90	41,54	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	75,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1068	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990866250	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	18,63	21,45	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	17,82
1069	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990866304	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,23	37,21	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,94
1070	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990866366	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	65,67	74,50	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	59,96
1071	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990866397	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	36,44	42,68	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	31,77
1072	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990866427	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	71,51	82,12	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	60,31
1073	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990866458	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	43,74	51,26	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,72
1074	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990866472	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	86,51	99,29	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	70,21
1075	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps. twardych	5909990795307	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	11,57	13,96	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,33
1076	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps. twardych	5909990795376	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,13	27,56	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	20,29
1077	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990795383	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41
1078	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. twardych	5909990795567	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,70	40,83	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,92
1079	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990795574	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,40	79,88	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	58,07
1080	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. twardych	5909990795598	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,27	53,95	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	39,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1081	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990795604	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	92,53	105,67	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	76,59
1082	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860883	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,56	40,68	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,77
1083	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990860890	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,12	79,59	31,16	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	57,78
1084	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860937	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	45,36	52,97	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,43
1085	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990860944	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	90,72	103,75	41,54	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	74,67
1086	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg	28 tabl.	5909990808199	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	14,23	16,77	5,19	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	13,14
1087	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 3 mg	28 tabl.	5909990808397	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	14,23	18,12	10,38	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	10,85
1088	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 tabl.	5909990808427	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	22,32	27,71	15,58	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	16,80
1089	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 6 mg	28 tabl.	5909990808441	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	29,81	36,49	20,77	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	21,95
1090	Salbutamololum	Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml	100 ml	5909990317516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	3,00	4,45	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
1091	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990673742	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	12,45	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,89
1092	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990673759	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	24,31	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,18
1093	Simvastatinum	Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618279	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	8,45	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1094	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618286	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,80	14,54	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,65
1095	Simvastatinum	Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618293	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	27,23	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	17,45
1096	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023608	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	9,77	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,49
1097	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	19,77	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,21
1098	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990023653	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	37,07	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,94
1099	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649532	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,86	9,17	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,61
1100	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649655	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,25	18,46	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,33
1101	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	12,85	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,57
1102	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,74	19,65	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,09
1103	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,78	35,98	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	26,85
1104	Simvastatinum	Simratio 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019723	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	12,37	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,09
1105	Simvastatinum	Simratio 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	19,08	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,52
1106	Simvastatinum	Simratio 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019945	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	36,55	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1107	Simvastatinum	SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623273	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	9,61	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,17
1108	Simvastatinum	SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623297	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	20,35	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,46
1109	Simvastatinum	SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 0,04 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623334	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	31,01	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,23
1110	Simvastatinum	Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	11,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,97
1111	Simvastatinum	Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	18,39	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,83
1112	Simvastatinum	Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27,00	31,97	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	22,84
1113	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	6,67	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,39
1114	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	11,64	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,08
1115	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	21,67	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,54
1116	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336623	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,40	8,86	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,42
1117	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336630	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	16,22	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,33
1118	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	25,29	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,51
1119	Simvastatinum	Simvagama 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909991146016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,10	5,37	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1120	Simvastatinum	Simvagama 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909991146115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	10,62	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,73
1121	Simvastatinum	Simvagama 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909991146214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	22,43	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,65
1122	Simvastatinum	Simvagen 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,63	4,80	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,52
1123	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,23	11,81	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,92
1124	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743650	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,73	9,03	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,47
1125	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037964	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,93	24,66	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,88
1126	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743667	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,38	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,25
1127	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623082	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,62	4,86	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,42
1128	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623105	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,80	9,24	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,35
1129	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623136	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,15	18,54	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,76
1130	Simvastatinum	Simvastatin 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990037698	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,48	8,77	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,21
1131	Simvastatinum	Simvastatin 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990037704	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,70	9,12	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,23
1132	Simvastatinum	Simvastatin 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990037582	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,58	18,99	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1133	Simvastatinum	Simvastatin Krka (Vasilip), tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990436316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	11,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,97
1134	Simvastatinum	Simvastatin Krka (Vasilip), tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990436415	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	17,93	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,37
1135	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,50	15,26	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,98
1136	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	20,22	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,66
1137	Simvastatinum	Simvastaterol, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990927838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	36,55	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	27,42
1138	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990914012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	11,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,97
1139	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990914111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	17,93	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,37
1140	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990982714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	27,17	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,04
1141	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,25	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,97
1142	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,10	14,74	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,18
1143	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	13,93	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,37
1144	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	7,32	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,88
1145	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	14,51	6,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1146	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	24,15	13,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,37
1147	Simvastatinum	Zocor 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990365913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	21,65	3,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	19,37
1148	Simvastatinum	Zocor 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990366026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,61	6,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,05
1149	Simvastatinum	Zocor 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990769124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	37,13	13,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	28,00
1150	Simvastatinum	Zocor 80, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990846627	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	80,97	26,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	62,71
1151	Sirolimusum	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml	60 ml (but.+30 strzyk.)	5909990893645	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,50	1 083,93	1 080,56	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku Stano po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Cytopenie w autoimmunizacyjnym zespole limfoproliferacyjnym (ALPS) odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach nieop danych przewlekłej sterydoterapii w wysokich dawkach	ryczałt	6,57
1152	Sirolimusum	Rapamune, tabl. powl., 1 mg	30 tabl.	5909990985210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	540,28	540,28	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Cytopenie w autoimmunizacyjnym zespole limfoproliferacyjnym (ALPS) odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach nieop danych przewlekłej sterydoterapii w wysokich dawkach	ryczałt	3,20
1153	Sotalolum	Biosotal 160, tabl., 160 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0. Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,55	10,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1154	Sotalolum	Biosotal 40, tabl. , 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990365715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,58	9,57	5,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,80
1155	Sotalolum	Biosotal 80, tabl. , 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,25	5,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,48
1156	Sotalolum	SotaHEXAL 160, tabl. , 160 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,78	7,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,75
1157	Sotalolum	SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991014711	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,10	1,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	1,84
1158	Sotalolum	SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,47	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,96
1159	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990110216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	5,40	6,83	3,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	4,26
1160	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	100 tabl.	5909990110223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	19,44	24,85	18,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	12,00
1161	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990673124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	10,37	14,69	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	4,41
1162	Spironolactonum	Verospiron, tabl. , 25 mg	20 tabl.	5909990117215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	5,89	7,34	3,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	4,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1163	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	10,90	14,52	11,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	6,81
1164	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	16,38	22,15	22,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Przewlekła niewydolno serca; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	30%	6,73
1165	Sucralfatum	Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml	250 ml	5909990164615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.2, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - plynne postacie farmaceutyczne	10,89	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	7,68
1166	Sucralfatum	Ulgastran, tabl., 1 g	50 tabl.	5909990223619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.1, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	10,89	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	7,68
1167	Sucralfatum	Venter, tabl. powl., 1 g	50 tabl.	5909990242818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.1, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	15,57	20,31	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	12,64
1168	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	100 ml	5909990312610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne	9,80	13,73	12,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka e u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	7,33
1169	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, zawiesina doustna, (0,2 g+0,04 g)/5 ml ml	100 ml	5909997198927	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne	9,72	13,64	12,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka e u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	7,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1170	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5ml	100 ml	5909990117819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacię plynne	8,93	12,81	12,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka e u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	6,41
1171	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol 120, tabl. , 100+20 mg	20 tabl. (blist.)	5909990117529	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacię stałe	8,64	10,76	5,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka e u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	8,17
1172	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol 480, tabl. , 400+80 mg	20 tabl.	5909990117611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacię stałe	15,12	20,73	20,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka e u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	10,37
1173	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Biseptol 960, tabl. , 800+160 mg	10 tabl. (blist.)	5909990117710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacię stałe	15,12	20,73	20,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka e u chorych leczonych cyclophosphamidem	50%	10,37
1174	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	33,85	30,64	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1175	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990864423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,67	61,25	61,25	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
1176	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN , tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909997012001	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	44,82	57,17	57,17	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
1177	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN , tabl. dojel., 500 mg	100 szt.	5909997012759	2013-01-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,15	55,40	55,40	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Mikroskopowe zapalenie jelita; 2. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
1178	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,15	30,64	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	7,71
1179	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,27	61,27	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,20
1180	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	30,80	30,64	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci; 3. Mikroskopowe zapalenie jelita; 4. Choroba uchyłkowa jelit	ryczałt	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1181	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990051052	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,20	118,46	85,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	36,05
1182	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990051076	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	171,22	171,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1183	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990051137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1 086,74	856,10	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	233,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1184	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg	30 kaps.	5909990699957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	652,41	513,66	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	141,95
1185	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990783489	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,12	85,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	8,71
1186	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990783533	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729,00	804,61	804,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1187	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990783571	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	165,07	165,07	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1188	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	171,22	171,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1189	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447312	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	820,13	820,13	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1190	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991148713	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - takrolimus	74,41	91,12	85,61	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	8,71
1191	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990821006	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - takrolimus	66,96	83,23	83,23	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1192	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990821228	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - takrolimus	146,20	171,22	171,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1193	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990821280	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	669,60	741,65	741,65	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1194	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 0,5 mg	30 kaps.	5909990881352	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	68,85	85,22	85,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1195	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg	30 kaps.	5909990881406	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	165,07	165,07	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1196	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg	90 kaps.	5909990881475	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	421,20	470,59	470,59	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1197	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836857	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	59,40	75,21	75,21	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1198	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836888	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	112,32	135,31	135,31	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1199	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836949	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - takrolimus	540,00	604,27	604,27	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporno ci na cyklosporyn ; Choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporno ci	ryczałt	3,20
1200	Telmisartanum	Actelsar, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990891863	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	27,00	34,38	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	14,02
1201	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 40 mg	28 tabl.	5909990440726	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	40,48	46,58	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia; Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	36,40
1202	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 80 mg	14 tabl.	5909990440818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	26,18	31,42	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia; Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	21,24
1203	Telmisartanum	Micardis, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990440825	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	54,02	63,02	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia; Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	42,66
1204	Telmisartanum	Pritor, tabl. , 40 mg	28 tabl.	5909990463428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	47,43	53,96	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia; Niewydolno serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	43,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1205	Telmisartanum	Pritor, tabl. , 80 mg	14 tabl.	5909990463510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,70	38,33	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia; Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	28,15
1206	Telmisartanum	Pritor, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990463527	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	65,29	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia; Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	44,93
1207	Telmisartanum	Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990840472	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,23	17,69	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	7,51
1208	Telmisartanum	Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990840557	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	33,81	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	13,45
1209	Telmisartanum	Telmix, tabl., 40 mg	28 szt	5909990974863	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	17,41	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	7,23
1210	Telmisartanum	Telmix, tabl., 80 mg	28 szt	5909990974979	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,92	33,23	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	12,87
1211	Telmisartanum	Telmizek, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990902002	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,56	19,11	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	8,93
1212	Telmisartanum	Telmizek, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990902095	2012-09-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,30	34,70	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	14,34
1213	Telmisartanum	Tezeo , tabl. , 40 mg	28 tabl.	5909990818082	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,57	19,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	8,94
1214	Telmisartanum	Tezeo , tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990818150	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,32	33,66	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	13,30
1215	Telmisartanum	Tolura 40 mg tabletki, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909997077604	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,63	24,48	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	14,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1216	Telmisartanum	Tolura 80 mg tabletki, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909997077673	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-01-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	36,67	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)	30%	16,31
1217	Testosteronum	Undestor Testocaps, kaps., 40 mg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990665082	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	63.0, Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	44,63	44,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Opóźnione dojrzewanie płciowe przy hipogonadzie męskiej - terapia substytucyjna	30%	13,39
1218	Theophyllinum	Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,94	8,04	5,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	5,32
1219	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	7,02	8,84	4,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,31
1220	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,18	11,80	7,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,90
1221	Theophyllinum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl.	5909990261215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,23	11,83	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,00
1222	Theophyllinum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990803910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	6,31	8,43	5,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	5,71
1223	Theophyllinum	Theovent 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990149926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,51	12,13	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,30
1224	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 5 mg	50 tabl.	5909990058822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	96,45	96,45	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia	ryczałt	3,20
1225	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 10 mg	50 tabl.	5909990058839	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	190,07	190,07	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia	ryczałt	3,20
1226	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 15 mg	50 tabl.	5909990058846	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	282,03	282,03	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia	ryczałt	3,20
1227	Ticlopidinum	Aclostin, tabl. powł., 0,25 g	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990334971	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	31,32	40,08	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	13,45
1228	Ticlopidinum	Aclostin, tabl. powł., 0,25 g	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990667116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	16,20	20,59	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1229	Ticlopidinum	Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (but.)	5909990646616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	27,27	35,79	35,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	10,74
1230	Ticlopidinum	Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg	30 tabl. (but.)	5909990938315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	13,77	19,02	19,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	5,71
1231	Ticlopidinum	Iclopid, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990044986	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	29,70	38,36	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,73
1232	Ticlopidinum	Iclopid, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991029333	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	11,45	15,56	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	6,68
1233	Ticlopidinum	Ifapidin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990694846	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	32,18	40,99	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	14,36
1234	Ticlopidinum	Ifapidin, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990694853	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	16,63	21,04	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	12,16
1235	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990450510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	17,82	22,31	12,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	13,43
1236	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990450534	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	37,80	46,95	38,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	20,32
1237	Tioguaninum	Lanvis, tabl., 40 mg	25 tabl.	5909990185214	2012-11-01 – dla kolumny 12, 2013-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	234.0, Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity - analogi puryn - tioguanina	677,70	748,82	748,82	Nowotwory zło liwe	Choroba Le niowskiego - Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	bezpłatny	0,00
1238	Tizanidinum	Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	144.0, Leki działające rozkurczowo na mi nie szkieletowe - tizanidyna	44,24	54,67	44,19	Stwardnienie rozsiane	Stany spastyczne ci zwi zane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci	30%	23,74
1239	Topiramatum	Epiramat, tabl. powł., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017652	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,32	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,61
1240	Topiramatum	Epiramat, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990017669	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	24,12	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,49
1241	Topiramatum	Epiramat, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017676	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	41,79	41,79	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1242	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990017751	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	75,35	75,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1243	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990649556	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	7,99	11,51	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,80
1244	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990649570	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	15,98	21,83	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1245	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990649594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,46	39,88	39,88	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1246	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990649617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,99	75,93	75,93	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1247	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	9,14	12,73	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,02
1248	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644148	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	17,45	23,39	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,76
1249	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644155	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	35,19	44,89	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,43
1250	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	72,00	87,60	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,48
1251	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990061464	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	83,16	99,43	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	15,31
1252	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990061471	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	22,68	28,93	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	10,30
1253	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990061488	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,34	15,06	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,35
1254	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990061495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	44,28	54,52	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	14,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1255	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 25 mg	1 but. po 60szt.	5909990715084	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	16,20	22,30	22,30	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1256	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 50 mg	1 but. po 60szt.	5909990715145	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,24	40,00	40,00	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1257	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 100 mg	1 but. po 60szt.	5909990715169	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	56,70	71,86	71,86	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1258	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990644056	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	75,35	75,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1259	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990644070	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	41,79	41,79	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1260	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990644094	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	24,12	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,49
1261	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990644124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,32	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,61
1262	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (but.)	5909990758814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,72	15,46	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,75
1263	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (but.)	5909990758913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,44	29,74	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	11,11
1264	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (but.)	5909990759019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	46,87	57,26	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	16,80
1265	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (but.)	5909990759118	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	93,64	110,54	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	26,42
1266	Topiramatum	Topamax, kaps., 15 mg	60 kaps. (poj.)	5909990861514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	15,67	20,29	14,03	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	9,46
1267	Topiramatum	Topamax, kaps., 25 mg	60 kaps. (poj.)	5909990861613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	26,13	32,83	23,39	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	12,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1268	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 25 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743377	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,32	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,61
1269	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 50 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743384	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	24,12	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,49
1270	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 100 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743391	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	41,79	41,79	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1271	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 200 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743407	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	75,35	75,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1272	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676545	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,85	16,66	10,91	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	8,95
1273	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676552	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,54	29,84	21,83	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	11,21
1274	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676569	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,18	53,35	43,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	12,89
1275	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676576	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	80,46	96,57	87,32	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	12,45
1276	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 25 mg	60 tabl.	5909990744978	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	18,87	18,87	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1277	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 50 mg	60 tabl.	5909990744985	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	35,42	35,42	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1278	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 100 mg	60 tabl.	5909990744992	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	66,71	66,71	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1279	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 200 mg	60 tabl.	5909990745005	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	103,68	125,66	125,66	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,27
1280	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	5909990763344	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	66,71	66,71	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1281	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990763351	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	18,87	18,87	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1282	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 100 mg	30 tabl.	5909990763368	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	35,42	35,42	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1283	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990763375	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	6,48	10,09	10,09	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1284	Topiramatum	Toramat, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671472	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,88	15,82	11,69	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,33
1285	Topiramatum	Toramat, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671489	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,44	25,74	23,39	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,55
1286	Topiramatum	Toramat, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671496	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	34,56	44,58	44,58	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1287	Topiramatum	Toramat, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671502	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	64,80	80,45	80,45	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1288	Valganciclovirum	Valcyte, tabl. powl., 450 mg	60 tabl. (but.)	5909990727407	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postaci do stosowania doustnego	5 562,00	5 997,92	5 997,92	Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narz dów mi szowych - profilaktyka po zako czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 110 dni po przeszczepie, Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zako czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 200 dni po przeszczepie	Zapobieganie i leczenie zaka enia wirusem cytomegalii po transplantacji narz dów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku ycia; Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom ko czyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zako czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	3,20
1289	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 0,08 g	28 tabl.	5909990830961	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,58	15,94	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,76
1290	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 0,16 g	28 tabl.	5909990831067	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1291	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	6,09
1292	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751877	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,50	30,66	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,30
1293	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990929115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,20	49,46	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	39,28
1294	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990929214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	54,99	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	34,63
1295	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	14 tabl.	5909990929238	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	28,86	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	18,68
1296	Valsartanum	Nortivan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726776	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	6,09
1297	Valsartanum	Nortivan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726844	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
1298	Valsartanum	Tensart, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990681877	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,82	19,39	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	9,21
1299	Valsartanum	Tensart, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990682065	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,38	30,53	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,17
1300	Valsartanum	Valsacor 160, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074969	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
1301	Valsartanum	Valsacor 160, tabl. powł., 160 mg	60 tabl.	5909990818983	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,52	59,53	59,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	17,86
1302	Valsartanum	Valsacor 80, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074945	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	21,99	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	11,81
1303	Valsartanum	Valsacor 80, tabl. powł., 80 mg	60 tabl.	5909990818853	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,16	32,66	31,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1304	Valsartanum	Valsargen, kaps. twarde, 80 mg	28 kaps.	5909990856954	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,12	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,94
1305	Valsartanum	Valsargen, kaps. twarde, 160 mg	28 kaps.	5909990857081	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	28,66	28,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,60
1306	Valsartanum	Valzek, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990681761	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,27	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	6,09
1307	Valsartanum	Valzek, tabl., 160 mg	28 tabl.	5909990681785	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	30,95	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	10,59
1308	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688531	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,76	33,10	14,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	22,92
1309	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,84	36,33	29,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	15,97
1310	Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047895	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	32,98	25,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,10
1311	Venlafaxinum	Alventa, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047956	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	49,68	61,17	51,08	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	25,41
1312	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660636	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,69	14,83	12,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	5,89
1313	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660643	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,71	28,52	25,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	10,64
1314	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660650	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,94	47,67	47,67	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	14,30
1315	Venlafaxinum	Efectin ER 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990494019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	75,60	88,64	51,08	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	52,88
1316	Venlafaxinum	Efectin ER 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990493913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	50,98	59,55	25,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	41,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1317	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990715299	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,72	13,81	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	4,87
1318	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990715350	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,90	25,54	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	7,66
1319	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990715374	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,25	50,12	50,12	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,04
1320	Venlafaxinum	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721528	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	37,80	48,57	48,57	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	14,57
1321	Venlafaxinum	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721498	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,10	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	7,16
1322	Venlafaxinum	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721504	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	11,67
1323	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990691760	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,69	13,78	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	4,84
1324	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990691883	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	38,59	49,42	49,42	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	14,83
1325	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990691906	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,06	24,64	24,64	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	7,39
1326	Venlafaxinum	Jarvis 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077359	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,76	27,36	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	10,61
1327	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,76	24,46	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	15,52
1328	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673766	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	31,18	38,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	20,67
1329	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673803	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,35	70,36	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	34,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1330	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990795789	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	12,96	19,24	19,24	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	5,77
1331	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	98 kaps.	5909990795796	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	43,20	57,30	57,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	17,19
1332	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps.	5909990795802	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	6,48	10,37	10,37	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	3,11
1333	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	98 kaps.	5909990795819	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,14	31,23	31,23	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	9,37
1334	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990795826	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	32,55	32,55	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	9,77
1335	Venlafaxinum	Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	98 kaps.	5909990795833	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	78,84	99,08	99,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	29,72
1336	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727490	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,34	15,52	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	6,58
1337	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727506	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,55	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	11,67
1338	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	45,36	56,59	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	20,83
1339	Venlafaxinum	Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048106	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54,00	65,75	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	29,99
1340	Venlafaxinum	Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048397	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,06	27,83	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	9,95
1341	Venlafaxinum	Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990048403	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,41	20,04	9,12	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	13,66
1342	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 37,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	17,60	22,17	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe	Bólowa polineuropatia cukrzycowa	30%	13,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1343	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 37,5 mg	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,02	43,68	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	25,80
1344	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 75 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	32,62	40,09	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	22,21
1345	Venlafaxinum	Velafax, tabl. , 75 mg	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093921	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	67,77	80,35	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	44,59
1346	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (blist.)	5909990626670	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,51	37,84	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	19,96
1347	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (blist.)	5909990626724	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,61	70,64	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	34,88
1348	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055982	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,54	24,22	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	15,28
1349	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056279	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	29,44	36,72	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	18,84
1350	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056293	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	59,86	71,96	51,08	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	36,20
1351	Venlafaxinum	Venlabax MR 150, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719327	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,00	40,30	40,30	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	12,09
1352	Venlafaxinum	Venlabax MR 75, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719259	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	15,00	21,40	21,40	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	6,42
1353	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	5909990767601	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,58	20,96	20,96	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	6,29
1354	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	5909990767625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	35,98	35,98	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	10,79
1355	Venlafaxinum	Venlectine, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, 37,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040971	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,26	14,38	12,77	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1356	Venlafaxinum	Venlectine, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, 75 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040995	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,98	26,68	25,54	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	8,80
1357	Venlafaxinum	Venlectine, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg	28 kaps.	5909990424672	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2013-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,96	50,86	50,86	Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne	Bólowna polineuropatia cukrzycowa	30%	15,26
1358	Verapamilum	Staveran 120, tabl. powl., 120 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkiloininy - werapamil	2,08	3,08	3,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,08
1359	Verapamilum	Staveran 40, tabl. powl., 40 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990045211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkiloininy - werapamil	2,08	2,50	1,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	2,50
1360	Verapamilum	Staveran 80, tabl. powl., 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkiloininy - werapamil	2,08	2,79	2,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	2,79

A 2. Rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka rodka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin ważności decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją	Poziomota odpłatności	Wysokość dopłaty w badaniu -biorecy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepti 1, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2025 kJ/100 g	450 g	5909990734511, 8718117600601	2012-01-01	2 lata	217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka	17,16	22,02	14,95	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	11,56
2	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepti 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego,	450 g	5909990823710, 8718117600618	2012-01-01	2 lata	217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka	17,16	23,32	23,32	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	7,00
3	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon sojowy 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2065 kJ/100 g	400 g	5909990400713, 8718117600632	2012-01-01	2 lata	217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następujące stosowane powyżej 6 miesięcy	10,48	14,84	14,84	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	4,45
4	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Humana SL, proszek,	650 g	5909990319718, 4031244774132	2012-01-01	2 lata	217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowo przeznaczone dla niemowląt od urodzenia	18,01	24,41	24,41	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	7,32
5	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Isomil, proszek,	400 g (puszka)	5909990660414	2012-01-01	2 lata	217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowo przeznaczone dla niemowląt od urodzenia	10,09	13,78	10,95	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	6,12
6	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Isomil 2, proszek,	400 g (puszka)	5909990836413	2012-01-01	2 lata	217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następujące stosowane powyżej 6 miesięcy	11,42	14,96	10,47	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	7,63
7	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Neocate Advance, proszek, --	400g	5016533616170	2012-11-01	2 lata	217.7, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - mieszanki elementarne	133,35	156,77	153,69	Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych		ryczałt	6,28
8	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Neocate LCP, proszek, --	400g	5016533627251	2012-11-01	2 lata	217.7, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - mieszanki elementarne	133,35	156,92	156,92	Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych		ryczałt	3,20
9	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Nutramigen 1, proszek do sporządzenia roztworu,	425 g	5909990335046, 87-12045-02729-5	2012-03-01	2 lata	217.6, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty kazeiny	29,70	37,84	31,58	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		ryczałt	9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Dieta eliminacyjna mlekozast pcza	Nutramigen 1 LGG, proszek do sporz dzania roztworu,	400 g	5909990586851, 8712045027530	2012-07-01	2 lata	217.8, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty bialek mleka	48,28	55,10	15,48	Alergia na bialko mleka krowiego, objawy zwi zane z alergii pokarmow zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, nietolerancja laktozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, wtorna nietolerancja sacharozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, inne alergii zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, alergia na bialko sojowe z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego		30%	44,26
11	Dieta eliminacyjna mlekozast pcza	Nutramigen 2, proszek do sporz dzania roztworu,	425 g	5909990224586, 87-12045-02730-1	2012-03-01	2 lata	217.6, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty kazeiny	29,70	38,70	38,70	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergii pokarmowe i biegunki przewlekłe		ryczałt	3,20
12	Dieta eliminacyjna mlekozast pcza	Nutramigen 2 LGG, proszek do sporz dzania roztworu,	400 g	5909990586837, 8712045027547	2012-07-01	2 lata	217.8, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty bialek mleka	48,28	57,25	30,48	Alergia na bialko mleka krowiego, objawy zwi zane z alergii pokarmow zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, nietolerancja laktozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, wtorna nietolerancja sacharozy zwi zana z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, inne alergii zwi zane z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego, alergia na bialko sojowe z nadwra liwo ci na bialka mleka krowiego		30%	35,91
13	Dieta eliminacyjna mlekozast pcza	Nutramigen AA, proszek do przygotowania roztworu doustnego, - -	400g	5909990799909, 87-12045-02755-4	2012-07-01	2 lata	217.7, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - mieszanke elementarne	125,28	147,63	140,52	Stosowanie dietetyczne u niemowl t od urodzenia i dzieci z ci k postaci alergii na bialko mleka krowiego oraz nietolerancj ró nego rodzaju ywno ci, u których zastosowanie w post powaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a tak e w alergii na bialko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanke elementarnej zwyczajnej		ryczałt	10,31
14	Dieta eliminacyjna mlekozast pcza	Nutrison advanced Peptisorb Powder, proszek,	4 szt.a 125g (kart.)	5909990661510, 8712400763141	2012-01-01	2 lata	217.3, Dieta peptydowa kompletna	44,54	56,43	56,43	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergii pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	16,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Easiphen o smaku owoców le nych, płyn doustny,	18 poj.a 250 ml (4500 ml)	5909990652129, 5016533625929	2012-01-01	2 lata	216.15, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w głowodany), porcjowana, w płynie - przeznaczona dla pacjentów powy ej 8 r	501,65	557,55	557,55	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
16	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej,	30 sasz.a 27,8g (834g)	5909990635030, 5016533630992	2012-01-01	2 lata	216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. .	992,11	1 090,43	1 090,43	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
17	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Lophlex o smaku owoców le nych, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej,	30 sasz.a 27,8g (834g)	5909990635054, 5016533630978	2012-01-01	2 lata	216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. .	992,11	1 090,43	1 090,43	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
18	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Lophlex o smaku pomara czowym, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej,	30 sasz.a 27,8g (834g)	5909990635047, 5016533630985	2012-01-01	2 lata	216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. .	992,11	1 090,43	1 090,43	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
19	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Milupa PKU 3 tempora, proszek do sporz dzania roztworu doustnego, - -	10 saszetek	4008976599661, 4008976340294	2012-07-01	2 lata	216.18, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii przeznaczone do stosowania u kobiet w okresie prekoncepcji, podczas ci y oraz w okresie laktacji	438,90	489,36	489,36	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
20	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Minaphlex, proszek,	30 sasz.a 29g (870g)	5909991072216, 5016533640021	2012-01-01	2 lata	216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, porcjowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r. .	432,55	482,47	482,47	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
21	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Minaphlex o smaku waniliowo-ananasowym, proszek,	30 sasz.a 29g (870g)	5909991072315, 5016533624878	2012-01-01	2 lata	216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, porcjowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r. .	432,55	482,47	482,47	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
22	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	PKU Lophlex LQ o smaku owoców le nych, płyn doustny, 125 ml	30 x 125 ml (3750 ml)	5016533632323	2013-01-01	2 lata	216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powy ej 4 r. ., dorosłych, w tym kobiet w ci y	1 098,36	1 205,87	1 205,87	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
23	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	PKU Lophlex LQ o smaku owoców le nych, płyn doustny, 62,5 ml	60 x 62,5 ml (3750 ml)	5016533632354	2013-01-01	2 lata	216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powy ej 4 r. ., dorosłych, w tym kobiet w ci y	1 098,36	1 205,87	1 205,87	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
24	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	PKU Lophlex LQ o smaku pomara czowym, płyn doustny, 125 ml	30 x 125 ml (3750 ml)	5016533632347	2013-01-01	2 lata	216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powy ej 4 r. ., dorosłych, w tym kobiet w ci y	1 098,36	1 205,87	1 205,87	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
25	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Phenyl-Free 1, proszek do sporz dzania roztworu,	454 g	5909990754465, 03-0087-510213-8	2012-01-01	2 lata	216.2, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla niemowl t i małych dzieci	136,31	160,22	160,22	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
26	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Phenyl-Free 2, proszek do sporz dzania roztworu,	454 g	5909990886715, 03-0087-510006-6	2012-01-01	2 lata	216.13, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla dzieci i dorosłych	129,14	152,23	152,23	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
27	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	Phenyl-Free 2HP, proszek do sporz dzania roztworu,	454 g	5909990886616, 03-0087-510012-7	2012-01-01	2 lata	216.16, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla dzieci i dorosłych, w tym dla kobiet w ci y	189,12	217,98	217,98	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	XP Analog LCP, proszek do sporządzenia roztworu doustnego,	400 g	5909991022112, 5016533644456	2012-01-01	2 lata	216.4, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długą łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i prebiotykami - przeznaczona dla niemowląt i jako uzupełnienie diety u dzieci do 3 r.	146,52	171,57	171,57	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
29	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	XP Maxamum o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej,	30 sasz. a 50g (1500 g)	5909990642601, 5016533620368	2012-01-01	2 lata	216.17, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, porcjowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 8 r. w tym dla kobiet w ciąży	922,52	1 014,81	1 014,81	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
30	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 1, granulata,	500 g	5909990904112, 5016533644418	2012-01-01	2 lata	216.1, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla niemowląt	252,93	287,31	287,31	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
31	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 1 mix, granulata,	1 kg	5909990966011, 4008976340270	2012-01-01	2 lata	216.3, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długą łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla niemowląt	270,13	305,99	305,99	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
32	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 2 mix, proszek,	400 g	5909991059019, 4008976340287	2012-01-01	2 lata	216.10, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawierająca wszystkie składniki odżywcze, z długą łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia	359,96	403,60	403,60	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
33	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 2 prima, granulata,	500 g	5909990634705, 5016533644425	2012-01-01	2 lata	216.8, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia	376,37	421,42	421,42	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
34	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 2 secunda, granulata,	500 g	5909990634699, 5016533644432	2012-01-01	2 lata	216.11, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 8 r.	393,86	440,43	440,43	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
35	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 2 shake choco, proszek,	500g (10 sasz. x 50g)	4008976599234	2013-01-01	2 lata	216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w gwałodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r.	276,15	312,54	312,54	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
36	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 2 shake truskawkowo-waniliowy, proszek,	20 sasz. a 30g (600g)	5909990639366, 4008976340317	2012-01-01	2 lata	216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w gwałodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r.	281,81	317,74	278,23	Fenyloketonuria		ryczałt	42,71
37	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 2 shake truskawkowy, proszek,	500g (10 sasz. x 50g)	4008976599227	2013-01-01	2 lata	216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w gwałodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r.	276,15	312,54	312,54	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
38	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 3, tabl. powł.,	600 tabl.	5909990654857, 4008976340331	2012-01-01	2 lata	216.6, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii porcjowane, w postaci tabletek powlekanych - przeznaczone dla pacjentów powyżej 15 r.	501,72	557,62	557,62	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
39	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 3 advanta, granulata,	500 g	5909990634712, 5016533644449	2012-01-01	2 lata	216.5, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 15 r.	458,45	510,61	510,61	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii	milupa pku 3 shake pomara czowy, proszek,	20 sasz.a 30g (600g)	5909990639274, 4008976340324	2012-01-01	2 lata	216.7, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawieraj ca dodatkowe składniki energetyczne (tłuszcze i w glowodany), porcjowane - przeznaczona dla pacjentów powy ej 15 r. .	409,46	457,38	457,38	Fenyloketonuria		ryczałt	3,20
41	Dieta eliminacyjna z MCT	Bebilon pepti MCT, proszek do sporz dzania roztworu doustnego, 2155 kJ/100 g	450 g	5909990713912, 8718117600625	2012-01-01	2 lata	217.4, Diety eliminacyjne z MCT	26,10	33,30	27,16	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	14,29
42	Dieta eliminacyjna z MCT	Humana z MCT, proszek,	350 g	5909990306718, 4031244774125	2012-01-01	2 lata	217.4, Diety eliminacyjne z MCT	13,80	19,06	19,06	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		30%	5,72
43	Dieta eliminacyjna z MCT	Milupa cystilac, proszek,	900 g	5909990223299, 4008976340348	2012-01-01	2 lata	217.5, Dieta stosowana w mukowiscydozie	128,73	151,77	151,77	Mukowiscydoza		ryczałt	3,20

A 3. Wyroby medyczne dostępnym w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Rodzaj wyrobu	Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją	Poziomota odpłatności	Wysokość dopłaty wliczenia -biorecy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-	Keto-Diastix, test paskowy,	50 pasków	5016003288302	2012-01-01	2 lata	219.1, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu	12,74	17,70	17,70	Cukrzyca		30%	5,31
2	-	strzykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji,	100 szt.	382900932033	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	21,60	28,83	28,83	Cukrzyca		30%	8,65
3	-	strzykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji,	10 szt.	382900931012	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	2,16	3,21	3,21	Cukrzyca		30%	0,96
4	-	strzykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji,	100 szt.	382900931036	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	21,60	28,83	28,83	Cukrzyca		30%	8,65
5	-	strzykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji,	10 szt.	382900911014	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	2,16	3,21	3,21	Cukrzyca		30%	0,96
6	-	strzykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji,	100 szt.	382900911038	2012-01-01	2 lata	221.0, Strzykawki insulinowe	21,60	28,83	28,83	Cukrzyca		30%	8,65
7	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Aquacel - opatrunek hydrofibrice, opatrunek, 5x5 cm ²	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	2,43	3,39	2,75	Przewlekłe owrzodzenia		30%	1,47
8	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Aquacel - opatrunek hydrofibrice, opatrunek, 5x5 cm ²	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	2,43	3,39	2,75	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,64
9	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Aquacel - opatrunek hydrofibrice, opatrunek, 10x10 cm ²	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	9,07	12,53	10,99	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,84
10	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Aquacel - opatrunek hydrofibrice, opatrunek, 10x10 cm ²	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	9,07	12,53	10,99	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,54
11	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Aquacel - opatrunek hydrofibrice, opatrunek, 15x15 cm ²	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	18,90	25,16	24,73	Przewlekłe owrzodzenia		30%	7,85
12	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Aquacel - opatrunek hydrofibrice, opatrunek, 15x15 cm ²	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	18,90	25,16	24,73	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,43
13	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylne, 7,5x12 cm ²	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	6,48	9,55	9,55	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,87
14	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylne, 7,5x12 cm ²	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	6,48	9,55	9,55	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
15	Emplastry alginatosa et hydrofibrice	Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylne, 10x20 cm ²	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1, Opatrunki alginianowe i hydrofibrice	15,66	21,33	21,33	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylny, 10x20 cm2	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,66	21,33	21,33	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
17	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,42	10,79	10,79	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,24
18	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,42	10,79	10,79	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
19	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x20 cm2	1 szt.	4049500217927	2012-07-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	14,80	20,42	20,42	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,13
20	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x20 cm2	1 szt.	4049500217927	2012-07-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	14,80	20,42	20,42	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
21	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x10 cm2	1 szt.	4049500217958	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,61	10,99	10,99	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,30
22	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x10 cm2	1 szt.	4049500217958	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,61	10,99	10,99	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
23	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5x5 cm2	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	3,11	4,11	2,75	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,19
24	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5x5 cm2	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	3,11	4,11	2,75	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,36
25	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013466	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	6,76	10,09	10,09	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,03
26	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013466	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	6,76	10,09	10,09	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
27	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,17	20,81	20,81	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,24
28	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,17	20,81	20,81	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
29	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	2,31	3,26	2,75	Przewlekłe owrzodzenia		30%	1,34
30	Emplastris alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	2,31	3,26	2,75	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,51
31	Emplastris antimicrobiotica	Acticoat Flex 3 10cm x 10cm, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm pokryty nanokrystalicznym srebrem, 100 cm2	1 szt.	0040565124810	2013-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,50	18,68	7,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,25
32	Emplastris antimicrobiotica	Acticoat Flex 3 10cm x 10cm, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm pokryty nanokrystalicznym srebrem, 100 cm2	1 szt.	0040565124810	2013-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,50	18,68	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,92
33	Emplastris antimicrobiotica	Acticoat Flex 3 10cm x 20cm, opatrunek o rozmiarach 10cm x 20cm pokryty nanokrystalicznym srebrem, 200 cm2	1 szt.	0040565124858	2013-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	31,00	36,70	15,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	25,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Emplastry antimicrobiotyczne	Acticoat Flex 3 10cm x 20cm, opatrunek o rozmiarach 10cm x 20cm pokryty nanokrystalicznym srebrem, 200 cm2	1 szt.	0040565124858	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	31,00	36,70	15,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	21,19
35	Emplastry antimicrobiotyczne	Acticoat Flex 3 20cm x 40cm, opatrunek o rozmiarach 20cm x 40cm pokryty nanokrystalicznym srebrem, 800 cm2	1 szt.	0040565124872	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	123,98	140,60	62,04	Przewlekłe owrzodzenia		30%	97,17
36	Emplastry antimicrobiotyczne	Acticoat Flex 3 20cm x 40cm, opatrunek o rozmiarach 20cm x 40cm pokryty nanokrystalicznym srebrem, 800 cm2	1 szt.	0040565124872	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	123,98	140,60	62,04	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	78,56
37	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 56,25 cm2	1 szt.	5000223461621	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	8,64	10,47	4,36	Przewlekłe owrzodzenia		30%	7,42
38	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 56,25 cm2	1 szt.	5000223461621	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	8,64	10,47	4,36	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	6,11
39	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10cm x 10cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 100 cm2	1 szt.	5000223461652	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,12	18,28	7,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	12,85
40	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10cm x 10cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 100 cm2	1 szt.	5000223461652	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,12	18,28	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,52
41	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 156,25 cm2	1 szt.	5000223461683	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	24,21	28,90	12,12	Przewlekłe owrzodzenia		30%	20,42
42	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 156,25 cm2	1 szt.	5000223461683	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	24,21	28,90	12,12	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	16,78
43	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Heel, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10,5 cm x 13,5 cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 141,75 cm2	1 szt.	5000223461928	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	30,99	35,84	10,99	Przewlekłe owrzodzenia		30%	28,15
44	Emplastry antimicrobiotyczne	Allelyn Ag Heel, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10,5 cm x 13,5 cm zawieraj ca sulfadiazyn srebra, 141,75 cm2	1 szt.	5000223461928	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	30,99	35,84	10,99	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	24,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm zawieraj cy sulfadiazyn srebra, 100 cm2	1 szt.	5000223461775	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	15,50	18,68	7,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,25
46	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm zawieraj cy sulfadiazyn srebra, 100 cm2	1 szt.	5000223461775	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	15,50	18,68	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,92
47	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 15cm x 15cm zawieraj cy sulfadiazyn srebra, 225 cm2	1 szt.	5000223461805	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	34,86	41,07	17,45	Przewlekłe owrzodzenia		30%	28,86
48	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 15cm x 15cm zawieraj cy sulfadiazyn srebra, 225 cm2	1 szt.	5000223461805	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	34,86	41,07	17,45	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	23,62
49	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 20cm x 20cm zawieraj cy sulfadiazyn srebra, 400 cm2	1 szt.	5000223461836	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	58,32	67,82	31,02	Przewlekłe owrzodzenia		30%	46,11
50	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 20cm x 20cm zawieraj cy sulfadiazyn srebra, 400 cm2	1 szt.	5000223461836	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	58,32	67,82	31,02	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	36,80
51	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolic krzy ow o rozmiarze 17cm x 17cm zawieraj ca sulfadiazyn , 289 cm2	1 szt.	5000223461867	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	34,83	41,80	22,41	Przewlekłe owrzodzenia		30%	26,11
52	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolic krzy ow o rozmiarze 17cm x 17cm zawieraj ca sulfadiazyn , 289 cm2	1 szt.	5000223461867	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	34,83	41,80	22,41	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	19,39
53	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolic krzy ow o rozmiarze 22cm x 22cm zawieraj ca sulfadiazyn , 484 cm2	1 szt.	5000223461898	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	59,13	69,42	37,53	Przewlekłe owrzodzenia		30%	43,15
54	Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolic krzy ow o rozmiarze 22cm x 22cm zawieraj ca sulfadiazyn , 484 cm2	1 szt.	5000223461898	2013-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	59,13	69,42	37,53	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	31,89
55	Emplastry antimicrobiotyczne	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm2	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	17,50	23,60	21,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm2	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	17,50	23,60	21,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,09
57	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm2	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	37,66	48,40	48,40	Przewlekle owrzodzenia		30%	14,52
58	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm2	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	37,66	48,40	48,40	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
59	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm2	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	102,06	122,01	122,01	Przewlekle owrzodzenia		30%	36,60
60	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm2	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	102,06	122,01	122,01	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
61	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2x45 cm2	1 szt.	768455106738	2012-07-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	15,01	20,60	19,36	Przewlekle owrzodzenia		30%	7,05
62	Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, plytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2x45 cm2	1 szt.	768455106738	2012-07-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra pochłaniaj ce i zatrzymuj ce wysi k z rany	15,01	20,60	19,36	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,24
63	Emplastry antimicrobiotica	Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500586412	2012-07-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	4,00	4,83	1,94	Przewlekle owrzodzenia		30%	3,47
64	Emplastry antimicrobiotica	Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500586412	2012-07-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	4,00	4,83	1,94	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,89
65	Emplastry antimicrobiotica	Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x10 cm2	1 szt.	4049500586429	2012-07-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	6,91	9,58	7,76	Przewlekle owrzodzenia		30%	4,15
66	Emplastry antimicrobiotica	Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x10 cm2	1 szt.	4049500586429	2012-07-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	6,91	9,58	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,82
67	Emplastry antimicrobiotica	Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x20 cm2	1 szt.	4049500586436	2012-07-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	11,02	15,51	15,51	Przewlekle owrzodzenia		30%	4,65
68	Emplastry antimicrobiotica	Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x20 cm2	1 szt.	4049500586436	2012-07-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierajace jony srebra	11,02	15,51	15,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag, opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm2	1 szt.	5708932481922	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany	34,88	45,46	45,46	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,64
70	Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag, opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm2	1 szt.	5708932481922	2012-01-01	2 lata	220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany	34,88	45,46	45,46	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
71	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447930350	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	19,96	7,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	14,53
72	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447930350	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	19,96	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	12,20
73	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447930381	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	35,09	15,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	24,23
74	Emplastry antimicrobiotica	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447930381	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	35,09	15,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	19,58
75	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag, opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309323	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	18,57	7,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,14
76	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag, opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309323	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	18,57	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,81
77	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag opatrunek w głowę, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, tamponada do ran gł bokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309200	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	15,14	7,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	9,71
78	Emplastry antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag opatrunek w głowę, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, tamponada do ran gł bokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309200	2012-01-01	2 lata	220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	15,14	7,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	7,38
79	Emplastry carbo activatus	Vliwaktiv opatrunek w głowę, chłonny, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447037493	2012-01-01	2 lata	220.8, Opatrunki z węgłem aktywowanym	5,40	7,94	7,94	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,38
80	Emplastry carbo activatus	Vliwaktiv opatrunek w głowę, chłonny, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447037493	2012-01-01	2 lata	220.8, Opatrunki z węgłem aktywowanym	5,40	7,94	7,94	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
81	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,11	35,87	Przewlekłe owrzodzenia		30%	14,00
82	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,11	35,87	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	71,74	71,74	Przewlekłe owrzodzenia		30%	21,52
84	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	71,74	71,74	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
85	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500737043	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	8,18	10,81	7,19	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,78
86	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500737043	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	8,18	10,81	7,19	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,62
87	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x20 cm2	1 szt.	4049500737074	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	17,82	22,56	14,38	Przewlekłe owrzodzenia		30%	12,49
88	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x20 cm2	1 szt.	4049500737074	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	17,82	22,56	14,38	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	8,18
89	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500737258	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	19,44	24,55	16,18	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,22
90	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500737258	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	19,44	24,55	16,18	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	8,37
91	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	4049500737401	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	30,24	37,82	28,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	17,69
92	Emplastry conlativi	HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	4049500737401	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	30,24	37,82	28,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	9,06
93	Emplastry conlativi	HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 12,5x12,5 cm2	1 szt.	4049500736534	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	7,99	11,52	11,24	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,65
94	Emplastry conlativi	HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 12,5x12,5 cm2	1 szt.	4049500736534	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	7,99	11,52	11,24	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,28
95	Emplastry conlativi	HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500736596	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	12,20	16,87	16,18	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,54
96	Emplastry conlativi	HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500736596	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	12,20	16,87	16,18	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,69
97	Emplastry conlativi	HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	4049500736749	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	20,52	27,51	27,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,25
98	Emplastry conlativi	HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	4049500736749	2012-05-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	20,52	27,51	27,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x20 cm	1 szt.	4049500586351	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	10,26	14,55	14,38	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,48
100	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x20 cm	1 szt.	4049500586351	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	10,26	14,55	14,38	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,17
101	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x10 cm	1 szt.	4049500587495	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	5,13	7,58	7,19	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,55
102	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x10 cm	1 szt.	4049500587495	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	5,13	7,58	7,19	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,39
103	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15x15 cm	1 szt.	4049500587501	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	11,55	16,18	16,18	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,85
104	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15x15 cm	1 szt.	4049500587501	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	11,55	16,18	16,18	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
105	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20x20 cm	1 szt.	4049500587518	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	20,52	27,51	27,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,25
106	Emplastry conlativi	PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20x20 cm	1 szt.	4049500587518	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	20,52	27,51	27,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
107	Emplastry conlativi	PermaFoam cavity, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x10 cm	1 szt.	4049500586399	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	5,13	7,58	7,19	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,55
108	Emplastry conlativi	PermaFoam cavity, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x10 cm	1 szt.	4049500586399	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	5,13	7,58	7,19	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,39
109	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x20 cm	1 szt.	4049500586344	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	10,26	14,55	14,38	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,48
110	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10x20 cm	1 szt.	4049500586344	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	10,26	14,55	14,38	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,17
111	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 11x11 cm	1 szt.	4049500587525	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	6,21	9,05	8,70	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,96
112	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 11x11 cm	1 szt.	4049500587525	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	6,21	9,05	8,70	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,35
113	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15x15 cm	1 szt.	4049500587532	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	11,55	16,18	16,18	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,85
114	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15x15 cm	1 szt.	4049500587532	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	11,55	16,18	16,18	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
115	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20x20 cm	1 szt.	4049500587549	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	20,52	27,51	27,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	Emplastry conlativi	PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20x20 cm	1 szt.	4049500587549	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	20,52	27,51	27,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
117	Emplastry conlativi	PermaFoam concave, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 16,5x18 cm	1 szt.	4049500586382	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	15,12	20,76	20,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,23
118	Emplastry conlativi	PermaFoam concave, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 16,5x18 cm	1 szt.	4049500586382	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	15,12	20,76	20,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
119	Emplastry conlativi	PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 18x18 cm2	1 szt.	4049500586368	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	16,52	22,53	22,53	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,76
120	Emplastry conlativi	PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 18x18 cm2	1 szt.	4049500586368	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	16,52	22,53	22,53	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
121	Emplastry conlativi	PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 22x22 cm2	1 szt.	4049500586375	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	24,83	32,77	32,77	Przewlekłe owrzodzenia		30%	9,83
122	Emplastry conlativi	PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 22x22 cm2	1 szt.	4049500586375	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	24,83	32,77	32,77	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
123	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	46,87	54,23	20,14	Przewlekłe owrzodzenia		30%	40,13
124	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	46,87	54,23	20,14	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	34,09
125	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	12,51	13,81	1,80	Przewlekłe owrzodzenia		30%	12,55
126	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	12,51	13,81	1,80	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	12,01
127	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 9x9 cm , opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	17,47	20,28	5,82	Przewlekłe owrzodzenia		30%	16,21
128	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 9x9 cm , opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	17,47	20,28	5,82	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	14,46
129	Emplastry conlativi	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	5,48	7,03	4,05	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Emplastry conlativi	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	5,48	7,03	4,05	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,98
131	Emplastry conlativi	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	8,18	10,81	7,19	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,78
132	Emplastry conlativi	TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	8,18	10,81	7,19	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,62
133	Emplastry conlativi	TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4049500759946	2012-03-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	4,50	6,00	4,05	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,17
134	Emplastry conlativi	TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4049500759946	2012-03-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	4,50	6,00	4,05	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,95
135	Emplastry conlativi	TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500759977	2012-03-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	6,57	9,09	7,19	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,06
136	Emplastry conlativi	TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500759977	2012-03-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	6,57	9,09	7,19	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,90
137	Emplastry conlativi	TenderWet active cavity, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500021746	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	15,12	18,16	7,19	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,13
138	Emplastry conlativi	TenderWet active cavity, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500021746	2012-07-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami	15,12	18,16	7,19	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,97
139	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 6x6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,51	6,62	2,59	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,81
140	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 6x6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,51	6,62	2,59	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	4,03
141	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,88	14,73	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	9,69
142	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,88	14,73	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	7,53
143	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,58	23,64	16,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	12,30
144	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,58	23,64	16,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	7,44
145	Emplastry hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,66	19,23	9,36	Przewlekłe owrzodzenia		30%	12,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	Emplastr hydrocolloidosa	Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,66	19,23	9,36	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	9,87
147	Emplastr hydrocolloidosa	Comfeel Podstawowy, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10 cm	1 szt.	5708932208208	2013-03-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,13	7,58	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,54
148	Emplastr hydrocolloidosa	Comfeel Podstawowy, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10 cm	1 szt.	5708932208208	2013-03-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,13	7,58	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,38
149	Emplastr hydrocolloidosa	Comfeel Podstawowy, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15 cm	1 szt.	5708932208291	2013-03-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,45	16,09	16,09	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,83
150	Emplastr hydrocolloidosa	Comfeel Podstawowy, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15 cm	1 szt.	5708932208291	2013-03-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,45	16,09	16,09	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
151	Emplastr hydrocolloidosa	Comfeel Podstawowy, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 20x20 cm	1 szt.	5708932208352	2013-03-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	20,52	27,52	27,52	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,26
152	Emplastr hydrocolloidosa	Comfeel Podstawowy, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 20x20 cm	1 szt.	5708932208352	2013-03-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	20,52	27,52	27,52	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
153	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,67	8,14	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,10
154	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,67	8,14	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,94
155	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,56	16,20	16,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,86
156	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,56	16,20	16,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
157	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	22,68	29,81	28,80	Przewlekłe owrzodzenia		30%	9,65
158	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	22,68	29,81	28,80	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,01
159	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,93	23,77	21,60	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,65
160	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,93	23,77	21,60	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,17
161	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - pasta hydrokoloidowa, pasta, 30 g	30 g	768455094950	2012-01-01	2 lata	220.11, Opatrunki w postaci pasty	10,80	15,24	15,24	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,57
162	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex - pasta hydrokoloidowa, pasta, 30 g	30 g	768455094950	2012-01-01	2 lata	220.11, Opatrunki w postaci pasty	10,80	15,24	15,24	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,72	7,28	4,05	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,45
164	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,72	7,28	4,05	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,23
165	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 10x10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,93	10,55	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,51
166	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 10x10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,93	10,55	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,35
167	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 15x15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	13,28	18,03	16,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,69
168	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 15x15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	13,28	18,03	16,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,83
169	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5x19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,19	24,71	24,71	Przewlekłe owrzodzenia		30%	7,41
170	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5x19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	18,19	24,71	24,71	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
171	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20x22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,98	25,24	25,24	Przewlekłe owrzodzenia		30%	7,57
172	Emplastr hydrocolloidosa	Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20x22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	17,98	25,24	25,24	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
173	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,45	10,03	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	7,45	10,03	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,83
175	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	19,98	25,13	16,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,79
176	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	19,98	25,13	16,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	8,93
177	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	33,80	41,60	28,80	Przewlekłe owrzodzenia		30%	21,44
178	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	33,80	41,60	28,80	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	12,80
179	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll concave, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 8x12 cm2	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,63	18,64	6,91	Przewlekłe owrzodzenia		30%	13,80
180	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll concave, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 8x12 cm2	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	15,63	18,64	6,91	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	11,73
181	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll sacral, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 12x18 cm2	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	24,08	29,37	15,55	Przewlekłe owrzodzenia		30%	18,49
182	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll sacral, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 12x18 cm2	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	24,08	29,37	15,55	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	13,82
183	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	6,75	9,29	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,25
184	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	6,75	9,29	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,09
185	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,30	16,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,96
186	Emplastr hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,30	16,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,10
187	Emplastr hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,84	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,80
188	Emplastr hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,84	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,64
189	Emplastr hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,02	15,62	15,62	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,69
190	Emplastr hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,02	15,62	15,62	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
191	Emplastr hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolic krzyżow, na sterylny, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,72	16,13	Przewlekłe owrzodzenia		30%	15,43
192	Emplastr hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolic krzyżow, na sterylny, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,72	16,13	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013268	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,43	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,39
194	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013268	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,43	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,23
195	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,54	3,60	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,02
196	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,54	3,60	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,94
197	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447914978	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,27	7,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,23
198	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447914978	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,27	7,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,07
199	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,23	16,20	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,89
200	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,23	16,20	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,03
201	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,42	28,42	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,53
202	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,42	28,42	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
203	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 6x12 cm2	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	2,62	3,56	2,67	Przewlekłe owrzodzenia		30%	1,69
204	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 6x12 cm2	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	2,62	3,56	2,67	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,89
205	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 10x12 cm2	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	3,48	5,00	4,45	Przewlekłe owrzodzenia		30%	1,89
206	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 10x12 cm2	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	3,48	5,00	4,45	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,55
207	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x12 cm2	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	3,86	5,66	5,35	Przewlekłe owrzodzenia		30%	1,92
208	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x12 cm2	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	3,86	5,66	5,35	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,31
209	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x24 cm2	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	7,40	10,69	10,69	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,21
210	Emplastry hydropolymerosa	Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x24 cm2	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	7,40	10,69	10,69	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
211	Emplastry hydropolymerosa	Intrasite Gel, sterylny, czysty amorficznie hydro el składający się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo celulozy, glikolu, 15 g	1 szt.	50223480	2013-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	9,07	13,75	13,75	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	Emplastry hydropolymerosa	Intrasite Gel, sterylne, czyste amorficznie hydro el składaj cy si ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo celulozy, glikolu, 15 g	1 szt.	50223480	2013-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	9,07	13,75	13,75	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
213	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	15,91	20,81	15,47	Przewlekłe owrzodzenia		30%	9,98
214	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	15,91	20,81	15,47	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	5,34
215	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,57	27,57	27,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,31
216	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,57	27,57	27,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,06
217	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,42	7,88	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,06
218	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,42	7,88	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,00
219	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P Plus, opatrunek polimerowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844523	2012-11-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,13	7,58	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,76
220	Emplastry hydropolymerosa	Medisorb P Plus, opatrunek polimerowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844523	2012-11-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,13	7,58	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,70
221	Emplastry hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	11,50	13,28	3,71	Przewlekłe owrzodzenia		30%	10,68
222	Emplastry hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	11,50	13,28	3,71	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	9,57
223	Emplastry hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylne, 20x20cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	32,78	38,43	14,85	Przewlekłe owrzodzenia		30%	28,04
224	Emplastry hydropolymerosa	Suprasorb G , opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylne, 20x20cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydro elowe	32,78	38,43	14,85	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	23,58
225	Emplastry hydropolymerosa	Suprasorb G , el amorficzny w strzykawce, sterylne, 20g, opatrunek, 20 g	1 strzyk.a 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	16,20	22,18	22,18	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,65
226	Emplastry hydropolymerosa	Suprasorb G , el amorficzny w strzykawce, sterylne, 20g, opatrunek, 20 g	1 strzyk.a 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	16,20	22,18	22,18	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
227	Emplastry microfibrillum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 12,5x12,5 cm2	1 szt.	768455123711	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	23,63	31,21	29,23	Przewlekłe owrzodzenia		30%	10,75
228	Emplastry microfibrillum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 12,5x12,5 cm2	1 szt.	768455123711	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	23,63	31,21	29,23	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,98
229	Emplastry microfibrillum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 17,5x17,5 cm2	1 szt.	768455123728	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	46,31	58,38	57,30	Przewlekłe owrzodzenia		30%	18,27
230	Emplastry microfibrillum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 17,5x17,5 cm2	1 szt.	768455123728	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	46,31	58,38	57,30	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 21x21 cm2	1 szt.	768455123735	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	66,68	82,08	82,08	Przewlekłe owrzodzenia		30%	24,62
232	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 21x21 cm2	1 szt.	768455123735	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	66,68	82,08	82,08	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
233	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 25x30 cm2	1 szt.	768455123742	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	113,40	134,57	134,57	Przewlekłe owrzodzenia		30%	40,37
234	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 25x30 cm2	1 szt.	768455123742	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	113,40	134,57	134,57	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
235	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 14x19,8 cm2	1 szt.	768455123759	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	41,91	53,26	51,86	Przewlekłe owrzodzenia		30%	16,96
236	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 14x19,8 cm2	1 szt.	768455123759	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	41,91	53,26	51,86	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,40
237	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 16,9x20 cm2	1 szt.	768455123766	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	51,11	63,97	63,24	Przewlekłe owrzodzenia		30%	19,70
238	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 16,9x20 cm2	1 szt.	768455123766	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	51,11	63,97	63,24	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,73
239	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 10x10 cm2	1 szt.	768455123834	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	15,12	20,66	18,71	Przewlekłe owrzodzenia		30%	7,56
240	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 10x10 cm2	1 szt.	768455123834	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	15,12	20,66	18,71	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,95
241	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 15x15 cm2	1 szt.	768455123841	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	34,02	43,84	42,10	Przewlekłe owrzodzenia		30%	14,37
242	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 15x15 cm2	1 szt.	768455123841	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	34,02	43,84	42,10	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,74
243	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 20x20 cm2	1 szt.	768455123858	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	60,48	74,87	74,84	Przewlekłe owrzodzenia		30%	22,48
244	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 20x20 cm2	1 szt.	768455123858	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	60,48	74,87	74,84	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,03
245	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 15x20 cm2	1 szt.	768455123865	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	45,36	57,28	56,13	Przewlekłe owrzodzenia		30%	17,99
246	Emplastri microfibrificum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 15x20 cm2	1 szt.	768455123865	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujace poziom wilgotno ci rany	45,36	57,28	56,13	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofibr, 10x10 cm2	1 szt.	768455127115	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	15,12	20,66	18,71	Przewlekłe owrzodzenia		30%	7,56
248	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofibr, 10x10 cm2	1 szt.	768455127115	2013-05-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	15,12	20,66	18,71	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,95
249	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Mepilex Transfer, opatrunek jałowy, 15x20 cm2	1 szt.	7332430008800	2012-11-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	44,28	56,13	56,13	Przewlekłe owrzodzenia		30%	16,84
250	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Mepilex Transfer, opatrunek jałowy, 15x20 cm2	1 szt.	7332430008800	2012-11-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	44,28	56,13	56,13	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
251	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Mepitel, opatrunek jałowy, 7,5x10 cm2	1 szt.	7310792907108	2012-11-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	10,78	15,27	14,03	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,45
252	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Mepitel, opatrunek jałowy, 7,5x10 cm2	1 szt.	7310792907108	2012-11-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	10,78	15,27	14,03	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,24
253	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 14x20cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	42,98	54,45	52,39	Przewlekłe owrzodzenia		30%	17,78
254	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 14x20cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	42,98	54,45	52,39	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,06
255	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatrunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	17,12	20,62	7,86	Przewlekłe owrzodzenia		30%	15,12
256	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatrunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	17,12	20,62	7,86	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	12,76
257	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	16,36	21,38	15,16	Przewlekłe owrzodzenia		30%	10,77
258	Emplastrum microfibrillum cellulosa	Suprasorb X , z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany	16,36	21,38	15,16	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	6,22
259	Emplastrum poliurethanum spumantum	Allevyn Heel, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10,5cm x 13,5cm kształt przystosowany do założenia na piętę, 141,75 cm2	1 szt.	5000223426705	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,23	13,66	9,75	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,84
260	Emplastrum poliurethanum spumantum	Allevyn Heel, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10,5cm x 13,5cm kształt przystosowany do założenia na piętę, 141,75 cm2	1 szt.	5000223426705	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,23	13,66	9,75	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,91
261	Emplastrum poliurethanum spumantum	Allevyn Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 22cm x 22cm, 484 cm2	1 szt.	5000223426736	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,81	38,05	33,29	Przewlekłe owrzodzenia		30%	14,75
262	Emplastrum poliurethanum spumantum	Allevyn Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 22cm x 22cm, 484 cm2	1 szt.	5000223426736	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,81	38,05	33,29	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
263	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2	1 szt.	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,58	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,76
264	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2	1 szt.	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,58	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	6,70
265	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm2	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	38,95	27,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	19,69
266	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm2	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	38,95	27,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	11,44
267	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5x5 cm2	1 szt.	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,29	1,72	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,09
268	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5x5 cm2	1 szt.	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,29	1,72	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	5,57
269	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm2	1 szt.	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	28,86	13,76	Przewlekłe owrzodzenia		30%	19,23
270	Emplastry polyurethanum spumatum	Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm2	1 szt.	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	28,86	13,76	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	15,10
271	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolic krzy ow sterylne, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,07	25,38	Przewlekłe owrzodzenia		30%	14,30
272	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolic krzy ow sterylne, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,07	25,38	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	6,69
273	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,00	15,47	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,17
274	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,00	15,47	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,53
275	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,68	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,86
276	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,68	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,80
277	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,59	3,87	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,88
278	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,59	3,87	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,72
279	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,02	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,02	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,14
281	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,68	15,47	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,85
282	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,68	15,47	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	2,21
283	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,86	3,87	Przewlekłe owrzodzenia		30%	3,15
284	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,86	3,87	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,99
285	Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one	Granugel - el hydrokoloidowy, el, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	12,42	17,30	17,30	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,19
286	Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one	Granugel - el hydrokoloidowy, el, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	12,42	17,30	17,30	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
287	Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one	Purilon Gel, opatrunek hydro elowy, 15 g	15 g	5701780645317	2012-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	23,53	29,07	17,30	Przewlekłe owrzodzenia		30%	16,96
288	Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one	Purilon Gel, opatrunek hydro elowy, 15 g	15 g	5701780645317	2012-01-01	2 lata	220.12, Opatrunki w postaci elu	23,53	29,07	17,30	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	11,77
289	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Allevyn Adhesive, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawil aj ca pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm, 156,25 cm2	1 szt.	5000223415587	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,01	11,54	10,75	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,02
290	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Allevyn Adhesive, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawil aj ca pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm, 156,25 cm2	1 szt.	5000223415587	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,01	11,54	10,75	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,79
291	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Allevyn Adhesive, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawil aj ca pianka poliuretanowa o rozmiarze 17,5cm x 17,5cm, 306,25 cm2	1 szt.	5000223415594	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	15,70	21,47	21,06	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,73
292	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Allevyn Adhesive, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawil aj ca pianka poliuretanowa o rozmiarze 17,5cm x 17,5cm, 306,25 cm2	1 szt.	5000223415594	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	15,70	21,47	21,06	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,41
293	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Allevyn Adhesive, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawil aj ca pianka poliuretanowa o rozmiarze 22,5cm x 22,5cm, 506,25 cm2	1 szt.	5000223416799	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,96	34,15	34,15	Przewlekłe owrzodzenia		30%	10,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
294	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Allevyn Adhesive, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawil aj ca pianka poliuretanowa o rozmiarze 22,5cm x 22,5cm, 506,25 cm2	1 szt.	5000223416799	2013-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,96	34,15	34,15	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
295	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,28	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	2,46
296	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,28	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,40
297	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 14x14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,08	13,48	Przewlekłe owrzodzenia		30%	5,64
298	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 14x14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,08	13,48	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	1,60
299	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	6,95	3,87	Przewlekłe owrzodzenia		30%	4,24
300	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	6,95	3,87	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,08
301	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,86	8,32	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,04
302	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,86	8,32	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	3,54
303	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 15x15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,12	15,47	Przewlekłe owrzodzenia		30%	10,29
304	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 15x15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,12	15,47	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	5,65
305	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 20x20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,51	27,51	Przewlekłe owrzodzenia		30%	8,25
306	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 20x20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,51	27,51	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	0,00
307	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 10x10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,29	6,88	Przewlekłe owrzodzenia		30%	6,47
308	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 10x10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,29	6,88	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	4,41
309	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 14x14 cm2	1 szt.	768455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,80	13,48	Przewlekłe owrzodzenia		30%	11,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
310	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 14x14 cm2	1 szt.	768455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,80	13,48	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	7,32
311	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 22x22 cm2	1 szt.	768455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	47,66	33,29	Przewlekłe owrzodzenia		30%	24,36
312	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 22x22 cm2	1 szt.	768455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	47,66	33,29	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	14,37
313	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 18,5x20,5 cm2	1 szt.	768455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,50	26,08	Przewlekłe owrzodzenia		30%	18,24
314	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 18,5x20,5 cm2	1 szt.	768455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,50	26,08	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	10,42
315	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 21x25 cm2	1 szt.	768455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,00	36,11	Przewlekłe owrzodzenia		30%	22,72
316	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 21x25 cm2	1 szt.	768455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,00	36,11	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	11,89
317	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 19x19 cm2	1 szt.	768455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	43,96	24,83	Przewlekłe owrzodzenia		30%	26,58
318	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 19x19 cm2	1 szt.	768455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	43,96	24,83	Epidermolysis bullosa		bezpłatny	19,13
319	glukoza we krwi	Abra, test paskowy,	50 pasków	5907581253625	2012-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca		30%	11,91
320	glukoza we krwi	Abra, test paskowy,	50 pasków	5907581253625	2012-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
321	glukoza we krwi	Accu-Chek Active, test paskowy,	50 pasków	4015630056316	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,39	41,98	41,98	Cukrzyca		30%	12,59
322	glukoza we krwi	Accu-Chek Active, test paskowy,	50 pasków	4015630056316	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,39	41,98	41,98	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
323	glukoza we krwi	Accu-Chek Go, test paskowy,	50 pasków	4015630056576	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,39	41,98	41,98	Cukrzyca		30%	12,59
324	glukoza we krwi	Accu-Chek Go, test paskowy,	50 pasków	4015630056576	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,39	41,98	41,98	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
325	glukoza we krwi	Accu-Chek Performa, test paskowy,	50 pasków	4015630980987	2012-09-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca		30%	11,91
326	glukoza we krwi	Accu-Chek Performa, test paskowy,	50 pasków	4015630980987	2012-09-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
327	glukoza we krwi	Ascensia Entrust paski testowe, test paskowy,	50 pasków	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,62	42,23	41,98	Cukrzyca		30%	12,84
328	glukoza we krwi	Ascensia Entrust paski testowe, test paskowy,	50 pasków	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,62	42,23	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,45
329	glukoza we krwi	BTM SuperCheck 1 paski testowe, test paskowy,	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	4719932588185	2012-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca		30%	11,91
330	glukoza we krwi	BTM SuperCheck 1 paski testowe, test paskowy,	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	4719932588185	2012-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
331	glukoza we krwi	CareSens N , test paskowy,	50 pasków	8809126640358	2012-05-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,78	40,28	40,28	Cukrzyca		30%	12,08
332	glukoza we krwi	CareSens N , test paskowy,	50 pasków	8809126640358	2012-05-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,78	40,28	40,28	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
333	glukoza we krwi	Contour Link paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne,	100 pasków	5016003707100	2013-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	64,78	80,03	80,03	Cukrzyca		30%	24,01
334	glukoza we krwi	Contour Link paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne,	100 pasków	5016003707100	2013-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	64,78	80,03	80,03	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	6,40
335	glukoza we krwi	Contour Plus, paski testowe,	50 szt.	5016003763403	2013-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,35	41,94	41,94	Cukrzyca		30%	12,58
336	glukoza we krwi	Contour Plus, paski testowe,	50 szt.	5016003763403	2013-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,35	41,94	41,94	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
337	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, test paskowy,	50 pasków	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,22	42,86	41,98	Cukrzyca		30%	13,47
338	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, test paskowy,	50 pasków	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,22	42,86	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
339	glukoza we krwi	Diagnostic Gold Strip, test paskowy,	50 pasków	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,14	41,98	Cukrzyca		30%	13,75
340	glukoza we krwi	Diagnostic Gold Strip, test paskowy,	50 pasków	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,14	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,36
341	glukoza we krwi	Diagomat Strip, test paskowy,	50 pasków	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,39	41,98	41,98	Cukrzyca		30%	12,59
342	glukoza we krwi	Diagomat Strip, test paskowy,	50 pasków	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,39	41,98	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
343	glukoza we krwi	Eusure Test Paskowy, test paskowy,	50 pasków	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	41,99	41,98	Cukrzyca		30%	12,60
344	glukoza we krwi	Eusure Test Paskowy, test paskowy,	50 pasków	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	41,99	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,21
345	glukoza we krwi	Evercare, test paskowy,	50 pasków	5904378480035	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,05	42,69	41,98	Cukrzyca		30%	13,30
346	glukoza we krwi	Evercare, test paskowy,	50 pasków	5904378480035	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,05	42,69	41,98	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,91
347	glukoza we krwi	Evolution, test paskowy,	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	8809115901385	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	40,85	40,85	Cukrzyca		30%	12,26
348	glukoza we krwi	Evolution, test paskowy,	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	8809115901385	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	40,85	40,85	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
349	glukoza we krwi	GLUCOCARD Vital Test Strip, test paskowy,	50 pasków	5028939000101	2012-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca		30%	11,91
350	glukoza we krwi	GLUCOCARD Vital Test Strip, test paskowy,	50 pasków	5028939000101	2012-07-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
351	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy,	50 pasków	4987486785590	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	43,62	41,98	Cukrzyca		30%	14,23
352	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy,	50 pasków	4987486785590	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	43,62	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,84
353	glukoza we krwi	Glucocard G Sensor, test paskowy,	50 pasków	4987486777328	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	43,62	41,98	Cukrzyca		30%	14,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
354	glukoza we krwi	Glucocard G Sensor, test paskowy,	50 pasków	498748677328	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	43,62	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,84
355	glukoza we krwi	Glucocard II, test paskowy,	50 pasków	4987486775454	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,26	41,85	41,85	Cukrzyca		30%	12,56
356	glukoza we krwi	Glucocard II, test paskowy,	50 pasków	4987486775454	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,26	41,85	41,85	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
357	glukoza we krwi	Glucosense, test paskowy,	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,70	43,37	41,98	Cukrzyca		30%	13,98
358	glukoza we krwi	Glucosense, test paskowy,	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,70	43,37	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,59
359	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy,	50 pasków	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	40,85	40,85	Cukrzyca		30%	12,26
360	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy,	50 pasków	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	40,85	40,85	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
361	glukoza we krwi	NEO paski testowe do pomiaru st enia glukozy we krwi , test paskowy,	50 pasków (2 fiol. a 25 szt.)	5902768217018	2012-11-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca		30%	11,91
362	glukoza we krwi	NEO paski testowe do pomiaru st enia glukozy we krwi , test paskowy,	50 pasków (2 fiol. a 25 szt.)	5902768217018	2012-11-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	30,24	39,70	39,70	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
363	glukoza we krwi	One Touch Horizon, test paskowy,	50 pasków	4030841253507	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,94	42,57	41,98	Cukrzyca		30%	13,18
364	glukoza we krwi	One Touch Horizon, test paskowy,	50 pasków	4030841253507	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,94	42,57	41,98	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,79
365	glukoza we krwi	One Touch Select, test paskowy,	50 pasków	4030841213921	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,14	41,98	Cukrzyca		30%	13,75
366	glukoza we krwi	One Touch Select, test paskowy,	50 pasków	4030841213921	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,14	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,36
367	glukoza we krwi	Optium Omega, test paskowy,	50 pasków	5021791708888	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	41,99	41,98	Cukrzyca		30%	12,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
368	glukoza we krwi	Optium Omega, test paskowy,	50 pasków	5021791708888	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	41,99	41,98	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,21
369	glukoza we krwi	Optium Xido, test paskowy,	50 pasków	5021791707249	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,14	41,98	Cukrzyca		30%	13,75
370	glukoza we krwi	Optium Xido, test paskowy,	50 pasków	5021791707249	2012-03-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,14	41,98	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	4,36
371	glukoza we krwi	Rightest GS100, test paskowy,	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27,00	36,27	36,27	Cukrzyca		30%	10,88
372	glukoza we krwi	Rightest GS100, test paskowy,	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27,00	36,27	36,27	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
373	glukoza we krwi	Wellion Calla, test paskowy,	50 pasków	9120015780825	2012-09-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	28,19	37,53	37,53	Cukrzyca		30%	11,26
374	glukoza we krwi	Wellion Calla, test paskowy,	50 pasków	9120015780825	2012-09-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	28,19	37,53	37,53	Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	3,20
375	glukoza we krwi	iXell, test paskowy , test paskowy,	50 pasków	5908222562632	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	44,40	41,98	Cukrzyca		30%	15,01
376	glukoza we krwi	iXell, test paskowy , test paskowy,	50 pasków	5908222562632	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	44,40	41,98	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej		ryczałt	5,62

B. Leki dostępne w ramach programu lekowego

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Wysokość limitu finansowania	Oznaczenie załącznika zawierającego opis programu lekowego określający zakres refundacji	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Adalimumabum	Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg	2 amp.-strz. (+2 gaziki)	590999005055	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	1050.1, blokery TNF - adalimumab	4 155,84	4 405,19	4 405,19	B.35.; B.33.; B.36.; B.32.; B.47.	bezpłatne	0 zł
2	Adefowiri dipivoxilum	Hepsera, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990009596	2012-07-01	2 lata	1051.1, analogi nukleozydowe/nukleotydydowe inne niż lamiwudyna - adefowir	1 814,40	1 923,26	1 923,26	B.1.	bezpłatne	0 zł
3	Alglucosidasum alfa	Myozyme, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 0,05 g	1 fiol. a 20 ml	5909990623853	2012-07-01	2 lata	1052.0, Alglucosidase alfa	1 892,16	2 005,69	2 005,69	B.22.	bezpłatne	0 zł
4	Ambrisentanum	Volibris, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990643165	2013-01-01	2 lata	1103.0, Ambrisentan	8 965,08	9 502,98	9 502,98	B.31.	bezpłatne	0 zł
5	Ambrisentanum	Volibris, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990643189	2013-01-01	2 lata	1103.0, Ambrisentan	8 965,08	9 502,98	9 502,98	B.31.	bezpłatne	0 zł
6	Anagrelidum	Thromboreductin, kaps., 0,5 mg	100 kaps.	5909990670154	2012-01-01	2 lata	1053.0, anagrelidum	1 488,24	1 577,53	1 577,53	B.16.	bezpłatne	0 zł
7	Bendamustinum hydrochloridum	Levact, proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml	5 fiol. a 25 mg	5909990802210	2013-07-01	2 lata	1115.0, Bendamustyna	1 620,00	1 717,20	1 717,20	B.51.	bezpłatne	0 zł
8	Bendamustinum hydrochloridum	Levact, proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml	5 fiol. a 100 mg	5909990802234	2013-07-01	2 lata	1115.0, Bendamustyna	6 480,00	6 868,80	6 868,80	B.51.	bezpłatne	0 zł
9	Betainum anhydricum	CYSTADANE, proszek doustny, 1 g	1 but. 180 g + 3 miarki	5909990031900	2012-07-01	2 lata	1084.0, Betaine anhydrous	1 728,00	1 831,68	1 831,68	B.21.	bezpłatne	0 zł
10	Bevacizumabum	Avastin, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/4ml	1 fiol. a 4 ml	5909990010486	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacyzumab	1 387,80	1 471,07	1 471,07	B.4.; B.50.	bezpłatne	0 zł
11	Bevacizumabum	Avastin, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 400 mg/16ml	1 fiol. a 16 ml	5909990010493	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacyzumab	5 551,20	5 884,27	5 884,27	B.4.; B.50.	bezpłatne	0 zł
12	Boceprevirum	Victrelis, kaps. twarde, 200 mg	336 kaps.	5909990896325	2013-05-01	2 lata	1113.1, inhibitory proteazy - boceprewir	13 433,60	14 239,62	14 239,62	B.2.	bezpłatne	0 zł
13	Bortezomibum	Velcade, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg	1 fiol.	5909990000890	2012-09-01	2 lata	1054.0, Bortezomib	4 298,40	4 556,30	4 556,30	B.13.	bezpłatne	0 zł
14	Bortezomibum	Velcade, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 mg	1 fiol.	5909990646968	2012-09-01	2 lata	1054.0, Bortezomib	1 228,10	1 301,79	1 301,79	B.13.	bezpłatne	0 zł
15	Bosentanum	Tracleer, tabl. powł., 0,125 g	56 tabl. (blist.)	5909990213771	2012-07-01	2 lata	1056.0, Bosentan	9 828,00	10 417,68	10 417,68	B.31.	bezpłatne	0 zł
16	Capecitabinum	Xeloda, tabl. powł., 150 mg	60 tabl.	5909990893416	2012-07-01	2 lata	1006.0, Capecitabinum	267,79	283,86	283,86	B.9.	bezpłatne	0 zł
17	Capecitabinum	Xeloda, tabl. powł., 500 mg	120 tabl.	5909990893515	2012-07-01	2 lata	1006.0, Capecitabinum	1 776,33	1 882,91	1 882,91	B.9.	bezpłatne	0 zł
18	Certolizumabum pegol	Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml	2 amp.-strz.	5909990734894	2013-01-01	2 lata	1104.0, Certolizumab pegol	4 024,08	4 265,52	4 265,52	B.45.	bezpłatne	0 zł
19	Cetuximabum	Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990035922	2012-07-01	2 lata	1057.0, Cetuximab	853,20	904,39	904,39	B.4.	bezpłatne	0 zł
20	Cetuximabum	Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990035946	2012-07-01	2 lata	1057.0, Cetuximab	4 266,00	4 521,96	4 521,96	B.4.	bezpłatne	0 zł
21	Cinacalcetum	Mimpara, tabl. powł., 30 mg	28 tabl.	5909990016297	2012-07-01	2 lata	1058.0, Cinacalcet	643,68	682,30	682,30	B.39.	bezpłatne	0 zł
22	Cinacalcetum	Mimpara, tabl. powł., 60 mg	28 tabl.	5909990016341	2012-07-01	2 lata	1058.0, Cinacalcet	1 281,96	1 358,88	1 358,88	B.39.	bezpłatne	0 zł
23	Cinacalcetum	Mimpara, tabl. powł., 90 mg	28 tabl.	5909990016389	2012-07-01	2 lata	1058.0, Cinacalcet	1 924,56	2 040,03	2 040,03	B.39.	bezpłatne	0 zł
24	Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany	BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.	1 fiol. (+ rozp.)	5909990057184	2012-07-01	2 lata	1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante	675,00	715,50	715,50	B.15.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Czynnik krzepni cia IX rekombinowany	BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m.	1 fiol. (+ rozp.)	5909990057191	2012-07-01	2 lata	1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante	1 350,00	1 431,00	1 431,00	B.15.	bezpłatne	0 zł
26	Czynnik krzepni cia IX rekombinowany	BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m.	1 fiol. (+ rozp.)	5909990057207	2012-07-01	2 lata	1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante	2 700,00	2 862,00	2 862,00	B.15.	bezpłatne	0 zł
27	Czynnik krzepni cia IX rekombinowany	BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 2000 j.m.	1 fiol. (+ rozp.)	5909990057221	2012-07-01	2 lata	1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante	5 400,00	5 724,00	5 724,00	B.15.	bezpłatne	0 zł
28	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 10 mcg/0,4ml	1 amp.-strz. a 0,4 ml (b/op/blist.)	5909990007608	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	68,04	72,12	72,12	B.37.	bezpłatne	0 zł
29	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml	1 wstrz. 1 ml	5909990340330	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	3 402,00	3 606,12	3 606,08	B.37.	bezpłatne	0 zł
30	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 15 mcg/0,375ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,375 ml	5909990738755	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	102,06	108,18	108,18	B.37.	bezpłatne	0 zł
31	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 20 mcg/0,5 ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml	5909990738779	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	136,08	144,24	144,24	B.37.	bezpłatne	0 zł
32	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,3 ml	5909990738793	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	204,12	216,37	216,37	B.37.	bezpłatne	0 zł
33	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 40 mcg/0,4ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,4 ml	5909990738847	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	272,16	288,49	288,49	B.37.	bezpłatne	0 zł
34	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 50 mcg/0,5 ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml	5909990738861	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	340,20	360,61	360,61	B.37.	bezpłatne	0 zł
35	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 60 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,3 ml	5909990738885	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	408,24	432,73	432,73	B.37.	bezpłatne	0 zł
36	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 80 mcg/0,4ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,4 ml	5909990738908	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	544,32	576,98	576,97	B.37.	bezpłatne	0 zł
37	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 100 mcg/0,5 ml	1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml	5909990738939	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	680,40	721,22	721,22	B.37.	bezpłatne	0 zł
38	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml	1 amp.-strz. a 1 ml	5909990739035	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna	3 402,00	3 606,12	3 606,08	B.37.	bezpłatne	0 zł
39	Dasatynibum	Sprycel, tabl., 20 mg	60 tabl. (but.)	5909990621323	2012-01-01	2 lata	1059.0, dazatynib	5 603,88	5 940,11	5 940,11	B.14.	bezpłatne	0 zł
40	Dasatynibum	Sprycel, tabl., 50 mg	60 tabl.	5909990621354	2012-01-01	2 lata	1059.0, dazatynib	14 009,72	14 850,30	14 850,30	B.14.	bezpłatne	0 zł
41	Dasatynibum	Sprycel, tabl., 100 mg	30 tabl. (but.)	5909990671601	2012-01-01	2 lata	1059.0, dazatynib	14 009,72	14 850,30	14 850,30	B.14.	bezpłatne	0 zł
42	Dasatynibum	Sprycel, tabl., 80 mg	30 tabl. (but.)	5909990818631	2012-01-01	2 lata	1059.0, dazatynib	11 207,76	11 880,23	11 880,23	B.14.	bezpłatne	0 zł
43	Dasatynibum	Sprycel, tabl., 140 mg	30 tabl. (but.)	5909990818655	2012-01-01	2 lata	1059.0, dazatynib	19 613,61	20 790,43	20 790,42	B.14.	bezpłatne	0 zł
44	Deferazyroxum	Exjade, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg	28 tabl.	5909990613021	2013-03-01	2 lata	1112.0, Deferazyroks	1 508,97	1 599,51	1 599,51	B.49.	bezpłatne	0 zł
45	Deferazyroxum	Exjade, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500 mg	28 tabl.	5909990613045	2013-03-01	2 lata	1112.0, Deferazyroks	3 017,91	3 198,98	3 198,98	B.49.	bezpłatne	0 zł
46	Docetaxelum	Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 1 ml	5909990810987	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	228,42	242,13	242,13	B.6.	bezpłatne	0 zł
47	Docetaxelum	Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 4 ml	5909990810994	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	857,84	909,31	909,31	B.6.	bezpłatne	0 zł
48	Docetaxelum	Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 7 ml	5909990811007	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	2 247,70	2 382,56	2 382,56	B.6.	bezpłatne	0 zł
49	Docetaxelum	Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg	1 fiol. a 2 ml	5909990777006	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	246,02	260,78	260,78	B.6.	bezpłatne	0 zł
50	Docetaxelum	Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg	1 fiol. a 8 ml	5909990777020	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	997,27	1 057,11	1 057,11	B.6.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Docetaxelum	Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 160 mg	1 fiol. a 16 ml	5909990850280	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	1 053,97	1 117,21	1 117,21	B.6.	bezpłatne	0 zł
52	Docetaxelum	Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. a 2 ml	5909990786466	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	64,80	68,69	68,69	B.6.	bezpłatne	0 zł
53	Docetaxelum	Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. á 8 ml	5909990786473	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	259,20	274,75	274,75	B.6.	bezpłatne	0 zł
54	Docetaxelum	Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. á 16 ml	5909990786480	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	486,00	515,16	515,16	B.6.	bezpłatne	0 zł
55	Docetaxelum	Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml	1 fiol. 0,5 ml + 1 fiol. rozp. 1,5 ml	5909990744688	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	70,92	75,18	75,18	B.6.	bezpłatne	0 zł
56	Docetaxelum	Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml	1 fiol. a 2 ml +1fiol. rozp. a 6 ml	5909990744695	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	283,69	300,71	300,71	B.6.	bezpłatne	0 zł
57	Entekawirum	Baraclude, tabl., 0,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990619177	2012-07-01	2 lata	1051.2, analogi nuklezydowe/nukleotydydowe inne ni lamiwudyna - entekawir	1 674,00	1 774,44	887,22	B.1.	bezpłatne	0 zł
58	Entekawirum	Baraclude, tabl., 1 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990619191	2012-07-01	2 lata	1051.2, analogi nuklezydowe/nukleotydydowe inne ni lamiwudyna - entekawir	1 674,00	1 774,44	1 774,44	B.1.	bezpłatne	0 zł
59	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 1000 j.m./0,5 ml	6 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990654062	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	86,40	91,58	91,58	B.37.	bezpłatne	0 zł
60	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 2000 j.m./ml	6 amp.-strz. a 1 ml	5909990654086	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	172,80	183,17	183,17	B.37.	bezpłatne	0 zł
61	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 3000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990654109	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	259,20	274,75	274,75	B.37.	bezpłatne	0 zł
62	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 4000 j.m./0,4 ml	6 amp.-strz. a 0,4 ml	5909990654123	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	345,60	366,34	366,34	B.37.	bezpłatne	0 zł
63	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 5000 j.m./0,5 ml	6 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990654147	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	432,00	457,92	457,92	B.37.	bezpłatne	0 zł
64	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 6000 j.m./0,6 ml	6 amp.-strz. a 0,6 ml	5909990654161	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	518,40	549,50	549,50	B.37.	bezpłatne	0 zł
65	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 8000 j.m./0,8 ml	6 amp.-strz. a 0,8 ml	5909990654185	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	691,20	732,67	732,67	B.37.	bezpłatne	0 zł
66	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 10000 j.m./1 ml	6 amp.-strz. a 1 ml	5909990654208	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	864,00	915,84	915,84	B.37.	bezpłatne	0 zł
67	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 1000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072378	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	172,80	183,17	91,58	B.37.	bezpłatne	0 zł
68	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 2000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072392	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	345,60	366,34	183,17	B.37.	bezpłatne	0 zł
69	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 3000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072439	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	518,40	549,50	274,75	B.37.	bezpłatne	0 zł
70	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 4000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072453	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	691,20	732,67	366,34	B.37.	bezpłatne	0 zł
71	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072477	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	864,00	915,84	457,92	B.37.	bezpłatne	0 zł
72	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 6000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072491	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 036,80	1 099,01	549,50	B.37.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 8000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072538	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 382,40	1 465,34	732,67	B.37.	bezpłatne	0 zł
74	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072552	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 728,00	1 831,68	915,84	B.37.	bezpłatne	0 zł
75	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 40000 j.m./ml	6 amp-strz. a 1 ml	5909990845170	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	6 912,00	7 326,72	3 663,36	B.37.	bezpłatne	0 zł
76	Epoetinum alfa	Eporex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 2000 j.m./ml	6 amp.-strz a 0,5 ml	5909990670956	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	183,12	194,11	91,58	B.37.	bezpłatne	0 zł
77	Epoetinum alfa	Eporex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 4000 j.m./ml	6 amp.-strz a 0,5 ml	5909990670963	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	366,25	388,23	183,17	B.37.	bezpłatne	0 zł
78	Epoetinum alfa	Eporex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml	6 amp.-strz 0,3 ml	5909990670970	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	549,37	582,33	274,75	B.37.	bezpłatne	0 zł
79	Epoetinum alfa	Eporex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml	6 amp.-strz a 0,4 ml	5909990670987	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	732,50	776,45	366,34	B.37.	bezpłatne	0 zł
80	Epoetinum alfa	Eporex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml	6 amp.-strz a 1 ml	5909990671045	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 831,25	1 941,13	915,84	B.37.	bezpłatne	0 zł
81	Erlotinib	Tarceva, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. powl.	5909990334261	2013-03-01	2 lata	1085.0, Erlotinib	2 231,83	2 365,74	2 365,74	B.6.	bezpłatne	0 zł
82	Erlotinib	Tarceva, tabl. powl., 100 mg	30 tabl. powl.	5909990334278	2013-03-01	2 lata	1085.0, Erlotinib	7 752,66	8 217,82	8 217,82	B.6.	bezpłatne	0 zł
83	Erlotinib	Tarceva, tabl. powl., 150 mg	30 tabl. powl.	5909990334285	2013-03-01	2 lata	1085.0, Erlotinib	9 063,00	9 606,78	9 606,78	B.6.	bezpłatne	0 zł
84	Etanerceptum	Enbrel, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 25 mg	4 amp.-strz. (+8gazik.z alkoh.)	5909990618217	2012-07-01	2 lata	1050.2, blokery TNF - etanercept	1 998,00	2 117,88	2 117,88	B.35.; B.33.; B.36.	bezpłatne	0 zł
85	Etanerceptum	Enbrel, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg	4 amp.-strz. (+8gazik.z alkoh.)	5909990618255	2012-07-01	2 lata	1050.2, blokery TNF - etanercept	3 996,00	4 235,76	4 235,76	B.35.; B.33.; B.36.	bezpłatne	0 zł
86	Etanerceptum	Enbrel, roztwór do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, 50 mg	4 wstrz. (+8gazik.z alkoh.)	5909990712755	2012-07-01	2 lata	1050.2, blokery TNF - etanercept	3 996,00	4 235,76	4 235,76	B.35.; B.33.; B.36.	bezpłatne	0 zł
87	Etanerceptum	Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 25 (25mg/ml)	4 fiol. + 4 amp.-strz.+ 4 igły + 4 nasadki na fiol. + 8 gazików	5909990777938	2012-09-01/2013-05-01	2 lata	1050.2, blokery TNF - etanercept	1 998,00	2 117,88	2 117,88	B.35.; B.33.; B.36.	bezpłatne	0 zł
88	Etanerceptum	Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa do stosowania u dzieci, 10 mg/ml	4 fiol. (+4amp.-strz.+akces.)	5909990880881	2012-09-01	2 lata	1050.2, blokery TNF - etanercept	799,20	847,15	847,15	B.33.	bezpłatne	0 zł
89	Everolimusum	Afinitor, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990711567	2012-07-01	2 lata	1086.0, Ewerolimus	12 088,44	12 813,75	8 564,37	B.10.	bezpłatne	0 zł
90	Everolimusum	Afinitor, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990711598	2012-07-01	2 lata	1086.0, Ewerolimus	16 159,18	17 128,73	17 128,73	B.10.	bezpłatne	0 zł
91	Factor IX coagulationis humanus	Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 1200 j.m.	1 zest.	5909990930500	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	3 740,27	3 964,69	2 017,14	B.15.	bezpłatne	0 zł
92	Factor IX coagulationis humanus	Berinin P 300, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 300 j.m.	1 zest.	5909990930579	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	994,57	1 054,24	504,29	B.15.	bezpłatne	0 zł
93	Factor IX coagulationis humanus	Berinin P 600, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 600 j.m.	1 zest.	5909990930562	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	1 514,46	1 605,33	1 008,57	B.15.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	Factor IX coagulationis humanus	Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1200 j.m.	1 zest.	5909990645220	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	1 902,96	2 017,14	2 017,14	B.15.	bezpłatne	0 zł
95	Factor IX coagulationis humanus	Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 600 j.m.	1 zest.	5909990643110	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	951,48	1 008,57	1 008,57	B.15.	bezpłatne	0 zł
96	Factor IX coagulationis humanus	Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 100 j.m./ml	1 fiol. a 5 ml	5909990623549	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	1 444,42	1 531,09	840,48	B.15.	bezpłatne	0 zł
97	Factor IX coagulationis humanus	Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 100 j.m./ml	1 fiol. a 10ml	5909990623563	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	2 759,23	2 924,78	1 680,95	B.15.	bezpłatne	0 zł
98	Factor IX coagulationis humanus	Octanine F 1000 IU, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m.	1 amp.	5909990799374	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	2 106,00	2 232,36	1 680,95	B.15.	bezpłatne	0 zł
99	Factor IX coagulationis humanus	Octanine F 500 IU, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m.	1 amp.	5909990799367	2012-07-01	2 lata	1091.2, Factor IX coagulationis humanus	1 053,00	1 116,18	840,48	B.15.	bezpłatne	0 zł
100	Factor VIII coagulationis humanus	Beriate P 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 1000 j.m.	1 fiol.liof. (+ rozp.)	5909990928057	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	2 701,08	2 863,14	1 508,85	B.15.	bezpłatne	0 zł
101	Factor VIII coagulationis humanus	Beriate P 250, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 250 j.m.	1 fiol.liof. (+ rozp.)	5909990928033	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	702,59	744,75	377,21	B.15.	bezpłatne	0 zł
102	Factor VIII coagulationis humanus	Beriate P 500, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 500 j.m.	1 fiol.liof. (+ rozp.)	5909990928040	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	1 233,53	1 307,54	754,43	B.15.	bezpłatne	0 zł
103	Factor VIII coagulationis humanus	Immunate Baxter 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m./fiol.	1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+ 1zest.)	5909990573615	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	1 423,44	1 508,85	1 508,85	B.15.	bezpłatne	0 zł
104	Factor VIII coagulationis humanus	Immunate Baxter 250, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m./fiol.	1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+ 1zest.)	5909990573554	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	355,86	377,21	377,21	B.15.	bezpłatne	0 zł
105	Factor VIII coagulationis humanus	Immunate Baxter 500, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m.	1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+ 1zest.)	5909990573561	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	711,72	754,42	754,42	B.15.	bezpłatne	0 zł
106	Factor VIII coagulationis humanus	Octanate 1 000 IU, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m.	1 amp.	5909990825349	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	2 138,40	2 266,70	1 508,85	B.15.	bezpłatne	0 zł
107	Factor VIII coagulationis humanus	Octanate 250 IU, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m.	1 amp.	5909990825301	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	534,60	566,68	377,21	B.15.	bezpłatne	0 zł
108	Factor VIII coagulationis humanus	Octanate 500 IU, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m.	1 amp.	5909990825332	2012-07-01	2 lata	1090.2, Factor VIII coagulationis humanus	1 069,20	1 133,35	754,43	B.15.	bezpłatne	0 zł
109	Fingolimodum	Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg	28 kaps. twardych	5909990856480	2013-01-01	2 lata	1105.0, Fingolimod	7 344,00	7 784,64	7 784,64	B.46.	bezpłatne	0 zł
110	Galsulfaseum	NAGLAZYME , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990614745	2012-07-01	2 lata	1060.0, Galsulfase	7 001,64	7 421,74	7 421,74	B.26.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Gefitynibum	Iressa, tabl. powł., 250 mg	30 tabl.	5909990717231	2012-07-01	2 lata	1087.0, Gefitynibum	9 612,00	10 188,72	10 188,72	B.6.	bezpłatne	0 zł
112	Glatirameri acetat	Copaxone, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml	28 amp.-strz. (4 blist. a 7 amp.-strz. a 1 ml)	5909990017065	2012-11-01	2 lata	1061.0, Glatirameri acetat	3 780,00	4 006,80	4 006,80	B.29.	bezpłatne	0 zł
113	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 50 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990052684	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	420,50	445,73	445,73	B.37.	bezpłatne	0 zł
114	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 100 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990052707	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	841,00	891,46	891,45	B.37.	bezpłatne	0 zł
115	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 200 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990052745	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	1 682,00	1 782,92	1 782,91	B.37.	bezpłatne	0 zł
116	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 75 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990052868	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	630,75	668,60	668,59	B.37.	bezpłatne	0 zł
117	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 150 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990052875	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	1 261,49	1 337,18	1 337,18	B.37.	bezpłatne	0 zł
118	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990661008	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	252,30	267,44	267,44	B.37.	bezpłatne	0 zł
119	Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 120 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990661046	2012-07-01	2 lata	1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta	1 009,20	1 069,75	1 069,74	B.37.	bezpłatne	0 zł
120	Idursulfasum	Elapraxe, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 3 ml	5909990053742	2012-07-01	2 lata	1062.0, Idursulfase	11 340,00	12 020,40	12 020,40	B.25.	bezpłatne	0 zł
121	Iloprostum	Ventavis , roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 mcg	30 amp. a 1 ml	5909990609079	2012-07-01	2 lata	1063.0, Iloprost	1 807,13	1 915,56	1 915,56	B.31.	bezpłatne	0 zł
122	Imatinibum	Glivec, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909990001057	2012-07-01	2 lata	1064.0, Imatynib	4 488,00	4 757,28	4 757,28	B.7.; B.3.; B.14.	bezpłatne	0 zł
123	Imatinibum	Glivec, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990001071	2012-07-01	2 lata	1064.0, Imatynib	8 976,00	9 514,56	9 514,56	B.7.; B.3.; B.14.	bezpłatne	0 zł
124	Imiglucerasum	Cerezyme, proszek do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 400 j.m.	1 fiol.s.subs.	5909990943012	2012-07-01	2 lata	1065.0, Imiglucerasum	7 236,00	7 670,16	7 670,16	B.23.	bezpłatne	0 zł
125	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA, roztwór do infuzji, 50 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990741038	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 004,40	1 064,66	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
126	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990797868	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	972,00	1 030,32	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
127	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml	1 fiol. a 200 ml	5909990797875	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 944,00	2 060,64	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
128	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml	1 fiol. a 400 ml	5909990797882	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	4 017,60	4 258,66	3 434,40	B.17.	bezpłatne	0 zł
129	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990797899	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	486,00	515,16	429,30	B.17.	bezpłatne	0 zł
130	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990836055	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	2 008,80	2 129,33	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
131	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 200 ml	5909990836062	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	4 017,60	4 258,66	3 434,40	B.17.	bezpłatne	0 zł
132	Immunoglobulinum humanum	FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990836079	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	972,00	1 030,32	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
133	Immunoglobulinum humanum	Hizentra, roztwór do wstrzykiwa , 0,2 g/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990869541	2012-01-01	2 lata	1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum	243,42	258,03	186,03	B.17.	bezpłatne	0 zł
134	Immunoglobulinum humanum	Hizentra, roztwór do wstrzykiwa , 0,2 g/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990869572	2012-01-01	2 lata	1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum	462,21	489,94	372,06	B.17.	bezpłatne	0 zł
135	Immunoglobulinum humanum	Hizentra, roztwór do wstrzykiwa , 0,2 g/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990869657	2012-01-01	2 lata	1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum	914,72	969,60	744,13	B.17.	bezpłatne	0 zł
136	Immunoglobulinum humanum	Kiovig, roztwór do infuzji, 1 g	1 fiol. a 10 ml	5909990425143	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	205,20	217,51	171,72	B.17.	bezpłatne	0 zł
137	Immunoglobulinum humanum	Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990425150	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	513,00	543,78	429,30	B.17.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	Immunoglobulinum humanum	Kiovig, roztwór do infuzji, 5 g	1 fl. a 50 ml	5909990425167	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 026,00	1 087,56	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
139	Immunoglobulinum humanum	Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990425174	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	2 052,00	2 175,12	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
140	Immunoglobulinum humanum	Kiovig, roztwór do infuzji, 20 g	1 fiol. a 200 ml	5909990425181	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	4 104,00	4 350,24	3 434,40	B.17.	bezpłatne	0 zł
141	Immunoglobulinum humanum	Kiovig, roztwór do infuzji, 30 g	1 fiol. a 300 ml	5909990782208	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	6 156,00	6 525,36	5 151,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
142	Immunoglobulinum humanum	Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990725786	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 063,80	1 127,63	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
143	Immunoglobulinum humanum	Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990725793	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	2 106,00	2 232,36	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
144	Immunoglobulinum humanum	Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 200 ml	5909990725809	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	4 212,00	4 464,72	3 434,40	B.17.	bezpłatne	0 zł
145	Immunoglobulinum humanum	Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990725823	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	594,00	629,64	429,30	B.17.	bezpłatne	0 zł
146	Immunoglobulinum humanum	Vivaglobin, roztwór do wstrzykiwa podskórnych, 0,16 g/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990571642	2012-01-01	2 lata	1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum	280,80	297,65	297,65	B.17.	bezpłatne	0 zł
147	Immunoglobulinum humanum normale	Gammanorm, roztwór do wstrzykiwa , 165 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990729883	2012-01-01	2 lata	1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum	442,80	469,37	306,95	B.17.	bezpłatne	0 zł
148	Immunoglobulinum humanum normale	Subcuvia, roztwór do wstrzykiwa , 0,16 g/ml	10 ml	5909990420490	2012-01-01	2 lata	1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum	367,20	389,23	297,65	B.17.	bezpłatne	0 zł
149	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do infuzji, 2,5 g	1 fiol. z prosz. + 1 rozpuszczalnik	5909990756117	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	540,00	572,40	429,30	B.17.	bezpłatne	0 zł
150	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do infuzji, 5 g	1 fiol. z prosz. + 1 rozpuszczalnik	5909990756216	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 080,00	1 144,80	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
151	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l	1 fiol. a 50 ml + zest. do infuzji	5909990049851	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	513,00	543,78	429,30	B.17.	bezpłatne	0 zł
152	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l	1 fiol. a 20 ml	5909990049868	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	205,20	217,51	171,72	B.17.	bezpłatne	0 zł
153	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l	1 fiol. a 100 ml + zest. do infuzji	5909990049875	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 026,00	1 087,56	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
154	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l	1 fiol. a 200 ml + zest. do infuzji	5909990049882	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	2 116,80	2 243,81	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
155	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam (5% 10g), roztwór do infuzji, 10 g/200ml	1 but. a 200 ml	5909990762712	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	2 592,00	2 747,52	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
156	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam (5% 2,5g), roztwór do infuzji, 2,5 g/50ml	1 but. a 50 ml	5909990762514	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	648,00	686,88	429,30	B.17.	bezpłatne	0 zł
157	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam (5% 5g), roztwór do infuzji, 5 g/100ml	100 ml	5909990762613	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 296,00	1 373,76	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
158	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam 10% (100 ml , 10g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 but. a 100 ml	5909990763887	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	2 592,00	2 747,52	1 717,20	B.17.	bezpłatne	0 zł
159	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam 10% (200ml , 20g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 but. a 200 ml	5909990763894	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	5 292,00	5 609,52	3 434,40	B.17.	bezpłatne	0 zł
160	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam 10% (20ml , 2g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 but. a 20 ml	5909990763863	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	518,40	549,50	343,44	B.17.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Octagam 10% (50ml , 5g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml	1 but. a 50 ml	5909990763870	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	1 323,00	1 402,38	858,60	B.17.	bezpłatne	0 zł
162	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Sandoglobulin P, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 3 g	1 but. (3 g)	5909990354313	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	486,00	515,16	515,16	B.17.	bezpłatne	0 zł
163	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	Sandoglobulin P, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 6 g	1 but. (6 g)	5909990354412	2012-01-01	2 lata	1066.0, Immunoglobulinum humanum	972,00	1 030,32	1 030,32	B.17.	bezpłatne	0 zł
164	Infliximabum	Remicade, proszek do sporz. dziania koncentratu do sporz. dziania roztworu do infuzji, 0,1 g	1 fiol. a 20 ml	5909990900114	2012-07-01/2013-03-01	2 lata	1050.3, blokery TNF - infliksimab	2 113,80	2 240,63	2 240,63	B.35.; B.33.; B.36.; B.32.	bezpłatne	0 zł
165	Interferonum alfa	Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 3000000 j.m.	1 amp. a 1 ml	5909990861118	2012-07-01	2 lata	1024.1, interferonum alfa	105,84	112,19	112,19	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
166	Interferonum alfa	Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 6000000 j.m./ml	1 amp. a 1 ml	5909990861217	2012-07-01	2 lata	1024.1, interferonum alfa	211,68	224,38	224,38	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
167	Interferonum alfa-2a	Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 3 mln j.m./0,5 ml	1 strzyk. a 0,5 ml (+igła)	5909990465118	2012-07-01	2 lata	1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a	50,33	53,35	53,35	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
168	Interferonum alfa-2a	Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 6 mln j.m./0,5 ml	1 strzyk. a 0,5 ml (+igła)	5909990465316	2012-07-01	2 lata	1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a	100,67	106,71	106,70	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
169	Interferonum alfa-2a	Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 9 mln j.m./0,5 ml	1 strzyk. a 0,5 ml (+igła)	5909990465415	2012-07-01	2 lata	1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a	150,99	160,05	160,05	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
170	Interferonum alfa-2b	IntronA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 25 mln j.m./2,5 ml	1 fiol. a 2,5 ml + 6 zest. (1 zest.: strzykawka + igła do wstrzykiwa + 2 waciki)	5909990004805	2012-07-01	2 lata	1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b	419,58	444,75	444,75	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
171	Interferonum alfa-2b	IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 15 mln j.m./ml	1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik)	5909990858118	2012-07-01	2 lata	1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b	302,10	320,23	320,23	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
172	Interferonum alfa-2b	IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 25 mln j.m./ml	1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik)	5909990858217	2012-07-01	2 lata	1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b	503,49	533,70	533,70	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
173	Interferonum beta-1a	Avonex, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg	4 amp.-strz. (+ 4 igły)	5909990008148	2012-07-01	2 lata	1024.41, Interferonum beta 1a a 30 mcg	2 824,20	2 993,65	2 993,65	B.29.	bezpłatne	0 zł
174	Interferonum beta-1a	Rebif 44, roztwór do wstrzykiwa , 44 mcg/0,5 ml	4 wkł. a 1,5 ml	5909990728497	2012-07-01	2 lata	1024.43, Interferonum beta 1a a 44 mcg	4 167,72	4 417,78	4 331,92	B.29.	bezpłatne	0 zł
175	Interferonum beta-1a	Rebif 44 , roztwór do wstrzykiwa , 44 mcg/0,5 ml	12 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990874934	2012-07-01	2 lata	1024.43, Interferonum beta 1a a 44 mcg	4 086,72	4 331,92	4 331,92	B.29.	bezpłatne	0 zł
176	Interferonum beta-1a	Rebif 8,8 mcg/0,1 ml; 22 mcg/0,25 ml, roztwór do wstrzykiwa podskórnych, 24 mln j.m./ml	2 wkł. a 1,5 ml	5909990728503	2012-07-01	2 lata	1024.42, Interferonum beta 1a a 22 mcg	3 528,36	3 740,06	3 740,06	B.29.	bezpłatne	0 zł
177	Interferonum beta-1a	Rebif 8,8 mcg/0,2 ml; 22 mcg/0,5 ml , roztwór do wstrzykiwa podskórnych, 8,8 mcg/(2,4 mln j.m.)/0,2 ml, 22 mcg/(6 mln j.m.)/0,5 ml mcg (j.m.)/ml	6 amp.strz.0,2 ml+6 amp.strz.0,5 ml	5909990568819	2012-07-01	2 lata	1024.42, Interferonum beta 1a a 22 mcg	3 818,88	4 048,01	4 048,01	B.29.	bezpłatne	0 zł
178	Interferonum beta-1b	Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 250 mcg/ml	15 zest.	5909990619375	2012-07-01	2 lata	1024.5, Interferonum beta 1b	3 057,48	3 240,93	3 240,93	B.29.	bezpłatne	0 zł
179	Interferonum beta-1b	Extavia, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 250 mcg/ml	15 fiol. (+15 a.-strz. rozp. a 1,2 ml)	5909990650996	2012-07-01	2 lata	1024.5, Interferonum beta 1b	2 862,00	3 033,72	3 033,72	B.29.	bezpłatne	0 zł
180	Lamivudinum	ZEFFIX, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990479610	2012-01-01/2012-09-01	2 lata	1067.0, Lamivudinum	225,70	239,24	239,24	B.1.; B.43.	bezpłatne	0 zł
181	Lapatynibum	TYVERB, tabl. powł., 250 mg	70 tabl. (blist.)	5909990084340	2012-07-01	2 lata	1068.0, Lapatynib	4 305,00	4 563,30	4 563,30	B.9.	bezpłatne	0 zł
182	Lapatynibum	TYVERB, tabl. powł., 250 mg	140 tabl.(2 blist.po 70 szt.)	5909990084357	2012-07-01	2 lata	1068.0, Lapatynib	8 610,00	9 126,60	9 126,60	B.9.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	Lapatynibum	TYVERB, tabl. powł., 250 mg	84 tabl. (blist.)	5909990763993	2012-07-01	2 lata	1068.0, Lapatynib	5 166,00	5 475,96	5 475,96	B.9.	bezpłatne	0 zł
184	Lapatynibum	TYVERB, tabl. powł., 250 mg	70 tabl.(but.)	5909990851966	2012-07-01	2 lata	1068.0, Lapatynib	4 305,00	4 563,30	4 563,30	B.9.	bezpłatne	0 zł
185	Lapatynibum	TYVERB, tabl. powł., 250 mg	140 tabl.(but.)	5909990851973	2012-07-01	2 lata	1068.0, Lapatynib	8 610,00	9 126,60	9 126,60	B.9.	bezpłatne	0 zł
186	Lapatynibum	TYVERB, tabl. powł., 250 mg	84 tabl. (but.)	5909990851980	2012-07-01	2 lata	1068.0, Lapatynib	5 166,00	5 475,96	5 475,96	B.9.	bezpłatne	0 zł
187	Laronidasum	Aldurazyme, konc.do wl.do . , 100 j.m./ml	1 fiol. a 5 ml	5909990005673	2012-07-01	2 lata	1069.0, Laronidasum	2 808,00	2 976,48	2 976,48	B.24.	bezpłatne	0 zł
188	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosfery do sporz. dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 3,75 mg	1 zest.	5909990686117	2012-07-01	2 lata	1070.1, analogi gonadoliberyny - leuprorelina	297,60	315,46	315,46	B.18.	bezpłatne	0 zł
189	Mecaserminum	INCRELEX, roztwór do wstrzykiwa , 0,01 g/ml	1 fiol. a 4 ml	5909990076024	2012-07-01	2 lata	1071.0, Mecasermine	2 538,04	2 690,32	2 690,32	B.20.	bezpłatne	0 zł
190	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (0,375 ml)	5907626701852	2013-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	20,16	21,37	21,37	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
191	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (0,5 ml)	5907626701913	2013-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	26,89	28,50	28,49	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
192	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (0,75 ml)	5907626702033	2013-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	40,33	42,75	42,74	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
193	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (1 ml)	5909990735235	2013-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	53,77	57,00	56,99	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
194	Methotrexatum	Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 20 mg/ml	1 amp.-strz. (1,25 ml)	5909990735266	2013-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	67,23	71,26	71,23	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
195	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,15 ml	5909990791255	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	53,09	56,28	21,37	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
196	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,2 ml	5909990791309	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	50,45	53,48	28,49	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
197	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990791361	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	65,55	69,48	42,74	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
198	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,4 ml	5909990791446	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	81,02	85,88	56,99	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
199	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990791491	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	90,20	95,61	71,23	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
200	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,25 ml	5909990822171	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	58,00	61,48	35,62	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
201	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,35 ml	5909990822195	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	73,29	77,69	49,86	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
202	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml	1 amp.-strz. a 0,45 ml	5909990822201	2012-07-01	2 lata	1028.1, Methotrexatum s.c.	85,55	90,68	64,11	B.34.; B.33.	bezpłatne	0 zł
203	Natalizumabum	Tysabri, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 300 mg	1 fiolka	5909990084333	2013-07-01	2 lata	1116.0, Natalizumab	6 367,80	6 749,87	6 749,87	B.46.	bezpłatne	0 zł
204	Nilotinibum	Tasigna, kaps., 200 mg	112 kaps.	5909990073535	2012-07-01	2 lata	1072.0, Nilotynib	14 672,01	15 552,33	15 552,33	B.14.	bezpłatne	0 zł
205	Octocog alfa	Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m.	1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria)	5909990224302	2012-01-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat	901,08	955,14	778,46	B.15.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	Octocog alfa	Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m.	1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria)	5909990224333	2012-01-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	1 802,15	1 910,28	1 556,92	B.15.	bezpłatne	0 zł
207	Octocog alfa	Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m.	1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria)	5909990224340	2012-07-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	3 603,96	3 820,20	3 113,84	B.15.	bezpłatne	0 zł
208	Octocog alfa	Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1500 j.m.	1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria)	5909990224357	2012-01-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	5 406,46	5 730,85	4 670,76	B.15.	bezpłatne	0 zł
209	Octocog alfa	Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 2000 j.m.	1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria)	5909990697441	2012-01-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	7 208,61	7 641,13	6 227,68	B.15.	bezpłatne	0 zł
210	Octocog alfa	Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 3000 j.m.	1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria)	5909990697458	2012-01-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	10 812,92	11 461,70	9 341,52	B.15.	bezpłatne	0 zł
211	Octocog alfa	Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m.	1 fiol. (+amp-strz.+1 cznik fiol.)	5909990020775	2012-07-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	734,40	778,46	778,46	B.15.	bezpłatne	0 zł
212	Octocog alfa	Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m.	1 fiol. (+amp-strz.+1 cznik fiol.)	5909990020782	2012-07-01	2 lata	1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinante	1 468,80	1 556,93	1 556,92	B.15.	bezpłatne	0 zł
213	Omalizumabum	Xolair, roztwór do wstrzykiwa , 75 mg	1 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990708376	2012-11-01	2 lata	1102.0, Omalizumabum	783,00	829,98	829,98	B.44.	bezpłatne	0 zł
214	Omalizumabum	Xolair, roztwór do wstrzykiwa , 150 mg	1 amp.-strzyk. 1 ml	5909990708406	2012-11-01	2 lata	1102.0, Omalizumabum	1 566,00	1 659,96	1 659,96	B.44.	bezpłatne	0 zł
215	Palivizumabum	Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg	1 fiol. 50 mg prosz. + 1 amp. 0,6 ml rozp. (100 mg/ml)	5909990815616	2013-07-01	2 lata	1073.0, Palivizumab	2 265,30	2 401,22	2 401,22	B.40.	bezpłatne	0 zł
216	Palivizumabum	Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 100 mg	1 fiol. 100 mg prosz. + 1 amp. 1 ml rozp. (100 mg/ml)	5909990815715	2013-07-01	2 lata	1073.0, Palivizumab	4 530,60	4 802,44	4 802,44	B.40.	bezpłatne	0 zł
217	Panitumumabum	Vectibix, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990646531	2012-07-01	2 lata	1096.0. Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - panitumumab	1 728,00	1 831,68	1 831,68	B.4.	bezpłatne	0 zł
218	Panitumumabum	Vectibix, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990646555	2012-07-01	2 lata	1096.0. Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - panitumumab	6 912,00	7 326,72	7 326,72	B.4.	bezpłatne	0 zł
219	Pazopanibum	Votrient, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990764877	2013-03-01	2 lata	1110.0, Pazopanib	2 980,80	3 159,65	3 159,65	B.10.	bezpłatne	0 zł
220	Pazopanibum	Votrient, tabl. powł., 200 mg	90 tabl.	5909990764884	2013-03-01	2 lata	1110.0, Pazopanib	8 942,40	9 478,94	9 478,94	B.10.	bezpłatne	0 zł
221	Pazopanibum	Votrient, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990764891	2013-03-01	2 lata	1110.0, Pazopanib	5 961,60	6 319,30	6 319,30	B.10.	bezpłatne	0 zł
222	Pazopanibum	Votrient, tabl. powł., 400 mg	60 tabl.	5909990764907	2013-03-01	2 lata	1110.0, Pazopanib	11 923,20	12 638,59	12 638,59	B.10.	bezpłatne	0 zł
223	Peginterferonum alfa-2a	Pegasys, roztwór do wstrzykiwa , 135 mcg/0,5 ml	1 wstrz. + 2 gaziki nas czone alkoholem	5909990881192	2012-07-01	2 lata	1074.1, Peginterferonum alfa 2a	664,99	704,89	643,95	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
224	Peginterferonum alfa-2a	Pegasys, roztwór do wstrzykiwa , 180 mcg/0,5 ml	1 wstrz. + 2 gaziki nas czone alkoholem	5909990881260	2012-07-01	2 lata	1074.1, Peginterferonum alfa 2a	810,00	858,60	858,60	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
225	Peginterferonum alfa-2a	Pegasys, roztwór do wstrzykiwa , 270 mcg/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml (+igła)	5909990984718	2012-07-01	2 lata	1074.1, Peginterferonum alfa 2a	664,99	704,89	643,95	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
226	Peginterferonum alfa-2a	Pegasys, roztwór do wstrzykiwa , 360 mcg/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml (+igła)	5909990984817	2012-07-01	2 lata	1074.1, Peginterferonum alfa 2a	810,00	858,60	858,60	B.2.; B.1.	bezpłatne	0 zł
227	Peginterferonum alfa-2b	PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 0,05 mg/0,5ml	1 zest. (1 wstrz.+1 igła+ 2 waciki)	5909991039110	2012-07-01	2 lata	1074.2, Peginterferonum alfa 2b	297,00	314,82	314,82	B.2.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	Peginterferonum alfa-2b	PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 0,12 mg/0,5ml	1 zest.	5909991039219	2012-07-01	2 lata	1074.2, Peginterferonum alfa 2b	712,80	755,57	755,57	B.2.	bezpłatne	0 zł
229	Peginterferonum alfa-2b	PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 0,08 mg/0,5ml	1 zest.	5909991039318	2012-07-01	2 lata	1074.2, Peginterferonum alfa 2b	475,20	503,71	503,71	B.2.	bezpłatne	0 zł
230	Peginterferonum alfa-2b	PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 0,15 mg/0,5ml	1 zest.	5909991039417	2012-07-01	2 lata	1074.2, Peginterferonum alfa 2b	891,00	944,46	944,46	B.2.	bezpłatne	0 zł
231	Peginterferonum alfa-2b	PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 0,1 mg/0,5ml	1 zest.	5909991039516	2012-07-01	2 lata	1074.2, Peginterferonum alfa 2b	594,00	629,64	629,64	B.2.	bezpłatne	0 zł
232	Pemetreksedum	Alimta 100 mg, proszek do sporz. dziania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol.s.subs.	5909990080205	2012-07-01	2 lata	1034.0, Pemetreksed	764,10	809,95	809,95	B.6.	bezpłatne	0 zł
233	Pemetreksedum	Alimta 500 mg, proszek do sporz. dziania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol.s.subs.	5909990009664	2012-07-01	2 lata	1034.0, Pemetreksed	3 822,12	4 051,45	4 049,75	B.6.	bezpłatne	0 zł
234	Ribavirinum	Copegus, tabl. powl., 400 mg	56 tabl. powl.	5909990043798	2013-05-01	2 lata	1075.0, Ribavirinum	1 261,98	1 337,70	1 337,52	B.2.	bezpłatne	0 zł
235	Ribavirinum	Copegus, tabl. powl., 200 mg	168 tabl. powl.	5909990996223	2013-05-01	2 lata	1075.0, Ribavirinum	1 893,02	2 006,61	2 006,28	B.2.	bezpłatne	0 zł
236	Ribavirinum	Rebetol, kaps. twarde, 200 mg	140 kaps.	5909990999828	2012-07-01	2 lata	1075.0, Ribavirinum	1 577,26	1 671,90	1 671,90	B.2.	bezpłatne	0 zł
237	Rituximabum	MabThera, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 100 mg	2 fiol. a 10 ml	5909990418817	2012-07-01	2 lata	1035.0, Rituximabum	2 445,01	2 591,71	2 591,71	B.33.; B.12.	bezpłatne	0 zł
238	Rituximabum	MabThera, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990418824	2012-07-01	2 lata	1035.0, Rituximabum	6 112,52	6 479,27	6 479,27	B.33.; B.12.	bezpłatne	0 zł
239	Sildenafilum	Revatio, tabl. powl., 20 mg	90 tabl.	5909990423040	2012-01-01	2 lata	1076.0, Sildenafilum	2 340,67	2 481,11	2 481,11	B.31.	bezpłatne	0 zł
240	Somatropinum	Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 12 mg	1 fiol. (+1 rozp.)	5909990771813	2012-07-01	2 lata	1077.0, Somatropinum	1 082,57	1 147,52	1 038,86	B.42.; B.41.; B.38.; B.19.	bezpłatne	0 zł
241	Somatropinum	Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 5,3 mg	1 fiol.s.subs. (+ rozp.)	5909990671014	2012-07-01	2 lata	1077.0, Somatropinum	480,70	509,54	458,83	B.42.; B.41.; B.38.; B.19.	bezpłatne	0 zł
242	Somatropinum	Omnitrope, roztwór do wstrzykiwa , 3,3 mg/ml	5 wkł. a 1,5 ml	5909990050161	2012-07-01	2 lata	1077.0, Somatropinum	1 836,00	1 946,16	1 946,16	B.42.; B.41.; B.38.; B.19.	bezpłatne	0 zł
243	Somatropinum	Omnitrope, roztwór do wstrzykiwa , 6,7 mg/ml	5 wkł. a 1,5 ml	5909990072897	2012-07-01	2 lata	1077.0, Somatropinum	4 104,00	4 350,24	4 350,24	B.42.; B.41.; B.38.; B.19.	bezpłatne	0 zł
244	Sorafenibum	Nexavar, tabl. powl., 200 mg	112 tabl.	5909990588169	2012-07-01	2 lata	1078.0, Sorafenib	15 660,00	16 599,60	16 599,60	B.5.; B.10.	bezpłatne	0 zł
245	Sunitinibum	Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990079377	2012-07-01	2 lata	1079.0, Sunitynib	5 340,36	5 660,78	5 660,78	B.3.; B.10.	bezpłatne	0 zł
246	Sunitinibum	Sutent, kaps. twarde, 25 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990079384	2012-07-01	2 lata	1079.0, Sunitynib	10 680,72	11 321,56	11 321,56	B.3.; B.10.	bezpłatne	0 zł
247	Sunitinibum	Sutent, kaps. twarde, 50 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990079391	2012-07-01	2 lata	1079.0, Sunitynib	21 361,45	22 643,14	22 643,14	B.3.; B.10.	bezpłatne	0 zł
248	Telaprevirum	Incivo, tabl. powl., 375 mg	42 tabl. (1 but.)	5909990916436	2013-05-01	2 lata	1113.2, inhibitory proteazy - telaprewir	9 838,80	10 429,13	10 429,13	B.2.	bezpłatne	0 zł
249	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps.	5909990805082	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	27,00	28,62	28,62	B.11.	bezpłatne	0 zł
250	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps.	5909990805105	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	108,00	114,48	114,48	B.11.	bezpłatne	0 zł
251	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps.	5909990805136	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	518,40	549,50	549,50	B.11.	bezpłatne	0 zł
252	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg	5 kaps.	5909990805150	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	756,00	801,36	801,36	B.11.	bezpłatne	0 zł
253	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps.	5909990805174	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	972,00	1 030,32	1 030,32	B.11.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps.	5909990805198	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 447,20	1 534,03	1 534,03	B.11.	bezpłatne	0 zł
255	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672158	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	218,16	231,25	152,26	B.11.	bezpłatne	0 zł
256	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672172	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 090,80	1 156,25	761,29	B.11.	bezpłatne	0 zł
257	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672196	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	2 727,00	2 890,62	1 903,23	B.11.	bezpłatne	0 zł
258	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 0,14 g	5 kaps. (saszet.)	5909990672219	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 527,12	1 618,75	1 065,81	B.11.	bezpłatne	0 zł
259	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672233	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 963,44	2 081,25	1 370,33	B.11.	bezpłatne	0 zł
260	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990716999	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	54,54	57,81	38,06	B.11.	bezpłatne	0 zł
261	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps. (but.)	4037353009967	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	35,91	38,06	38,06	B.11.	bezpłatne	0 zł
262	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps. (but.)	4037353009974	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	143,64	152,26	152,26	B.11.	bezpłatne	0 zł
263	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps. (but.)	4037353009981	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	718,20	761,29	761,29	B.11.	bezpłatne	0 zł
264	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 140 mg	5 kaps. (but.)	4037353009998	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 005,48	1 065,81	1 065,81	B.11.	bezpłatne	0 zł
265	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps. (but.)	4037353010000	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 292,76	1 370,33	1 370,33	B.11.	bezpłatne	0 zł
266	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps. (but.)	4037353010017	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 795,50	1 903,23	1 903,23	B.11.	bezpłatne	0 zł
267	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps. (but.)	5909990744701	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	35,91	38,06	38,06	B.11.	bezpłatne	0 zł
268	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps. (but.)	5909990744725	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	143,64	152,26	152,26	B.11.	bezpłatne	0 zł
269	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps. (but.)	5909990744749	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	718,20	761,29	761,29	B.11.	bezpłatne	0 zł
270	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 140 mg	5 kaps. (but.)	5909990744763	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 005,48	1 065,81	1 065,81	B.11.	bezpłatne	0 zł
271	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps. (but.)	5909990744787	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 292,76	1 370,33	1 370,33	B.11.	bezpłatne	0 zł
272	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps. (but.)	5909990746057	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 795,50	1 903,23	1 903,23	B.11.	bezpłatne	0 zł
273	Tenofoviru disoproksilum fumaratum	Viread, tabl. powł., 245 mg	30 tabl.	5909990009589	2012-01-01	2 lata	1051.0, analogi nukleozydowe/nukleotydydowe inne ni lamivudyna	1 591,92	1 687,44	1 687,44	B.1.	bezpłatne	0 zł
274	Tobramycynum	Bramitob, płyn do inhalacji z nebulizatora w pojemniku jednodawkowym, 300 mg/4 ml, 300 mg/4ml	56 poj. a 4 ml	5909990045976	2012-07-01	2 lata	1081.0, Tobramycynum	8 316,00	8 814,96	8 814,96	B.27.	bezpłatne	0 zł
275	Tobramycynum	Tobi, płyn do inhalacji z nebulizatora, 300 mg/5ml	56 amp. a 5 ml	5909991056216	2012-07-01	2 lata	1081.0, Tobramycynum	6 696,00	7 097,76	7 097,76	B.27.	bezpłatne	0 zł
276	Tocilizumabum	RoActemra, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990678259	2013-01-01	2 lata	1106.0, Tocilizumab	1 665,42	1 765,35	1 765,35	B.45.	bezpłatne	0 zł
277	Tocilizumabum	RoActemra, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990678266	2013-01-01	2 lata	1106.0, Tocilizumab	3 330,84	3 530,69	3 530,69	B.45.	bezpłatne	0 zł
278	Tocilizumabum	RoActemra, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 4 ml	5909990678273	2013-01-01	2 lata	1106.0, Tocilizumab	666,17	706,14	706,14	B.45.	bezpłatne	0 zł
279	Toxinum botulinicum typum A ad iniectionabile	Botox, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwania, 100 Jednostka Allergan	1 fiol.	5909990674817	2012-07-01	2 lata	1055.2, toksyny botulinowe - 2	612,38	649,12	649,12	B.28.; B.30.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile	DYSPOORT, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.	1 fiol. a 500j.(LD50)	5909990729227	2012-07-01	2 lata	1055.3, toksyny botulinowe - 3	1 127,52	1 195,17	1 195,17	B.28.; B.30.	bezpłatne	0 zł
281	Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile	Xeomin , proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 100 j.	1 fiol. a 100j. (LD50)	5909990643950	2012-07-01	2 lata	1055.1, toksyny botulinowe - 1	583,20	618,19	618,19	B.28.	bezpłatne	0 zł
282	Trabectedinum	Yondelis, proszek do sporz. dziania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg	1 fiol.	5909990635177	2012-07-01	2 lata	1088.0, Trabectedin	2 214,00	2 346,84	2 246,67	B.8.	bezpłatne	0 zł
283	Trabectedinum	Yondelis, proszek do sporz. dziania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg	1 fiol.	5909990635184	2012-07-01	2 lata	1088.0, Trabectedin	8 478,00	8 986,68	8 986,68	B.8.	bezpłatne	0 zł
284	Trastuzumabum	Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporz. dziania roztworu do infuzji, 150 mg	1 fiol. a 15 ml	5909990855919	2012-07-01	2 lata	1082.0, Trastuzumabum	2 700,00	2 862,00	2 862,00	B.9.	bezpłatne	0 zł
285	Treprostynilum	Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990046805	2012-07-01	2 lata	1083.0, treprostynilum	12 690,00	13 451,40	13 451,40	B.31.	bezpłatne	0 zł
286	Treprostynilum	Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990046850	2012-07-01	2 lata	1083.0, treprostynilum	31 726,08	33 629,64	33 629,64	B.31.	bezpłatne	0 zł
287	Treprostynilum	Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990046867	2012-07-01	2 lata	1083.0, treprostynilum	63 453,24	67 260,43	67 260,43	B.31.	bezpłatne	0 zł
288	Triptorelinum	Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesiny o przedłu onym uwalnianiu do wstrzykiwa , 3,75 mg	1 fiol.pr. (+amp-st.z rozp.+igły)	5909990486915	2012-01-01	2 lata	1070.0, analogi gonadoliberyny	289,98	307,38	307,38	B.18.	bezpłatne	0 zł
289	Ustekinumabum	Stelara, roztwór do wstrzykiwa , 45 mg	1 amp-strz.	5909997077505	2013-01-01	2 lata	1107.0, Ustekinumab	13 932,00	14 767,92	14 767,92	B.47.	bezpłatne	0 zł
290	Wemurafenib	Zelboraf, tabl. powl., 240 mg	56 tabl. powl.	5909990935581	2013-03-01	2 lata	1108.0, Wemurafenib	10 099,56	10 705,53	10 705,53	B.48.	bezpłatne	0 zł

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1	2	3
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3 lat, chorzy na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu B, charakteryzujący się obecnością HBV DNA w surowicy oraz antygeny HBs przez czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz spełniający dwa spośród trzech poniższych kryteriów:</p> <p>1) poziom wirerii HBV DNA powyżej 2000 IU/mL dla osób HBe (-) i powyżej 20 000 IU/mL dla osób HBe (+);</p> <p>2) aktywność AIAT przekraczająca górną granicę normy w co najmniej trzech oznaczeniach wykonanych w okresie nie krótszym niż trzy miesiące i nie dłuższym niż 12 miesięcy;</p> <p>3) zmiany histologiczne w wątrobie potwierdzające rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby; w uzasadnionych przypadkach w ocenie stopnia nasilenia włóknienia wątrobowego można uwzględniać nieinwazyjne metody badania o potwierdzonej naukowo wiarygodności diagnostycznej:</p> <p>a) badanie elastograficzne, fibroscan, b) badanie metodą fibrotest.</p> <p>1.2. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy z marskością wątroby oraz z wykrywalnym HBV DNA niezależnie od poziomu transaminaz (świadczeniobiorcy z niewyrównaną marskością wątroby są leczeni w trybie pilnym, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1).</p> <p>1.3. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy oczekujący na przeszczep narządowy niezależnie od poziomu wirerii HBV DNA i stwierdzonego poziomu aktywności AIAT.</p> <p>2. U świadczeniobiorców w wieku od 3 do 18 lat stosuje się wyłącznie</p>	<p>1. Interferony:</p> <p>1) interferon pegylowany alfa-2a: - roztwór do wstrzykiwań: 135 µg/0,5 ml oraz 180 µg/0,5 ml;</p> <p>2) interferon rekombinowany alfa-2a: a) ampułkostrzykawki zawierające 3 mln j.m./0,5 ml, b) ampułkostrzykawki zawierające 6 mln j.m./0,5 ml, c) ampułkostrzykawki zawierające 9 mln j.m./0,5 ml;</p> <p>3) interferon rekombinowany alfa-2b - wielodawkowy automatyczny dozownik po 18 MIU, 30 MIU lub 60 MIU, zawierający 1,2 ml roztworu o stężeniu 15 mln j.m./ml (6 dawek po 3 mln j.m.) lub 25 mln j.m./ml (6 dawek po 5 mln j.m.), lub 50 mln j.m./ml (6 dawek po 10 mln j.m.);</p> <p>4) naturalny interferon leukocytarny: a) ampułki po 3 000 000 j.m., b) ampułki po 6 000 000 j.m.</p> <p>Interferony dawkuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych. Czas leczenia</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia interferonem</p> <p>1) poziom wirerii HBV DNA; 2) oznaczenie antygeny HBs; 3) oznaczenie antygeny HBe; 4) oznaczenie przeciwciał anti-HBe; 5) oznaczenie przeciwciał anti-HCV; 6) oznaczenie przeciwciał anti-HIV; 7) morfologia krwi; 8) oznaczenie poziomu AIAT; 9) proteinogram; 10) oznaczenie poziomu glukozy; 11) czas lub wskaźnik protrombinowy; 12) oznaczenie autoprzeciwciał; 13) oznaczenie poziomu TSH; 14) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3; 15) oznaczenie stężenia mocznika i kreatyniny; 16) USG jamy brzusznej; 17) biopsja wątroby - w przypadkach uzasadnionych kryteriami kwalifikacji; 18) próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia interferonem</p>

<p>interferon rekombinowany alfa-2b.</p> <p>3. Lekiem pierwszego rzutu w terapii pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B dotychczas nieleczonych są interferony stosowane w monoterapii, o ile nie ma przeciwwskazań do ich podania. Preferowanym interferonem ze względu na wyniki leczenia jest interferon pegylowany alfa-2a, a pozostałe interferony bierze się pod uwagę tylko w szczególnych sytuacjach, podanych w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych.</p> <p>4. Choroby lub stany wykluczające stosowanie interferonów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) niewyrównana marskość wątroby; 2) ciężka współistniejąca choroba serca, w tym niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa; 3) niewyrównana cukrzyca insulinozależna; 4) choroby o podłożu autoimmunologicznym, z wyłączeniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu II (anty-LKM-1); 5) niewyrównana nadczynność tarczycy; 6) retinopatia (po konsultacji okulisty); 7) padaczka (po konsultacji neurologicznej); 8) czynne uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających; 9) ciąża lub karmienie piersią; 10) czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej); 11) choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy (po konsultacji onkologicznej, hematologicznej lub hematologicznej); 12) inne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów interferonu określone w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych. <p>5. Kryteria wyłączenia z leczenia interferonem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) brak odpowiedzi po 12 tygodniach leczenia definiowanej jako zmniejszenie poziomu wirerii HBV DNA o co najmniej 1 log₁₀; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości lub nietolerancji na substancję czynną lub pomocniczą; 3) choroby lub stany wymienione w ust. 4 ujawnione w trakcie leczenia interferonem. 	<p>interferonami nie może przekroczyć 48 tygodni.</p> <p>2. Analogi nukleozydowe lub nukleotydydowe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lamiwudyna - tabletki po 100 mg - raz dziennie 1 tabletką; 2) entekawir: a) tabletki po 0,5 mg - raz dziennie 1 tabletką u osób uprzednio nieleczonych analogami nukleozydowymi lub nukleotydydowymi, b) tabletki po 1,0 mg - raz dziennie 1 tabletką u osób uprzednio leczonych analogami nukleozydowymi lub nukleotydydowymi; 3) adefowir - tabletki po 10,0 mg - raz dziennie 1 tabletką; 4) tenofowir - tabletki po 245 mg - raz dziennie 1 tabletką. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) w dniu rozpoczęcia terapii: <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi, b) oznaczenie poziomu AIAT, c) czas lub wskaźnik protrombinowy, d) oznaczenie stężenia kreatyniny, e) oznaczenie poziomu AFP; 2) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi, b) oznaczenie poziomu AIAT; 3) w 4, 12, 24, 48 tygodniu - oznaczenie stężenia kreatyniny; 4) w 12 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) poziom wirerii HBV DNA, b) oznaczenie antygeny HBsAg; 5) w 24, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie antygeny HBsAg, b) oznaczenie antygeny HBeAg, c) oznaczenie przeciwciał anti-HBe, d) poziom wirerii HBV DNA; 6) w 12, 24, 36, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie poziomu TSH, b) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3; 7) w 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) proteinogram, b) czas lub wskaźnik protrombinowy, c) oznaczenie poziomu AFP, d) USG jamy brzusznej. <p>3. Badania przy kwalifikacji do leczenia analogami nukleozydów lub nukleotydydów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poziom wirerii HBV DNA; 2) oznaczenie antygeny HBe; 3) oznaczenie przeciwciał anti-HBe; 4) wiogram (lekooporność);
---	--	--

<p>6.1. W przypadkach niemożności zastosowania interferonów lub ich nieskuteczności należy rozważyć stosowanie analogów nukleozydowych lub nukleotydowych.</p> <p>6.2. U pacjentów HBeAg (-) leczenie należy rozpocząć od lamiwudyny, a u osób HBeAg (+) leczenie należy rozpocząć od innego analogu nukleozydowego lub nukleotydowego stosowanego w monoterapii. W ramach programu stosuje się następujące analogi nukleozydowe lub nukleotydowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adefowir, entekawir lub tenofowir - u pacjentów HBeAg (+) oraz HBeAg (-) ; 2) lamiwudynę - u pacjentów HBeAg (-). <p>6.3. Po pierwszych 12 tygodniach leczenia analogami nukleozydowymi lub nukleotydowymi należy ocenić ich skuteczność. Dla kontynuacji leczenia określonym analogiem nukleozydowym lub nukleotydowym konieczne jest obniżenie początkowych wartości wirerii HBV DNA co najmniej o 1 log₁₀.</p> <p>6.4. W uzasadnionych przypadkach leczenie określonym analogiem nukleozydowym lub nukleotydowym może być kontynuowane do 24 tygodnia, do ponownej oceny skuteczności, zgodnie z ust. 6.5. W innych przypadkach należy zmienić lek po uzyskaniu wyniku lekooporności i sprawdzeniu adherencji pacjenta do leczenia.</p> <p>6.5. Po 24 tygodniach terapii należy ponownie ocenić jej skuteczność poprzez ilościowe oznaczenie poziomu wirerii HBV DNA. W wypadku niewykrywalnego HBV DNA leczenie należy kontynuować do osiągnięcia punktu końcowego leczenia. W innym wypadku należy zmienić lek po uzyskaniu wyniku wirogramu i sprawdzeniu adherencji pacjenta do leczenia.</p> <p>6.6. U świadczeniobiorców HBeAg (-), uprzednio nieleczonych, poddanych terapii lamiwudyną, u których stwierdza się spadek wirerii HBV DNA w 24 tygodniu powyżej 1 log₁₀ można kontynuować podawanie leku do osiągnięcia niewykrywalnego HBV DNA w 48 tygodniu.</p> <p>7. W przypadku wyczerpania opcji terapeutycznych i nieuzyskania nieoznaczalnej wirerii HBV DNA, zwłaszcza u pacjentów z</p>		<ol style="list-style-type: none"> 5) morfologia krwi; 6) oznaczenie poziomu AIAT; 7) proteinogram; 8) czas lub wskaźnik protrombinowy; 9) oznaczenie stężenia kreatyniny; 10) USG jamy brzusznej; 11) biopsja wątroby - w przypadkach uzasadnionych kryteriami kwalifikacji. <p>4. Monitorowanie leczenia analogami nukleozydów lub nukleotydów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w dniu rozpoczęcia terapii: <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi, b) oznaczenie poziomu AIAT, c) czas lub wskaźnik protrombinowy, d) oznaczenie stężenia kreatyniny, e) oznaczenie poziomu AFP; 2) w 4, 12, 24, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie stężenia kreatyniny, b) morfologia krwi, c) oznaczenie poziomu AIAT; 3) w 12 tygodniu - poziom wirerii HBV DNA; 4) w 24 i następnie co 24 tygodnie: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie antygeny HBsAg, b) oznaczenie antygeny HBeAg, c) oznaczenie przeciwciał anti-HBe, d) poziom wirerii HBV DNA, e) oznaczenie lekooporności przy jej podejrzeniu; 5) w 48 tygodniu i następnie co 48 tygodni: <ol style="list-style-type: none"> a) czas lub wskaźnik protrombinowy, b) proteinogram, c) oznaczenie poziomu AFP,
--	--	---

<p>marskością wątroby, w przypadkach uzasadnionych, należy rozważyć leczenie równocześnie dwoma analogami nukleozydowymi albo interferonem, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1. Wniosek na taki sposób leczenia powinien być pozytywnie zaopiniowany przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych i zaakceptowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.</p> <p>8. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>8.1. Leczenie można zakończyć u osób leczonych dłużej niż rok, po stwierdzeniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) serokonwersji w układzie "s" lub2) dwukrotnie ujemnych wyników oznaczenia HBV DNA wykonanych w odstępach co najmniej 3 miesięcy. <p>Badania wykonuje się w medycznym laboratorium diagnostycznym posiadającym odpowiedni certyfikat jakości.</p> <p>8.2. W przypadku pacjentów z marskością wątroby i po przeszczepach narządowych terapię należy stosować bez ograniczeń czasowych</p>		d) USG jamy brzusznej.
---	--	------------------------

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3 roku życia, chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C i spełniający poniższe kryteria:</p> <p>1) obecność wirerii HCV RNA w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej;</p> <p>2) obecność przeciwciał anti-HCV;</p> <p>3) zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby.</p> <p>U pacjentów z genotypem 2 i 3 można odstąpić od biopsji wątroby, uwzględniając wyniki nieinwazyjnych metod badania o potwierdzonej naukowo wiarygodności diagnostycznej, tj. badania elastograficznego, fibroskanu. U pacjentów z genotypem 1 i 4 można odstąpić od biopsji w przypadku marskości wątroby z nadciśnieniem wrotnym (hipersplenizm, żylaki przełyku) i naczyńniakowatości wątroby.</p> <p>1.2. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy powyżej 3 roku życia z pozawątrobową manifestacją zakażenia HCV, niezależnie od zaawansowania choroby w obrazie histopatologicznym wątroby.</p> <p>2. U świadczeniobiorców w wieku od 3 do 18 roku życia stosuje się wyłącznie interferon pegylowany alfa-2b albo rekombinowany alfa-2b.</p> <p>3. Interferony pegylowane alfa w ramach programu mogą być stosowane:</p>	<p>1. Interferon pegylowany alfa-2a</p> <p>1.1. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2a w terapii skojarzonej z rybawiryną lub w monoterapii:</p> <p>1) 180 µg;</p> <p>2) 135 µg - u świadczeniobiorców ze schyłkową niewydolnością nerek;</p> <p>3) w przypadku wystąpienia działań niepożądanych możliwa jest redukcja dawki (interferonu lub rybawiryny) albo przerwanie leczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>1.2. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem pegylowanym alfa-2a:</p> <p>1) genotyp 1 lub 4:</p> <p>a) 1000 mg/dobę dla świadczeniobiorców o masie ciała poniżej 75 kg,</p> <p>b) 1200 mg/dobę dla świadczeniobiorców o masie ciała równej lub powyżej 75 kg;</p> <p>2) genotyp 2 lub 3 - 800 mg/dobę.</p> <p>1.3. Czas terapii dla leczenia skojarzonego:</p> <p>1) genotyp 1 lub 4:</p> <p>a) 48 tygodni, gdy po 12 tygodniach stwierdzono brak wirerii HCV RNA,</p> <p>b) dopuszczalne jest leczenie przez 24 tygodnie, gdy stwierdzono:</p> <p>- niskie wyjściowe miano wirusa ($\leq 800\ 000$ j.m./ml) oraz</p> <p>- brak wirerii HCV RNA w 4 tygodniu leczenia oraz</p> <p>- brak wirerii HCV RNA w 24 tygodniu leczenia,</p> <p>c) 72 tygodnie, gdy po 12 tygodniach leczenia wiremia HCV RNA obniża się o co najmniej $2 \log_{10}$ i zanika po 24 tygodniach leczenia;</p> <p>2) genotyp 2 lub 3 - 24 tygodnie;</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia interferonami (w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami):</p> <p>1) oznaczenie PCR HCV metodą ilościową;</p> <p>2) morfologia krwi;</p> <p>3) oznaczenie poziomu AIAT;</p> <p>4) proteinogram;</p> <p>5) czas lub wskaźnik protrombinowy;</p> <p>6) oznaczenie autoprzeciwciał;</p> <p>7) oznaczenie poziomu TSH;</p> <p>8) oznaczenie poziomu FT4 lub FT3;</p> <p>9) oznaczenie poziomu kwasu moczowego;</p> <p>10) oznaczenia poziomu mocznika i kreatyniny;</p> <p>11) oznaczenie poziomu glukozy;</p> <p>12) oznaczenie przeciwciał anti-HIV;</p> <p>13) oznaczenie antygenu Hbs;</p> <p>14) USG jamy brzusznej;</p> <p>15) biopsja wątroby - w przypadkach uzasadnionych kryteriami kwalifikacji;</p> <p>16) próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>17) oznaczenie genotypu HCV u osób leczonych interferonami pegylowanymi;</p> <p>18) oznaczenie polimorfizmu genu rs 12979860 IL 28 u osób wcześniej nieleczonych, u których planowane jest zastosowanie leczenia złożonego z interferonu pegylowanego alfa, rybawiryną i telaprewiru albo boceprewiru.</p>

<p>1) w monoterapii:</p> <p>a) u świadczeniobiorców dializowanych;</p> <p>b) u świadczeniobiorców przed i po przeszczepach narządowych;</p> <p>c) u świadczeniobiorców z przeciwwskazaniami do stosowania lub nadwrażliwością na rybawirybę;</p> <p>2) w leczeniu skojarzonym z rybawirybą u świadczeniobiorców:</p> <p>a) nieleczonych uprzednio interferonami;</p> <p>b) z nawrotem zakażenia;</p> <p>c) u których terapia interferonem rekombinowanym alfa lub interferonem rekombinowanym alfa i rybawirybą okazała się nieskuteczna;</p> <p>d) przed i po przeszczepach narządowych;</p> <p>e) u których terapia interferonem pegylowanym innego typu okazała się nieskuteczna jedynie w przypadku obserwowanej progresji choroby.</p> <p>3) w leczeniu skojarzonym z rybawirybą i telaprewirem albo rybawirybą i boceprewirem u świadczeniobiorców powyżej 18 roku życia z genotypem 1:</p> <p>a) uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem pegylowanym i rybawirybą, u których leczenie było przerwane po 12 tygodniach z powodu braku odpowiedzi wirusologicznej albo</p> <p>b) z brakiem odpowiedzi na wcześniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawirybą, przy czym stężenie HCV RNA przez cały okres terapii nie uległo obniżeniu o więcej niż 2 logarytmy dziesiętne (100-krotnie) albo</p> <p>c) z nawrotem zakażenia po terapii interferonem pegylowanym alfa z rybawirybą zakończonej uzyskaniem negatywnego wyniku HCV RNA (HCV RNA niewykrywalne w chwili zakończenia terapii, lecz wykrywalne w okresie obserwacji po leczeniu) albo</p>	<p>3) niezależnie od genotypu, przy współistniejącym zakażeniu HIV i HCV - 48 tygodni;</p> <p>4) niezależnie od genotypu, przy współistniejącym zakażeniu HBV i HCV - 48 tygodni.</p> <p>1.4. Leczenie należy przerwać u świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby do 2 stopnia włącznie w skali Scheuer'a, zakażonych genotypem 1 lub 4, u których:</p> <p>a) po 12 tygodniach terapii nie stwierdza się spadku wirerii o minimum 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej albo</p> <p>b) po 24 tygodniach terapii wiremia HCV RNA jest nadal wykrywalna, mimo że po 12 tygodniach zmniejszyła się o ponad 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej.</p> <p>1.5. U świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby powyżej 2 stopnia w skali Scheuer'a lub manifestacją pozawątrobową zakażenia HCV terapię kontynuuje się do 48 tygodni.</p> <p>2. Interferon pegylowany alfa-2b</p> <p>2.1. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2b w terapii skojarzonej z rybawirybą:</p> <p>1) 1,5 µg/kg masy ciała / tydzień - świadczeniobiorcy powyżej 18 roku życia;</p> <p>2) 60 µg/m² powierzchni ciała / tydzień - świadczeniobiorcy w wieku od 3 do 18 roku życia;</p> <p>3) w leczeniu skojarzonym świadczeniobiorcom o różnej masie ciała można podać zalecaną dawkę interferonu pegylowanego alfa-2b określoną w pkt 1, stosując wstrzykiwacze lub fiolki o różnej mocy w połączeniu z rybawirybą w odpowiedniej dawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla interferonu pegylowanego alfa-2b;</p> <p>4) w przypadku wystąpienia działań niepożądanych możliwa jest redukcja dawki (interferonu lub rybawiryby) albo przerwanie leczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>2.2. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2b w monoterapii:</p>	<p>2. Monitorowanie leczenia interferonami (w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami):</p> <p>1) świadczeniobiorcy z genotypem 2 lub 3 leczeni interferonem alfa pegylowanym:</p> <p>a) w 1 dniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu AIAT; - morfologia krwi; - próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym; <p>b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu AIAT; - morfologia krwi; <p>c) w 12 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie stężenia kreatyniny; - oznaczenie poziomu kwasu moczowego; - oznaczenie poziomu TSH; - oznaczenie poziomu fT4; <p>d) w 24 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu GGTP; - oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej; - oznaczenie stężenia kreatyniny; - oznaczenie poziomu kwasu moczowego; - oznaczenie poziomu TSH; - oznaczenie poziomu fT4; - oznaczenie poziomu AFP; - proteinogram; - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową; - USG jamy brzusznej; <p>e) w 48 tygodniu - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową;</p> <p>2) świadczeniobiorcy z genotypem 1 lub 4 leczeni interferonem alfa pegylowanym:</p> <p>a) w 1 dniu:</p>
---	---	--

<p>d) z częściową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawiryną (stężenie HCV RNA w trakcie terapii uległo obniżeniu o więcej niż 2 logarytmy dziesiętne (100-krotnie), ale przez cały czas było wykrywalne).</p> <p>Świadczeniobiorcy, o których mowa w lit. a-d muszą mieć stwierdzone włóknienie wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer'a.</p> <p>4) w leczeniu skojarzonym z rybawiryną i telaprewirem albo rybawiryną i boceprewirem u świadczeniobiorców powyżej 18 roku życia z genotypem 1 uprzednio nieleczonych:</p> <p>a) u których stwierdza się włóknienie w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer'a oraz</p> <p>b) u których stwierdza się genotyp rs 12979860 IL 28 T/T.</p> <p>4. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonami pegylowanymi alfa:</p> <p>1) przewlekłe zapalenie wątroby lub wyrównana marskość wątroby;</p> <p>2) pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV, niezależnie od zaawansowania choroby w obrazie histopatologicznym.</p> <p>5. Interferony rekombinowane alfa w ramach programu mogą być stosowane:</p> <p>1) w monoterapii:</p> <p>a) u świadczeniobiorców dializowanych;</p> <p>b) u świadczeniobiorców przed lub po przeszczepach narządowych;</p> <p>c) u świadczeniobiorców z przeciwwskazaniami do stosowania lub nadwrażliwością na rybawirynę;</p> <p>2) w leczeniu skojarzonym z rybawiryną.</p> <p>U świadczeniobiorców od 3 do 18 roku życia stosuje się interferon rekombinowany alfa-2b, po spełnieniu przez nich łącznie następujących warunków:</p> <p>a) brak wcześniejszego leczenia;</p> <p>b) brak cech dekompensacji czynności wątroby;</p>	<p>1) 0,5 µg/kg masy ciała / tydzień lub</p> <p>2) 1,0 µg/kg masy ciała / tydzień. Szczegóły dotyczące dawkowania w tym przypadku określone są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>2.3. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem pegylowanym alfa-2b - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla interferonu pegylowanego alfa-2b.</p> <p>2.4. Czas terapii dla leczenia skojarzonego:</p> <p>1) genotyp 1 lub 4:</p> <p>a) 48 tygodni, gdy po 12 tygodniach stwierdzono brak wirerii HCV RNA,</p> <p>b) dopuszczalne jest leczenie przez 24 tygodnie, gdy stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niskie wyjściowe miano wirusa (< 600 000 j.m./ml) oraz - brak wirerii HCV RNA w 4 tygodniu leczenia oraz - brak wirerii HCV RNA w 24 tygodniu leczenia, <p>c) 72 tygodnie, gdy po 12 tygodniach leczenia wiramia HCV RNA obniża się o co najmniej 2 log₁₀ i zanika po 24 tygodniach leczenia;</p> <p>2) genotyp 2 lub 3 - 24 tygodnie;</p> <p>3) niezależnie od genotypu, przy współistniejącym zakażeniu HIV i HCV - 48 tygodni.</p> <p>2.5. Leczenie należy przerwać u świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby do 2 stopnia włącznie w skali Scheuer'a, zakażonych genotypem 1 lub 4, u których:</p> <p>a) po 12 tygodniach terapii nie stwierdza się spadku wirerii o minimum 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej albo</p> <p>b) po 24 tygodniach terapii wiramia HCV RNA jest nadal wykrywalna, mimo że po 12 tygodniach zmniejszyła się o ponad 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej.</p> <p>2.6. U świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby powyżej 2 punktów w skali Scheuer'a lub manifestacją pozawątrobową zakażenia HCV terapię kontynuuje się do 48 tygodni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - morfologia krwi; - oznaczenie poziomu AIAT; - próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym; <p>b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morfologia krwi; - oznaczenie poziomu AIAT; <p>c) w 4 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową u świadczeniobiorców leczonych telaprewirem oraz (w genotypie 1) u świadczeniobiorców z wyjściową wiramią, poniżej 600 000 IU/ml; <p>d) w 8 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie PCR HCV metodą jakościową u osób leczonych boceprewirem; <p>e) w 12, 24, 36, 48, 60 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie stężenia kreatyniny; - oznaczenie poziomu kwasu moczowego; - oznaczenie poziomu TSH; - oznaczenie poziomu fT4; <p>f) w 12 tygodniu - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową;</p> <p>g) w przypadku leczenia telaprewirem u świadczeniobiorców wcześniej nie reagujących na terapię interferonem pegylowanym alfa i rybawiryną należy wykonać dodatkowe oznaczenia PCR HCV metodą ilościową pomiędzy 4 a 12 tygodniem terapii trójskładnikowej;</p> <p>h) w 24 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową; - oznaczenie poziomu AFP; <p>i) na zakończenie leczenia - w 24 albo 48, albo 72 tygodniu:</p>
--	---	---

<p>c) stwierdzenie obecności HCV-RNA w surowicy; d) stwierdzenie obecności przeciwciał anty-HCV w surowicy.</p> <p>6. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonami rekombinowanymi alfa: 1) przeciwwskazania do stosowania interferonu pegylowanego; 2) nietolerancja lub działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego; 3) przeciwwskazania do zastosowania interferonu pegylowanego alfa-2b u świadczeniobiorców poniżej 18 roku życia.</p> <p>Interferon rekombinowany alfa w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C u dorosłych jest stosowany tylko w przypadku niemożności zastosowania interferonu pegylowanego alfa.</p> <p>7. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonem naturalnym: 1) niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem pegylowanym lub interferonem rekombinowanym i potwierdzona celowość ponownego rozpoczęcia leczenia; 2) nietolerancja i inne działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego; 3) zaawansowane włóknienie lub wyrównana marskość wątroby.</p> <p>8. Kryteria uniemożliwiające kwalifikację do programu: 1) nadwrażliwość na substancję czynną lub substancję pomocniczą; 2) niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w tkance wątrobowej przy obecności przeciwciał anty-HCV; 3) niewyrównana marskość wątroby; 4) ciężka współistniejąca choroba serca, w tym niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa;</p>	<p>3. Interferon rekombinowany alfa-2a oraz interferon rekombinowany alfa-2b</p> <p>3.1. Dawkowanie interferonu rekombinowanego alfa-2a oraz interferonu rekombinowanego alfa-2b w terapii skojarzonej z rybawiryną lub w monoterapii: 1) świadczeniobiorcy powyżej 18 roku życia - zgodnie z charakterystykami odpowiednich produktów leczniczych; 2) świadczeniobiorcy od 3 do 18 roku życia (może być stosowany jedynie interferon rekombinowany alfa-2b) - 3 mln j.m./m² powierzchni ciała, 3 razy w tygodniu przez 24 lub 48 tygodni, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.</p> <p>3.2. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem rekombinowanym alfa-2a lub interferonem rekombinowanym alfa-2b: 1) 1000 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych dla świadczeniobiorców dorosłych o masie ciała poniżej 75 kg; 2) 1200 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych dla świadczeniobiorców dorosłych o masie ciała równej lub powyżej 75 kg; 3) 15 mg/kg masy ciała / dobę dla świadczeniobiorców od 3 do 18 roku życia.</p> <p>4. Interferon naturalny - dawkowanie i czas trwania leczenia zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.</p> <p>5. Telaprewir Telaprewir stosowany jest w dawce 750 mg 3 x dziennie (po 2 tabletki co ok. 8 godzin).</p> <p>5.1 Schemat terapii polega na stosowaniu we wszystkich grupach chorych 3 leków (telaprewiru, interferonu pegylowanego alfa oraz rybawiryny) przez okres pierwszych 12 tygodni terapii. Terapia kontynuowana jest następnie z użyciem 2 leków (interferonu pegylowanego alfa oraz rybawiryny) i jej długość uzależniona jest od odpowiedzi na terapię.</p> <p>5.2 Świadczeniobiorcy dotychczas nieleczeni i świadczeniobiorcy z nawrotem po poprzedniej terapii:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu GGTP; - oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej; - oznaczenie stężenia kreatyniny; - oznaczenie poziomu kwasu moczowego; - oznaczenie poziomu TSH; - oznaczenie poziomu fT4; - oznaczenie poziomu AFP; - proteinogram; - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową; - USG jamy brzusznej; <p>j) po 24 tygodniach od zakończenia leczenia - w 48 albo 72, albo 96 tygodniu</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową; <p>3) świadczeniobiorcy leczeni interferonem rekombinowanym alfa albo interferonem naturalnym alfa:</p> <p>a) w 1 dniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morfologia krwi; - oznaczenie poziomu AIAT; - próba ciążowa; <p>b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morfologia krwi; - oznaczenie poziomu AIAT; <p>c) w 12, 24, 36 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie stężenia kreatyniny; - oznaczenie poziomu kwasu moczowego; - oznaczenie poziomu TSH; - oznaczenie poziomu fT4; <p>d) na zakończenie leczenia - w 24 albo 48 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu GGTP; - oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej;
--	---	--

<p>5) niewyrównana cukrzyca insulinozależna; 6) choroby o podłożu autoimmunologicznym z wyłączeniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu II (anty-LKM-1); 7) niewyrównana nadczynność tarczycy; 8) retinopatia (po konsultacji okulistycznej); 9) padaczka (po konsultacji neurologicznej); 10) czynne uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających; 11) ciąża lub karmienie piersią; 12) czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej); 13) choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy (po konsultacji onkologicznej, hematologicznej lub hematologicznej); 14) inne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów interferonu, rybawiryny, telaprewiru albo boceprewiru określone w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych.</p> <p>9. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <p>1) ujawnienie okoliczności określonych w ust. 8 w trakcie leczenia; 2) działania niepożądane stosowanych w programie leków uzasadniające przerwanie leczenia: a) w opinii lekarza prowadzącego terapię lub b) zgodnie z charakterystykami odpowiednich produktów leczniczych.</p>	<p>a) z niewykrywalnym HCV RNA w 4 i 12 tygodniu leczenia – całkowity czas leczenia wynosi 24 tygodnie. b) z marskością wątroby lub wykrywalnym HCV RNA poniżej 1000 IU/ml – całkowity czas leczenia wynosi 48 tygodni.</p> <p>5.3 Świadczeniobiorcy z częściową odpowiedzią na uprzednie leczenie oraz świadczeniobiorcy z niepowodzeniem poprzedniej terapii: a) świadczeniobiorcy z HCV RNA poniżej 1000 IU/ml w 4 i 12 tygodniu leczenia – czas leczenia wynosi 48 tygodni</p> <p>5.4 U wszystkich świadczeniobiorców, u których nie doszło do redukcji HCV RNA poniżej 1000 IU/ml w 4 albo w 12 tygodniu, terapia powinna być przerwana, ponieważ prawdopodobieństwo osiągnięcia u nich trwałej odpowiedzi wirusowej (SVR) jest znikome.</p> <p>5.5 U świadczeniobiorców, u których planowany czas leczenia wynosi 48 tygodni leczenie należy przerwać jeśli HCV RNA będzie wykrywalne w 24 lub 36 tygodniu.</p> <p>5.6 U świadczeniobiorców wcześniej niereagujących na leczenie należy rozważyć wykonanie dodatkowego badania RNA HCV pomiędzy 4 i 12 tygodniem. Jeżeli stężenie RNA HCV wyniesie >1 000 j.m./ml, należy przerwać leczenie telaprewirem, interferonem pegylowanym alfa oraz rybawiryną.</p> <p>5.7 W przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowanymi lekami możliwa jest redukcja dawki interferonu i rybawiryny według wskazań ujętych w Charakterystykach Produktów Leczniczych.</p> <p>5.8 Nie należy stosować redukcji dawek telaprewiru.</p> <p>5.9 Telaprewir nie powinien być stosowany w monoterapii. W przypadku konieczności przerwania leczenia pegylowanym interferonem alfa należy także odstawić telaprewir.</p> <p>6. Boceprewir</p> <p>6.1 Boceprewir musi być podawany w skojarzeniu z interferonem pegylowanym alfa i rybawiryną. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym boceprewir należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego interferonu pegylowanego alfa</p>	<p>- oznaczenie stężenia kreatyniny; - oznaczenie poziomu kwasu moczowego; - oznaczenie poziomu TSH; - oznaczenie poziomu FT4; - oznaczenie poziomu AFP; - proteinogram; - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową; - USG jamy brzusznej; e) po 24 tygodniach od zakończenia leczenia - w 48 albo 72 tygodniu - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową.</p>
---	--	--

i rybawiryny.

6.2 Zgodnie z zasadami rejestracyjnymi leku zastosowanie boceprewiru jest poprzedzone czterotygodniowym cyklem terapii dwulekowej, określanym jako faza wprowadzająca (lead-in). Polega ona na zastosowaniu interferonu pegylowanego alfa w skojarzeniu z rybawiryną. Obniżenie wirerii w tym okresie ma zapobiegać powstawaniu lekooporności na boceprewir.

6.3 Zalecana dawka produktu leczniczego boceprewir wynosi 800 mg, podawany doustnie 3x dobowo (TID) z jedzeniem (posiłkiem lub lekką przekąską).

Maksymalna dawka dobową produktu leczniczego boceprewir wynosi 2400 mg. W przypadku przyjmowania produktu leczniczego bez posiłku można spodziewać się zmniejszenia skuteczności końcowej w wyniku suboptymalnej ekspozycji ustrojowej.

6.4 U świadczeniobiorców uprzednio leczonych z całkowitym brakiem odpowiedzi wirusologicznej (null responders) oraz z marskością wątroby leczenie powinno trwać 48 tygodni: po czterotygodniowej fazie wstępnej dwulekowej przez 44 tygodnie należy prowadzić terapię trójlekową.

6.5 U świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 6.4 czas trwania terapii trójlekowej z zastosowaniem boceprewiru wdrażanej po pierwszych 4 tygodniach terapii dwulekowej nie powinien być krótszy niż 32 tygodnie. Ze względu na narastające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas leczenia boceprewirem (zwłaszcza niedokrwistości), jeżeli pacjent źle toleruje leczenie, należy rozważyć możliwość zmiany schematu leczenia trójlekowego w 12 ostatnich tygodniach cyklu leczenia na schemat dwulekowy (interferon pegylowany alfa oraz rybawiryna).

6.6 U chorych:

- a) u których wystąpił nawrót, czyli HCV RNA było niewykrywalne pod koniec poprzedniej terapii, lecz wykrywalne w czasie 24-tygodniowej obserwacji po zakończeniu leczenia,
- b) z częściową odpowiedzią na wcześniejszą terapię, kiedy stężenie HCV RNA obniżyło się w trakcie poprzedniego leczenia o co najmniej

<p>2 log₁₀ (100-krotnie) w 12 tygodniu leczenia, lecz było nadal wykrywalne w 24 tygodniu lub reaktywacja wirerii wystąpiła w późniejszym okresie leczenia,</p> <p>c) wcześniej nieleczonych, u których w 8 tygodniu HCV RNA jest wykrywalne, a w 24 tygodniu niewykrywalne</p> <p>- leczenie powinno trwać 48 tygodni: po czterotygodniowej fazie wstępnej należy przez 32 tygodnie prowadzić terapię trójlekową, a następnie przez kolejnych 12 tygodni stosuje się wyłącznie interferon pegylowany alfa i rybawiryne.</p> <p>6.7 U chorych wcześniej nieleczonych, u których HCV RNA jest niewykrywalne w 8 i 24 tygodniu leczenia leczenie powinno trwać 28 tygodni: po 4 tygodniowej fazie wstępnej należy przez 24 tygodnie prowadzić terapię trójlekową.</p> <p>6.8 Leczenie należy przerwać, jeśli:</p> <p>a) wiremia w 12 tygodniu terapii przekracza 100 IU/mL albo</p> <p>b) wiremia w 24 tygodniu jest nadal wykrywalna (≥ 25 IU/mL).</p>	
--	--

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia imatinibem</p> <p>1) rozpoznanie podścieliskowego mięsaka potwierdzone histologicznie; 2) ekspresja CD117 potwierdzona immunohistochemicznie; 3) brak możliwości zastosowania chirurgicznego leczenia lub obecność przerzutów udokumentowana na podstawie oceny stanu klinicznego i wyników obrazowych badań; 4) obecność zmian możliwych do zmierzenia w badaniu komputerowej tomografii; 5) wiek: powyżej 18 roku życia; 6) stan sprawności (według klasyfikacji WHO 0-2) 7) prawidłowe wyniki badań czynności szpiku; 8) prawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby i nerek.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia imatinibem w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z leczenia imatinibem</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na imatinib; 2) progresja choroby w trakcie stosowania leku po zwiększeniu dawki imatinibu do 800 mg/dobę, zwłaszcza pierwotna oporność na imatinib; 3) brak skuteczności po 4 miesiącach stosowania leku (zwiększenie sumy wielkości zmian w TK spiralnej, powyżej 20% z wyjątkiem sytuacji gdy gęstość tych zmian jest mniejsza niż 15% w stosunku do gęstości wyjściowej lub pojawienie się nowej/nowych zmian o wielkości co najmniej 10 mm); 4) toksyczność według skali WHO większa bądź równa 3 (zwłaszcza 3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych, ciężka niedokrwistość, neutropenia lub</p>	<p>1. Dawkowanie imatinibu</p> <p>-dobowa dawka początkowa- 400 mg jednorazowo -dobowa dawka w przypadku wystąpienia progresji 800 mg w dwóch dawkach (2x400mg)</p> <p>2. Dawkowanie sunitynibu</p> <p>Zalecana dawka początkowa preparatu sunitynib wynosi 50 mg doustnie raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie, po czym następuje dwutygodniowa przerwa (schemat 4/2), co stanowi pełny cykl 6 tygodni.</p> <p>Można stopniowo dokonywać zmian dawkowania za każdym razem o 12,5 mg, zależnie od indywidualnie ocenianego bezpieczeństwa i tolerancji lub przedłużać przerwę w przyjmowaniu leku. Dawka dobową nie powinna być mniejsza niż 25 mg.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia imatinibem albo sunitynibem</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem 2) badanie ogólne moczu 3) aktywność transaminaz wątrobowych, 4) stężenie bilirubiny; 5) aktywności fosfatazy zasadowej; 6) poziom albumin, 7) tomografia komputerowa, 8) EKG.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia imatinibem albo sunitynibem</p> <p>Badania kontrolne należy przeprowadzać podczas każdej wizyty świadczeniobiorcy - nie rzadziej niż raz na 4-6 tygodni:</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem; 2) badanie ogólne moczu; 3) aktywność aminotransferaz wątrobowych; 4) stężenie bilirubiny; 5) aktywność fosfatazy zasadowej; 6) poziom albumin; 7) tomografia komputerowa (badanie TK należy wykonywać co 2 miesiące w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia i następnie co 3 miesiące). Należy oceniać zmiany pod względem różnic ich wielkości (skala RECIST) i gęstości.</p>

małopłytkowość);

5) stan sprawności według WHO 3-4.

4. Kryteria kwalifikacji do leczenia sunitynibem

1) rozpoznanie mięsaka podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) potwierdzone histologicznie;

2) ekspresja CD117 potwierdzona immunohistochemicznie;

3) brak możliwości leczenia resekcji zmian lub obecność przerzutów udokumentowane na podstawie oceny stanu klinicznego i wyników obrazowych badań;

4) obecność zmian możliwych do zmierzenia w badaniu komputerowej tomografii;

5) udokumentowana progresja w czasie leczenia imatynibem (oporność) lub nietolerancja imatinibu (3-4 stopień toksyczności);

6) stan sprawności według klasyfikacji WHO 0-3;

7) wiek: powyżej 18 roku życia;

8) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: liczba płytek krwi $\geq 75,000/\text{mm}^3$, liczba bezwzględna neutrofilii $\geq 1000/\text{mm}^3$, stężenie hemoglobiny $\geq 8.0 \text{ g/dl}$;

9) prawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby i nerek (nieprzekraczające 2,5 raza górnej granicy normy lub 5 razy dla prób wątrobowych w przypadku przerzutów do wątroby).

2. Określenie czasu leczenia w programie.

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.

3. Wyłączenie z programu leczenia sunitynibem:

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sunitynib,

2) udokumentowana progresja choroby w trakcie stosowania leku,

3) brak skuteczności (pod postacią progresji choroby) po 3 miesiącach stosowania leku, nieakceptowalna, nawracająca (pomimo modyfikacji dawkowania) toksyczność według skali WHO ≥ 3 (zwłaszcza 3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych, neutropenia lub małopłytkowość; wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych

zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia). 4) stan sprawności 4 według WHO.		
--	--	--

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 – C 20)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab.</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego; 2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych; 3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii; 4) udokumentowana nieskuteczność chemioterapii pierwszej linii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu; 5) niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem oksaliplatyny lub bewacyzumabu; 6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST; 7) stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO; 8) wiek powyżej 18 roku życia; 9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: <ol style="list-style-type: none"> a) liczba płytek krwi większa lub równa $1,5 \times 10^5/\text{mm}^3$, b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa $1500/\text{mm}^3$, c) stężenie hemoglobiny większe lub równe $10,0 \text{ g/dl}$; 10) wskaźniki czynności wątroby i nerek: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta), b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy, c) stężenie kreatyniny w granicach normy, d) nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według schematu FOLFOX-4; 	<p>1. Bewacyzumab -10 mg/kg masy ciała dożylnie we wlewie trwającym 30-90 minut (dzień 1) wraz z chemioterapią według schematu FOLFOX-4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oksaliplatyna 85 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 2 godziny – dzień 1; 2) kwas folinowy 200 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wlewie 2 godziny – dzień 1 i 2; 3) fluorouracyl 400 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wstrzyknięciu, a następnie 600 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 22-godziny – dzień 1 i 2 (całkowita dawka fluorouracylu – 2000 mg/m^2 powierzchni ciała w ciągu 48 godzin). <p>Lek podaje się raz na dwa tygodnie.</p> <p>W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku wystąpienia polineuropatii) można zredukować dawkę oksaliplatyny do 65 mg/m^2 powierzchni ciała, a także wydłużyć przerwę pomiędzy cyklami leczenia do 3 tygodni (w szczególności w przypadku powikłań hematologicznych).</p> <p>Bewacyzumab nie może być stosowany w monoterapii.</p> <p>2. Cetuksymab:</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia bewacyzumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenie stężenia: <ol style="list-style-type: none"> a) mocznika, b) kreatyniny, c) bilirubiny – w surowicy; 4) oznaczenie aktywności: <ol style="list-style-type: none"> a) transaminaz (AspAT, AlAT), b) dehydrogenazy mleczanowej (LDH) – w surowicy; 5) oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT); 6) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego (PT); 7) badanie ogólne moczu; 8) próba ciążowa – u kobiet w okresie prokreacyjnym; 9) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań klinicznych; 10) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu w przypadku wskazań klinicznych w celu wykluczenia przerzutów; 11) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy; 12) EKG; 13) pomiar ciśnienia tętniczego;

<p>11) wykluczenie ciąży;</p> <p>12) nieobecność przeciwwskazań do zastosowania bewacyzumabu, którymi są:</p> <ol style="list-style-type: none"> obecna pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (pacjenci kwalifikowani do leczenia bewacyzumabem muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym), czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, niestabilne nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba niedokrwienna serca, obecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego), naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie, wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia, stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień, stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych, niegojące się rany, zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia, białkomocz, alergia na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> objawy nadwrażliwości na bewacyzumab lub którykolwiek składnik chemioterapii według schematu FOLFOX-4; 	<ol style="list-style-type: none"> 400 mg/m² powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 2 godziny – pierwsza dawka; 250 mg/m² powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 1 godzinę – kolejne dawki. <p>Lek podaje się raz na tydzień.</p> <p>W przypadku wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy dostosować do wytycznych zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>3. Panitumumab – 6 mg/kg masy ciała dożylnie we wlewie trwającym 1 godzinę. Lek podaje się raz na dwa tygodnie.</p> <p>W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> opóźnić moment podania leku, zmniejszyć dawkę leku <p>– zgodnie z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p>	<p>14) inne badania w razie wskazań klinicznych.</p> <p>Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>2. Badania przy kwalifikacji do leczenia cetuksymabem lub panitumumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego z ekspresją EGFR (w co najmniej 1% komórek nowotworowych) oraz z prawidłowym stanem genu KRAS; morfologia krwi z rozmazem; oznaczenie stężenia: <ol style="list-style-type: none"> mocznika, kreatyniny, bilirubiny – w surowicy; oznaczenie aktywności: <ol style="list-style-type: none"> transaminaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) – w surowicy; próba ciążowa – u kobiet w okresie prokreacyjnym; badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań klinicznych; badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu w przypadku wskazań klinicznych w celu wykluczenia przerzutów; badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy; EKG; inne badania w razie wskazań klinicznych. <p>Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą</p>
--	---	---

- 2) progresja choroby w trakcie leczenia;
- 3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub większym od 3 według klasyfikacji WHO;
- 4) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 lub 4 według klasyfikacji Zubroda-WHO.

2. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnych cetuksymab oraz panitumumab.

2.1 Kryteria kwalifikacji:

- 1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego;
- 2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
- 3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
- 4) udokumentowana nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu oraz oksaliplatyny (wszystkie wymienione leki muszą być zastosowane łącznie lub sekwencyjnie);
- 5) niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem leków anti-EGFR;
- 6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST;
- 7) stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO;
- 8) wiek powyżej 18 roku życia;
- 9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
 - a) liczba płytek krwi większa lub równa $1,5 \times 10^5/\text{mm}^3$,
 - b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa $1500/\text{mm}^3$,
 - c) stężenie hemoglobiny większe lub równe $10,0 \text{ g/dl}$;
- 10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:
 - a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
 - b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
 - c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej

obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.

3. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia bewacyzumabem:

- 1) morfologia krwi z rozmazem;
- 2) oznaczenie stężenia:
 - a) kreatyniny,
 - b) bilirubiny– w surowicy;
- 3) oznaczenie aktywności:
 - a) transaminaz (AspAT, AlAT),
 - b) fosfatazy alkalicznej– w surowicy;
- 4) badanie ogólne moczu;
- 5) pomiar ciśnienia tętniczego;
- 6) inne badanie w razie wskazań klinicznych.

Badania wykonuje się co 2 tygodnie lub przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii jeżeli podanie leku było opóźnione.

4. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia cetuksymabem lub panitumumabem:

- 1) morfologia krwi z rozmazem;
- 2) oznaczenie stężenia:
 - a) kreatyniny,
 - b) bilirubiny– w surowicy;
- 3) oznaczenie aktywności:
 - a) transaminaz (AspAT, AlAT),
 - b) fosfatazy alkalicznej– w surowicy;
- 4) ocena powikłań skórnych;
- 5) inne badanie w razie wskazań klinicznych.

Badania wykonuje się:

- 1) co tydzień – w przypadku leczenia cetuksymabem;

granicy normy;

- 11) potwierdzenie prawidłowego stanu genu KRAS (wykluczenie mutacji w kodonach 12 oraz 13 eksonu 1) oraz obecności białka EGFR w co najmniej 1% komórek nowotworowych;
- 12) nieobecność przerzutów w mózgu (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego);
- 13) wykluczenie ciąży;
- 14) nieobecność przeciwwskazań do zastosowania cetuksymabu lub panitumumabu, którymi są:
 - a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc,
 - b) alergia na lek lub każdą substancję pomocniczą.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

2.2 Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.

2.3 Kryteria wyłączenia z programu:

- 1) objawy nadwrażliwości na cetuksymab lub panitumumab;
- 2) progresja choroby w trakcie leczenia;
- 3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub większym od 3 według klasyfikacji WHO;
- 4) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc;
- 5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 lub 4 według klasyfikacji Zubroda-WHO.

- 2) co 2 tygodnie lub przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii jeżeli podanie leku było opóźnione – w przypadku leczenia panitumumabem.

5. Monitorowanie skuteczności leczenia bewacyzumabem, cetuksymabem lub panitumumabem:

- 1) badanie tomografii komputerowej odpowiednich obszarów ciała w zależności od wskazań klinicznych;
- 2) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy;
- 3) inne badania w razie wskazań klinicznych.

Badania wykonuje się:

- 1) nie rzadziej niż co 12 tygodni;
- 2) w chwili wyłączenia z programu, o ile nastąpiło z innych przyczyn niż udokumentowana progresja choroby;
- 3) zawsze w przypadku wskazań klinicznych.

Oceny skuteczności leczenia dokonuje się zgodnie z kryteriami RECIST.

LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO (ICD-10 C 22.0)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne lub cytologiczne rozpoznanie raka wątrobokomórkowego; 2) brak możliwości zastosowania leczenia miejscowego lub jego nieskuteczność; 3) stan sprawności 0-1 według WHO; 4) czynnościowy stan wątroby w kategorii A na podstawie oceny według klasyfikacji Child-Pugh; 5) nieobecność przerzutów poza wątrobą; 6) obecność przynajmniej jednej zmiany mierzalnej, zgodnie z kryteriami RECIST; 7) wskaźniki morfologii krwi: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie hemoglobiny większe lub równe 8,5 g/dl, b) liczba granulocytów większa lub równa $1,0 \times 10^9/l$, c) liczba płytek większa lub równa $60 \times 10^9/l$; 8) wskaźniki czynności nerek - stężenie kreatyniny mniejsze lub równe 1,5-krotności górnej granicy normy; 9) wskaźniki czynności wątroby: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie bilirubiny mniejsze lub równe 3 mg/dl, b) stężenie AspAT i AlAT mniejsze lub równe 5-krotności górnej granicy normy, c) stężenie albumin większe lub równe 3 g/dl, d) INR mniejsze lub równe 2,3 lub czas protrombinowy przedłużony o maksymalnie 6 sekund powyżej górnej granicy normy; 10) niestosowanie w przeszłości farmakologicznego leczenia przeciwnowotworowego z powodu raka wątrobokomórkowego; 11) u kobiet w wieku rozrodczym wykluczenie ciąży na podstawie testu ciążowego. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sorafenib jest stosowany w dobowej dawce 800 mg (2 razy dziennie po 2 tabletki zawierające 200 mg) bez przerw. 2. W przypadkach wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się nasilenia tych objawów oraz należy rozważyć zmniejszenie dobowej dawki sorafenibu do 400 mg dziennie (2 tabletki po 200 mg raz dziennie). 3. Jeżeli istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w okresie 4 tygodni pomimo przerywania podawania leku, należy zakończyć leczenie. 4. Jeżeli pomimo zmniejszenia dawki do 400 mg dziennie istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, należy zredukować dawkę leku do 400 mg podawanych co drugi dzień. 5. Dalsze redukcje dawki leku nie są możliwe - ponowne pojawienie się istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych nakazuje zakończenie leczenia. 	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia sorafenibem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne lub cytologiczne potwierdzenie raka wątrobokomórkowego; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenie stężenia mocznika, kreatyniny, AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny, wapnia, białka, glukozy, albumin, AFP w surowicy; 4) oznaczenie antygenu HBS oraz przeciwciał anti-HCV w surowicy; 5) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego; 6) tomografia komputerowa jamy brzusznej i klatki piersiowej (w celu wykluczenia przerzutów pozawatrobowych); 7) RTG klatki piersiowej; 8) EKG; 9) próba ciążowa (u kobiet w wieku rozrodczym); 10) pomiar ciśnienia tętniczego. <p>Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) co 4 tygodnie (lub w chwili rozpoczynania kolejnego 28-dniowego kursu jeżeli leczenie było czasowo przerwane): <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem, b) oznaczenie stężenia kreatyniny, AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny w surowicy,

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu:

- 1) brak rozpoznania mikroskopowego raka wątrobowokomórkowego;
- 2) przebyta chemioterapia lub innego rodzaju farmakologiczne leczenie z powodu raka wątrobowokomórkowego;
- 3) możliwość zastosowania leczenia miejscowego raka wątrobowokomórkowego;
- 4) nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze;
- 5) stan sprawności 2-4 według WHO;
- 6) obecność przerzutów poza wątrobą;
- 7) niekontrolowane nadciśnienie tętnicze;
- 8) obecność istotnych schorzeń współistniejących;
- 9) uszkodzenie szpiku kostnego, nerek lub wątroby (brak spełnienia laboratoryjnych kryteriów włączenia do programu);
- 10) utrzymująca się przed włączeniem do programu toksyczność powyżej 3 według WHO;
- 11) ciąża lub karmienie piersią;
- 12) brak zgody na stosowanie efektywnej antykoncepcji (u mężczyzn lub u kobiet w okresie prokreacyjnym).

3. Określenie czasu leczenia w programie:

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w ust. 4.

4. Kryteria wyłączenia z programu:

- 1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sorafenib lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
- 2) obiektywna progresja choroby w trakcie stosowania leku;
- 3) wystąpienie działań niepożądanych uniemożliwiających kontynuację leczenia, w tym istotnego pogorszenia stanu sprawności ogólnej;
- 4) istotne, w ocenie lekarza prowadzącego, pogorszenie jakości życia świadczeniobiorcy;
- 5) rezygnacja świadczeniobiorcy.

- c) pomiar ciśnienia tętniczego,
 - d) inne - w razie wskazań klinicznych;
- 2) nie rzadziej niż co 12 tygodni (lub przed zakończeniem co trzeciego 28-dniowego kursu jeżeli leczenie było czasowo przerwane):
- a) oznaczenie poziomu AFP w surowicy,
 - b) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego,
 - c) tomografia komputerowa jamy brzusznej,
 - d) RTG klatki piersiowej,
 - e) EKG,
 - f) inne badania – w razie wskazań klinicznych;
- 3) zawsze w przypadku wskazań klinicznych:
- a) oznaczenie poziomu AFP w surowicy,
 - b) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego,
 - c) tomografia komputerowa jamy brzusznej,
 - d) RTG klatki piersiowej,
 - e) EKG.

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (ICD-10 C-34)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1	2	3
<p>1. Kryteria kwalifikacji 1.1 Pierwsza linia leczenia 1.1.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej pemetreksedu: 1) rozpoznanie gruczolakoraka, wielkomórkowego raka płuca lub nowotworu z przewagą wymienionych typów histologicznych; 2) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 3) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia; 4) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania; 5) wiek powyżej 18 roku życia; 6) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG; 7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich stosowania; 8) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia</p>	<p>1. Pemetrekse 1.1 Zalecana dawka wynosi 500 mg/m² powierzchni ciała. 1.2 Podanie leku obejmuje 10-minutowy wlew dożylny w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. 1.3 W dniu poprzedzającym zastosowanie pemetreksedu oraz w dniu zastosowania leku i w dniu następnym należy stosować lek z grupy kortykosteroidów w dawce równoważnej 4 mg deksametazonu podawanego doustnie 2 razy na dobę. 1.4 W celu ograniczenia objawów toksyczności pacjenci otrzymujący pemetrekse</p> <p>powinni również otrzymywać suplementację witaminową: 1) kwas foliowy lub produkt multiwitaminowy zawierający ten związek: a) codziennie, przez cały cykl leczenia i przez 21 dni po podaniu ostatniej dawki pemetreksedu w dawce od 350 do 1000 mikrogramów doustnie, b) w ciągu 7 dni poprzedzających zastosowanie pierwszej dawki pemetreksedu - co najmniej 5 dawek kwasu foliowego w ilości od 350 do 1000 mikrogramów doustnie; 2) witamina B12: a) w tygodniu poprzedzającym pierwszą dawkę pemetreksedu - 1000 mikrogramów domięśniowo, b) co 3 cykle leczenia, tj. co 9 tygodni - 1000 mikrogramów domięśniowo w dniu zastosowania pemetreksedu. 1.5 Stosowanie pemetreksedu w ramach pierwszej linii leczenia obejmuje wyłącznie schemat z cisplatyną podawaną</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 1.1 Pemetrekse w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej linii leczenia: 1) histologiczne potwierdzenie określonego typu niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami włączenia; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenia stężenia kreatyniny; 4) oznaczenie stężenia bilirubiny; 5) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 6) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 7) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej; 8) test ciążyowy u kobiet w wieku rozrodczym; 9) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny; 10) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>1.2 Gefitynib w pierwszej linii leczenia: 1) histologiczne potwierdzenie określonego typu niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami włączenia; 2) ocena obecności mutacji genu EGFR w eksonie 19 lub 21;</p>

<p>rytmu wymagające leczenia);</p> <p>9) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego:</p> <p>a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³,</p> <p>b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>10) prawidłowa czynność nerek:</p> <p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;</p> <p>11) prawidłowa czynność wątroby:</p> <p>a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;</p> <p>12) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego);</p> <p>13) brak przeciwwskazań do stosowania cisplatyny (lek stosowany w skojarzeniu z pemetreksedem);</p> <p>14) brak przeciwwskazań do stosowania deksametazonu, kwasu foliowego i witaminy B12.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.1.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej gefitynib:</p> <p>1) rozpoznanie gruczolaka lub nowotworu z przewagą wymienionego typu histologicznego;</p> <p>2) potwierdzona mutacja genu EGFR w eksonie 19 lub 21;</p> <p>3) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV;</p> <p>4) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;</p> <p>5) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;</p>	<p>w dawce 75 mg/m², w 2-godzinny wlew, 30 minut po zakończeniu podawania pemetreksedu, w pierwszym dniu każdego cyklu co 21 dni.</p> <p>2. Docetaksel</p> <p>2.1 Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m² powierzchni ciała.</p> <p>2.2 Podanie leku obejmuje 60-minutowy wlew dożylny w pierwszym dniu 21-dniowego cyklu leczenia.</p> <p>2.3 Premedykacja składa się z zastosowania doustnie deksametazonu w dobowej dawce 16 mg przez 3 dni, począwszy od dnia poprzedzającego rozpoczęcie stosowania docetakselu.</p> <p>3. Gefitynib</p> <p>3.1 Zalecana dawka dobową gefitynibu wynosi 250 mg (1 tabletkę) i powinna być przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku, codziennie o tej samej porze dnia.</p> <p>3.2 Każdy cykl leczenia obejmuje 28 dni - 28 tabletek.</p> <p>4. Erlotynib</p> <p>4.1 Zalecana dawka dobową erlotynibu wynosi 150 mg (1 tabletkę) i powinna być przyjmowana przynajmniej 60 minut przed posiłkiem lub przynajmniej 120 minut po posiłku.</p> <p>4.2 Każdy cykl leczenia obejmuje 30 dni – 30 tabletek.</p> <p>4.3. Jeżeli konieczna jest modyfikacja dawki, należy ją zmniejszać stopniowo po 50 mg.</p> <p>W przypadku jednoczesnego stosowania substratów i leków wpływających na CYP3A4 lub w przypadkach wystąpienia działań niepożądanych może być konieczna modyfikacja dawki (zgodnie z zapisami Charakterystyki Produktu Leczniczego).</p>	<p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) oznaczenia stężenia kreatyniny;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;</p> <p>9) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>10) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>11) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>1.3 Erlotynib w pierwszej i drugiej linii leczenia:</p> <p>1) histologiczne lub cytologiczne potwierdzenie określonego typu niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami włączenia;</p> <p>2) ocena obecności aktywującej mutacji genu EGFR;</p> <p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) oznaczenia stężenia kreatyniny;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;</p> <p>9) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>10) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>11) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji</p>
--	--	--

<p>6) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich stosowania;</p> <p>7) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>8) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>9) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);</p> <p>10) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego:</p> <p>a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³,</p> <p>b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>11) prawidłowa czynność nerek:</p> <p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;</p> <p>12) prawidłowa czynność wątroby:</p> <p>a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;</p> <p>13) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego);</p> <p>14) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p>		<p>klinicznej.</p> <p>2. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia Pemetreksed w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej linii leczenia:</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) oznaczenie stężenia kreatyniny - jedynie w przypadku leczenia pemetreksedem.</p> <p>Badania wykonywane są przed każdym podaniem leku.</p> <p>3. Monitorowanie skuteczności leczenia:</p> <p>3.1 Pemetreksed w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej linii leczenia:</p> <p>1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>Badania wykonywane są po 2, 4 i 6 cyklu leczenia (w przypadku kontynuacji do 6 cykli).</p> <p>3.2 Gefitynib w pierwszej linii leczenia:</p> <p>1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>Badania wykonywane są co 2 cykle leczenia.</p> <p>3.3 Erlotynib w pierwszej i drugiej linii leczenia:</p>
--	--	---

1.1.3 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej erlotynib:

- 1) rozpoznanie gruczolakoraka lub nowotworu z przewagą wymienionego typu histologicznego;
- 2) zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);
- 3) brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia (obecność przerzutów) lub miejscowego zaawansowania;
- 4) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;
- 5) w przypadku pojedynczej zmiany – umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;
- 6) potwierdzona mutacja aktywująca genu EGFR w komórkach raka;
- 7) zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według kryteriów RECIST 1.1;
- 8) wiek powyżej 18 roku życia;
- 9) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;
- 10) nieobecność istotnych klinicznie chorób współwystępujących, w szczególności niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia;
- 11) brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz bez objawów neurologicznych i bez konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
- 12) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego umożliwiające leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego
- 13) prawidłowa czynność nerek:

- 1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;
- 2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia – USG, rezonans magnetyczny– MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.
- 3) badanie czynności wątroby (aminotransferazy i bilirubina).
Badania wykonywane są co 2 cykle leczenia.

<p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, b) klirens kreatyniny większy lub równy 45ml/min; 14) prawidłowa czynność wątroby: a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie; 15) brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 16) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Druga linia leczenia</p> <p>1.2.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej pemetrekseid albo substancji czynnej docetaksel:</p> <p>1) rozpoznanie gruczolakoraka, wielkokomórkowego raka płuca lub nowotworu z przewagą wymienionych typów histologicznych w przypadku stosowania pemetrekseidu albo rozpoznanie niedrobnokomórkowego raka płuca (każdy typ histologiczny) w przypadku stosowania docetakselu; 2) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 3) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia; 4) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania; 5) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich</p>		
--	--	--

<p>stosowania;</p> <p>6) wcześniejsze zastosowanie wielolekowej chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (w przypadku pacjentów w wieku powyżej 70 roku życia - wcześniejsza monoterapia lekiem innym niż pochodna platyny);</p> <p>7) potwierdzenie odpowiedzi na leczenie lub stabilizacji choroby po zastosowaniu wcześniejszej chemioterapii (czas trwania odpowiedzi na leczenie lub stabilizacji choroby musi wynosić co najmniej 3 miesiące);</p> <p>8) progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii obejmującej co najmniej jedną linię leczenia;</p> <p>9) nieobecność działań niepożądanych po wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem wyłysienia;</p> <p>10) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>11) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>12) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);</p> <p>13) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego:</p> <p>a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³,</p> <p>b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>14) prawidłowa czynność nerek:</p> <p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;</p> <p>15) prawidłowa czynność wątroby:</p> <p>a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;</p>		
---	--	--

<p>16) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego);</p> <p>17) brak przeciwwskazań do stosowania deksametazonu oraz - w przypadku pemetreksedu - kwasu foliowego i witaminy B12.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej erlotynib:</p> <ol style="list-style-type: none">1) rozpoznanie gruczolaka lub nowotworu z przewagą wymienionego typu histologicznego;2) zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);3) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;4) w przypadku pojedynczej zmiany – umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;5) potwierdzona mutacja aktywująca genu EGFR w komórkach raka;6) zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według RECIST 1.1;4) wiek powyżej 18 roku życia;5) nieobecność istotnych klinicznie chorób współistniejących, w szczególności niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia;6) progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii obejmującej co najmniej jedną linię leczenia;7) wcześniejsze zastosowanie wielolekowej chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (w przypadku chorych powyżej 70. roku życia – wcześniejsza monoterapia);8) okres od zakończenia wcześniejszej chemioterapii co		
---	--	--

<p>najmniej 3-4 tygodnie;</p> <p>9) nieobecność działań niepożądanych po wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem wyłysienia;</p> <p>10) brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz bez objawów neurologicznych i bez konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;</p> <p>11) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>12) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego umożliwiające leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego</p> <p>13) prawidłowa czynność nerek:</p> <p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) klirens kreatyniny większy lub równy 45ml/min;</p> <p>14) prawidłowa czynność wątroby:</p> <p>a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;</p> <p>15) brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego;</p> <p>16) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie:</p> <p>1) z zasadami terapii określonymi w ust. 2.1 i 2.2 oraz</p> <p>2) z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w ust. 3.</p>		
---	--	--

2.1 Pemetreksed, docetaksel

2.1.1 Stosowanie pemetreksedu w ramach pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetakselu w ramach drugiej linii leczenia obejmuje:

- 1) 4 cykle - w sytuacjach innych niż opisane w pkt 2;
- 2) 6 cykli - w przypadku stwierdzenia:
 - a) odpowiedzi całkowitej lub
 - b) odpowiedzi częściowej, lub
 - c) odpowiedzi większego stopnia, tj. odpowiedzi całkowitej po wcześniejszej odpowiedzi częściowej lub odpowiedzi częściowej po wcześniejszej stabilizacji choroby w kolejnych badaniach po drugim oraz czwartym cyklu leczenia.

2.1.2 Stosowanie pemetreksedu lub docetakselu może być krótsze w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

2.1.3 W czasie leczenia konieczne jest trzykrotne wykonanie badań obrazowych (dodatkowe badania obrazowe wykonuje się w zależności od sytuacji klinicznej):

- 1) przed leczeniem - nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej dawki leku;
- 2) w połowie leczenia - po drugim cyklu;
- 3) po zakończeniu leczenia - po czwartym cyklu oraz nie później niż 28 dni po podaniu ostatniej dawki leku.

2.1.4 W przypadku uzyskania odpowiedzi na leczenie i kontynuacji chemioterapii do 6 cykli należy wykonać dodatkowe badania obrazowe po szóstym cyklu oraz nie później niż 28 dni po podaniu ostatniej dawki leku.

2.1.5 Badania obrazowe obejmują ocenę:

- 1) zmiany pierwotnej:
 - a) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub
 - b) badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany

<p>dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) zmian przerzutowych - w zależności od sytuacji klinicznej i lokalizacji badanie tomografii komputerowej lub inne badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny, scyntygrafia i inne) pozwalające na pomiar zmian mierzalnych.</p> <p>2.1.6 Jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje (stan po resekcji płuca, nowotwór płuca bez ogniska pierwotnego), konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian niemierzalnych.</p> <p>2.1.7 Ocenę wyniku leczenia (odpowieź) należy wykonywać według kryteriów skali RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).</p> <p>2.1.8 Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest wykonanie badania morfologii krwi i badań biochemicznych, a przed kolejnymi cyklami leczenia należy powtarzać badanie morfologii krwi.</p> <p>2.2 Gefitynib, erlotynib</p> <p>2.2.1 Stosowanie gefitynibu w ramach pierwszej linii leczenia oraz erlotynibu w ramach pierwszej i drugiej linii leczenia jest prowadzone do stwierdzenia progresji choroby lub wystąpienia poważnych działań niepożądanych.</p> <p>2.2.2 W czasie leczenia konieczne jest wykonywanie badań obrazowych (dodatkowe badania obrazowe wykonuje się w zależności od sytuacji klinicznej):</p> <p>1) przed leczeniem - nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>2) w czasie leczenia - co 2 cykle leczenia - ważność badania - 14 dni;</p> <p>2.2.3 Badania obrazowe obejmują ocenę:</p> <p>1) zmiany pierwotnej:</p> <p>a) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z</p>		
---	--	--

<p>objęciem nadbrzusza lub</p> <p>b) badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) zmian przerzutowych - w zależności od sytuacji klinicznej i lokalizacji badanie tomografii komputerowej lub inne badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny, scyntygrafia i inne) pozwalające na pomiar zmian mierzalnych.</p> <p>Badania obrazowe w trakcie leczenia powinny obejmować ocenę zmian mierzalnych, które zostały opisane przed rozpoczęciem leczenia.</p> <p>2.2.4 Jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje (stan po resekcji płuca, nowotwór płuca bez ogniska pierwotnego), konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian niemierzalnych.</p> <p>2.2.5 Ocenę wyniku leczenia (odpowieź) należy wykonywać według kryteriów skali RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <p>1) progresja choroby:</p> <p>a) powiększenie się istniejących zmian o przynajmniej 20% lub</p> <p>b) pojawienie się przynajmniej jednej nowej zmiany - potwierdzona w badaniu przedmiotowym lub obrazowym;</p> <p>2) pogorszenie stanu pacjenta w związku z nowotworem bez progresji potwierdzonej w badaniu przedmiotowym lub obrazowym;</p> <p>3) toksyczność leczenia z wystąpieniem przynajmniej jednego niepożądanego działania będącego zagrożeniem życia według kryteriów CTC (Common Toxicity Criteria);</p> <p>4) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według kryteriów CTC (Common Toxicity</p>		
--	--	--

<p>Criteria);</p> <p>5) nadwrażliwość na lek lub na substancję pomocniczą;</p> <p>6) obniżenie sprawności do stopnia 3-4 (2, 3, 4 w przypadku stosowania erlotynibu) według kryteriów WHO lub ECOG;</p> <p>7) przerwa w przyjmowaniu erlotynibu dłuższa niż trzy tygodnie, która została spowodowana niepożądanym działaniem leczenia.</p> <p>7) pogorszenie jakości życia o istotnym znaczeniu według oceny lekarza;</p> <p>8) rezygnacja pacjenta - wycofanie zgody na udział w programie.</p>		
--	--	--

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO WŁÓKNIAKOMIĘSĄKA GUZOWATEGO SKÓRY (DFSP) (ICD-10 C 44, C 49)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1	2	3
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) potwierdzone histologicznie rozpoznanie zaawansowanego włóknakiomięsaka guzowatego skóry (dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP);</p> <p>2) udokumentowana obecność rearanżacji chromosomów 17 i 22 w zakresie genów COL1A1/PDGFβ;</p> <p>3) nowotwór w stadium nieresekcyjnym (w przypadku zmian miejscowo złośliwych) lub uogólnionym z obecnością zmian przerzutowych;</p> <p>4) w przypadku zmian ograniczonych do powłok - zmiany nowotworowe udokumentowane z pomocą fotografii z miarką;</p> <p>5) w przypadku zmian przerzutowych - zmiany nowotworowe mierzone w badaniu tomografii komputerowej;</p> <p>6) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>7) stan sprawności 0-2 według klasyfikacji WHO;</p> <p>8) prawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby i nerek;</p> <p>9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <p>a) liczba granulocytów obojętnochłonnych przed leczeniem większa od $1,5 \times 10^9/l$,</p> <p>b) liczba płytek krwi większa od $100 \times 10^9/l$,</p> <p>c) stężenie hemoglobiny większe od 8,5 g/dl.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2. Kryteria uniemożliwiające kwalifikację do programu</p> <p>1) nadwrażliwość na imatynib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;</p> <p>2) obecność istotnych chorób współistniejących lub niewydolności narządowej;</p> <p>3) stan sprawności 3 albo 4 wg WHO;</p> <p>4) ciąża.</p>	<p>1. Imatynib</p> <p>1.1 Dobowa dawka imatynibu wynosi 800 mg (w dwóch dawkach po 400 mg).</p> <p>1.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych dawkę leku można zmniejszyć do 600 mg lub 400 mg/dobę.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia imatynibem</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie rozpoznania zaawansowanego włóknakiomięsaka skóry;</p> <p>2) potwierdzenie rearanżacji chromosomów 17 i 22 w zakresie genów COL1A1/PDGFβ;</p> <p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) oznaczenie aktywności transaminaz wątrobowych;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;</p> <p>7) oznaczenie poziomu albumin;</p> <p>8) badanie ogólne moczu;</p> <p>9) wykonanie tzw. zdjęcia z miarką - w przypadku zmian nowotworowych ograniczonych jedynie do powłok (skóra i tkanka podskórna);</p> <p>10) badanie tomografii komputerowej z podwójnym kontrastem odpowiednich okolic ciała - w przypadku obecności przerzutów;</p> <p>11) RTG klatki piersiowej;</p> <p>12) badanie EKG;</p> <p>13) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym.</p> <p>2. Monitorowanie skuteczności leczenia</p> <p>1) badania wykonywane co 4-6 tygodni w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące:</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>b) oznaczenie aktywności transaminaz wątrobowych,</p> <p>c) oznaczenie stężenia bilirubiny,</p> <p>d) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej,</p> <p>e) oznaczenie poziomu albumin,</p>

3. Określenie czasu leczenia w programie

3.1 Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.2 i 3.3 oraz zgodnie z kryteriami zakończenia udziału w programie, określonymi w ust. 4.

3.2 Po co najmniej 14 tygodniach leczenia należy ocenić możliwość wykonania chirurgicznej resekcji wyjściowo nieoperacyjnego nowotworu.

3.3 Jeżeli w wyniku tej oceny podjęto próbę chirurgicznego leczenia i w badaniu histopatologicznym po zabiegu operacyjnym marginesy chirurgiczne zostaną ocenione jako wolne od nowotworu należy odstąpić od dalszego stosowania imatynibu.

4. Kryteria zakończenia udziału w programie

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na imatynib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;

2) progresja choroby w trakcie stosowania leku;

3) utrzymywanie się toksyczności w stopniu większym lub równym 3 wg skali WHO, w szczególności:

a) 3-krotny wzrost stężenia bilirubiny,

b) 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych,

c) ciężka niedokrwistość, neutropenia lub małopłytkowość;

4) pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 albo 4 według WHO.

f) badanie ogólne moczu;

2) badania wykonywane co 2 miesiące w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące:

a) wykonanie serii zdjęć z miarką w przypadku zmian nowotworowych ograniczonych jedynie do powłok (skóry i tkanki podskórnej),

b) badanie tomografii komputerowej z podwójnym kontrastem odpowiednich okolic ciała:

- w przypadku obecności przerzutów oraz

- w przypadku podejrzenia progresji choroby nowotworu pierwotnie ograniczonego jedynie do powłok;

3) badania wykonywane co 6 miesięcy - RTG klatki piersiowej.

Wykonane badania obrazowe muszą umożliwić obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie. Ocena odpowiedzi na leczenie powinna być przeprowadzana zgodnie z kryteriami RECIST.

LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH (ICD-10 C 48, C 49)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1	2	3
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznanie zaawansowanego miejscowo (nieresekcyjnego) lub przerzutowego mięsaka o typie histologicznym tłuszczakomięsaka (liposarcoma) lub mięsaka gładkokomórkowego (leiomyosarcoma);</p> <p>2) stopień sprawności 0-1 według klasyfikacji WHO;</p> <p>3) należna masa ciała (dopuszczalny ubytek masy ciała mniejszy niż 10% wartości należnej);</p> <p>4) niewystępowanie poważnych chorób współistniejących o istotnym znaczeniu dla zastosowania chemioterapii;</p> <p>5) możliwość przeprowadzenia obiektywnej oceny odpowiedzi na leczenie według kryteriów klasyfikacji RECIST;</p> <p>6) liczba granulocytów obojętnochłonnych (ANC) większa lub równa 1500/mm³;</p> <p>7) liczba płytek krwi większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>8) stężenie bilirubiny nieprzekraczające górnej granicy normy;</p> <p>9) aktywność fosfatazy zasadowej mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej granicy normy (jeżeli podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego, należy brać pod uwagę izoenzymy wątrobowe 5-nukleotyduazy lub GGT);</p> <p>10) poziom albuminy większy lub równy 25 g/l;</p> <p>11) aktywność aminotransferazy alaninowej (AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej granicy normy;</p> <p>12) klirens kreatyniny większy lub równy 30 ml/min w przypadku monoterapii;</p> <p>13) stężenie kreatyniny w surowicy mniejsze lub równe 1,5 mg/dl (132,6 μmol/l) lub klirens kreatyniny większy lub równy 60 ml/min w przypadku terapii skojarzonej;</p> <p>14) poziom kinazy kreatynowej mniejszy lub równy 2,5-krotności górnej granicy normy;</p> <p>15) stężenie hemoglobiny większe lub równe 9 g/dl;</p>	<p>1. Trabectedyna</p> <p>1.1 Zalecana dawka trabectedyny wynosi 1,5 mg/m² powierzchni ciała.</p> <p>1.2 Podanie leku obejmuje wlew dożylny trwający 24 godziny. Lek podaje się przez cewnik w żyłę centralnej.</p> <p>1.3 Przerwa pomiędzy cyklami leczenia wynosi 3 tygodnie.</p> <p>1.4 W ramach premedykacji należy zastosować kortykosteroidy.</p> <p>1.5 Przed podaniem drugiej i kolejnych dawek leku muszą być spełnione łącznie następujące kryteria dotyczące parametrów biochemicznych:</p> <p>1) liczba granulocytów obojętnochłonnych (ANC) większa lub równa 1500/mm³;</p> <p>2) liczba płytek krwi większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>3) stężenie bilirubiny nieprzekraczające górnej granicy normy;</p> <p>4) aktywność fosfatazy zasadowej mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej granicy normy (jeżeli podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego, należy brać pod uwagę izoenzymy wątrobowe 5-nukleotyduazy lub GGT);</p> <p>5) poziom albuminy większy lub równy 25 g/l;</p> <p>6) aktywność aminotransferazy alaninowej (AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie określonego typu mięsaka zgodnie z kryteriami włączenia - w przypadku diagnostyki mięsaka gładkokomórkowego konieczne wykonanie immunohistochemicznego oznaczenia desminy;</p> <p>2) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>3) oznaczenie stężenia hemoglobiny;</p> <p>4) oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej (w tym 5-nukleotyduazy lub GGT, w przypadku gdy podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego);</p> <p>9) oznaczenie poziomu albumin w surowicy;</p> <p>10) oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej;</p> <p>11) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>12) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego odpowiednich okolic ciała.</p> <p>2. Monitorowanie skuteczności leczenia</p> <p>2.1 Badania biochemiczne:</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) oznaczenie stężenia hemoglobiny;</p>

<p>16) udokumentowana progresja choroby podczas przynajmniej jednej linii chemioterapii z udziałem doksorubicyny lub ifosfamidu zastosowanej z powodu zaawansowanego miejscowo (nieresekcyjnego) lub przerzutowego mięsaka o typie histologicznym tłuszczakomięsaka (liposarcoma) lub mięsaka gładkokomórkowego (leiomyosarcoma);</p> <p>17) zastosowanie nie więcej niż 3 linii wcześniejszej chemioterapii.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nadwrażliwość na trabektedynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 2) współistniejące poważne lub niekontrolowane zakażenie; 3) wystąpienie poważnej, nawracającej i trudno odwracalnej toksyczności (stopień 3-4) podczas wcześniejszej chemioterapii; 4) ciąża lub karmienie piersią; 5) jednoczesne podanie szczepionki przeciwko żółtej febrze. <p>3. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w ust. 4.</p> <p>4. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) progresja choroby - oceniania zgodnie z kryteriami RECIST; 2) działania niepożądane powyżej 2 stopnia według WHO (z wyłączeniem przejściowych objawów typowych dla leczenia trabektedyną); 3) niespełnienie kryteriów wymaganych przy podaniu kolejnej dawki leku; 4) rezygnacja pacjenta. 	<p>granicy normy;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) klirens kreatyniny większy lub równy 30 ml/min w przypadku monoterapii; 8) stężenie kreatyniny w surowicy mniejsze lub równe 1,5 mg/dl (132,6 μmol/l) lub klirens kreatyniny większy lub równy 60 ml/min w przypadku terapii skojarzonej; 9) poziom kinazy kreatynowej mniejszy lub równy 2,5-krotności górnej granicy normy; 10) stężenie hemoglobiny większe lub równe 9 g/dl. <p>1.6 W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w ust. 1.5 należy opóźnić podanie trabektedyny aż do osiągnięcia przez parametry biochemiczne wymaganych wartości.</p> <p>1.7 Opóźnienie podania drugiej i kolejnych dawek leku nie może wynosić więcej niż 3 tygodnie.</p> <p>Brak spełniania w tym okresie kryteriów określonych w ust. 1.5 nakazuje zakończenie udziału w programie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3) oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny; 4) oznaczenie stężenia bilirubiny; 5) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 6) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 7) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej (w tym 5-nukleotydu lub GGT, w przypadku gdy podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego); 8) oznaczenie poziomu albumin w surowicy; 9) oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej. <p>Badania należy wykonywać raz w tygodniu podczas dwóch pierwszych cykli leczenia oraz co najmniej raz między zastosowaniem leku w kolejnych cyklach leczenia.</p> <p>2.2 Badania obrazowe</p> <p>Badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego odpowiednich okolic ciała - wykonywane co 7-9 tygodni oraz nie rzadziej niż co 3 cykle terapii.</p> <p>Odpowiedź na leczenie należy oceniać zgodnie z kryteriami RECIST.</p>
---	---	--

LECZENIE RAKA PIERSI (ICD-10 C 50)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 1.1 Kryteria kwalifikacji 1) histologiczne rozpoznanie raka piersi; 2) nadekspresja receptora HER2 w komórkach raka (wynik /3+/ w badaniu IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik +/- w badaniu FISH lub CISH); 3) nowotwór pierwotnie operacyjny (wyjściowy stopień zaawansowania (IC - T1c N0, II - T0-2 N0-1 lub IIIA - T3 N1); 4) zaawansowanie umożliwiające leczenie chirurgiczne po zastosowaniu wstępnej chemioterapii i uzyskaniu możliwości chirurgicznego leczenia o założeniu doszczętnym w stopniu IIIA (T0-3 N2); 5) leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym polegające na: a) amputacji piersi oraz wycięciu pachowych węzłów chłonnych, b) wycięciu guza z marginesem tkanek prawidłowych oraz pachowych węzłów chłonnych z uzupełnianą radioterapią całej piersi (leczenie oszczędzające); 6) czynniki ryzyka nawrotu raka wykazane na podstawie histologicznego badania materiału pooperacyjnego obejmujące: a) obecność przerzutów w pachowych węzłach chłonnych dołu pachowego (cecha pN+) lub b) największą średnicę guza powyżej 1,0 cm w przypadku nieobecności przerzutów w pachowych węzłach chłonnych (cecha pN0); 7) wydolność serca wykazana na podstawie oceny klinicznej i badania ECHO lub MUGA (przed rozpoczęciem stosowania trastuzumabu) z frakcją wyrzutu lewej komory serca wynoszącą przynajmniej 50%; 8) wykluczenie ciąży.</p> <p>2. Leczenie przerzutowego raka piersi trastuzumabem albo lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną 2.1 Kryteria kwalifikacji 1) histologiczne rozpoznanie raka piersi z przerzutami (IV stopień) - (dla</p>	<p>1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem Początkowa dawka nasycająca wynosi 8 mg/kg masy ciała, a następnie 6 mg/kg po 3 tygodniach, po czym 6 mg/kg powtarzane w 3 tygodniowych odstępach, podawane we wlewie przez około 90 minut. Jeżeli podanie leku z jakichś powodów spóźniło się o 7 dni lub mniej, należy podać jak najszybciej zwykłą dawkę leku (6 mg/kg) (nie czekając do następnego planowanego cyklu), a następnie należy podawać dawki podtrzymujące 6 mg/kg co 3 tygodnie, zgodnie z uprzednim planem leczenia. Jeżeli podanie leku opóźniło się o więcej niż 7 dni, wtedy należy ponownie podać dawkę nasycającą (8 mg/kg przez około 90 minut), a następnie podawać kolejne podtrzymujące dawki leku (6 mg/kg) co 3 tygodnie od tego momentu. Świadczeniobiorców z wczesnym rakiem piersi należy leczyć przez 1 rok lub do momentu nawrotu choroby. Lek podaje się w 90-minutowym wlewie dożylnym. Świadczeniobiorcy powinni być obserwowani przez co najmniej 6 godzin, od rozpoczęcia pierwszego wlewu i przez 2 godziny od rozpoczęcia kolejnych wlewów, pod kątem wystąpienia objawów takich jak: gorączka, dreszcze lub innych objawów związanych z wlewem dożylnym. Przerwanie wlewu może pomóc w kontrolowaniu tych objawów. Wlew może być wznowiony po zmniejszeniu nasilenia</p>	<p>1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 1.1 Wykaz badań przy kwalifikacji a) badanie immunohistochemiczne lub FISH lub CISH (ocena nadekspresji receptora HER2, obecność receptorów ER i PGR), b) morfologia krwi z rozmazem, c) poziom kreatyniny, d) poziom ALAT, e) poziom AspAT, f) stężenie bilirubiny, g) USG jamy brzusznej, h) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian), i) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej), j) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca), k) konsultacja kardiologiczna.</p> <p>1.2 Monitorowanie leczenia Badanie przeprowadzane co 3 tygodnie: a) morfologia krwi z rozmazem, b) poziom kreatyniny, c) poziom ALAT, d) poziom AspAT, e) stężenie bilirubiny, f) EKG. Badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca) przeprowadzane w 9, 18, 27, 36 i 45 tygodniu oraz następnie w przypadku kontynuacji leczenia co trzy</p>

<p>trastuzumabu i lapatynibu z kapecytabiną);</p> <p>2) udokumentowane niepowodzenie chemioterapii z użyciem antracyklin lub z przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin (dla trastuzumabu stosowanego w skojarzeniu z lekiem o działaniu cytotoksycznym);</p> <p>3) udokumentowane niepowodzenie leczenia z użyciem przynajmniej 2 schematów chemioterapii z użyciem antracyklin i taksanów (dla trastuzumabu stosowanego w monoterapii);</p> <p>4) udokumentowana progresja po uprzednim leczeniu trastuzumabem jest kryterium włączenia do leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną;</p> <p>5) udokumentowana nadekspresja receptora HER2 (wynik /3+/ w badaniu IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik +/- w badaniu FISH lub CISH);</p> <p>6) stan sprawności 0-2 wg WHO;</p> <p>7) prawidłowe wskaźniki czynności nerek;</p> <p>8) prawidłowe wskaźniki czynności wątroby (możliwość kwalifikowania chorych z umiarkowanym wzrostem aktywności transaminaz to znaczy do 3-krotnego wzrostu aktywności transaminaz w stosunku do wartości prawidłowych);</p> <p>9) prawidłowe wskaźniki czynności szpiku;</p> <p>10) wydolność serca wykazana na podstawie oceny klinicznej i badania ECHO lub MUGA (przed rozpoczęciem stosowania trastuzumabu) z frakcją wyrzutu lewej komory serca wynoszącą przynajmniej 50%;</p> <p>11) nieobecność nasilonej duszności spoczynkowej związanej z zaawansowanym nowotworem;</p> <p>12) wykluczenie ciąży.</p> <p>Nieuzasadnione jest włączanie do leczenia trastuzumabem w ramach leczenia przerzutowego raka piersi świadczeniobiorców, u których zastosowano ten lek w leczeniu adjuwantowym raka piersi.</p> <p>3. Wyłączenie z programu:</p> <p>1) Leczenie adjuwantowe raka piersi:</p> <p>a) rozpoznanie przewodowego raka przedinwazyjnego,</p> <p>b) zaawansowanie w stopniach I A oraz IIIB, IIIC i IV,</p> <p>c) progresja choroby w trakcie stosowania leku,</p> <p>d) niewydolność serca (klasa III lub IV według klasyfikacji NYHA),</p> <p>e) niestabilność hemodynamiczna w przebiegu choroby wieńcowej lub zastawkowej wady serca oraz nadciśnienia tętniczego i innych sytuacji klinicznych (np. wieloletnia lub niekontrolowana cukrzyca),</p> <p>f) frakcja wyrzutu lewej komory serca poniżej 50 % wykazana w badaniu</p>	<p>objawów. Jeżeli pierwsza dawka nasycająca była dobrze tolerowana, dawki kolejne mogą być podawane w 30-minutowym wlewie.</p> <p>Leczenie trastuzumabem powinno być prowadzone do czasu wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia niepożądanych działań o istotnym znaczeniu klinicznym.</p> <p>2. Leczenie przerzutowego raka piersi trastuzumabem</p> <p>Zalecana początkowa dawka nasycająca wynosi 4 mg/kg masy ciała.</p> <p>Następnie podaje się cotygodniową dawkę leku 2 mg/kg masy ciała, rozpoczynając po upływie tygodnia od podania dawki nasycającej.</p> <p>Alternatywnie zalecany jest niższy schemat dawek nasycającej i podtrzymującej w monoterapii i leczeniu skojarzonym z paklitakselem, docetakselem lub inhibitorem aromatazy:</p> <p>Początkowa dawka nasycająca 8 mg/kg masy ciała, a następnie 6 mg/kg po 3 tygodniach, po czym 6 mg/kg powtarzane w 3 tygodniowych odstępach, podawane we wlewie przez około 90 min.</p> <p>Leczenie trastuzumabem powinno być prowadzone do czasu wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia niepożądanych działań o istotnym znaczeniu klinicznym.</p> <p>3. Leczenie uogólnionego raka piersi lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną</p> <p>Zalecana dawka dobowego lapatynibu wynosi 1.250 mg (5 tabletek jednorazowo w ciągu doby - dawki dobowej nie należy dzielić). Leczenie lapatynibem należy prowadzić codziennie do wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia poważnych działań niepożądanych.</p> <p>Kapecytabinę w skojarzeniu z lapatynibem należy stosować w dobowej dawce 2.000mg/m²</p>	<p>podania trastuzumabu.</p> <p>2. Paliatywne leczenie raka piersi</p> <p>2.1 Wykaz badań przy kwalifikacji</p> <p>a) badanie immunohistochemiczne lub FISH (ocena nadekspresji receptora HER2, obecność receptorów ER i PGR),</p> <p>b) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>c) poziom kreatyniny,</p> <p>d) poziom ALAT,</p> <p>e) poziom AspAT,</p> <p>f) stężenie bilirubiny,</p> <p>g) USG jamy brzusznej,</p> <p>h) RTG - klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),</p> <p>i) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej),</p> <p>j) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca);</p> <p>k) konsultacja kardiologiczna</p> <p>2.2 Monitorowanie leczenia</p> <p>Badanie przeprowadzane co 3 tygodnie</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>b) poziom kreatyniny,</p> <p>c) poziom ALAT,</p> <p>d) poziom AspAT,</p> <p>e) stężenie bilirubiny.</p> <p>Badania przeprowadzane co trzy podania trastuzumabu:</p> <p>a) USG jamy brzusznej,</p> <p>b) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),</p> <p>c) badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca),</p> <p>d) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej),</p>
--	--	---

<p>ECHO lub MUGA,</p> <p>g) niewydolność oddechowa związana z innymi chorobami współistniejącymi,</p> <p>h) współistnienie innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy i podstawnokomórkowego raka skóry,</p> <p>i) okres ciąży i karmienia piersią,</p> <p>j) przeciwwskazania do stosowania trastuzumabu wynikające z nadwrażliwości na trastuzumab, białko mysie lub substancje pomocnicze.</p> <p>2) Leczenie przerzutowego raka piersi:</p> <p>a) wystąpienie objawów nadwrażliwości na lek podawany w programie,,</p> <p>b) toksyczność według WHO powyżej 3, zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku, objawów niewydolności krążenia,</p> <p>c) stan sprawności 3 - 4 według WHO,</p> <p>d) progresja choroby w trakcie stosowania leku:</p> <ul style="list-style-type: none">- wystąpienie nowych zmian nowotworowych lub- stwierdzenie progresji istniejących zmian - zwiększenie o przynajmniej 20% najmniejszego wymiaru istniejącej zmiany pojedynczej lub sumy najdłuższych wymiarów w przypadku mnogich zmian, <p>e) niewydolność krążenia i niewydolność wieńcowa oraz niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,</p> <p>f) ciąża.</p>	<p>powierzchni ciała (dwie dawki podzielone) w dniach 1- 14 w cyklach 21- dniowych.</p>	<p>e)EKG</p>
---	---	--------------

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1	2	3
<p>1. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sunitynib 1.1 Kryteria kwalifikacji 1) histologicznie potwierdzone rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym; 2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym); 3) brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki; 4) uprzednie wykonanie nefrektomii (radykałnej lub oszczędzającej); 5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych; 6) zmiany możliwe do obiektywnej oceny w badaniach obrazowych metodą komputerowej tomografii (KT) lub magnetycznego rezonansu (MR) z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej rentgenografii (RTG) lub MR; 7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (dopuszczalne wcześniejsze wycięcie przerzutów i /lub radioterapia, o ile po leczeniu utrzymuje się stan bezobjawowy); 8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego; 9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center); 10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią; 11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego skóry; 12) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi: a) wyniki badań czynności wątroby: - stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy</p>	<p>1. Sunitynib 1.1 Zalecana dawka sunitynibu wynosi 50 mg doustnie raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie, po czym następuje 14-dniowa przerwa, co stanowi pełny 6-tygodniowy cykl leczenia. 1.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się nasilenia wspomnianych objawów oraz w trakcie dalszego leczenia należy rozważyć redukcję dawki do 37,5 mg na dobę podawanej przez 4 kolejne tygodnie z następującą po tym okresie 14-dniową przerwą. 1.3 Jeżeli ciężkie objawy niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w ciągu 4 tygodni mimo przerwania podawania leku, to należy definitywnie zakończyć leczenie. 1.4 Jeżeli pomimo redukcji dawki do 37,5 mg na dobę istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, to należy zmniejszyć dawkę leku do 25 mg na dobę podawanej przez 4 kolejne tygodnie z następującą po tym okresie 14-dniową przerwą. 1.5 Ponowne pojawienie się istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych nakazuje zakończenie leczenia.</p> <p>2. Sorafenib 2.1 Sorafenib jest stosowany w dobowej dawce 800 mg (2 razy dziennie po 2 tabletki zawierające 200 mg) bez</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia sunitynibem, sorafenibem, pazopanibem ewerolimusem 1) histologiczne potwierdzenie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenie stężenia hemoglobiny; 4) oznaczenie stężenia mocznika; 5) oznaczenia stężenia kreatyniny; 6) oznaczenie stężenia bilirubiny; 7) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 8) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 9) oznaczenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH); 10) oznaczenie aktywności hormonu tyreotropowego (TSH) - dla sunitynibu, sorafenibu i pazopanibu; 11) oznaczenie skorygowanego stężenia wapnia w surowicy; 12) inne badania laboratoryjne w razie wskazań klinicznych; 13) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym; 14) badanie KT klatki piersiowej i jamy brzusznej; 15) badanie RTG klatki piersiowej- wyłącznie w przypadkach możliwości przeprowadzenia pomiaru</p>

<p>normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta), - aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, b) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy, c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: - liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/\text{mm}^3$, - bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/\text{mm}^3$, - poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; 13) czynność tarczycy prawidłowa lub wyrównana farmakologicznie; 14) nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu 1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sunitynib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 3) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO; 4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali Karnofsky'ego; 5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia; 6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku.</p> <p>2. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sorafenib</p> <p>2.1 Kryteria kwalifikacji 1) rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym potwierdzone badaniem histopatologicznym z materiału operacyjnego, biopsji guza nerki lub ogniska przerzutowego;</p>	<p>przerw.</p> <p>2.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się ich nasilenia oraz należy rozważyć zmniejszenie dobowej dawki sorafenibu do 400 mg dziennie (2 tabletki po 200 mg 1 raz dziennie).</p> <p>2.3 Jeżeli ciężkie działania niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w ciągu 4 tygodni mimo przerwania podawania leku, należy zakończyć leczenie.</p> <p>2.4 Jeżeli pomimo redukcji dawki do 400 mg dziennie istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, należy zredukować dawkę leku do 400 mg podawanych co drugi dzień.</p> <p>2.5 Ponowne pojawienie się istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych nakazuje zakończenie leczenia.</p> <p>3. Pazopanib 3.1 Zalecana dawka pazopanibu wynosi 800 mg doustnie raz na dobę 3.2 Modyfikacje dawki: w zależności od indywidualnej tolerancji leczenia, w celu opanowania działań niepożądanych, dawkę należy dostosowywać, zmieniając ją stopniowo, za każdym razem o 200 mg. Dawka pazopanibu nie powinna być większa niż 800 mg 3.3 Zaleca się, aby pacjenci z łagodnymi nieprawidłowościami parametrów czynności wątroby byli leczeni na początku dawką 800 mg pazopanibu raz na dobę. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest stosowanie zmniejszonej dawki 200 mg pazopanibu. Stosowanie pazopanibu nie jest zalecane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.</p>	<p>zmian chorobowych oraz oceny odpowiedzi na leczenie; 16) badanie KT lub MR mózgu - w przypadku osób z podejrzeniem przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego (tj. w przypadku objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz u osób po wcześniejszej resekcji przerzutów); 17) elektrokardiogram (EKG); 18) pomiar ciśnienia tętniczego; 19) inne badania obrazowe w razie wskazań klinicznych. Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>2. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) oznaczenie stężenia hemoglobiny-w przypadku leczenia sunitynibem, sorafenibem, pazopanibem i ewerolimusem 3) oznaczenia stężenia kreatyniny; 4) oznaczenie stężenia bilirubiny; 5) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 6) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 7) oznaczenie aktywności LDH; 8) oznaczenie aktywności fosfatazy alkalicznej. Badania wykonuje się: 1) co 6 tygodni - w przypadku leczenia sunitynibem; 2) co 4 tygodnie - w przypadku leczenia sorafenibem i pazopanibem; 3) co 4 tygodnie - w przypadku leczenia ewerolimusem.</p> <p>3. Monitorowanie skuteczności leczenia 1) badanie KT lub MR odpowiedniego obszaru; 2) badanie RTG klatki piersiowej - jeżeli nie jest wykonywane badanie KT;</p>
---	---	--

<p>2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);</p> <p>3) udokumentowane niepowodzenie wcześniejszej immunoterapii z zastosowaniem interferonu alfa lub udokumentowane przeciwwskazania do dalszego stosowania interferonu alfa;</p> <p>4) uprzednie wykonanie nefrektomii (radikalnej lub oszczędzającej);</p> <p>5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych;</p> <p>6) zmiany możliwe do obiektywnej oceny w badaniach obrazowych metodą KT lub MR z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej RTG lub MR;</p> <p>7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (dopuszczalne wcześniejsze wycięcie przerzutów i /lub radioterapia, o ile po leczeniu utrzymuje się stan bezobjawowy);</p> <p>8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego;</p> <p>9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center);</p> <p>10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;</p> <p>11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego skóry;</p> <p>12) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:</p> <p>a) wyniki badań czynności wątroby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta), - aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, <p>b) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/\text{mm}^3$, - bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/\text{mm}^3$, - poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; <p>13) czynność tarczycy prawidłowa lub wyrównana farmakologicznie;</p> <p>14) nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p>	<p>4. Ewerolimus</p> <p>4.1 Ewerolimus jest stosowany w dobowej dawce 10 mg (1 raz dziennie 2 tabletki zawierające 5 mg albo 1 raz dziennie 1 tabletką zawierającą 10 mg) bez przerw.</p> <p>4.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się ich nasilenia oraz należy rozważyć zmniejszenie dobowej dawki ewerolimusu do 5 mg dziennie (1 tabletką po 5 mg 1 raz dziennie).</p> <p>4.3 Jeżeli ciężkie działania niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w ciągu 4 tygodni mimo przerwania podawania leku, należy zakończyć leczenie.</p> <p>4.4 Jeżeli pomimo redukcji dawki do 5 mg dziennie istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, należy zakończyć leczenie.</p>	<p>3) EKG;</p> <p>4) inne badania obrazowe w razie wskazań klinicznych.</p> <p>Badania wykonuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nie rzadziej niż co 12 tygodni; 2) przed zakończeniem: <ol style="list-style-type: none"> a) co drugiego kursu leczenia - w przypadku sunitynibu, b) co trzeciego kursu leczenia - w przypadku sorafenibu i pazopanibu; c) co trzeciego kursu leczenia - w przypadku ewerolimusu; 3) w chwili wyłączenia z programu, o ile nie nastąpiło z powodu udokumentowanej progresji choroby. <p>Wykonane badania obrazowe muszą umożliwić obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie. Ocena odpowiedzi na leczenie powinna być przeprowadzana zgodnie z kryteriami RECIST lub CHOI</p> <p>4. Monitorowanie programu</p> <p>Dane dotyczące monitorowania leczenia należy gromadzić w dokumentacji pacjenta i każdorazowo przedstawiać na żądanie kontrolerom NFZ.</p> <p>a) przekazywanie do NFZ zakresu informacji sprawozdawczo – rozliczeniowych,</p> <p>b) uzupełnianie danych zawartych w rejestrze Raka nerki (SMPT-Rak nerki), dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez oddziały wojewódzkie NFZ, nie rzadziej niż co 3 miesiące oraz na zakończenie leczenia.</p>
--	---	--

<p>2.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>2.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none">1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sorefenib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;3) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO;4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali Karnofsky'ego;5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia;6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku. <p>3. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej pazopanib</p> <p>3.1 Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none">1) histologicznie potwierdzone rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym;2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);3) brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki lub wcześniejsze leczenie z zastosowaniem cytokin (udokumentowane niepowodzenie wcześniejszej immunoterapii z zastosowaniem interferonu-α (IFN-α) lub przeciwwskazania do dalszego stosowania IFN-α)4) uprzednie wykonanie nefrektomii (radykałnej lub oszczędzającej);5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych;6) możliwa obiektywna ocena w badaniach obrazowych metodą komputerowej tomografii (KT) lub magnetycznego rezonansu (MR) z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej rentgenografii (RTG) lub MR;7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym		
---	--	--

<p>(dopuszczalne wcześniejsze wycięcie przerzutów i /lub radioterapia, o ile po leczeniu utrzymuje się stan bezobjawowy);</p> <p>8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego;</p> <p>9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center);</p> <p>10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;</p> <p>11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego skóry;</p> <p>12) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:</p> <p>a) wyniki badań czynności wątroby:</p> <ul style="list-style-type: none">- stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),- aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, <p>b) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/mm^3$,- bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/mm^3$,- poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; <p>13) czynność tarczycy prawidłowa lub wyrównana farmakologicznie;</p> <p>14) nieobecność chorób układu sercowo-naczyniowego, które nie mogą być opanowane przy użyciu dostępnych metod leczenia.</p> <p>Kryteria włączenia muszą być spełnione łącznie.</p> <p>3.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none">1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na pazopanib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;3) nawracająca lub nieakceptowana toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO;4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali		
--	--	--

<p>Karnofsky'ego;</p> <p>5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia oraz wystąpienia objawów toksyczności ze strony wątroby ≥ 3 stopnia;</p> <p>6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku.</p> <p>4. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej ewerolimus</p> <p>4.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) histologicznie potwierdzone rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym;</p> <p>2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);</p> <p>3) udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia z zastosowaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib, sorafenib, pazopanib) stosowanych jako jedyne leczenie poprzedzające lub po wcześniejszej immunoterapii;</p> <p>4) uprzednie wykonanie nefrektomii (radykałnej lub oszczędzającej);</p> <p>5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych;</p> <p>6) zmiany możliwe do obiektywnej oceny w badaniach obrazowych metodą KT lub MR z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej RTG lub MR;</p> <p>7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (dopuszczalne wcześniejsze usunięcie przerzutów);</p> <p>8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego;</p> <p>9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center);</p> <p>10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;</p> <p>11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego skóry;</p> <p>12) wykluczenie czynnych zakażeń miejscowych lub ogólnoustrojowych;</p> <p>13) nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego;</p> <p>14) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań</p>		
--	--	--

<p>laboratoryjnych krwi:</p> <p>a) wyniki badań czynności wątroby:</p> <ul style="list-style-type: none">- stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),- aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, <p>b) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/\text{mm}^3$,- bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/\text{mm}^3$,- poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; <p>15) prawidłowe stężenie glukozy we krwi;</p> <p>16) niestosowanie leków z grupy silnych i umiarkowanych inhibitorów CYP3A4 (w szczególności ketokonazol, itrakonazol, worikonazol, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, werapamil, flukonazol, diltiazem, cyklosporyna).</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>4.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>4.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none">1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na ewerolimus lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;3) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO;4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali Karnofsky'ego;5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia;6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku.		
--	--	--

LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU (ICD-10 C 71)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Leczenie dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) histologiczne nowe rozpoznanie złośliwego glejaka GIII i GIV (gwiaździak anaplastyczny lub glejak wielopostaciowy);</p> <p>2) stan sprawności według WHO 0 - 2;</p> <p>3) prawidłowa czynność szpiku (wskaźniki morfologii krwi);</p> <p>4) prawidłowa czynność nerek i wątroby (wskaźniki biochemiczne);</p> <p>5) wykluczona ciąża.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na temozolomid;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej lub równa 3 (zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku);</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3 - 4;</p> <p>4) brak skuteczności po 2 cyklach stosowania leku- pogorszenie stanu chorego;</p> <p>5) progresja choroby w trakcie stosowania leku (ocena na podstawie stanu klinicznego oraz badania obrazowego w celu rozróżnienia z często występującą pseudoprogresją w obrazie radiologicznym).</p> <p>2. Leczenie dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych z glejakiem złośliwym (gwiaździak anaplastyczny lub glejak wielopostaciowy) wykazującym wznowę lub progresję po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii z udokumentowanymi przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania leczenia chirurgicznego i radioterapii</p>	<p>1. Leczenie dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wileopostaciowym</p> <p>Temozolomid kapsułki twarde podaje się w skojarzeniu z celowaną radioterapią (okres leczenia skojarzonego) a następnie podaje się do 6 cykli temozolomidu w monoterapii (okres monoterapii). Temozolomid w ramach skojarzonego leczenia (radiochemioterapia) chorych na pierwotnie rozpoznanego glejaka wielopostaciowego stosuje się według schematu:</p> <p>1) okres jednoczesnego stosowania chemioterapii i radioterapii - leczenie skojarzone</p> <p>a) temozolomid - codziennie w dawce 75 mg/m² powierzchni ciała przez 42 dni</p> <p>b) radioterapia - 2 Gy dziennie przez 5 dni w tygodniu do dawki całkowitej 60 Gy (30 frakcji) w ciągu 42 dni (6 tygodni)</p> <p>2) okres wyłącznego stosowania chemioterapii (rozpoczęcie po 4 tygodniach od zakończenia radioterapii) - monoterapia</p> <p>a) temozolomid pierwszy cykl - w dniach od 1. do 5. w dawce 150 mg/m² powierzchni ciała, po których następuje 23-dniowa przerwa w podawaniu leku</p> <p>b) temozolomid kolejne cykle (od 2. do 6. cyklu) - w dniach od 1. do 5. cyklu w dawce 200 mg/m² powierzchni ciała co 28 dni.</p> <p>2. Leczenie dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starsze z glejakiem złośliwym wykazującym wznowę lub progresję</p> <p>Cykl leczenia obejmuje 28 dni. Pacjentom niepoddawany wcześniej chemioterapii temozolomidem podaje się lek doustnie w dawce 200 mg/m² p.c. raz na dobę przez pierwsze 5 dni, po których następuje 23 dniowa przerwa w leczeniu (w sumie 28 dni). U pacjentów poddawanych wcześniej chemioterapii początkowa</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>b) próby wątrobowe,</p> <p>c) poziom kreatyniny i mocznika we krwi,</p> <p>d) ocena stopnia zapotrzebowania na kortykosteroidy,</p> <p>e) badanie histopatologiczne,</p> <p>f) rezonans magnetyczny głowy lub tomografia komputerowa głowy,</p> <p>g) badanie neurologiczne.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Leczenie skojarzone</p> <p>Raz w tygodniu morfologia krwi z rozmazem</p> <p>2.2 Monoterapia</p> <p>Przed każdym kolejnym cyklem leczenia:</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem</p> <p>b) ocena stopnia zapotrzebowania na kortykosteroidy</p> <p>c) badanie neurologiczne</p> <p>W przypadku pogorszenia wyniku badania neurologicznego lub oceny stopnia zapotrzebowania na kortykosteroidy, należy wykonać badanie obrazowe nieprzewidziane wymienionym wyżej rytmem.</p> <p>2.3 Po każdym kolejnych 2 cyklach:</p> <p>1) kreatynina;</p> <p>2) AspAT;</p> <p>3) AlAT;</p>

<p>2.1 Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nawrót po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii z udokumentowanymi przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania leczenia chirurgicznego i radioterapii 2) stan sprawności według WHO 0 - 2; 3) prawidłowa czynność szpiku (wskaźniki morfologii krwi); 4) prawidłowa czynność nerek i wątroby (wskaźniki biochemiczne); 5) wykluczona ciąża. <p>2.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz, na podstawie kryteriów wyłączenia.</p> <p>2.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na temozolomid; 2) toksyczność według WHO powyżej lub równa 3 (zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku); 3) stan sprawności według WHO 3 - 4; 4) brak skuteczności po 2 cyklach stosowania leku- pogorszenie stanu chorego; 5) progresja choroby w trakcie stosowania leku (ocena na podstawie stanu klinicznego oraz badania obrazowego w celu rozróżnienia z często występującą pseudoprogresją w obrazie radiologicznym). 	<p>dawka wynosi 150mg/m² p.c. na dobę i może być zwiększona w drugim cyklu do 200mg/m² p.c. raz na dobę przez 5 dni pod warunkiem, że całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi $\geq 1,5 \times 10^9/l$. i liczba płytek krwi wynosi $\geq 100 \times 10^9$.</p> <p>Leczenie temozolomidem prowadzone jest zwykle do 6 cykli, o ile wcześniej nie wystąpi progresja lub do wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności leczenia (najczęściej jest to małopłytkowość).</p>	<p>4) tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny;</p>
--	---	--

LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH (ICD-10 C 82, C 83)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) potwierdzony histologicznie chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania, a w przypadku zastosowania monoterapii - oporność na chemioterapię bądź druga lub kolejna wznowa po chemioterapii lub</p> <p>2) potwierdzony histologicznie chłoniak niezziarniczny rozlany z dużych komórek B, z udokumentowaną w badaniu obecnością antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka;</p> <p>3) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>4) stan ogólny według WHO 0 - 2;</p> <p>5) wyrównana niewydolność krążenia lub niewydolność wieńcowa (jeżeli występują);</p> <p>6) dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze (jeżeli występuje).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów włączenia i kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na rytuksymab, którykolwiek ze składników preparatu lub na białka mysie;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 3;</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3 - 4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 2 cyklach stosowania;</p> <p>5) progresja lub nawrót choroby w okresie 6 miesięcy przy leczeniu rytuksymabem;</p> <p>6) niewydolność serca w IV klasie według NYHA;</p> <p>7) czynne ciężkie zakażenie;</p> <p>8) ciąża.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 U świadczeniobiorców z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania, rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m² pow. ciała, podawanej w postaci wlewu dożylnego raz w tygodniu, przez 4 tygodnie.</p> <p>1.2 U świadczeniobiorców chorych na niezziarnicze chłoniaki grudkowe w fazie nawrotu lub oporności na leczenie, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne po zastosowaniu chemioterapii bez lub z rytuksymabem wynosi 375 mg/m² powierzchni ciała raz na 3 miesiące do czasu progresji choroby lub przez maksymalnie okres dwóch lat.</p> <p>1.3 U świadczeniobiorców z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania, rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m² pow. ciała, podawanej w postaci wlewu dożylnego w skojarzeniu z chemioterapią co 21 dni - 8 podań.</p> <p>1.4 U świadczeniobiorców z rozpoznaniem chłoniaka niezziarniczego rozlanego z dużych komórek B, rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m² pow. ciała, podawanej w postaci wlewu dożylnego w skojarzeniu ze schematem CHOP co 21 dni - 8 podań.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) dehydrogenaza mleczanowa w surowicy;</p> <p>3) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);</p> <p>4) fosfataza zasadowa (AP);</p> <p>5) transaminazy (AspAT, AlAT);</p> <p>6) stężenie bilirubiny całkowitej;</p> <p>7) poziom kwasu moczowego;</p> <p>8) stężenie kreatyniny;</p> <p>9) stężenie wapnia w surowicy;</p> <p>10) stężenie fosforu w surowicy;</p> <p>11) proteinogram;</p> <p>12) pobranie węzła chłonnego bądź wycinka zmienionej tkanki metodą biopsji chirurgicznej;</p> <p>13) badanie histologiczne wycinka;</p> <p>14) badanie na obecność antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka;</p> <p>15) radiografia klatki piersiowej;</p> <p>16) RTG przewodu pokarmowego (w przypadku objawów klinicznych);</p> <p>17) tomografia komputerowa głowy;</p> <p>18) tomografia komputerowa klatki piersiowej i szyi;</p> <p>19) tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy;</p> <p>20) MR (diagnostyka zmian w kanale kręgowym, głowie i tkankach miękkich);</p> <p>21) USG w diagnostyce ewentualnych zmian jamy brzusznej, tkanek miękkich, tarczycy, jąder i serca;</p> <p>22) endosonografia (EUS) w diagnostyce chłoniaków żołądka.</p> <p>Badania stosownie do wskazań lekarskich podczas</p>

		<p>diagnostyki chłoniaka w danej lokalizacji.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Badanie przeprowadzane przed każdym podaniem leku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) morfologia krwi z rozmazem;2) poziom kreatyniny;3) poziom kwasu moczowego;4) poziom aktywności aminotransferaz;5) fosfataza alkaliczna;6) bilirubina;7) EKG (jedynie u chorych z chłoniakiem rozlanym). <p>Badanie przeprowadzane po 3 lub 4 cyklu leczenia oraz po 8 cyklach (odpowiednio do ilości cykli w zastosowanym schemacie leczenia):</p> <ol style="list-style-type: none">1) TK lub rezonans magnetyczny zmiany mierzalnej;2) EKG.
--	--	---

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem</p> <p>1.1 Leczenie bortezomibem nowo zdiagnozowanych pacjentów ze szpiczakiem mnogim</p> <p>Pacjenci z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim niekwalifikujący się do chemioterapii wysokodawkowej w połączeniu z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, spełniający przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) niewydolność nerek, definiowana jako klirens kreatyniny < 60 ml/min; 2) stwierdzenie przynajmniej jednego z następujących zaburzeń cytogenetycznych: translokacja t(4; 14) lub t(14; 16) lub delecja 17p; 3) wiek \geq 75 r.ż. <p>1.2. Leczenie pacjentów, u których wystąpiła oporność w trakcie zastosowanej terapii szpiczaka mnogiego lub nawrót po skutecznej terapii</p> <p>Pacjenci zarówno kwalifikujący się jak i niekwalifikujący się do chemioterapii wysokodawkowej w połączeniu z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, spełniający jedno z poniższych kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chorzy z cechami progresji po co najmniej 2 cyklach leczenia I lub II linii bez zastosowania bortezomibu; 2) chorzy, u których nie stwierdzono co najmniej częściowej odpowiedzi po 4 cyklach leczenia I lub II linii bez zastosowania bortezomibu; 3) chorzy z nawrotem choroby po skutecznym leczeniu w I lub II linii; 4) chorzy z nawrotem szpiczaka po chemioterapii 	<p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 U pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim niekwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowej w połączeniu z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych</p> <p>Bortezomib w dawce 1,3 mg/m² jest podawany ze stosowanymi doustnie melfalanem i prednizonem przez dziewięć 6-tygodniowych cykli. W trakcie cykli 1-4 bortezomib podaje się dwa razy w tygodniu (dni: 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, i 32) natomiast w trakcie cykli 5-9 bortezomib podaje się raz w tygodniu (dni: 1, 8, 22, i 29). Zarówno melfalan jak i prednizon powinny być podawane doustnie w dniach 1, 2, 3 i 4 pierwszego tygodnia w każdym cyklu. Jeden cykl leczenia obejmuje 42 dni, a łączny czas trwania terapii to 54 tygodnie.</p> <p>U pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane, niewykluczające ich z udziału w programie, należy modyfikować dawkowanie bortezomibu, melfalanu, prednizonu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Charakterystykach Produktu Leczniczego.</p> <p>1.2 U pacjentów, u których wystąpiła oporność w trakcie zastosowanej terapii szpiczaka mnogiego lub nawrót po jego skutecznej terapii</p> <p>Zalecana początkowa dawka bortezomibu wynosi 1,3 mg/m² powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu, przez dwa tygodnie (w dniach 1., 4., 8. i 11.), a następnie 10-dniowa przerwa (od 12. do 21. dnia). Opisany trzytygodniowy okres jest uważany za jeden cykl leczenia. Pomiędzy kolejnymi dawkami</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oznaczenie morfologii krwi; 2) oznaczenie AspAT, AlAT; 3) stężenie wapnia; 4) kreatynina; 5) bilirubina; 6) klirens kreatyniny; 7) proteinogram; 8) immunofiksacja w surowicy krwi; 9) badania ogólne moczu; 10) badanie na obecność białka Bence'a - Jonesa w moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich); 11) mielogram lub trepanobiopsja szpiku; 12) RTG kości płaskich i długich; 13) MR lub TK (w wybranych przypadkach); 14) stężenie beta2-mikroglobuliny; 15) badanie wolnych łańcuchów lekkich (do decyzji lekarza); 16) badania cytogenetyczne (w wybranych przypadkach). <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Co najmniej raz w miesiącu badanie neurologiczne (może być wykonane przez lekarza prowadzącego).</p> <p>Przed każdym cyklem leczenia oznaczenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologii krwi; 2) stężenia kreatyniny; 3) AspAT; 4) AlAT; 5) bilirubiny. <p>Po 2 cyklu leczenia oznaczenie:</p>

<p>wysokodawkowej i przeszczepieniu własnych komórek krwiotwórczych bez remisji częściowej, kwalifikowanych do przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych. Nieuzasadnione jest włączenie do leczenia bortezomibem pacjentów, u których zastosowano ten lek we wcześniejszych liniach leczenia i nie uzyskano odpowiedzi w postaci co najmniej remisji częściowej.</p> <p>5) U chorych z nawrotem szpiczaka po uzyskaniu co najmniej bardzo dobrej remisji częściowej po leczeniu za pomocą chemioterapii wysokodawkowej i przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, którzy uzyskali co najmniej remisję częściową po zastosowaniu bortezomibu w ramach wcześniejszego leczenia.</p> <p>Chorzy w wieku rozrodczym muszą zobowiązać się do stosowania antykoncepcji.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>2.1. U pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim niekwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowej w połączeniu z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, bortezomib jest podawany ze stosowanymi doustnie melfalanem i prednizonem przez dziewięć 6-tygodniowych cykli.</p> <p>W trakcie cykli 1-4 bortezomib podaje się dwa razy w tygodniu natomiast w trakcie cykli 5-9 bortezomib podaje się raz w tygodniu.</p> <p>2.2. U pacjentów, u których wystąpiła oporność w trakcie zastosowanej terapii szpiczaka mnogiego lub nawrót po jego skutecznej terapii, bortezomib podaje się przez maksymalnie osiem cykli.</p> <p>Lek podaje się dwa razy w tygodniu, przez dwa tygodnie (w dniach 1., 4., 8. i 11.), a następnie jest 10-dniowa przerwa (od 12. do 21. dnia).</p> <p>Opisany trzytygodniowy okres jest uważany za jeden cykl leczenia.</p> <p>Zaleca się by pacjenci, u których potwierdzono wystąpienie remisji całkowitej otrzymali jeszcze 2 dodatkowe cykle</p>	<p>bortezomibu powinny upłynąć co najmniej 72 godziny. U pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane, niewykluczające ich z udziału w programie, należy modyfikować dawkowanie bortezomibu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>1.3. W przypadkach opisanych w ust. 1.1 i 1.2 bortezomib należy podawać w postaci wstrzyknięcia dożylnego lub podskórnego. Podanie podskórne dotyczy wyłącznie dawki 3,5 mg / fiołka.</p> <p>Podanie dożylne: rozcieńczony roztwór bortezomibu należy podawać w postaci dożylnego wstrzyknięcia w formie bolusa, trwającego od 3 do 5 sekund, do żył obwodowych lub przez centralny dostęp żylny, po którym wkłucie powinno zostać przepłukane roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%).</p> <p>Podanie podskórne: odpowiednio przygotowany roztwór należy podawać w postaci podskórnego wstrzyknięcia w udo (prawe lub lewe) lub brzuch (po prawej lub lewej stronie). Roztwór należy wstrzykiwać pod kątem 45-90°, zmieniając strony podczas kolejnych wstrzyknięć.</p>	<p>1) morfologii krwi; 2) proteinogramu; 3) stężenia kreatyniny; 4) stężenia wapnia w surowicy; 5) aktywności AspAT i AlAT; 6) stężenia bilirubiny całkowitej; 7) stężenia białka Bence'a – Jonesa w dobowej zbiorce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich).</p> <p>Po 4 cyklu leczenia oznaczenie:</p> <p>1) morfologii krwi; 2) proteinogramu; 3) immunofiksacja w surowicy krwi; 4) stężenia kreatyniny; 5) stężenia wapnia w surowicy; 6) aktywności AspAT i AlAT; 7) stężenia bilirubiny całkowitej; 8) stężenia wolnych łańcuchów lekkich w surowicy krwi (do decyzji lekarza).</p> <p>Po 6 cyklu leczenia oznaczenie:</p> <p>1) morfologii krwi; 2) proteinogramu; 3) stężenia kreatyniny; 4) stężenia wapnia w surowicy; 5) aktywności AspAT i AlAT; 6) stężenia bilirubiny całkowitej; 7) stężenia białka Bence'a – Jonesa w dobowej zbiorce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich); 8) aktywności zmian kostnych (badania jak przy włączeniu); 9) mielogram lub trepanobiopsja szpiku (do decyzji lekarza).</p> <p>Na zakończenie udziału chorego w programie oznaczenie:</p> <p>1) morfologii krwi; 2) proteinogramu; 3) stężenia kreatyniny; 4) stężenia wapnia w surowicy; 5) aktywności AspAT i AlAT; 6) stężenia bilirubiny całkowitej;</p>
--	--	--

<p>leczenia bortezomibem. Ponadto zaleca się, by pacjenci odpowiadający na leczenie, u których nie stwierdzono całkowitej remisji otrzymali w sumie 8 cykli leczenia bortezomibem.</p> <p>W razie wystąpienia bardzo dobrej reakcji na leczenie umożliwiającej wcześniejsze wykonanie przeszczepienia komórek krwiotwórczych dopuszcza się przerwanie leczenia bortezomibem po mniej niż 6 cyklach. Dany chory może następnie otrzymać pozostałe cykle w ramach leczenia poprzyszczepowego.</p> <p>W razie wystąpienia przerwy w leczeniu spowodowanej umiarkowanymi działaniami niepożądanymi lub innymi nieleżącymi po stronie świadczeniodawcy przyczynami, leczenie jest wydłużone o tę przerwę.</p> <p>3. Kryteria niepozwalające na włączenie do programu ze względu na bezpieczeństwo</p> <p>1) nadwrażliwość na bortezomib, boron (bor) lub którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <p>2) ostra rozlana naciekowa choroba płuc i osierdza.</p> <p>4. Kryteria zakończenia udziału w programie</p> <p>1) działania niepożądane bortezomibu, IV stopień wg NCI CTCAE 4.0, z wyłączeniem toksyczności hematologicznej;</p> <p>2) progresja choroby po 2 cyklach leczenia z zastosowaniem bortezomibu ;</p> <p>3) brak poprawy częściowej po 4 cyklach leczenia z zastosowaniem bortezomibu.</p>		<p>7) immunofiksacja w surowicy krwi;</p> <p>8) stężenia białka Bence'a – Jonesa w dobowej zbiórce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich);</p> <p>9) mielogram lub trepanobiopsja szpiku; (do decyzji lekarza);</p> <p>10) aktywności zmian kostnych (badania jak przy włączeniu);</p> <p>11) stężenie beta 2 – mikroglobuliny;</p> <p>12) badanie wolnych łańcuchów lekkich (do decyzji lekarza).</p>
--	--	---

LECZENIE PRZEWLEKLEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>Świadczeniobiorcy z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej, z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) spełniający następujące kryteria:</p> <p>1) w fazie przewlekłej:</p> <p>a) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli co najmniej częściową remisję cytogenetyczną po 1 roku leczenia,</p> <p>b) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli całkowitą remisję cytogenetyczną najpóźniej po 18 miesiącach leczenia,;</p> <p>c) nowo zdiagnozowani - świeżo rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa, w trakcie przedłużającego się poszukiwania dawcy szpiku</p> <p>d) wcześniej leczeni hydroksykarbamidem lub interferonem bez uzyskania remisji cytogenetycznej lub z udokumentowaną silną nietolerancją leczenia (III i IV stopień toksyczności według WHO),</p> <p>e) po alogenicznej transplantacji szpiku kostnego, u których wystąpiła wznowa choroby;</p> <p>2) w fazie przyspieszonej:</p> <p>świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu;</p> <p>3) w fazie kryzy blastycznej:</p> <p>świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu.</p> <p>1.2 Kryteria wyłączenia</p> <p>1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na imatinib;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych działań niepożądanych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych działań niepożądanych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość).</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3-4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku (brak remisji</p>	<p>1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem</p> <p>Zalecane dawkowanie imatinibu u świadczeniobiorców w fazie przewlekłej PBSz wynosi 400 mg/dobę.</p> <p>Faza przewlekła jest definiowana jako stan, który spełnia wszystkie podane kryteria: liczba blastów we krwi i szpiku jest poniżej 15%, liczba leukocytów zasadochłonnych we krwi obwodowej jest poniżej 20%, a liczba płytek jest powyżej $100 \times 10^9/l$. W razie wydłużania czasu uzyskiwania remisji cytogenetycznej lub niewielkiego nawrotu cytogenetycznego możliwe jest przejściowe zwiększenie dawki imatinibu w fazie przewlekłej do 600 mg/dobę.</p> <p>Zalecane dawkowanie imatinibu u świadczeniobiorców w fazie przyspieszonej wynosi 600 mg/dobę.</p> <p>Faza akceleracji jest definiowana jako stan, który spełnia którekolwiek z podanych kryteriów: odsetek blastów we krwi i szpiku jest większy bądź równy 15% ale poniżej 30%, liczba blastów i promielocytów we krwi i szpiku jest większa bądź równa 30% (pod warunkiem, że liczba blastów jest mniejsza niż 30%), liczba leukocytów zasadochłonnych we krwi obwodowej jest większa bądź równa 20%, liczba płytek jest mniejsza niż $100 \times 10^9/l$ i jest nie związana z leczeniem. W fazie akceleracji zwiększenie dawki do 800 mg/dobę (podawanych w dwóch dawkach po 400 mg) może</p>	<p>1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem</p> <p>1.1 Badania przy kwalifikacji</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) fosfataza alkaliczna granulocytów,</p> <p>f) badania ogólne moczu,</p> <p>g) badanie cytogenetyczne szpiku,</p> <p>h) badanie cytogenetyczne krwi,</p> <p>i) badanie cytologiczne szpiku,</p> <p>j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie),</p> <p>k) USG wątroby i śledziony.</p> <p>1.2 Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej imatinibem:</p> <p>Raz w miesiącu, przez pierwsze trzy miesiące leczenia, następnie co 90 dni</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) badanie cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej.</p> <p>Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co pół roku przez pierwszy rok, następnie, po uzyskaniu całkowitej remisji cytogenetycznej, co rok.</p> <p>Badanie ilościowe PCR: po uzyskaniu całkowitej remisji</p>

<p>hematologicznej, brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);</p> <p>5) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>6) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> <p>2. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci Imatinibem</p> <p>2.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>Do leczenia imatinibem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej, z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) spełniający następujące kryteria:</p> <p>1) w fazie przewlekłej:</p> <p>a) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli co najmniej częściową remisję cytogenetyczną po 1 roku leczenia,</p> <p>b) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli całkowitą remisję cytogenetyczną najpóźniej po 18 miesiącach leczenia;</p> <p>c) nowo zdiagnozowani - świeżo rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa w trakcie przedłużającego się poszukiwania dawcy szpiku,</p> <p>d) wcześniej leczeni hydroksykarbamidem lub interferonem bez uzyskania remisji cytogenetycznej lub z udokumentowaną silną nietolerancją leczenia (III i IV stopień toksyczności według WHO),</p> <p>e) po alogenicznej transplantacji szpiku kostnego, u których wystąpiła wznowa choroby;</p> <p>2) w fazie przyspieszonej: świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu;</p> <p>3) w fazie kryzy blastycznej: świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu.</p> <p>2.2 Kryteria wyłączenia</p> <p>1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na imatinib;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych (ciężka</p>	<p>nastąpić w następujących przypadkach:</p> <p>a) postęp choroby,</p> <p>b) brak zadowalającej odpowiedzi hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia,</p> <p>c) utrata osiągniętej wcześniej odpowiedzi hematologicznej.</p> <p>Zalecane dawkowanie imatinibu w fazie kryzy blastycznej wynosi 800 mg/dobę. Kryza blastyczna jest definiowana jako stan, w którym odsetek blastów w szpiku lub krwi obwodowej przekracza 30%.</p> <p>2. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci imatinibem</p> <p>Dawkowanie u dzieci należy ustalać na podstawie powierzchni ciała (mg/m² pc.).</p> <p>U dzieci w fazie przewlekłej i fazach zaawansowanych zaleca się dawkę 340 mg/m² pc. na dobę (nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 800 mg). Produkt można podawać w postaci jednej dawki na dobę lub można podzielić dawkę dobową na dwie części - jedną podawaną rano i drugą wieczorem.</p> <p>U dzieci, u których nie występują poważne działania niepożądane oraz poważna neutropenia lub trombocytopenia spowodowane białaczką można rozważyć zwiększenie dawki z 340 mg/m² pc do 570 mg/m² pc na dobę (nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 800 mg) w następujących przypadkach:</p> <p>a) postęp choroby (na każdym jej etapie);</p> <p>b) brak zadowalającej odpowiedzi hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia;</p> <p>c) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia;</p> <p>d) utrata osiągniętej wcześniej odpowiedzi hematologicznej lub cytogenetycznej.</p> <p>3. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u</p>	<p>cytogenetycznej co 90 dni. W razie niemożności wykonania badania ilościowego, badanie jakościowe PCR.</p> <p>2. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci Imatinibem</p> <p>2.1 Badania przy kwalifikacji</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) fosfataza alkaliczna granulocytów,</p> <p>f) badania ogólne moczu,</p> <p>g) badanie cytogenetyczne szpiku,</p> <p>h) badanie cytogenetyczne krwi,</p> <p>i) badanie cytologiczne szpiku,</p> <p>j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie),</p> <p>k) USG wątroby i śledziony.</p> <p>2.3 Monitorowanie leczenia</p> <p>Raz w miesiącu przez pierwsze trzy miesiące leczenia, następnie co 90 dni:</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) fosfataza alkaliczna granulocytów,</p> <p>f) badania ogólne moczu.</p> <p>Raz w miesiącu przez pierwsze trzy miesiące leczenia, następnie co 90 dni - badanie ilościowe PCR (BCR-ABL/ABL ratio).</p> <p>Co 90 dni - badanie cytogenetyczne szpiku.</p> <p>Co 90 dni - USG jamy brzusznej.</p> <p>Co 180 dni - badanie histologiczne szpiku.</p> <p>3. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem</p> <p>3.1 Badania przy kwalifikacji</p>
---	--	--

<p>neutropenia lub małopłytkowość) działań niepożądanych;</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3-4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak remisji hematologicznej, - brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %); <p>5) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>6) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> <p>3. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem</p> <p>3.1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);</p> <p>2) wiek: powyżej 18 roku życia;</p> <p>3) stan ogólny według WHO 0-2;</p> <p>4) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315I, b) którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatinibem, c) u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej w 6 miesiącu leczenia imatinibem d) u których brak jest odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia imatinibem, e) którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną, f) ze stwierdzoną progresją choroby, g) nietolerujący imatinibu h) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni dazatynibem w ramach terapii niestandardowej, u których uzyskano co najmniej całkowitą odpowiedź hematologiczną; 	<p>dorosłych dazatynibem</p> <p>Zalecana dawka początkowa produktu w przewlekłej fazie PBSz wynosi 100 mg raz na dobę, podawane doustnie. Zalecana dawka początkowa dazatynibu w zaawansowanych fazach choroby wynosi 140 mg raz na dobę, podawane doustnie. Zaawansowane fazy PBSz obejmują fazę akceleracji, fazę przełomu blastycznego, który może być mieloblastyczny lub limfoblastyczny. Podobnie jest traktowana ostra białaczka limfoblastyczna z chromosomem filadelfijskim (Ph+ALL)</p> <p>W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy dawkę leku zmniejszyć do 80 mg na dobę, Nie wolno rozkruszać lub dzielić tabletek, muszą one być połykane w całości, niezależnie od posiłków.</p> <p>Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo przynosi ono korzyść kliniczną dla świadczeniobiorcy z uwzględnieniem kryteriów wyłączenia z programu .Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, a świadczeniobiorcy znajdują się w odpowiednim wieku należy rozpocząć poszukiwanie dawcy szpiku</p> <p>4. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych nilotynibem</p> <p>Zaleca się podawanie dawki 800 mg nilotynibu na dobę, podawanej w dwóch dawkach po 400 mg co około 12 godzin. Nilotynib należy przyjmować na czczo. Nie należy spożywać posiłków na dwie godziny przed i jedną godzinę po przyjęciu leku. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo przynosi ono korzyść kliniczną dla pacjenta z uwzględnieniem kryteriów wyłączenia z programu. W przypadku wystąpienia toksyczności niehematologicznej lub hematologicznej może być konieczne zaprzestanie podawania nilotynibu przez</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty), b) AspAT, AIAT, c) kreatynina, d) bilirubina, e) fosfataza alkaliczna granulocytów, f) badania ogólne moczu, g) badanie cytogenetyczne szpiku, h) badanie cytogenetyczne krwi, i) badanie cytologiczne szpiku, j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie), k) USG wątroby i śledziony. <p>3.3 Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem</p> <p>Pierwsze 2 miesiące leczenia- co 7 dni, następnie co 30 dni (po uzyskaniu remisji hematologicznej co 90 dni):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty), b) AspAT, AIAT, c) kreatynina, d) bilirubina. <p>Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co 90 dni przez pierwszy rok, następnie co pół roku.</p> <p>Badanie ilościowe PCR: po uzyskaniu całkowitej remisji cytogenetycznej co 90 dni.</p> <p>4. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem</p> <p>4.1 Badania przy kwalifikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty), b) AspAT, AIAT, c) kreatynina, d) bilirubina, e) fosfataza alkaliczna granulocytów, f) badania ogólne moczu, g) badanie cytogenetyczne szpiku, h) badanie cytogenetyczne krwi,
--	--	---

<p>5) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczenia nilotynibem nietolerujący nilotynibu lub z niepowodzeniem leczenia nilotynibem</p> <p>6) świadczeniobiorcy w fazie kryzy blastycznej, którzy wcześniej nie otrzymywali dazatynibu, nietolerujący lub nieodpowiadający na imatynib. W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib albo nilotynib) w oparciu o wskazania medyczne.</p> <p>3.2 Kryteria wyłączenia</p> <p>1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na dazatynib;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych działań niepożądanych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych działań niepożądanych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość);</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3-4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku -brak remisji hematologicznej, -brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);</p> <p>5) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 6 miesiącach</p> <p>6) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>7) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> <p>8) toksyczność hematologiczna lub pozahematologiczna w stopniu 3 lub 4 - która przejawia się pomimo przerw w leczeniu</p> <p>4. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem</p> <p>4.1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);</p> <p>2) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>3) stan ogólny według WHO 0-2;</p>	<p>pewien czas lub zmniejszenie podawanej dawki, zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego</p>	<p>i) badanie cytologiczne szpiku,</p> <p>j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie),</p> <p>k) USG wątroby i śledziony.</p> <p>4.2 Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem</p> <p>Raz w miesiącu (po uzyskaniu remisji hematologicznej co 90 dni):</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina.</p> <p>Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co 90 dni przez pierwszy rok, następnie co pół roku.</p> <p>Badanie ilościowe PCR: po uzyskaniu całkowitej remisji cytogenetycznej co 90 dni.</p>
--	--	---

4) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem:

- a) u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315I,
- b) którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatinibem,
- c) u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej w 6 miesiącu leczenia imatinibem
- d) u których brak jest odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia imatinibem,
- e) którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną,
- f) ze stwierdzoną progresją choroby,
- g) nietolerujący imatinibu,
- h) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni nilotynibem w ramach terapii niestandardowej, u których uzyskano co najmniej całkowitą odpowiedź hematologiczną;

5) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczeni dazatynibem nietolerujący dazatynibu lub z niepowodzeniem leczenia dazatynibem.

W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatinibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib albo nilotynib) w oparciu o wskazania medyczne.

4.2 Kryteria wyłączenia

- 1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na nilotynib;
- 2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych działań niepożądanych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych działań niepożądanych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość);
- 3) stan sprawności według WHO 3-4;
- 4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku:
 - brak remisji hematologicznej,
 - brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);
- 5) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 6 miesiącach;
- 6) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu

<p>przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>7) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p>		
--	--	--

ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10 D 66, D 67)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii pierwotnej i wtórnej profilaktyki krwawień oraz leczenia hemofilii powikłanej nowo powstałym krążącym antykoagulantem dokonuje Zespół Koordynujący ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Moduł pierwotnej profilaktyki krwawień</p> <p>1.1. Pierwotna profilaktyka krwawień u dzieci od 1 dnia życia z zachowaniem ciągłości leczenia do ukończenia 18 roku życia, z ciężką postacią hemofilii A lub B, o poziomie aktywności czynników krzepnięcia VIII lub IX równym lub poniżej 1% poziomu normalnego. Substancja czynna finansowana w ramach pierwotnej profilaktyki krwawień – koncentraty osoczopochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX.</p> <p>1.2. Pierwotna profilaktyka krwawień nowozdiagnozowanych dzieci z ciężką postacią hemofilii A i B, wcześniej nie leczonych czynnikami osoczopochodnymi (ludzkimi). Substancja czynna finansowana w ramach pierwotnej profilaktyki krwawień – koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX, minimum drugiej generacji.</p> <p>1.3. Zapewnienie koncentratów czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX dla dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego:</p>	<p>1. Pierwotna profilaktyka krwawień:</p> <p>1) czynnik VIII: a) dzieci do ukończenia 2 roku życia – 25- 40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 1-3 razy w tygodniu, b) dzieci powyżej 2 roku życia – 25-40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 2- 3 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem, że podawanie 2 razy w tygodniu dotyczy dzieci dotychczas leczonych 2 razy w tygodniu z dobrym efektem;</p> <p>2) czynnik IX: 25-50 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 1-2 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem, że podawanie 1 raz w tygodniu dotyczy dzieci dotychczas leczonych z dobrym efektem.</p> <p>2. Wtórna profilaktyka krwawień:</p> <p>1) czynnik VIII: a) dzieci do ukończenia 2 roku życia – 25- 40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 2-3 razy w tygodniu, b) dzieci powyżej 2 roku życia – 25-40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 3 razy w tygodniu;</p> <p>2) czynnik IX: 25-50 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 2 razy w tygodniu.</p> <p>3. U dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego, zapewnienie czynnika VIII lub IX do zabiegu, według schematu:</p>	<p>1. W ramach kwalifikacji świadczeniobiorcy do udziału w programie, na podstawie decyzji lekarza lokalnego lub regionalnego centrum leczenia hemofilii, wykonuje się następujące badania:</p> <p>1) badania przesiewowe: a) czas krwawienia (metodą Copley’ a), b) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), c) czas protrombinowy (PT), d) czas trombinowy (TT);</p> <p>2) wykonanie testu korekcji osoczem prawidłowym;</p> <p>3) ocena aktywności czynników krzepnięcia I, VIII i IX, von Willebranda (vWFRCo), XI, XII;</p> <p>4) antygen czynnika von Willebranda (vWFAg);</p> <p>5) ocena miana inhibitora czynnika VIII i IX u dzieci uprzednio leczonych (test Bethesda w modyfikacji Nijmegen);</p> <p>6) wykonanie badań wirusologicznych (w tym HCV PCR, HBV PCR);</p> <p>7) morfologia krwi.</p> <p>W związku z realizacją modułów programu, inne niż wymienione w pkt 1- 7 badania, są wykonywane na podstawie indywidualnych decyzji Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. Regionalne centra leczenia hemofilii są zobligowane do zapewnienia do nich dostępu.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1. Ocena skuteczności leczenia W zależności od oceny klinicznej należy wykonać:</p>

<p>1) dla grupy określonej w ust. 1.1. – czynniki osoczo pochodne (ludzkie);</p> <p>2) dla grupy określonej w ust. 1.2. – czynniki rekombinowane minimum drugiej generacji.</p> <p>2. Moduł wtórnej profilaktyki krwawień</p> <p>2.1. Wtórna profilaktyka krwawień jest prowadzona u dzieci od 1 dnia życia do ukończenia 18 roku życia, chorych na hemofilię A lub B, po wystąpieniu wylewów do stawów.</p> <p>Substancja czynna finansowana w ramach wtórnej profilaktyki krwawień – koncentraty osoczo pochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX.</p> <p>2.2. Zapewnienie koncentratów osoczo pochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX dla dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego.</p> <p>3. Objęcie programem wywoływania tolerancji immunologicznej wszystkich pacjentów z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) (powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania powyżej 6 miesięcy od momentu wykrycia). Finansowanie realizacji wywoływania tolerancji immunologicznej odbywa się poprzez realizację stosownych umów z podmiotami odpowiedzialnymi. Wymóg zawarcia przedmiotowych umów jest zapisywany w specyfikacji przetargowej.</p> <p>Kryteria włączenia do przedmiotowego modułu nowopowstałego inhibitora u dzieci do 18 roku życia:</p> <p>1) pacjenci z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) (powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania inhibitora powyżej 6 miesięcy) zakwalifikowani na podstawie decyzji Zespołu</p>	<p>1) pierwsza doba: 40 do 70 jednostek międzynarodowych/kg m.c., co 8 godzin;</p> <p>2) od drugiej do piątej doby: 30 do 50 jednostek międzynarodowych/ kg m.c., co 12 godzin;</p> <p>3) szósta doba jednorazowo: 30 do 50 jednostek międzynarodowych/kg m.c.;</p> <p>4) dziesiąta doba (zdjęcie szwów) jednorazowo: 30 do 50 jednostek międzynarodowych/kg m.c.</p> <p>Dawkowanie koncentratów czynnika krzepnięcia u pacjentów, u których stwierdzono utrzymywanie się inhibitora w mianie poniżej 5 B.U. oraz nieskuteczność leczenia w dotychczasowej dawce, może zostać ustalone indywidualnie przez Zespół Koordynujący ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.</p>	<p>1) RTG stawów - nie częściej niż raz w roku;</p> <p>2) USG stawów - nie rzadziej niż raz w roku;</p> <p>3) NMR - w razie trudności diagnostycznych w ocenie stawów.</p> <p>2.2. W ramach monitorowania leczenia obowiązkowe jest prowadzenie rejestru krwawień dla danego pacjenta oraz rejestracja danych wymaganych w programie do prowadzenia rejestru dla każdego pacjenta.</p> <p>Badania w monitorowaniu leczenia:</p> <p>1) aminotransferaza alaninowa (AlAT) co najmniej raz w roku;</p> <p>2) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) co najmniej raz w roku;</p> <p>3) obecność przeciwciał anti-HBs;</p> <p>4) obecność antygenu HBs (w przypadku braku miana zabezpieczającego przeciwciał anti-HBs), u dodatnich przeciwciała anti-HBc i anti HBe, DNA HBV;</p> <p>5) przeciwciała anti-HCV (raz w roku), u dodatnich RNA HCV;</p> <p>6) przeciwciała anti-HIV (w uzasadnionych przypadkach), u dodatnich RNA HIV;</p> <p>7) USG naczyń w okolicy dojścia żylnego, nie rzadziej niż raz w roku;</p> <p>8) badanie ogólne moczu.</p> <p>2.3. Na podstawie decyzji lekarza lokalnego lub regionalnego centrum leczenia hemofilii możliwe jest, w ramach monitorowania leczenia, wykonanie następujących badań:</p> <p>1) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT);</p> <p>2) ocena aktywności czynników krzepnięcia VIII i IX (w hemofilii A – czynnika VIII, w hemofilii B – czynnika IX); w zależności od sytuacji klinicznej powyższe badanie należy wykonać w razie braku skuteczności czynnika w dotychczasowej dawce oraz w innych uzasadnionych sytuacjach (np. przed zabiegami i procedurami inwazyjnymi lub po zmianie produktu leczniczego koncentratu czynnika</p>
--	---	--

<p>Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;</p> <p>2) pacjenci uprzednio zakwalifikowani do programu, jednak stwierdzenie obecności inhibitora dotyczy okresu prowadzonej profilaktyki, która miała miejsce po dniu 15 stycznia 2010 r.</p> <p>4. Kryteria wyłączenia Stwierdzenie obecności inhibitora (krążącego antykoagulantu o mianie powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania inhibitora powyżej 6 miesięcy).</p> <p>5. Kryteria zakończenia udziału w programie lub module programu (dotyczy przyczyn, z powodu których udział pacjenta - uprzednio zakwalifikowanego - w przedmiotowym programie musi zostać zakończony):</p> <p>1) stwierdzenie obecności nowo powstałego inhibitora (powyżej 5 B.U.) lub utrzymywanie się inhibitora w mianie niższym lub równym 5 B.U. przez ponad 6 miesięcy;</p> <p>2) ukończenie 18 roku życia.</p> <p>6. Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do momentu ukończenia 18 roku życia lub do momentu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p>		<p>krzepnięcia na inny).</p> <p>2.4. Oznaczanie inhibitora:</p> <p>1) do 150 przetoczeń - co 3 miesiące lub po każdych 10 przetoczeniach;</p> <p>2) powyżej 150 przetoczeń - co 6 do 12 miesięcy;</p> <p>3) w momencie zmiany produktu leczniczego koncentratu czynnika krzepnięcia na inny;</p> <p>4) w przypadku stwierdzenia braku skuteczności czynnika w dotychczasowej dawce.</p> <p>W przypadku niewykrycia inhibitora kolejne jego oznaczenia powinny być wykonywane zgodnie z powyższym opisem. W przypadku wykrycia inhibitora kolejne jego oznaczenia powinny być wykonywane co miesiąc (możliwa jest zmiana częstotliwości oznaczania inhibitora na podstawie decyzji lekarza regionalnego centrum leczenia hemofilii).</p>
--	--	--

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (ICD-10 D 75.2)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznana nadpłytkowość samoistna;</p> <p>2) wykluczenie innych przyczyn nadpłytkowości;</p> <p>3) stwierdzona toksyczność hydroksymocznika (udokumentowany III stopień toksyczności według WHO);</p> <p>4) stwierdzona niedostateczna reakcja na hydroksymocznik;</p> <p>5) liczba płytek krwi powyżej 1.500 G/l (co najmniej 2 badania w odstępie 1 tygodnia), nawet jeżeli świadczeniobiorca nie ma objawów klinicznych;</p> <p>6) liczba płytek 600 - 1.500 G/l (jeśli liczba płytek w okresie 2 miesięcy zwiększyła się powyżej 300 G/l albo występują objawy, które można wiązać z nadpłytkowością, względnie świadczeniobiorca miał w przeszłości powikłania zakrzepowe lub krwotoczne).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na anagrelid lub którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <p>2) niewydolność układu krążenia stopnia 3 lub 4;</p> <p>3) niestabilna choroba wieńcowa;</p> <p>4) klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min;</p> <p>5) aktywność aminotransferaz 5 razy większa od normy i wyższa;</p> <p>6) brak efektu terapeutycznego po 4 tygodniach leczenia;</p> <p>7) wystąpienie działań niepożądanych wymagające przerwania terapii;</p> <p>8) nietolerancja laktozy;</p> <p>9) ciąża.</p>	<p>Leczenie należy rozpoczynać od dawki anagrelidu 0,5 mg/dobę (1 kaps.) przez pierwszy tydzień, a następnie dawkę należy zwiększać co tydzień o 0,5 mg/dobę, aż do uzyskania normalizacji liczby płytek lub obniżenia ich liczby poniżej 600 G/l lub o 50 % w stosunku od stanu wyjściowego. Terapię należy kontynuować przy użyciu minimalnej skutecznej dawki zabezpieczającej świadczeniobiorcę, kontrolując liczbę płytek krwi co 4 tygodnie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) morfologia krwi;</p> <p>2) oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych;</p> <p>3) oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi;</p> <p>4) badanie podmiotowe i przedmiotowe;</p> <p>5) EKG.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>1) morfologia krwi - oznaczenie liczby płytek krwi przynajmniej raz na 4 tygodnie;</p> <p>2) oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych raz na 12 tygodni;</p> <p>3) oznaczenie klirensu kreatyniny raz na 4 tygodnie;</p> <p>4) badanie podmiotowe i przedmiotowe raz na 4 tygodnie;</p> <p>5) EKG raz na 4 tygodnie.</p>

LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji 1) rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności - według definicji WHO (World Health Organization report on Primary Immunodeficiencies, Clinical and Experimental Immunology, Vol. 99 (Suppl.1), 1995); 2) wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności; 3) stężenie IgG poniżej 400mg/dl jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia Nadwrażliwość na immunoglobuliny lub inny składnik preparatu. Towarzyszący niedoborowi IgG niedobór IgA z występowaniem przeciwciał przeciwko IgA wymaga leczenia w ośrodku z oddziałem intensywnej terapii.</p>	<p>1. Dawkowanie 1.1 Pierwsze podanie immunoglobulin w dawce 0,6-0,8 g/kg m.c. we wlewie iv. w celu znormalizowania poziomu stężenia IgG w surowicy (dawka może być podzielona na dwa wlewy w odstępie 24 godzin). 1.2 Kontynuacja leczenia substytucyjnego wlewaniami w dawce do 0,4 g/kg m. c. w odstępach 4 tygodniowych (modyfikacja dawki odpowiednio do udokumentowanego, osiągniętego ochronnego poziomu IgG w surowicy) W przypadku postaci farmaceutycznej do podań podskórnych 1,6 g preparat powinien umożliwić osiągnięcie stałego poziomu IgG. Świadczeniobiorca może wymagać podania dawki nasycającej co najmniej 0,2 do 0,5 g/kg m.c. w okresie tygodnia (0,1 do 0,15 g/kg masy ciała w okresie jednego dnia). Po osiągnięciu stałego poziomu skumulowanej dawki miesięcznej rzędu 0,4 do 0,8 g/kg m.c. należy oznaczyć stężenia minimalne w celu dostosowania dawek i odstępu pomiędzy dawkami. Dawkowanie preparatów gammaglobulin do podawania podskórnego: Podskórne preparaty gammaglobulin wydawane są przez szpital (Poradnia Immunologii Klinicznej) do domu. Świadczeniobiorca samodzielnie lub z pomocą podaje je przez pompę infuzyjną 1 raz w tygodniu. Sumaryczna miesięczna dawka odpowiada dawkom preparatów dożylnych. Świadczeniobiorca przetacza sobie ¼ dawki miesięcznej.</p>	<p>2. Badania przy kwalifikacji 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) AIAT; 3) AspAT; 4) oznaczanie subpopulacji limfocytów; 5) oznaczanie poziomu immunoglobulin i podklas IgG lub swoistych przeciwciał; 6) proteinogram; 7) badanie czynności fagocytarnych i neutralizacji patogenów; 8) badanie ekspresji cząstek adhezyjnych; 9) badanie składowych dopełniacza; 10) test stymulacji limfocytów. W przypadku preparatów gammaglobulin do podawania dożylnego lub podskórnego: badania wirusologiczne (zakażenia HBV, HCV) - przed włączeniem leczenia.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia 2.1 Immunoglobuliny dożylne Badanie przeprowadzane przed każdym podaniem leku zgodnie z harmonogramem dawkowania co 4 tyg.: a) morfologia krwi z rozmazem, b) AIAT, c) AspAT, d) poziom IgG w surowicy. Raz na 3 miesiące (przed podaniem immunoglobulin); w przypadku braku komplikacji raz na pół roku: - oznaczanie stężenia immunoglobulin IgG i podklas IgG lub swoistych przeciwciał w surowicy krwi. W przypadku wskazań dodatkowo:</p>

		<p>a) IgA w surowicy krwi, b) IgM w surowicy krwi. Raz na 6 miesięcy: - USG jamy brzusznej. Powikłania infekcyjne stanowią wskazania do wykonania badań: a) oznaczanie stężenia immunoglobulin IgG i podklas IgG lub swoistych przeciwciał w surowicy krwi. b) IgA w surowicy krwi, c) IgM w surowicy krwi, d) USG jamy brzusznej.</p> <p>2.2 Immunoglobuliny podskórne Badania kontrolne są wykonywane standardowo co 4-6 miesięcy: a) badania efektywności leczenia (stężenie IgG i podklas IgG lub swoistych przeciwciał), b) morfologia krwi z rozmazem, c) AlAT, d) AspAT. Raz na 6 miesięcy: - USG jamy brzusznej. Raz na rok: - badania wirusologiczne (zakażenia HBV, HCV).</p>
--	--	--

LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI (ICD-10 E 22.8)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji 1) przedwczesne dojrzewanie płciowe typu ośrodkowego u dzieci (objawy dojrzewania płciowego u dziewcząt poniżej 8 roku życia, u chłopców poniżej 10 roku życia) ustalone na podstawie badań laboratoryjnych i obrazowych oraz badania klinicznego; 2) wczesne dojrzewanie płciowe z dużą akceleracją wzrostu kostnego i niskim przewidywanym wzrostem docelowym.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu</p> <p>3. Kryteria wyłączenia 1) osiągnięcie przez świadczeniobiorcę wieku chronologicznego właściwego dla wystąpienia cech dojrzewania płciowego; 2) stwierdzenie określonego zaawansowania wieku kostnego: powyżej 13 lat; 3) zmniejszenie tempa wzrastania poniżej dolnej granicy normy dla okresu prepubertalnego (4 cm na rok).</p>	<p>1. Dawkowanie leuproreliny Co 4 tygodnie podskórnie lub domięśniowo. Jeśli nie osiągnięto zahamowania wydzielania hormonów, dawkę leku należy stopniowo zwiększać o 3,75 mg, co 4 tygodnie. Dawka ta stanowić będzie dawkę podtrzymującą. Każdorazowo należy zmienić miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo). 1) masa ciała ≤ 25 kg, dawka 3,75 mg x 2, liczba wstrzyknięć 1, dawka całkowita 7,5 mg; 2) masa ciała większa niż 25 do 37,5 kg, dawka 3,75 mg x 3, liczba wstrzyknięć 2, dawka całkowita 11,25 mg; 3) masa ciała większa niż 37,5 kg, dawka 3,75 mg x 4, liczba wstrzyknięć 2, dawka całkowita 15 mg.</p> <p>2. Dawkowanie triptoreliny U dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg zazwyczaj podaje się domięśniowo połowę zawartości ampułki 3,75 mg co 28 dni. U dzieci o masie ciała przekraczającej 20 kg zazwyczaj podaje się zawartość 1 ampułki 3,75 mg co 28 dni.</p>	<p>2. Badania przy kwalifikacji 1) stężenie β-gonadotropiny kosmówkowej (β-HCG); 2) stężenie estradiolu; 3) stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu; 4) stężenie 17-hydroksyprogesteronu; 5) stężenie testosteronu; 6) test stymulacyjny na wydzielanie LH i FSH; 7) stężenie luteotropiny; 8) stężenie folikulotropiny; 9) stężenie prolaktyny; 10) profil steroidów w moczu (w zależności od potrzeby w określonych przypadkach); 11) badanie RTG lewej dłoni i nadgarstka w celu oceny wieku kostnego; 12) badanie USG narządów miednicy i nadnerczy; 13) badanie tomografii komputerowej lub rezonans magnetyczny głowy (układu podwzgórzowoprzysadkowego) w celu wykluczenia guza wewnątrzczaszkowego; 14) pomiar wzrostu i masy ciała, należy określić dotychczasowy przebieg wzrastania, dokonać oceny wzrostu rodziców, obliczyć wzrost docelowy dziecka; 15) należy ocenić obecność cech płciowych i stadium dojrzewania płciowego według skali Tannera-Marschalla.</p> <p>3. Monitorowanie leczenia Po 3 miesiącach od rozpoczęcia leczenia lub po zmianie dawkowania: 1) LH; 2) FSH; 3) oznaczyć występowanie cech płciowych według kryteriów Tannera-Marschalla.</p>

		<p>Co 12 miesięcy należy wykonać badanie stanu kośćca RTG lub rezonansu magnetycznego celem oceny wieku kostnego.</p>
--	--	---

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOSCIĄ PRZYSADKI (ICD-10 E 23)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku stanów zagrożenia życia w następstwie trudnych do opanowania, nawracających stanów hipoglikemii u noworodków lub niemowląt, świadczeniobiorca kwalifikowany jest do terapii niezwłocznie po jego zgłoszeniu.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) niskorosłość, tj. wysokość ciała poniżej 3 centyla dla płci i wieku, na siatkach centylowych dla populacji dzieci polskich;</p> <p>2) upośledzone tempo wzrastania, poniżej -1 SD w odniesieniu do tempa wzrastania populacji dzieci polskich (wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres obserwacji w ośrodku uprawnionym do terapii hormonem wzrostu), z określeniem przewidywanego wzrostu ostatecznego, metodą Baley-Pineau;</p> <p>3) opóźniony wiek kostny, oceniany metodą Greulich'a-Pyle;</p> <p>4) wykluczenie innych, aniżeli SNP, przyczyn niskorosłości (niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, zaburzenia wchłaniania i trawienia jelitowego, obciążenia dotyczące przebiegu ciąży i porodu, itp.);</p> <p>5) niski wyrzut hormonu wzrostu (poniżej 10 ng/ml) w 2. godzinnym teście nocnego wyrzutu tego hormonu (co najmniej 5 pomiarów stężeń hormonu wzrostu - test przesiewowy);</p> <p>6) obniżony wyrzut hormonu wzrostu (poniżej 10 ng/ml) w dwóch, niezależnych testach stymulacji sekrecji tego hormonu (z uwagi na ryzyko powikłań testy te można wykonywać jedynie u dzieci powyżej 2 roku życia);</p> <p>7) nawracające stany hipoglikemii w okresie noworodkowym lub niemowlęcym, szczególnie u dzieci z wadami linii pośrodkowej twarzoczaszki;</p> <p>8) nieprawidłowości okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (TK z</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,1 - 0,33mg (0,3 - 1,0 IU)/kg m.c. /tydzień.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>Badania wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z somatotropinową lub wielohormonalną niedoczynnością przysadki (SNP/ WNP).</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach: pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>2.2 Co 180 dni pomiar stężenia glukozy we krwi z pomiarem odsetka glikowanej hemoglobiny A_{1c} lub co 365 dni: test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii.</p> <p>2.3 Co 90 dni</p> <p>1) krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja;</p> <p>2) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - test stymulacji wydzielania GH insuliną - 8 pomiarów stężeń GH (dotyczy świadczeniobiorców przed przekazaniem pod opiekę poradni endokrynologii dla osób dorosłych (około 20 -25% świadczeniobiorców));</p> <p>3) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - próba zagęszczenia moczu z ewentualną korektą dawki hormonu antydiuretycznego (dotyczy niektórych świadczeniobiorców z WNP - najczęściej po zabiegach neurochirurgicznych z moczówką prostą (około 5-10%));</p> <p>4) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - test stymulacji wydzielania gonadotropin (z użyciem preparatu do stymulacji wydzielania gonadotropin - 4 pomiary stężeń FSH i LH oraz 1 pomiar stężeń estrogenów i androgenów) - dotyczy świadczeniobiorców z opóźnionym lub</p>

kontrastem, MRI).

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.

3. Kryteria wyłączenia z programu:

- 1) złuszczenia główki kości udowej;
- 2) pseudo-tumor cerebri;
- 3) cukrzyca;
- 4) ujawnienia lub wznowy choroby rozrostowej;
- 5) brak zgody pacjenta na kontynuację leczenia;
- 6) niezadowalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała świadczeniobiorcy leczonego hormonem wzrostu poniżej 3 cm/rok (nie dotyczy dziewcząt z dojrzałością szkieletu powyżej 14 lat i chłopców z dojrzałością szkieletu powyżej 16 lat);
- 7) osiągnięcie wieku kostnego powyżej 16 lat przez dziewczynkę i powyżej 18 lat przez chłopca.

przedwczesnym pokwitaniem (około 5-10%).

2.4 Co 180 dni

- 1) pomiar stężenia TSH; pomiar stężenia fT_4 ;
- 2) jonogram w surowicy krwi (co najmniej pomiar stężenia Na^+).

2.5 Co 365 dni

- 1) pomiar stężenia IGF-1;
- 2) RTG śródreźcza z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego)
- 3) przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (2-3% leczonych) - konsultacja ortopedyczna, RTG lub USG stawów biodrowych, poszerzone o TK lub MRI stawów biodrowych
- 4) w przypadku wystąpienia objawów pseudo tumor cerebri (około 3-5% leczonych): konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego TK z kontrastem lub MRI.
- 5) konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; konsultacja neurochirurgiczna; morfologia krwi z rozmazem; TK z kontrastem lub MRI OUN (dotyczy świadczeniobiorców z podejrzeniem wznowy choroby rozrostowej lub innych poważnych powikłań (około 10-15%).

Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania są wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z somatotropinową lub wielohormonalną niedoczynnością przysadki (SNP / WNP).

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBREM IGF-1 (ICD-10 E-34.3)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Świadczeniobiorców do programu kwalifikuje, według standardów diagnozowania pacjentów z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1, Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) skrajna niskorosłość, tj. wysokość ciała poniżej -3 SD w odniesieniu do płci i wieku, na siatkach centylowych dla populacji dzieci polskich,</p> <p>2) stężenie IGF-1 poniżej -2,5 SDS w odniesieniu do płci i wieku,</p> <p>3) prawidłowe stężenie GH (w teście krótkiego nocnego wyrzutu tego hormonu - co najmniej 5 pomiarów stężeń hormonu wzrostu, w uzasadnionych przypadkach poszerzone o wykonanie dwóch testów stymulacji sekrecji tego hormonu),</p> <p>4) wykluczenie innych, aniżeli ciężki pierwotny niedobór IGF-1, przyczyn niskorosłości (niedokrwistość, choroby wątroby, niedoczynność tarczycy, zaburzenia wchłaniania i trawienia jelitowego, obciążenia dotyczące przebiegu ciąży i porodu, itp.),</p> <p>5) rozpoznanie ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 potwierdzone testem generacji somatomedyn,</p> <p>6) w przypadkach wątpliwych badania molekularne w kierunku rozpoznania mutacji w obrębie receptora hormonu wzrostu, mutacji genu kodującego syntezę IGF-1 lub promotora tego genu.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu lub czasowego zaprzestania terapii preparatem rhIGF-1</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Mecaserminum podawane jest w dawce 0,04 - 0,12 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) pomiar stężenia IGF-1,</p> <p>2) pomiar stężenia IGFBP₃,</p> <p>3) pomiar stężenia glukozy we krwi,</p> <p>4) Test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii</p> <p>5) Pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny HbA_{1c}</p> <p>6) Krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja</p> <p>7) Pomiar stężenia TSH, pomiar stężenia fT₄</p> <p>8) Jonogram surowicy krwi (co najmniej pomiar stężenia Na⁺)</p> <p>9) Konsultacja laryngologiczna z audiogramem, konsultacja kardiologiczna z USG układu sercowo-naczyniowego</p> <p>10) Konsultacja okulistyczna (w zależności od potrzeb (ok. 10% pacjentów))</p> <p>11) RTG śródreżca z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego)</p> <p>12) Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI).</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 30 dni po rozpoczęciu leczenia, następnie co 90 dni</p> <p>1) pomiar stężenia IGF-1;</p> <p>2) pomiar stężenia IGFBP₃;</p> <p>3) pomiar stężenia glukozy we krwi.</p> <p>2.2 30 dni po rozpoczęciu leczenia, następnie co 365 dni</p> <p>- test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii lub co 180 dni</p> <p>- pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny HbA_{1c}</p>

<p>1) nawracające, zagrażające życiu stany hipoglikemii;</p> <p>2) złuszczenia główki kości udowej;</p> <p>3) pseudo-tumor cerebri;</p> <p>4) ujawnienia lub wznowy choroby rozrostowej;</p> <p>5) brak zgody pacjenta na kontynuację leczenia;</p> <p>6) niezadowalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała pacjenta leczonego za pomocą rhIGF-1 < 3 cm/rok;</p> <p>7) osiągnięcie wieku kostnego:</p> <p>a) powyżej 14 lat przez dziewczynkę,</p> <p>b) powyżej 16 lat przez chłopca.</p>		<p>2.3 Co 90 dni (w razie wystąpienia powikłań częścię) - krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja.</p> <p>2.4 Co 180 dni</p> <p>1) pomiar stężenia TSH;</p> <p>2) pomiar stężenia fT₄;</p> <p>3) jonogram surowicy krwi (co najmniej pomiar stężenia Na⁺).</p> <p>2.5 Co 365 dni</p> <p>1) konsultacja laryngologiczna z audiogramem;</p> <p>2) konsultacja kardiologiczna z USG układu sercowo-naczyniowego.</p> <p>2.6 Co 365 dni</p> <p>1) RTG śródreżca z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego);</p> <p>2) obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI) - w zależności od potrzeb (ok. 20% pacjentów).</p> <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy, co 12 miesięcy, przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.</p>
--	--	---

LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII (ICD-10 E 72.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
1	2	3
<p>Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia co 6 miesięcy odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Leczenie następujących niedoborów enzymatycznych: beta-syntazy cystationiny (CBS), reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu (MTHFR) oraz niektórych zaburzeń metabolizmu kofaktora kobalaminy (cbl C,D,E,F,G):</p> <p>1) wysoki poziom homocysteiny we krwi, tj. > 50 $\mu\text{mol/l}$, oraz nieprawidłowy poziom metioniny, tj. < 5 lub > 40 $\mu\text{mol/l}$, po wykluczeniu niedoboru witaminy B₁₂ i kwasu foliowego. W przypadku niedoborów witaminy B₁₂ lub kwasu foliowego należy dokonać powtórnej oceny poziomu homocysteiny i metioniny po uzupełnieniu niedoborów;</p> <p>2) w przypadku rozpoznania homocystynurii klasycznej (deficyt CBS) negatywny wynik testu obciążenia witaminą B₆ (pirydoksyną). Za negatywny wynik testu należy rozumieć brak redukcji lub redukcję mniejszą niż 30% od stanu wyjściowego poziomu homocysteiny lub metioniny; kolejno w pierwszej dobie po podaniu doustnym 100 mg pirydoksyny, w przypadku braku reakcji w drugiej dobie należy podać 200 mg pirydoksyny. Jeżeli nadal brak reakcji w trzeciej dobie testu zalecane jest 500 mg (u dzieci do 3 roku życia dawka pirydoksyny w trzeciej dobie testu wynosi 300 mg). Poziomy homocysteiny i metioniny powinny być oznaczane 24 godziny po każdej dawce witaminy B₆;</p> <p>3) w przypadku niejednoznacznych wyników badań biochemicznych wskazane jest potwierdzenie rozpoznania badaniem enzymatycznym,</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Zalecana dawka dobową betainy bezwodnej u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat wynosi 6 g. Preparat podaje się doustnie, dwa razy na dobę, w dawkach podzielonych po 3 g. W ciężkich postaciach deficytu MTHFR może wystąpić konieczność zwiększenia dawki do 9 g betainy na dobę.</p> <p>1.2 U dzieci w wieku poniżej 10 lat zwykle skuteczne jest dawkowanie 100 mg/kg mc/dobę w 2 dawkach podzielonych; zwiększenie dawkowania ponad 2 razy na dobę lub zwiększenie wielkości dawki ponad 150 mg/kg mc/dobę nie jest zalecane, bo nie zwiększa skuteczności leczenia.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poziom homocysteiny całkowitej we krwi; 2) poziom metioniny we krwi (aminoacydogram); 3) morfologia krwi; 4) stężenie witaminy B₁₂ i kwasu foliowego we krwi; 5) profil kwasów organicznych moczu metodą GC/MS z ilościową oceną wydalania kwasu metylomalonowego; 6) profil acylokarnityn metodą MS/MS; 7) MRI OUN; 8) konsultacja neurologiczna; 9) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji; 10) badanie densytometryczne kośćca (dla pacjentów powyżej 5 roku życia); 11) konsultacja okulistyczna, z oceną narządu wzroku w lampie szczelinowej (jeśli pacjent nie przebył lansektomii). <p>2. Monitorowanie leczenia Raz na 180 dni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poziom homocysteiny całkowitej we krwi; 2) poziom metioniny we krwi (aminoacydogram); 3) morfologia krwi; 4) stężenie witaminy B₁₂, kwasu foliowego, witaminy 250HD₃ we krwi; 5) poziom Ca, PO₄³⁻, fosfatazy alkalicznej we krwi; 6) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji; 7) badanie densytometryczne kośćca (dla pacjentów powyżej 5 roku życia); 8) konsultacja neurologiczna;

analizą komplementarności w fibroblastach skóry lub analizą DNA.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkowych lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.

3. Kryteria wyłączenia:

- 1) wystąpienie nadwrażliwości na betainę;
- 2) pozytywny wynik testu z witaminą B6 - pacjenci z tym typem homocystynurii witaminoB6-zależnej odpowiadają bowiem na leczenie pirydoksyną w stopniu zadowalającym i nie wymagają dodatkowej podaży betainy;
- 3) dyskwalifikacja z powodu działań niepożądanych leku, w tym wystąpienia obrzęku mózgu związanego z wysokim poziomem metioniny we krwi $> 1000 \mu\text{mol/l}$ u pacjentów z homocystynurią klasyczną (deficyt CBS);
- 4) stwierdzenie nieskuteczności leczenia - weryfikacji skuteczności leczenia dokonuje co 6 miesięcy Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii;
- 5) ciąża lub karmienie piersią.

9) konsultacja dietetyczna.

W przypadku napadowych objawów neurologicznych konieczne są aktualne badania MRI OUN lub EEG (zależnie od objawów). Okresowej skuteczności terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkowych po przedstawieniu przez lekarza prowadzącego wymaganych kart monitorowania pacjenta.

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKU W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się, co 6 miesięcy, w oparciu o ocenę stanu klinicznego pacjenta oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Wczesna postać (typ niemowlęcy) oraz późna postać (<i>late-onset</i>) choroby Pompego, zdiagnozowana na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności alfa-glukozydazy w leukocytach krwi obwodowej lub fibroblastach skóry, potwierdzona badaniem molekularnym.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciąża lub laktacja; 2) obecność poważnych wrodzonych anomalii lub chorób współistniejących, które w ocenie lekarza kwalifikującego do leczenia lub Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, mogą uniemożliwić poprawę stanu zdrowia świadczeniobiorcy; 3) znaczna progresja choroby, pojawiająca się pomimo leczenia. 	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Dawka preparatu alglukozydazy alfa wynosi 20 mg/kg masy ciała, podawana raz na dwa tygodnie, w postaci infuzji. Lek należy podawać stopniowo. Zaleca się rozpoczęcie wlewu z szybkością 1 mg/kg m.c./h i stopniowe zwiększanie szybkości podawania leku o 2 mg/kg m.c./h, co 30 minut, do osiągnięcia maksymalnej szybkości 7 mg/kg m.c./h, jeśli nie wystąpią niepożądane reakcje związane z infuzją. Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu choroby Pompego lub dziedzicznych zaburzeń metabolizmu. Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stwierdzenie braku lub głębokiego niedoboru aktywności alfa-glukozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym; 2) ocena miana przeciwciał przeciwko alglukozydazie alfa (nie jest badaniem obligatoryjnym); 3) morfologia krwi z rozmazem; 4) układ krzepnięcia; 5) proteinogram; 6) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, CK-MB, stężenie bilirubiny całkowitej; 7) stężenie fosfatazy alkalicznej; 8) stężenie cholesterolu i frakcji LDL-cholesterolu; 9) ocena równowagi kwasowo-zasadowej; 10) USG jamy brzusznej z oceną wątroby i śledziony; 11) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa; 12) pomiary antropometryczne; 13) konsultacja psychologiczna; 14) ciśnienie tętnicze krwi; 15) EKG; 16) USG układu sercowo-naczyniowego; 17) RTG klatki piersiowej; 18) konsultacja pulmonologiczna; 19) spirometria; 20) konsultacja laryngologiczna; 21) badanie audiometryczne; 22) badanie okulistyczne;

- 23) konsultacja ortopedyczna;
- 24) konsultacja neurologiczna;
- 25) konsultacja kardiologiczna;
- 26) test 3/6 minutowego marszu;
- 27) ocena siły mięśniowej za pomocą dynamometru;
- 28) ocena sprawności ruchowej za pomocą wskaźnika Barthel.

2. Monitorowanie leczenia

2.1 Raz na 180 dni (okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie świadczeniobiorców z chorobą Pompego. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii):

- 1) morfologia krwi z rozmazem;
- 2) stężenie CK-MB;
- 3) stężenie fosfatazy alkalicznej;
- 4) ocena równowagi kwasowo-zasadowej;
- 5) układ krzepnięcia;
- 6) proteinogram;
- 7) stężenie cholesterolu i frakcji LDL-cholesterolu;
- 8) konsultacja pulmonologiczna;
- 9) badanie spirometryczne;
- 10) pomiary antropometryczne;
- 11) ciśnienie tętnicze krwi;
- 12) EKG;
- 13) USG układu sercowo-naczyniowego;
- 14) USG jamy brzusznej;
- 15) test 3/6 minutowego marszu;
- 16) RTG klatki piersiowej;
- 17) badanie audiometryczne;
- 18) konsultacja neurologiczna;
- 19) konsultacja kardiologiczna;
- 20) konsultacja laryngologiczna;

		<p>21) ocena siły mięśniowej za pomocą dynamometru;</p> <p>22) ocena sprawności ruchowej za pomocą wskaźnika Barthel.</p> <p>2.2 Co 365 dni</p> <p>1) ocena miana przeciwciał przeciwko alglukozydazie alfa (badanie nieobligatoryjne – zalecane przez Zespół Koordynacyjny);</p> <p>2) badanie okulistyczne;</p> <p>3) konsultacja psychologiczna;</p> <p>4) w uzasadnionych przypadkach RTG kręgosłupa;</p> <p>5) konsultacja ortopedyczna.</p> <p>6) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, stężenie bilirubiny.</p>
--	--	---

LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A (ICD-10 E 75.2)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacji chorych do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia co 6 miesięcy odbywa się, w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) brak lub znaczny niedobór aktywności enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzony badaniem molekularnym.</p> <p>Refundowane jest leczenie świadczeniobiorców z typem I choroby oraz z typem III choroby.</p> <p>Nie jest refundowane leczenie świadczeniobiorców z asymptotyczną (bezobjawową) postacią choroby Gauchera.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Przedłużenie leczenia następuje co 6 miesięcy decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii.</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na imiglucerażę;</p> <p>2) znaczna progresja choroby pojawiająca się pomimo podjętego leczenia;</p> <p>3) pacjenci z asymptotyczną (bezobjawową) postacią choroby Gauchera;</p> <p>4) pacjenci z typem II choroby.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Dawka imigluceraży zależy od ciężkości objawów i wynosi 15-60 U/kg m.c. podawanych co 14 ± 3 dni w postaci jednogodzinnych wlewów dożylnych.</p> <p>W przypadku braku efektywności zastosowanej dawki po 6 mies. terapii dawkę imigluceraży można zwiększyć do maksymalnej dawki, t.j. do 60 U/kg m.c. podawanych co 14 ± 3 dni (przed zwiększeniem dawki należy oznaczyć miano przeciwciał przeciw imiglucerażom).</p> <p>W przypadku zwiększenia dawki leku do 60 U/kg m.c., przy braku skuteczności leczenia, w takiej, maksymalnej dawce po 12 miesiącach terapii, lek należy odstawić, ponieważ wskazuje to, iż leczenie jest nieefektywne.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) stwierdzenie braku lub znacznego niedoboru aktywności enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone wynikiem badania molekularnego;</p> <p>2) ocena miana przeciwciał przeciwko imiglucerażom (badanie nieobligatoryjne);</p> <p>3) morfologia krwi pełna z rozmazem;</p> <p>4) układ krzepnięcia;</p> <p>5) próby wątrobowe: ALAT, AspAT;</p> <p>6) stężenie fosfatazy alkalicznej;</p> <p>7) stężenia witaminy D;</p> <p>8) chitotriozydaza;</p> <p>9) USG jamy brzusznej, z oceną wielkości (z podaniem wymiarów) wątroby i śledziony;</p> <p>10) pomiary antropometryczne;</p> <p>11) MRI OUN;</p> <p>12) Badanie densytometryczne kości (DEXA);</p> <p>13) MRI kości długich (badanie obligatoryjne jedynie u pacjentów z nieprawidłowościami układu kostnow stawowego lub w przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych);</p> <p>14) badanie psychologiczne;</p> <p>15) konsultacja okulistyczna;</p> <p>16) EKG;</p> <p>17) USG układu sercowo-naczyniowego;</p> <p>18) konsultacja neurologiczna;</p> <p>19) konsultacja kardiologiczna (w uzasadnionych przypadkach);</p> <p>20) konsultacja ortopedyczna.</p>

		<p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Raz na 180 dni</p> <p>1) ocena miana przeciwciał przeciwko imiglucerazie - badanie nieobligatoryjne - zalecane przez Zespół Koordynacyjny, w przypadku braku efektywności dotychczasowego leczenia, szczególnie przy podaniu leku w maksymalnej dawce tj. 60U/kg m.c.;</p> <p>2) morfologia krwi pełna z rozmazem;</p> <p>3) układ krzepnięcia;</p> <p>4) próby wątrobowe: AlAT, AspAT;</p> <p>5) chitotriozydaza;</p> <p>6) USG jamy brzusznej, z oceną wielkości (z podaniem wymiarów) wątroby i śledziony;</p> <p>7) pomiary antropometryczne;</p> <p>8) konsultacja neurologiczna.</p> <p>Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjenta z chorobą Gauchera.</p> <p>2.2 Co 365 dni</p> <p>1) Badanie densytometryczne kości (DEXA);</p> <p>2) MRI kości długich (badanie obligatoryjne jedynie u pacjentów z nieprawidłowościami układu kostnowązowego lub w przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych);</p> <p>3) MRI OUN-badanie obligatoryjne jedynie u pacjentów z podejrzeniem typu III choroby (z przewlekłą neuropatią);</p> <p>4) badanie psychologiczne,;</p> <p>5) konsultacja okulistyczna;</p> <p>6) EKG;</p> <p>7) USG układu sercowo-naczyniowego (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym w poprzednim badaniu);</p> <p>8) konsultacja kardiologiczna (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym w poprzednim badaniu);</p> <p>9) konsultacja ortopedyczna.</p>
--	--	---

LECZENIE CHOROBY HURLER (ICD-10 E 76.0)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia co 6 miesięcy odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji Brak lub głęboki niedobór aktywności enzymu α-L-iduronidazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Przedłużenie leczenia następuje co 6 miesięcy decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii. Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia 1) ciąża lub laktacja; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na laronidazę; 3) znaczna progresja choroby pomimo podjętego</p>	<p>1. Dawkowanie Zalecana dawka laronidazy wynosi 100 j./kg masy ciała, podawana raz w tygodniu, we wlewie dożylnym. Początkowa prędkość infuzji wynosi 2 j./kg m.c./h. Prędkość infuzji można stopniowo zwiększać, co 15 minut, przy dobrej tolerancji leku, aż do maksymalnej prędkości 43 j./kg m.c./h. Całkowitą objętość leku należy podać w okresie około 3-4 godzin.</p> <p>Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z mukopolisacharydozą typu 1 lub innych dziedzicznych zaburzeń metabolizmu. Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji 1) stwierdzenie braku lub głębokiego niedoboru aktywności α-L-iduronidazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym.. 2) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem 3) ocena miana przeciwciał przeciwko α-L-iduronidazie (nie jest badaniem obligatoryjnym) 4) morfologia krwi, z rozmazem 5) próby wątrobowe: AlAT, AspAT 6) stężenie fosfatazy alkalicznej 7) stężenie witamin B12, E, D 8) stężenie cholesterolu 9) ocena równowagi kwasowo-zasadowej 10) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony 11) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa 12) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa 13) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji 14) pomiar ciśnienia tętniczego krwi 15) EKG 16) USG układu sercowo-naczyniowego 17) konsultacja laryngologiczna</p>

leczenia.		<p>18) badanie audiometryczne 19) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów 20) EMG, do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka 21) konsultacja neurologiczna 22) konsultacja kardiologiczna 23) test 3/6 minutowego marszu</p> <p>2. Monitorowanie leczenia 2.1 Raz na 180 dni 1) morfologia krwi, z rozmazem 2) próby wątrobowe: AlAT, AspAT 3) stężenie fosfatazy alkalicznej 4) ocena równowagi kwasowo-zasadowej 5) badanie okulistyczne, z oceną w lampie szczelinowej 6) badanie spirometryczne układu oddechowego 7) pomiary antropometryczne 8) pomiar ciśnienia tętniczego krwi 9) test 3/6 minutowego marszu Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjentów z chorobą Hurler. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii.</p> <p>2.2 Co 365 dni 1) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem (po 6 miesiącach od wprowadzenia terapii, a następnie co 365 dni) 2) ocena miana przeciwciał przeciwko α-L-iduronidazie (badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o zwiększeniu dawki leku)</p>
-----------	--	--

		<p>lub braku efektywności dotychczasowej dawki leku)</p> <ol style="list-style-type: none">3) stężenie witamin B12, E, D4) stężenie cholesterolu5) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony6) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa (MRI OUN w przypadku nieprawidłowości w poprzednim badaniu lub pojawienia się lub nasilenia objawów neurologicznych)7) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa8) Badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji9) EKG10) USG układu sercowo-naczyniowego (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym - konsultacja kardiologiczna - co 180 dni lub częściej)11) konsultacja laryngologiczna12) badanie audiometryczne13) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów14) EMG, do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka15) konsultacja neurologiczna16) konsultacja kardiologiczna
--	--	--

LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) (ICD-10 E-76.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>a) mukopolisacharydoza typu II zdiagnozowana na podstawie udokumentowanego, głębokiego deficytu aktywności enzymu sulfatazy iduronianu w surowicy lub leukocytach krwi obwodowej, lub w fibroblastach skóry,</p> <p>b) powyżej ukończonego 5 roku życia.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) ciąża lub laktacja;</p> <p>2) obecność poważnych wrodzonych anomalii rozwojowych lub chorób współistniejących, które w ocenie lekarza kwalifikującego do leczenia lub Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, mogą uniemożliwić poprawę stanu zdrowia;</p> <p>3) znaczna progresja choroby pomimo leczenia.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Lek podawany jest w dawce 0,5 mg/kg masy ciała, co tydzień, w postaci dożylnego wlewu, trwającego ok. 3 godzin, który może być stopniowo skracany do 1 godziny, jeśli nie występują reakcje niepożądane związane z jego podaniem. Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu świadczeniobiorców z mukopolisacharydozą typu II lub innymi dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu.</p> <p>Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) układ krzepnięcia;</p> <p>3) proteinogram;</p> <p>4) gazometria;</p> <p>5) AspAT, AlAT, CK, bilirubina;</p> <p>6) cholesterol, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach;</p> <p>7) wydalanie mukopolisacharydów z moczem;</p> <p>8) poziom przeciwciał przeciwko sulfatazie iduronianu (w miarę możliwości);</p> <p>9) badanie fizykalne;</p> <p>10) parametry życiowe;</p> <p>11) pomiary antropometryczne;</p> <p>12) EKG;</p> <p>13) echokardiografia;</p> <p>14) RTG klatki piersiowej;</p> <p>15) USG jamy brzusznej;</p> <p>16) MRI OUN z uwzględnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa;</p> <p>17) RTG kręgosłupa;</p> <p>18) diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka (EMG);</p> <p>19) badanie pulmonologiczne (wydolność oddechowa, spirometria);</p> <p>20) badanie audiometryczne;</p> <p>21) badanie okulistyczne;</p> <p>22) badanie psychologiczne;</p> <p>23) badanie narządu ruchu oraz funkcji motorycznych;</p> <p>24) test 3/6 minutowego marszu;</p> <p>25) test SF36.</p>

2. Monitorowanie leczenia

2.1 W pierwszym roku leczenia wykonywanie badań powinno być przeprowadzone co 6 miesięcy

- 1) morfologia krwi z rozmazem;
- 2) układ krzepnięcia;
- 3) gazometria;
- 4) CK;
- 5) AspAT, AlAT, bilirubina;
- 6) wydalanie mukopolisacharydów z moczem;
- 7) poziom przeciwciał przeciwko sulfatazie iduronianu (w miarę możliwości);
- 8) badanie fizykalne;
- 9) ocena parametrów życiowych;
- 10) pomiary antropometryczne;
- 11) EKG;
- 12) echokardiografia;
- 13) USG jamy brzusznej;
- 14) badanie pulmonologiczne (wydolność oddechowa, spirometria);
- 15) badanie narządu ruchu oraz funkcji motorycznych;
- 16) badanie psychologiczne;
- 17) test 3/6 minutowego marszu;
- 18) test SF36.

Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjentów z chorobą Hunter. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii;

2.2 Raz na 12 miesięcy

- 1) cholesterol;
- 2) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach;
- 3) RTG klatki piersiowej;
- 4) RTG kręgosłupa;
- 5) MRI OUN wskazane przede wszystkim w przypadku współistniejącego wodogłowia (do decyzji lekarza);
- 6) badanie audiometryczne;

		7) badanie okulistyczne, z oceną dna oka; 8) diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka (EMG).
--	--	--

LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX – LAMY) (ICD-10 E-76.2)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkowych powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Mukopolisacharydoza typu VI zdiagnozowana na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkowych lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) ciąża lub laktacja; 2) obecność poważnych wrodzonych anomalii lub chorób współistniejących, które w ocenie lekarza kwalifikującego do leczenia lub Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, mogą uniemożliwić poprawę stanu zdrowia; 3) znaczna progresja choroby pomimo leczenia.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Zalecana dawka galsulfazy wynosi 1 mg/kg masy ciała podawanej raz w tygodniu w postaci wlewu dożylnego przez 4 godziny. Początkową prędkość wlewu można dostosować tak, aby około 2,5% całkowitego roztworu zostało podane w okresie pierwszej godziny, a pozostała jego objętość (około 97,5%) przez kolejne 3 godziny infuzji.</p> <p>Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z mukopolisacharydozą typu VI lub innych dziedzicznych zaburzeń metabolizmu.</p> <p>Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) stwierdzenie braku lub głębokiego niedoboru aktywności 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym; 2) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem; 3) ocena miana przeciwciał przeciwko 4-sulfatazie N-acetylogalaktozaminy (nie jest badaniem obligatoryjnym); 4) morfologia krwi z rozmazem; 5) układ krzepnięcia; 6) proteinogram; 7) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, stężenie bilirubiny; 8) stężenie fosfatazy alkalicznej; 9) stężenie witamin A, D, E, K; 10) stężenie cholesterolu; 11) ocena równowagi kwasowo-zasadowej; 12) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony; 13) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa; 14) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa; 15) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji; 16) pomiar ciśnienia tętniczego krwi; 17) EKG; 18) USG układu sercowo-naczyniowego; 19) RTG klatki piersiowej; 20) konsultacja pulmonologiczna, z oceną spirometrii; 21) konsultacja laryngologiczna; 22) badanie audiometryczne;</p>

- 23) badanie okulistyczne, z oceną oczu w lampie szczelinowej;
- 24) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów;
- 25) EMG, do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka;
- 26) konsultacja neurologiczna;
- 27) konsultacja kardiologiczna;
- 28) test 3/6 minutowego marszu.

2. Monitorowanie leczenia

2.1 Raz na 180 dni

- 1) morfologia krwi, z rozmazem;
- 2) układ krzepnięcia;
- 3) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, stężenie bilirubiny;
- 4) stężenie fosfatazy alkalicznej;
- 5) ocena równowagi kwasowo-zasadowej;
- 6) proteinogram;
- 7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
- 8) pomiary antropometryczne;
- 9) EKG;
- 10) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony;
- 11) USG układu sercowo-naczyniowego;
- 12) badanie okulistyczne, z oceną w lampie szczelinowej;
- 13) konsultacja pulmonologiczna, z badaniem spirometrycznym;
- 14) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów;
- 15) test 3/6 minutowego marszu.

Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjentów z chorobą Maroteaux-Lamy. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii;

2.2 Co 365 dni

		<ol style="list-style-type: none">1) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem (po 6 miesiącach od wprowadzenia terapii, a następnie co 365 dni);2) ocena miana przeciwciał przeciwko 4-sulfatazie N-acetylogalaktozaminie (badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o zwiększeniu dawki leku lub braku efektywności dotychczasowej terapii);3) stężenie cholesterolu;4) stężenie witamin A, D, E, K;5) RTG klatki piersiowej;6) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa;7) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa (MRI OUN w przypadku nieprawidłowości w poprzednim badaniu lub pojawienia się lub nasilenia objawów neurologicznych);8) EMG do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka;9) badanie audiometryczne;10) badanie psychologiczne z oceną ilorazu inteligencji;11) konsultacja laryngologiczna;12) konsultacja neurologiczna;13) konsultacja kardiologiczna (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym - konsultacja kardiologiczna -co 180 dni lub częściej).
--	--	---

LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ (ICD-10 E 84)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>a) wiek od 6 lat</p> <p>b) udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołanym przez <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <p>c) oporność na kolistynę lub udokumentowana nietolerancja kolistyny (nietolerancję kolistyny można wykazać poprzez spadek FEV1 lub FVC po rozpoczęciu leczenia kolistyną podawaną wziewnie lub dodatni wynik testu degranulacji bazofilów z kolistyną).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie należy kontynuować cyklicznie dopóki świadczeniobiorca odnosi korzyści z włączenia tobramycyny do schematu leczenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na tobramycynę, inny aminoglikozyd czy substancję pomocniczą;</p> <p>2) upośledzenie słuchu (z dużą ostrożnością należy rozważyć stosowanie leku u świadczeniobiorcy przyjmującego inne leki ototoksyczne);</p> <p>3) uszkodzenie nerek (stężenie kreatyniny w surowicy nie mniejsze niż 2mg/dl lub mocznika nie mniejsze niż 40mg/dl);</p> <p>4) krwioplucie nie mniejsze niż 60 cm³ na dobę w okresie 30 dni przed pierwszym podaniem tobramycyny;</p> <p>5) stwierdzenie ropnia płuca w RTG klatki piersiowej.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Dawka tobramycyny dla dorosłego i dzieci w wieku od 6 lat to zawartość jednego pojemnika (300 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez 28 dni.</p> <p>Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 12 godzin.</p> <p>Po 28 dniach leczenia tobramycyną, preparat należy odstawić na okres następnych 28 dni.</p> <p>Należy przestrzegać 28-dniowych naprzemiennych cykli aktywnego leczenia z 28-dniową przerwą w leczeniu (28 dni leczenia na przemian z 28-dniowymi przerwami w podawaniu leku).</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) stężenie kreatyniny;</p> <p>2) stężenie mocznika;</p> <p>3) test degranulacji bazofilów (opcjonalnie);</p> <p>4) badanie mikrobiologiczne potwierdzające oporność <i>P. aeruginosa</i> na kolistynę oraz potwierdzające wrażliwość drobnoustroju na tobramycynę;</p> <p>5) RTG klatki piersiowej;</p> <p>6) badanie spirometryczne przed i po podaniu kolistyny (2 mln j.m.) w celu potwierdzenia nietolerancji leku;</p> <p>7) audiometria</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Badanie przeprowadzane po 2, 3, 5 i 6 cyklu leczenia:</p> <p>1) badanie mikrobiologiczne;</p> <p>2) badanie spirometryczne (badanie spirometryczne należy dodatkowo wykonać w 2 i 4 tygodniu terapii).</p> <p>2.2 Badanie przeprowadzanie w 48 tygodniu leczenia (po zakończeniu 6 cykli leczenia) :</p> <p>1) stężenie kreatyniny;</p> <p>2) stężenie mocznika;</p> <p>3) badanie mikrobiologiczne;</p> <p>4) badanie spirometryczne;</p> <p>5) badanie słuchu - audiometria</p>

LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY (ICD-10 G 24.3, G 24.5, G 24.4, G 51.3, G 24.8, G 24.4)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji 1) komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej: a) w kręczy karku u świadczeniobiorców poniżej 50 roku życia - badanie TK/MRI głowy, RTG kręgosłupa szyjnego, badanie poziomu miedzi lub ceruloplazminy, ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, b) w kurczu powiek - w wybranych przypadkach różnicowanie z miastenią (próba nużliwości mięśni), c) w połowicznym kurczu twarzy - badanie TK lub MRI głowy; 2) wykluczenie miastenii i zespołu miastenicznego na podstawie wywiadu i badania neurologicznego (wykonanie dodatkowych badań jedynie w uzasadnionych przypadkach); 3) brak objawów uogólnionego zakażenia; 4) wykluczenie obecności stanu zapalnego w obrębie planowanego miejsca podania; 5) wykluczenie ciąży na podstawie wywiadu.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia 1) nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku; 2) powstanie oporności na lek; 3) stwierdzenie miastenii lub zespołu miastenicznego; 4) objawy uogólnionego zakażenia; 5) zapalenie okolicy miejsca podania; 6) ciąża; 7) przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwowo-mięśniową (np.</p>	<p>1. Dawkowanie 1.1 Botulinum A toxin a 500j. (Dysport) Kręcz karku 500 - 1.000 j.m. Kurcz powiek 100 - 250 j.m. Połowiczy kurcz twarzy 50 - 125 j.m. Dystonia krtaniowa 40 - 80 j.m. Dystonia twarzy 100-400 j.m.</p> <p>1.2 Botulinum A toxin a 100j. (Botox) Kręcz karku 100-200 j.m. Kurcz powiek 20 - 50 j.m. Połowiczy kurcz twarzy 10 - 25 j.m. Dystonia krtaniowa 10 - 20 j.m. Dystonia twarzy 20-80 j.m.</p> <p>1.3 Botulinum A toxin a 100j. (Xeomin) Kręcz karku 100 - 200 j.m. Kurcz powiek 20 - 50 j.m.</p> <p>Częstość podawania leku zależy od stanu klinicznego świadczeniobiorcy, maksymalnie 4 razy w okresie roku.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) poziom miedzi; 3) poziom ceruloplazminy; 4) RTG kręgosłupa szyjnego; 5) tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.</p> <p>RTG kręgosłupa szyjnego - w przypadku leczenia świadczeniobiorców z kręczem karku. Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny - w przypadku leczenia świadczeniobiorców z kręczem karku lub połowicznym kurczem twarzy.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia EMG - badanie przeprowadzane w niektórych przypadkach zgodnie z harmonogramem dawkowania (w niektórych przypadkach uzasadniony jest wybór miejsca podania toksyny botulinowej przy pomocy badania EMG).</p>

aminoglikozydy).		
------------------	--	--

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozlanego – oparte na kryteriach diagnostycznych McDonalda (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po kontraście; 3) uzyskanie co najmniej 15 punktów według punktowego systemu kwalifikacji określonego w ust. 3; 4) pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej opieką świadczeniobiorcę.</p> <p>1.2 Leczenia octanem glatirameru: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozlanego – oparte na kryteriach diagnostycznych McDonalda (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po kontraście; 3) uzyskanie co najmniej 15 punktów według punktowego systemu kwalifikacji określonego w ust. 3; 4) pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej opieką świadczeniobiorcę;</p>	<p>1. Dawkowanie interferonu beta</p> <p>1.1. Dawkowanie u osób dorosłych: Dawka należna wynosi w przypadku: 1) interferonu beta-1b: 0,25 mg podskórnie co drugi dzień; 2) interferonu beta-1a: 22µg, 44µg podskórnie lub 30µg domięśniowo w zależności od tolerancji raz lub 3 razy w tygodniu (dawkowanie zależy od Charakterystyki Produktu Leczniczego).</p> <p>1.2. Dawkowanie u dzieci i młodzieży: 1) u dzieci i młodzieży o ciężarze ciała poniżej 30 kg leczenie należy rozpocząć od 1/4 dawki należnej dla osoby dorosłej; dawkę należną dla dzieci i młodzieży o ciężarze ciała poniżej 30 kg (1/2 dawki należnej dla osoby dorosłej) należy osiągnąć po miesiącu leczenia; 2) u dzieci i młodzieży o ciężarze ciała powyżej 30 kg leczenie należy rozpocząć od 1/2 dawki należnej dla osoby dorosłej; dawkę należną równą dawce dla osoby dorosłej należy osiągnąć po miesiącu leczenia.</p> <p>2. Dawkowanie octanu glatirameru Zalecane dawkowanie wynosi 20 mg octanu glatirameru we wstrzyknięciu podskórnym, raz na dobę.</p> <p>2.1 Dawkowanie u dzieci i młodzieży Ograniczone opublikowane dane sugerują, że profil bezpieczeństwa u młodzieży od 12 do 18 roku życia przyjmującej codziennie octan glatirameru podawany</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji: 1) badania biochemiczne w tym oceniające funkcję nerek, wątroby, TSH; 2) badanie ogólne moczu; 3) morfologia krwi z rozmazem; 4) rezonans magnetyczny bez i po kontraście; rezonans magnetyczny wykonuje się w okresie kwalifikacji do programu. Jeżeli leczenie nie zostanie rozpoczęte do 30 dni od jego wykonania to badanie powtarza się tuż przed zastosowaniem pierwszej dawki leku; 5) wzrokowe potencjały wywołane (WPW), jeśli wymagane podczas ustalania rozpoznania; 6) w przypadkach wątpliwych diagnostycznie wskazane badanie białka oligoklonalnego IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia: 1) badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, przez pierwsze 6 miesięcy leczenia, kontrola co 3 miesiące, następnie co 6 miesięcy, z wyjątkiem morfologii i parametrów wątrobowych, które wykonuje się co 3 miesiące; u dzieci i młodzieży kontrola co miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, następnie co 3 miesiące 2) rezonans magnetyczny – po każdych 12 miesiącach leczenia bez i po kontraście.</p>

<p>2. Przeciwwskazania do stosowania interferonów beta lub octanu glatirameru.</p> <p>2.1. Przeciwwskazania do stosowania interferonów beta:</p> <p>1) pierwotne przeciwwskazania dla stosowania interferonów beta (wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych przeciwwskazań):</p> <ul style="list-style-type: none">a) nadwrażliwość na interferon beta,b) współtowarzysząca inna postać choroby,c) zdekompensovana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2 razy powyżej normy),d) zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy),e) depresja nie poddająca się leczeniu,f) padaczka z wyłączeniem napadów, które u dzieci i młodzieży wystąpiły w czasie rzutu stwardnienia rozsianego,g) przeciwwskazania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; <p>2) brak skuteczności leczenia, zgodnie z ust. 5;</p> <p>3) nietolerancja interferonów beta (wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych):</p> <ul style="list-style-type: none">a) ostre reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, pokrzywka),b) wzrost poziomu transaminaz (AspAT, ALAT powyżej 2 x GGN) lub kliniczne objawy niewydolności wątroby,c) wystąpienie leukopenii (poniżej 3000/ μl), trombocytopenii lub niedokrwistości,d) objawy ciężkiej depresji, próby samobójcze, padaczka,e) wystąpienie zaburzeń czynności tarczycy (bez eutyreozy),f) wieloogniskowe zmiany skórne. <p>2. 2. Przeciwwskazania do stosowania octanu glatirameru.</p> <p>1) pierwotne przeciwwskazania dla stosowania</p>	<p>podskórnie jest podobny do obserwowanego u dorosłych. Nie opublikowano wytycznych omawiających stosowanie leków immunomodulujących w odniesieniu do dzieci. Octan glatirameru można od razu podawać w dawkach, jakie zaleca się osobom dorosłym.</p>	
---	---	--

octanu glatirameru (wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych przeciwwskazań):

- a) nadwrażliwość na octan glatirameru lub mannitol,
 - b) współtowarzysząca inna postać choroby;
- 2) brak skuteczności leczenia, zgodnie z ust. 5;
3) ciąża

3. Punktowy system kwalifikacji do leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta i octanem glatirameru:

1) czas trwania choroby

0 - 3 lat - 6 pkt

3 - 6 lat - 4 pkt

6 - 10 lat - 2 pkt

powyżej 10 lat - 1 pkt

2) postać choroby

rzutowa bez objawów ubytkowych - 5 pkt

3) liczba rzutów choroby w ostatnim roku:

3 i więcej - 5 pkt

1 - 2 - 4 pkt

brak rzutów - 1 pkt

4) stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia) - objawy nieznacznie upośledzające układ ruchu (świadzeniobiorca samodzielnie chodzący)

EDSS 0 – 2 - 6 pkt

EDSS 2,5 – 4 - 5 pkt

EDSS 4,5 – 5 - 2 pkt

EDSS powyżej 5 - 1 pkt

4. Kryteria wyłączenia

4.1. Leczenie interferonem beta:

- 1) nadwrażliwość na interferon beta;
- 2) współtowarzysząca inna postać choroby;
- 3) ciąża;
- 4) zdekompensovana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2 razy powyżej normy);
- 5) zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy);
- 6) depresja niepoddająca się leczeniu;
- 7) padaczka, z wyłączeniem napadów występujących u dzieci i młodzieży jako objaw rzutu stwardnienia rozsianego;
- 8) przeciwwskazania wymienione Charakterystyce Produktu Leczniczego.

4.2 Leczenie octanem glatirameru:

- 1) nadwrażliwość na octan glatirameru lub mannitol;
- 2) współtowarzysząca inna postać choroby;
- 3) obciążenie innymi schorzeniami, które mogą zmniejszyć skuteczność leczenia;
- 4) ciąża.

5. Określenie czasu leczenia w programie

5.1. Leczenie trwa do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 60 miesięcy.

Po 12 miesiącach każdego roku trwania leczenia dokonuje się oceny skuteczności leczenia. Za brak skuteczności wymagający zmiany leczenia przyjmuje się wystąpienie jednej z poniższych sytuacji:

1) liczba i ciężkość rzutów:

- a) 2 lub więcej rzutów umiarkowanych (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych) lub
- b) 1 ciężki rzut po 6 miesiącach (wzrost w EDSS

<p>większy niż w definicji rzutu umiarkowanego);</p> <p>2) progresja choroby mimo leczenia, co oznacza utrzymujące się przez co najmniej 3 miesiące pogorszenie się stanu neurologicznego o co najmniej:</p> <p>a) 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5, b) 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0;</p> <p>3) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdych 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych:</p> <p>a) więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+), b) więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2;</p> <p>4) przejście rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego we wtórnie postępujące stwardnienie rozsiane, w skali EDSS powyżej 6 punktów.</p> <p>5.2. Kryteria przedłużenia leczenia interferonem beta lub octanem glatirameru o kolejne 12 miesięcy, nie więcej jednak niż do 60 miesięcy leczenia:</p> <p>1) brak rzutów lub rzuty łagodne (wzrost EDSS o 0.5 pkt lub o 1 pkt w jednym do trzech układów funkcjonalnych) lub 1 rzut umiarkowany (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub 2 pkt w zakresie jednego do dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych), lub</p> <p>2) brak progresji choroby w okresie ostatniego roku leczenia: różnica w skali EDSS poniżej 1 pkt;</p> <p>3) brak wyraźnych cech aktywności i progresji choroby w badaniu kontrastowym wykonanym rezonansem magnetycznym (nie więcej niż jedna zmiana Gd+ lub dwie nowe zmiany w sekwencji T2) z gadoliną.</p>		
---	--	--

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAZENIU DZIECIĘCYM (ICD-10 G 80)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji Do leczenia toksyną botulinową w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) potwierdzone rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego z towarzyszącą spastycznością ograniczającą funkcjonowanie dziecka lub zagrażającą rozwojem utrwalonych przykurczy mięśniowych i deformacji kostno-stawowych. 2) wiek 2-17 lat. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie: Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów kwalifikacji i kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku; 2) powstanie oporności na leczenie; 3) myastenia gravis; 4) objawy uogólnionego zakażenia; 5) zapalenie okolicy miejsca podania; 6) ciąża. 	<p>1. Dawkowanie Dysportu Dawka całkowita leku, na jedno podanie 30 j/kg, podzielonych na poszczególne mięśnie zgodnie z wzorcem spastyczności i oceną lekarza.</p> <p>2. Dawkowanie Botoxu Maksymalna dawka całkowita leku na rok leczenia to 24 j/kg, podzielonych na poszczególne mięśnie i sesje terapeutyczne zgodnie z wzorcem spastyczności i oceną lekarza.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji Morfologia krwi z rozmazem.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia EMG - badanie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem dawkowania (w niektórych przypadkach uzasadniony jest wybór miejsca podania toksyny botulinowej przy pomocy badania EMG).</p>

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0)

Klasyfikacja ICD 10 nie uwzględnia współczesnej klasyfikacji nadciśnienia płucnego. Rozpoczęto procedurę jej modyfikacji.

A. Leczenie TNP u dorosłych**1. Leczenie I rzutu****1.1 Leczenie I rzutu sildenafilem****1.2 Leczenie I rzutu bosentanem****2. Leczenie II rzutu**

- terapia bosentanem
- terapia iloprostem
- terapia treprostinilem
- terapia skojarzona / iloprost + sildenafil /
- terapia ambrisentanem

B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja**1. Leczenie dzieci - bosentan****2. Kontynuacja leczenia TNP u osób przekraczających wiek 18 lat i wcześniej otrzymujących bosentan w ramach leczenia TNP u dzieci****ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p style="text-align: center;">Kwalifikacja świadczeniobiorców do programu</p> <p>A. Leczenie TNP u dorosłych 1. Leczenie I rzutu 1.1 leczenie sildenafilem: 1.1.1 Kryteria włączenia świadczeniobiorcy do leczenia I rzutu sildenafilem Do leczenia I rzutu sildenafilem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający wszystkie następujące kryteria: 1) zdiagnozowana oraz udokumentowana jedna z poniższych postaci nadciśnieniu płucnego: a) idiopatyczne nadciśnienie płucne, b) rodzinne tętnicze nadciśnienie płucne, c) tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu choroby układowej tkanki łącznej (konieczne jest wykluczenie postaci choroby z dominującym włóknieniem płuc), 2) będący w III klasie czynnościowej według WHO,</p>	<p>A.Leczenie TNP u dorosłych: 1. Leczenie I rzutu 1.1 Dawkowanie sildenafilu Należy stosować dawkę 20 mg 3 razy dziennie. 1.2 Dawkowanie bosentanu Leczenie należy rozpoczynać od dawki 62,5 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie, następnie zwiększać dawkę do dawki podtrzymującej 125 mg dwa razy na dobę. Lek należy przyjmować rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu. 2. Leczenie II rzutu 2.1 Dawkowanie bosentanu Leczenie należy rozpoczynać od</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji 1.1 Badania nieinwazyjne: a) ocena klasy czynnościowej według NYHA, b) test 6-minutowego marszu, c) oznaczenie NT-pro-BNP, d) badanie echokardiograficzne; 1.2 Badania inwazyjne: badanie hemodynamiczne – (aktualne, wykonane nie więcej niż 8 tygodni przed kwalifikacją) cewnikowanie prawego serca z oceną ciśnienia zaklinowania, naczyniowego oporu płucnego, pojemności minutowej i saturacji mieszanej krwi żyłnej (z wyłączeniem świadczeniobiorców z zespołem Eisenmengera, jeśli w przeszłości wykonywano już taką ocenę), testy wazodylatacyjne (z wyłączeniem świadczeniobiorców z zespołem Eisenmengera) Ocena postępu leczenia powinna być wykonywana w stanie możliwie jak najbardziej stabilnym.</p>

<p>3) brak spadku ciśnienia w tętnicy płucnej w ostrym teście hemodynamicznym (według aktualnych standardów leczenia),</p> <p>4) wiek: 18 lat i powyżej</p> <p>1.1.2. Określenie czasu leczenia sildenafilem w ramach leczenia I rzutu: Czas leczenia sildenafilem w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia.</p> <p>1.1.3. Kryteria wyłączenia z leczenia I rzutu sildenafilem w programie: Świadczeniobiorca zostaje wyłączony z leczenia I rzutu sildenafilem w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z następujących kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nieskuteczność terapii; 2) ciężka niewydolność wątroby; 3) ostatnio przebyty udar mózgu; 4) zawał mięśnia sercowego; 5) ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg; 6) jednoczesne stosowanie azotanów, leków przeciwwirusowych, leków przeciwwirusowych; 7) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 8) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia; 9) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 10) retinitis pigmentosa lub utrata wzroku w wyniku nietętnicznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego NAION; 11) ciąża lub laktacja <p>1.2 leczenie I rzutu bosentanem:</p> <p>1.2.1 Kryteria włączenia świadczeniobiorcy do leczenia I rzutu bosentanem: Do leczenia I rzutu bosentanem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający wszystkie następujące kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) świadczeniobiorcy w III klasie czynnościowej według WHO,; 2) zdiagnozowane oraz udokumentowane tętnicze nadciśnienie płucne związane z wrodzonymi wadami serca / zespołem Eisenmengera; 3) wiek 18 lat i powyżej <p>1.2.2 Określenie czasu leczenia bosentanem w ramach leczenia I rzutu Czas leczenia bosentanem w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>1.2.3. Kryteria wyłączenia z leczenia I rzutu bosentanem u dorosłych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nieskuteczność terapii; 2) ciężka niewydolność wątroby klasa Child-Pugh B lub C; 3) Aktywność AspAT lub AlAT > 3 razy wartość górnej granicy normy (GGN) przed rozpoczęciem leczenia lub aktywność AspAT lub AlAT > 8 razy GGN w trakcie leczenia; 4) przebyty udar mózgu; 5) zawał mięśnia sercowego; 	<p>dawki 62,5 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie, następnie zwiększać dawkę do dawki podtrzymującej 125 mg dwa razy na dobę. Tabletki należy przyjmować rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.</p> <p>2.2 Dawkowanie iloprostu Dawka na jedną inhalację: 2,5 mikrograma lub 5,0 mikrogramów iloprostu (podawanego w inhalacji przez ustnik nebulizatora), rozpoczynając od podania mniejszej dawki 2,5 mikrograma w pierwszej inhalacji, a następnie w drugiej inhalacji podając 5,0 mikrogramów. W przypadku słabej tolerancji dawki 5 mikrogramów, dawka ta powinna być zmniejszona do 2,5 mikrograma.</p> <p>6 do 9 inhalacji na dobę.</p> <p>2.3 Dawkowanie treprostynilu Lek podaje się w sposób określony w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Dawkowanie leku dostosowane jest do masy ciała - dawka początkowa wynosi 1.25 ng/kg/min. Następnie dawka jest zwiększana w zależności od tolerancji leczenia i efektu klinicznego. Skuteczność leczenia treprostynilem zależy proporcjonalnie od stosowanej dawki leku. Istotny klinicznie efekt leczenia osiąga się zazwyczaj przy dawce około 15 - 20 ng/kg/min</p> <p>2.4 Dawkowanie iloprostu i sildenafilu w terapii skojarzonej</p>	<p>2. Monitorowanie programu Na monitorowanie programu składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) monitorowanie leczenia; w celu monitorowania leczenia świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać w wyznaczonych terminach badania, które wymienione są w punkcie 3. Dane dotyczące monitorowania leczenia należy gromadzić w dokumentacji świadczeniobiorcy i każdorazowo przedstawiać na żądanie kontrolerom NFZ. b) przekazywanie do NFZ zakresu informacji sprawozdawczo – rozliczeniowych wg sposobu ujętego w punkcie 4. c) uzupełnianie danych zawartych w rejestrze nadciśnienia płucnego dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez OW NFZ nie rzadziej niż co 3 miesiące oraz na zakończenie leczenia. <p>3. Monitorowanie leczenia</p> <p>3.1 Badania nieinwazyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocena klasy czynnościowej według NYHA, 2) test 6-minutowego marszu, 3) oznaczenie NT-pro-BNP, 4) badanie echokardiograficzne (w przypadku rozbieżności wyników badań podstawowych) <p>- wykonuje się co 3 - 6 miesięcy w trakcie uczestnictwa w programie.. Do podjęcia decyzji terapeutycznych mogą być użyte również badania wykonane nie w ramach rutynowej kontroli co 3-6 miesięcy, ale również wykonane w przypadku pogorszenia samopoczucia lub stanu chorego. W tej sytuacji odstęp 3-6 miesięcy do następnych rutynowych badań kontrolnych wymaganych przez program można także liczyć od momentu wspomnianych dodatkowych badań przeprowadzonych w terminie wcześniejszym ze wskazań klinicznych.</p> <p>Interpretacja wyników badań nieinwazyjnych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmiana klasy czynnościowej według NYHA na IV - wskazane jest włączenie terapii II rzutu po wykonaniu badania hemodynamicznego; 2) jeśli spełnione są dwa z trzech wymienionych niżej warunków: <ol style="list-style-type: none"> a) klasa czynnościowa III według NYHA, b) dystans 6-minutowego marszu poniżej 380m; c) NT-pro-BNP powyżej 3.400 pg/ml - świadczeniobiorca powinien mieć wykonane badanie hemodynamiczne.
--	---	--

<p>6) ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg; 7) jednoczesne stosowanie leków przeciwwgrzybiczych, przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, glibenklamidu, rifampicyny; 8) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 9) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia; 10) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 11) ciąża lub laktacja.</p> <p>2. Leczenie II rzutu</p> <p>2.1. Kryteria kwalifikacji do leczenia II rzutu u świadczeniobiorców w wieku 18 lat i powyżej</p> <p>2.1.1 Do leczenia II rzutu bosentanem, iloprostem, trepostynilem oraz iloprostem wraz z sildenafilem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z tętniczym nadciśnieniem płucnym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) po nieskutecznym leczeniu I rzutu lub 2) będący w IV klasie czynnościowej w momencie rozpoznania choroby . <p>2.1.2. Do leczenia II rzutu ambrisentanem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający poniższe kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zdiagnozowana i udokumentowana jedna z poniższych postaci nadciśnienia płucnego: <ol style="list-style-type: none"> a) idiopatyczne nadciśnienie płucne lub b) tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu choroby układuwej tkanki łącznej (konieczne jest wykluczenie postaci choroby z dominującym włóknieniem płuc) 2) po spełnieniu co najmniej jednego z poniższych kryteriów: <ol style="list-style-type: none"> a) świadczeniobiorcy po nieskutecznym leczeniu I rzutu lub b) świadczeniobiorcy po nieskutecznym leczeniu II rzutu innymi substancjami czynnymi określonymi w programie lekowym lub c) niezadowolające wyniki dotychczas stosowanego leczenia wskazujące na potrzebę zmiany dotychczas stosowanej terapii II rzutu lub utrzymywanie się III klasy czynnościowej i spełnienie 2 z 3 poniższych warunków: <ol style="list-style-type: none"> d1) indeks sercowy $\leq 2,4$ l/min/m², d2) średnie ciśnienie w prawym przedsionku > 10 mm Hg, d3) saturacja mieszanej krwi żyłnej $\leq 65\%$. 	<p>Duoterapia stosowana w przypadku wystąpienia progresji choroby u świadczeniobiorców leczonych w I rzucie sildenafilem lub u świadczeniobiorców znajdujących się w IV klasie czynnościowej w chwili rozpoznania choroby</p> <p>Dawka sildenafilu: 20 mg 3 razy dziennie.</p> <p>Dawka iloprostu na jedną inhalację: 2,5 mikrograma lub 5,0 mikrogramów iloprostu (podawanego w inhalacji przez ustnik nebulizatora), rozpoczynając od podania mniejszej dawki 2,5 mikrograma w pierwszej inhalacji, a następnie w drugiej inhalacji podając 5,0 mikrogramów.</p> <p>W przypadku złej tolerancji dawki 5 mikrogramów, dawka ta powinna być zmniejszona do 2,5 mikrograma.</p> <p>Maksymalna liczba inhalacji na dobę wynosi 8.</p> <p>2.5. Dawkowanie ambrisentanu</p> <p>Ambrisentan należy przyjmować doustnie w dawce 5 mg raz na dobę.</p> <p>Zwiększoną skuteczność leku stosowanego w dawce 10 mg stwierdzono u świadczeniobiorców w III klasie czynnościowej, jednakże zaobserwowano również zwiększenie obrzęków obwodowych.</p> <p>U świadczeniobiorców z TNP związanym z chorobami tkanki łącznej uzyskanie optymalnej skuteczności może wymagać</p>	<p>3) w innych sytuacjach powinna być kontynuowana terapia I rzutu. W przypadku znacznych rozbieżności w wynikach wspomnianych testów należy wykonać badanie echokardiograficzne i po uwzględnieniu jego wyniku podjąć decyzję o cewnikowaniu.</p> <p>3.2.Badania inwazyjne:</p> <p>3.2.1. cewnikowanie prawego serca z oceną ciśnienia zaklinowania, naczyniowego oporu płucnego, pojemności minutowej i saturacji mieszanej krwi żyłnej wykonuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co 12 -24 miesiące; - jeśli panel badań nieinwazyjnych wskazuje na pogorszenie (lub jeśli obraz kliniczny i wyniki badań nieinwazyjnych są niejednoznaczne) i rozważana jest zmiana stosowanej u świadczeniobiorcy terapii na inną terapię określoną w programie po spełnieniu kryteriów włączenia. <p>3.2.2. Interpretacja wyników badań inwazyjnych:</p> <p>Na niezadowolające wyniki leczenia wskazujące na potrzebę rozważenia zmiany dotychczas stosowanej terapii składa się spełnienie 2 z 3 poniższych warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks sercowy $\leq 2,4$ l/min/m², 2) średnie ciśnienie w prawym przedsionku – powyżej 10 mm Hg, 3) saturacja mieszanej krwi żyłnej $\leq 65\%$. <p>Zmiana terapii w obrębie II rzutu nie wymaga badania hemodynamicznego, zwłaszcza przy utrzymywaniu się IV klasy czynnościowej lub w przypadku progresji z III do IV klasy czynnościowej pomimo stosowanego leczenia II rzutu,.</p> <p>4. Sposób przekazywania informacji sprawozdawczo – rozliczeniowych</p> <p>Informacje będą przekazywane w formie papierowej i/lub w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.</p>
--	--	--

<p>2.2. Określenie czasu leczenia w programie Czas leczenia świadczeniobiorcy w ramach terapii II rzutu w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia..</p> <p>2.3. Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu iloprostem u dorosłych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciężka choroba niedokrwienna serca lub niestabilna dławica piersiowa; 2) zawał mięśnia sercowego przebyty w okresie ostatnich 6 miesięcy; 3) niewyrównana niewydolność serca; niekontrolowana przez lekarza; 4) ciężkie zaburzenia rytmu serca, 5) zaburzenia naczyniowo-mózgowe (np. przejściowe niedokrwienie mózgu, udar) przebyte w ciągu ostatnich 3 miesięcy; 6) wrodzone wady zastawkowe z istotnymi klinicznie zaburzeniami czynności mięśnia sercowego niezwiązane z nadciśnieniem płucnym; 7) stany, w których wpływ iloprostu na płytki krwi może zwiększyć ryzyko krwotoku (np.: aktywne wrzody trawienne, uraz, krwotok wewnątrzczaszkowy); 8) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 9) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia; 10) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 11) ciąża lub laktacja <p>2.4 Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu treprostynilem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nadciśnienie płucne związane z chorobą zarostową żył; 2) zastoinowa niewydolność serca spowodowana ciężkim zaburzeniem czynności lewej komory serca; 3) ciężka niewydolność wątroby klasa Child-Pugh C; 4) czynna choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, krwawienie śródczaszkowe, zranienie, inny rodzaj krwawienia; 5) wrodzone lub nabyte wady zastawkowe serca z klinicznie znaczącymi zaburzeniami czynności mięśnia sercowego niezwiązanymi z nadciśnieniem płucnym; 6) ciężka postać choroby niedokrwiennej serca lub niestabilna postać dławicy piersiowej; 7) zawał mięśnia sercowego przebyty w okresie ostatnich 6 miesięcy; 8) nieleczona niewydolność serca; 9) ciężkie zaburzenia rytmu serca; 10) ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg 11) epizody naczyniowo-mózgowe (np. przejściowe niedokrwienie mózgu, udar) w ciągu ostatnich 3 miesięcy; 12) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 13) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia; 14) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 15) ciąża lub laktacja. 	<p>stosowania ambrisentanu w dawce 10 mg. Przed rozważeniem zwiększenia dawki do 10 mg należy upewnić się, że dawka 5 mg jest u świadczeniobiorcy dobrze tolerowana.</p> <p>Opcje terapii II rzutu (bosentan; iloprost; treprostynil; ambrisentan; iloprost + sildenafil) mogą być stosowane zamiennie w zależności od tolerancji i skuteczności leczenia.</p> <p>B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja ich leczenia po 18 roku życia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) masa ciała od 20 do 40 kg, dawka początkowa (4 tygodnie) 31,25 mg dwa razy na dobę, dawka podtrzymująca 62,5 mg dwa razy na dobę; 2) masa ciała większa niż 40 kg, dawka początkowa (4 tygodnie) 62,5 mg dwa razy na dobę, dawka podtrzymująca 125 mg dwa razy na dobę. 3) kontynuacja leczenia TNP u osób przekraczających wiek 18 lat i wcześniej otrzymujących bosentan w ramach leczenia TNP u dzieci <p>Leczenie należy rozpoczynać od dawki 62,5 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie, następnie zwiększać dawkę do dawki podtrzymującej 125 mg dwa razy na dobę. Tabletki należy przyjmować rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.</p>	
--	---	--

<p>2.5 Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu sildenafilem i bosentanem - określono odpowiednio w pkt 1.1.3 oraz 1.2.3</p> <p>2.6. Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu ambrisentanem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciąża 2) kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji, 3) laktacja, 4) ciężkie zaburzenia czynności wątroby (z marskością wątroby lub bez), 5) wyjściowe wartości aminotransferaz wątrobowych AST lub ALT > 3xGGN 6) klinicznie istotna niedokrwistość przed rozpoczęciem leczenia, 7) nadwrażliwość na substancję czynną, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą, 8) brak współpracy ze strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli, 9) stan po przeszczepie płuc lub serca i płuc z ustąpieniem nadciśnienia płucnego, 10) można rozważyć w zależności od sytuacji klinicznej w przypadku ujawnienia się już w czasie realizacji programu innej etiologii nadciśnienia płucnego niż w kryteriach włączenia 11) można rozważyć w zależności od sytuacji klinicznej i dostępności alternatywnych terapii II rzutu w przypadku niezadawalających wyników badań inwazyjnych. <p>2.7. W przypadku utrzymywania się stabilnej poprawy po leczeniu ambrisentanem dopuszcza się możliwość powrotu do terapii I rzutu określonych w programie po spełnieniu kryteriów włączenia do terapii I rzutu z zastrzeżeniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) w uzasadnionych klinicznie przypadkach nie jest wymagane ponowne wykonanie cewnikowania serca, na przykład cewnikowanie serca nie jest konieczne, jeżeli od ostatniego badania minęło mniej niż 3 miesiące lub b) w przypadku gdy dotychczasowe leczenie ambrisentanem doprowadziło do poprawy stanu świadczeniobiorcy do II klasy czynnościowej wg WHO świadczeniobiorca może zostać zakwalifikowany do terapii I rzutu określonej w programie lekowym leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego <p>Oceny stabilnej poprawy dokonuje lekarz prowadzący na podstawie wyników badań wykonanych w ramach monitorowania leczenia . Podjęcie decyzji o powrocie do terapii I rzutu należy do lekarza prowadzącego.</p> <p>2.8. W przypadku niemożności stosowania u świadczeniobiorcy ambrisentanu lub braku osiągnięcia skuteczności klinicznej dopuszcza się możliwość zastosowania innej terapii II rzutu określonej w programie po spełnieniu kryteriów włączenia do</p>	<p>U dzieci w wieku powyżej 2 lat optymalna dawka podtrzymująca nie została ustalona w dobrze kontrolowanych badaniach. Jednak dane farmakokinetyczne u dzieci wykazały, że stężenie bozentanu w osoczu u dzieci było zwykle mniejsze niż u świadczeniobiorców dorosłych i nie wzrastało po zwiększeniu dawki bozentanu do poziomu powyżej 2mg/kg dwa razy na dobę .Na podstawie danych farmakokinetycznych można stwierdzić, że jest mało prawdopodobne, by większe dawki były bardziej skuteczne. Nie można także wykluczyć, że po zwiększeniu dawki u dzieci wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Nie przeprowadzono badań klinicznych porównujących stosunek skuteczności do bezpieczeństwa dawki 2 mg/kg i 4 mg/kg dwa razy na dobę u dzieci. Doświadczenie kliniczne, dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 lat jest ograniczone.</p>	
---	--	--

<p>terapii II rzutu z zastrzeżeniem - w uzasadnionych klinicznie przypadkach nie jest wymagane ponowne wykonanie cewnikowania serca, Oceny niemożności stosowania u świadczeniobiorcy ambrisentanu lub braku osiągnięcia skuteczności klinicznej dokonuje lekarz prowadzący na podstawie wyników badań wykonanych w ramach monitorowania leczenia.</p> <p>B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja ich leczenia po 18 roku życia</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji dzieci do leczenia bosentanem</p> <ol style="list-style-type: none">1) wieka) od 2 do 18 roku życiab) kontynuacja ich leczenia po 18 roku życia <ol style="list-style-type: none">2) pierwotne (idiopatyczne i rodzinne) tętnicze nadciśnienie płucne;3) wtórne tętnicze nadciśnienie płucne związane z chorobą tkanki łącznej;4) tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu wrodzonych wad serca;5) zespół Eisenmengera;6) III klasa czynnościowa według WHO;7) zastosowanie skutecznej metody antykoncepcji u miesiączkujących dziewcząt <p>1.2 Określenie czasu leczenia dzieci w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia dzieci z programu</p> <ol style="list-style-type: none">1) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia;2) wrodzona wada serca z nadciśnieniem płucnym, w której istnieje możliwość leczenia operacyjnego;3) brak współpracy ze strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli leczenia;4) nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;5) umiarkowane do ciężkiego zaburzenie czynności wątroby;6) aktywność AspAT lub AlAT > 3 razy wartość górnej granicy normy (GGN) przed rozpoczęciem leczenia lub aktywność AspAT lub AlAT > 8 razy GGN w trakcie leczenia;7) jednoczesne stosowanie leków przeciwwgrzybiczych, przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, glibenklamidu, rifampicyny;8) ciąża;9) miesiączkujące dziewczęta niestosujące skutecznych metod antykoncepcji.		
--	--	--

LECZENIE CHOROBY LEŚNIEWSKIEGO - CROHNA (chLC) (ICD-10 K 50)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKU W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) infliksymabem u dzieci w wieku od 6 lat do momentu ukończenia 18 roku życia</p> <p>1.1 Kryteria włączenia 1) ciężka, czynna postać choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali PCDAI większy lub równy 51 punktów), przy: a) braku odpowiedzi na leczenie glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi lub innymi niż infliksymab inhibitorami TNF alfa lub b) występowaniu przeciwwskazań lub objawów nietolerancji takiego leczenia</p> <p>lub 2) pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna cechującą się wytworzeniem przetok okołoodbytowych, którzy nie odpowiedzieli na leczenie podstawowe: antybiotyki, leki immunosupresyjne, leczenie chirurgiczne, - niezależnie od nasilenia choroby w skali PCDAI.</p> <p><i>Kobiety w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na świadomą kontrolę urodzeń w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu.</i></p> <p>W trakcie kwalifikacji do programu wszyscy chorzy leczeni infliksymabem otrzymują Kartę Ostrzeżeń dla pacjenta przyjmującego infliksymab. Potwierdzenie faktu otrzymania ww. Karty Ostrzeżeń dla pacjenta przechowywane jest w dokumentacji medycznej pacjenta.</p>	<p>1. Leczenie infliksymabem choroby Leśniowskiego - Crohna u dzieci w wieku od 6 lat do momentu ukończenia 18 roku życia. <i>Infliksymab</i> należy podać w dawce 5 mg/kg masy ciała w infuzji dożylną trwającą ponad 2 godziny, Następne dawki należy podać po 2 i 6 tygodniach od pierwszej infuzji. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić w schemacie infliksymab w dawce 5 mg/kg m.c. co 8 tygodni. Dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa od podanego schematu, nieprzekraczające jednak odstępów między kolejnymi dawkami.</p> <p>2. Leczenie infliksymabem choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych od momentu ukończenia 18 roku życia. <i>Infliksymab</i> należy podać w dawce 5 mg/kg mc w infuzji dożylną trwającą ponad 2 godziny, Następne dawki należy podać po 2 i 6 tygodniach od pierwszej infuzji. W leczeniu podtrzymującym należy podawać infliksymab w dawce 5 mg/kg m.c. co 8 tygodni. Dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa od podanego schematu, nieprzekraczające jednak odstępów między kolejnymi dawkami.</p> <p>3. Leczenie adalimumabem choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych od momentu ukończenia 18 roku życia.</p> <p>1. W ramach terapii indukcyjnej: 1) pierwsza dawka adalimumabu wynosi 160 mg we wstrzyknięciu podskórnym. 2) druga dawka adalimumabu wynosi 80 mg</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia infliksymabem 1) morfologia krwi obwodowej, 2) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 3) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 4) poziom kreatyniny w surowicy; 5) białko C-reaktywne; 6) badanie ogólne moczu; 7) próba tuberkulinowa lub test Quantiferon; 8) antygen HBs; 9) przeciwciała anty HCV; 10) antygen wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo); 11) stężenie elektrolitów w surowicy; 12) RTG klatki piersiowej; 13) EKG z opisem (wymagane wyłącznie u dorosłych pacjentów); 14) obliczenie wartości wskaźnika CDAI u pacjentów powyżej 18 roku życia / PCDAI u dzieci.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia infliksymabem W przypadku stosowania infliksymabu w leczeniu indukcyjnym u osób dorosłych, świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać, co najmniej po 2 tygodniach od podania trzeciej dawki leku następujące badania: morfologia krwi obwodowej, CRP, AlAT i AspAT. Wtedy też należy przeprowadzić ocenę wskaźnika CDAI. W leczeniu podtrzymującym świadczeniodawca jest zobowiązany wykonywać morfologię krwi obwodowej, CRP, AlAT i AspAT oraz ocenę CDAI przynajmniej, co 8 tygodni.</p> <p>W przypadku stosowania infliksymabu w leczeniu indukcyjnym u dzieci, świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać, co najmniej po 2 tygodniach od</p>

1.2 Leczenie podtrzymujące infliksymabem

Co najmniej 2 tygodnie po podaniu trzeciej dawki infliksymabu należy dokonać oceny odpowiedzi na leczenie przy użyciu skali PCDAI. Świadczeniobiorcy z odpowiedzią kliniczną przechodzą do leczenia podtrzymującego.

Odpowiedź kliniczna definiowana jest jako zmniejszenie PCDAI o 12,5 lub więcej punktów oraz PCDAI niższe niż 30 punktów.

2. Leczenie infliksymabem choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych od momentu ukończenia 18 roku życia.

2.1 Kryteria włączenia

- 1) ciężka, czynna postać choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali CDAI powyżej 300 punktów) przy:
- a) braku odpowiedzi na leczenie glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi lub innymi niż infliksymab inhibitorami TNF alfa lub
 - b) występowaniu przeciwwskazań lub objawów nietolerancji takiego leczenia

lub

- 2) obecność przetok okołoodbytowych, które nie zagoiły się pod wpływem antybiotyków i leczenia chirurgicznego w połączeniu z leczeniem immunosupresyjnym - niezależnie od nasilenia choroby.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na świadomą kontrolę urodzeń w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu.

3. Określenie czasu leczenia infliksymabem dzieci i dorosłych w programie

- 1) Terapia indukcyjna - 6 tygodni;
- 2) Leczenie podtrzymujące infliksymabem powinno trwać aż do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu podania

podana pacjentowi po 14 dniach od podania pierwszej dawki.

3) trzecia i kolejne dawki adalimumabu wynoszą 40 mg podawane pacjentowi po każdym kolejnych 14 dniach od podania poprzedniej dawki aż do 12 tygodnia terapii adalimumabem włącznie.

2. W leczeniu podtrzymującym: adalimumab podaje się w dawce 40 mg podskórnie co 14 dni.

Dopuszczalne są uzasadnione 1-2 dniowe odstępstwa od podanego schematu.

podania trzeciej dawki leku następujące badania: morfologia krwi obwodowej, CRP, ALAT i AspAT. Wtedy też należy przeprowadzić ocenę wskaźnika PCDAI.

W leczeniu podtrzymującym świadczeniodawca jest zobowiązany wykonywać morfologię krwi obwodowej, CRP, ALAT i AspAT oraz ocenę PCDAI przynajmniej co 8 tygodni.

3. Badania przy kwalifikacji do leczenia adalimumabem

- 1) morfologia krwi obwodowej;
- 2) aminotransferaza alaninowa(ALAT);
- 3) aminotransferaza asparaginianowa(AspAT);
- 4) poziom kreatyniny w surowicy;
- 5) białko C-reaktywne;
- 6) badanie ogólne moczu;
- 7) próba tuberkulinowa lub test Quantiferon
- 8) antygen HBs;
- 9) przeciwciała anty HCV;
- 10) antygen wirusa HIV(HIV Ag/Ab Combo);
- 11) stężenie elektrolitów w surowicy;
- 12) RTG klatki piersiowej;
- 13) EKG z opisem;
- 14) obliczenie wartości wskaźnika CDAI;
- 15) badanie endoskopowe

4. Monitorowanie leczenia adalimumabem

W przypadku stosowania adalimumabu w ramach 12 tygodniowej terapii indukcyjnej, po upływie 2 tygodni od podania pacjentowi ostatniej dawki leku świadczeniodawca wykonuje u pacjenta następujące badania: morfologia krwi obwodowej, CRP, ALAT i AspAT. Wtedy też należy przeprowadzić ocenę wskaźnika CDAI.

W przypadku stosowania adalimumabu w ramach leczenia podtrzymującego, co najmniej raz na 3 miesiące świadczeniodawca wykonuje u pacjenta następujące badania: morfologia krwi obwodowej, CRP, ALAT i AspAT oraz ocenę CDAI.

pierwszej dawki w terapii indukcyjnej.

4. Kryteria wyłączenia dzieci i dorosłych z programu leczenia infliksymabem

W przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych kryteriów pacjent zostaje wyłączony z programu:

- 1) nadwrażliwość na leki stosowane w programie,
- 2) ciężkie zakażenia wirusowe, grzybicze lub bakteryjne,
- 3) umiarkowana lub ciężka niewydolność mięśnia sercowego,
- 4) niestabilna choroba wieńcowa,
- 5) przewlekła niewydolność oddechowa,
- 6) przewlekła niewydolność nerek,
- 7) przewlekłą niewydolność wątroby,
- 8) zespół demielinizacyjny lub objawy przypominające ten zespół,
- 9) choroba alkoholowa, poalkoholowe uszkodzenie wątroby lub każdą czynną postępującą chorobę wątroby,
- 10) ciąża lub karmienie piersią,
- 11) rozpoznanie stanów przednowotworowych lub nowotworów złośliwych w okresie 5 lat poprzedzających moment kwalifikowania do programu,
- 12) powikłania wymagające zmiany postępowania (np. radykalnego leczenia operacyjnego – chirurgiczne zaopatrzenie przetok, może i powinno się odbywać w miarę wskazań klinicznych w trakcie leczenia biologicznego).

5. Zakończenie leczenia dzieci i dorosłych infliksymabem

- 1) brak efektów leczenia,
- 2) wystąpienie działań niepożądanych leczenia,
- 3) wystąpienia powikłań wymagających innego specyficznego leczenia.

Zakończenie leczenia powinno nastąpić w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z kryteriów określonych w pkt. 1-3.

Dostępne dane nie uzasadniają dalszego leczenia infliksymabem u dzieci i młodzieży, które nie zareagowały w ciągu pierwszych 10

tygodni leczenia.

W przypadku nietolerancji rozpoczętego leczenia infliksymabem lub wystąpieniu działań niepożądanych uniemożliwiających jego kontynuację możliwe jest zastosowanie innego leku z grupy anty-TNF, dopuszczonego w programie lekowym dedykowanym leczeniu choroby Leśniowskiego – Crohna po spełnieniu kryteriów tego programu.

W przypadku wystąpienia u pacjenta kolejnego zaostrzenia, po zakończeniu leczenia infliksymabem w ramach programu lekowego, możliwa jest uzasadniona względami medycznymi ponowna kwalifikacja do programu, jednak nie wcześniej niż w okresie 16 tygodni od zakończenia poprzedniej terapii.

B. Leczenia adalimumabem

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych

1. Do programu mogą zostać włączeni pacjenci w przypadku wystąpienia łącznie następujących kryteriów:

- 1) Wiek pacjenta: 18 lat i więcej ,
- 2) Ciężka, czynna postać choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali CDAI powyżej 300 punktów) przy :
 - a) braku odpowiedzi na pełny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi lub innymi niż adalimumab inhibitorami TNF alfa,
lub
 - b) występowaniu przeciwwskazań medycznych lub objawów nietolerancji takiego leczenia,
lub
 - c) obecności przetok okołodbytowych, które nie zagoiły się pod wpływem antybiotyków i leczenia chirurgicznego w połączeniu z leczeniem immunosupresyjnym - niezależnie od nasilenia choroby.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na świadomą kontrolę urodzeń w trakcie leczenia adalimumabem oraz w okresie do 5 miesięcy po

zastosowaniu ostatniej dawki adalimumabu.

Pacjenci leczeni adalimumabem otrzymują i zapoznają się ze specjalną kartą informującą o możliwych zagrożeniach oraz dołączoną do leku ulotką dla pacjenta.

2. Określenie czasu leczenia w programie

- 1) terapia indukcyjna adalimumabem – trwa 12 tygodni
- 2) leczenie podtrzymujące adalimumabem powinno trwać aż do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie (w tym również stwierdzenie konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego związanego z chorobą) jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu podania pierwszej dawki adalimumabu w terapii indukcyjnej.

3. Kryteria wyłączenia z programu leczenia adalimumabem

W przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów pacjent zostaje wyłączony z programu:

- 1) nadwrażliwość na leki stosowane w programie,
- 2) ciężkie zakażenia wirusowe, grzybicze lub bakteryjne,
- 3) umiarkowana lub ciężka niewydolność mięśnia sercowego,
- 4) niestabilna choroba wieńcowa,
- 5) przewlekła niewydolność oddechowa,
- 6) przewlekła niewydolność nerek,
- 7) przewlekła niewydolność wątroby,
- 8) zespół demielinizacyjny lub objawy przypominające ten zespół,
- 9) choroba alkoholowa, poalkoholowe uszkodzenie wątroby lub każda czynna postępująca choroba wątroby,
- 10) ciąża lub karmienie piersią,
- 11) rozpoznanie stanów przednowotworowych lub nowotworów złośliwych w okresie 5 lat poprzedzających moment kwalifikowania do programu,
- 12) powikłania wymagające zmiany postępowania (np. radykalnego leczenia operacyjnego- zamykanie przetok może i powinno odbywać się w miarę wskazań klinicznych w trakcie leczenia biologicznego).

4. Zakończenie leczenia adalimumabem

Zakończenie leczenia w ramach programu następuje w

<p>przypadku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) brak efektów leczenia,2) wystąpienie działań niepożądanych leczenia3) wystąpienia powikłań wymagających innego specyficznego leczenia. <p>Zakończenie leczenia następuje w przypadku spełnienia przynajmniej jednego kryterium wymienionych w punktach od 1 do 3.</p> <p>W przypadku nietolerancji rozpoczętego leczenia adalimumabem lub wystąpienia działań niepożądanych uniemożliwiających jego kontynuację możliwe jest zastosowanie innego leku z grupy anty-TNF, dopuszczonego w programie lekowym dedykowanym leczeniu choroby Leśniowskiego – Crohna po spełnieniu kryteriów tego programu.</p> <p>W przypadku wystąpienia u pacjenta kolejnego zaostrzenia, po zakończeniu leczenia adalimumabem w ramach programu lekowego możliwa jest uzasadniona względami medycznymi ponowna kwalifikacja do programu, jednak nie wcześniej niż w okresie 8 tygodni od zakończenia poprzedniej terapii.</p>		
---	--	--

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>I. LEKI BIOLOGICZNE A. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej), zostają przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu (z wyjątkiem metotreksatu podskórnego dla pacjentów uprzednio zakwalifikowanych do programu leczenia tą formą leku) następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się:</p> <p>1) pacjentów z RZS i MIZS, u których nastąpiło niepowodzenie w stosowaniu terapii co najmniej dwoma tradycyjnymi lekami modyfikującymi przebieg choroby:</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Adalimumab należy podawać w dawce 40 mg, we wstrzyknięciu podskórnym co dwa tygodnie</p> <p>1.2 Etanercept należy podać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dorośli – w dawce 50 mg podskórnym co tydzień; 2) dzieci – w dawce 0,4 mg/kg masy ciała (do dawki maksymalnej 25 mg) podskórnym 2 razy w tygodniu; po decyzji lekarza prowadzącego możliwe jest podawanie całej dawki tygodniowej raz w tygodniu, pod warunkiem utrzymywania się dotychczasowej skuteczności. <p>1.3 Infliksymab należy podać w dawce 3 mg/kg masy ciała w infuzji dożylną w dniach 0, 14 i 42, a następnie w każdym kolejnym 56 dniu (co 8 tygodni).</p> <p>1.4 Rytuksymab należy podać w formie dwóch infuzji dożylnych po 1000 mg w dniach 0 i 14. Kolejny cykl leczenia nie wcześniej niż po ocenie efektywności leczenia po 180 dniach terapii.</p> <p>Leczenie powyższymi lekami wymaga</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji (leczenie biologiczne):</p> <p>W ramach kwalifikacji świadczeniobiorcy do udziału w programie konieczne jest wykonanie następujących badań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)czynnik reumatoidalny w surowicy – u pacjentów z RZS; 2)morfologia krwi; 3) płytki krwi (PLT); 4)odczyn Biernackiego (OB); 5)aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 6)aminotransferaza alaninowa (AlAT); 7)stężenie kreatyniny w surowicy; 8)stężenie białka C-reaktywnego (CRP); 9)badanie ogólne moczu; 10) próba tuberkulinowa lub Quantiferon test; 11) obecność antygenu HBS; 12) przeciwciała anti-HCV; 13) obecność antygenu wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo); 14) stężenie elektrolitów w surowicy; 15) stężenie immunoglobulin w surowicy u pacjentów kwalifikowanych do leczenia rytuksymabem; 16) RTG klatki piersiowej z opisem (maksymalnie do 3 m-cy przed kwalifikacją);

<p>a) w przypadku RZS przez okres co najmniej 6 miesięcy każdym, w tym terapii maksymalnymi dawkami metotreksatu (ewentualnie w postaci podskórnej) wskazanymi w opisie programu przez okres przynajmniej 3 miesięcy (o ile nie było objawów nietolerancji, zmuszających do ich zmniejszenia),</p> <p>b) w przypadku MIZS przez okres co najmniej 3 miesięcy każdym, w tym terapii maksymalnymi dawkami metotreksatu (ewentualnie w postaci podskórnej) wskazanymi w opisie programu (o ile nie było objawów nietolerancji, zmuszających do ich zmniejszenia).</p> <p>Okres leczenia metotreksatem, jako jednym z dwóch leków, musi uwzględniać dodatkowo okres dochodzenia do dawkowania maksymalnego.</p> <p>2) pacjentów z RZS i MIZS o agresywnym przebiegu choroby, w przypadku RZS stopień aktywności schorzenia określony jako DAS 28 większy niż 5,1, którego wartość była określona dwukrotnie w odstępie 1 miesiąca (w trakcie 2 badań lekarskich); nie dotyczy kwalifikacji do leczenia RZS lekiem drugiej linii, w przypadku niepowodzenia w leczeniu lub nietolerancji pierwszoliniowego leku biologicznego;</p> <p>3) pacjentów z RZS z dominującym zajęciem kończyn dolnych, u których aktywność choroby wyrażona współczynnikiem DAS jest wyższa niż 3,7;</p> <p>4) pacjentów z MIZS z co najmniej 5 obrzękniętymi stawami i co najmniej 3 stawami o ograniczonej ruchomości, z towarzyszącym bólem, tkliwością lub obiema tymi cechami;</p> <p>5) pacjentów z innymi niż wymienione w pkt 1 – 4 postaciami RZS i MIZS, niezależnie od wartości DAS 28 i DAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) z zapaleniem błony naczyniowej oka, b) z postacią uogólnioną (Zespół Stilla), c) z RZS powikłanym krioglobulinemią, d) z postacią skąpostawową rozszerzającą się i przetrwałą ponad 6 miesięcy mimo leczenia metotreksatem, e) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. 	<p>równoczesnego podawania metotreksatu. Jednak w przypadku niemożności podania metotreksatu, etanercept i adalimumab może być podany jako monoterapia.</p> <p>1.5 Metotreksat (w formie doustnej lub podskórnej) należy podawać w dawce 25 mg/tydzień, jeżeli taka dawka jest tolerowana. U dzieci do 16 roku życia stosowana dawka metotreksatu powinna wynosić 10-20 mg/m² na tydzień (maksymalnie 25 mg/m² na tydzień).</p>	<p>17) EKG z opisem;</p> <p>18) dwukrotne obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub DAS w RZS, w odstępie 1 miesiąca; ostatnie oznaczenie nie wcześniej niż dwa tygodnie przed podaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>19) u kobiet zaleca się wykonanie mammografii lub USG piersi.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia (leki biologiczne):</p> <p>W celu monitorowania leczenia wykonuje się nie rzadziej, niż w wyznaczonych terminach następujące badania:</p> <p>1) u pacjentów z RZS po 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki terapii pierwszoliniowej należy oznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) morfologię krwi, b) odczyn Biernackiego (OB), c) stężenie białka C-reaktywnego (CRP), d) stężenie kreatyniny w surowicy <p>oraz obliczyć wartość wskaźnika DAS 28 lub DAS;</p> <p>2) u pacjentów z RZS w przypadku zastosowania terapii drugiej linii inhibitorem anty TNF alfa po kolejnych 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki leku drugiej linii należy oznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) morfologię krwi, b) odczyn Biernackiego (OB), c) stężenie białka C-reaktywnego (CRP), d) stężenie kreatyniny w surowicy <p>oraz obliczyć wartość wskaźnika DAS 28 lub DAS.</p>
--	---	--

W przypadkach, w których pacjentowi grozi kalectwo lub zagrożone jest jego życie, decyzją Zespołu Koordynującego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, leczenie biologiczne może być rozpoczęte jeszcze przed zakończeniem obowiązkowego dla pozostałych postaci RZS i MIZS okresu leczenia klasycznymi lekami DMARD.

W przypadku kobiet wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu, a w przypadku rytuksymabu do 12 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki.

B. Zasady kwalifikacji do leczenia lekami biologicznymi

1. RZS

1.1. Leczeniem pierwszoliniowym w ramach programu u pacjentów chorych na RZS jest inhibitor TNF alfa.

1.2. Leczeniem drugoliniowym w ramach programu u pacjentów chorych na RZS jest inhibitor TNF alfa lub rytuksymab. Rytuksymab jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z ciężkim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję innych leków modyfikujących proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów.

1.3. Leczeniem trzecioliniowym w ramach programu u pacjentów chorych na RZS jest rytuksymab.

W ramach programu dopuszcza się zastosowanie kolejno nie więcej niż dwóch inhibitorów TNF alfa u jednego pacjenta.

2. MIZS

2.1 Świadczeniobiorcy z MIZS zakwalifikowani do programu, kwalifikowani są do leczenia inhibitorami TNF alfa:

- 1) w przypadku adalimumabu - pacjenci w wieku 13 lat i powyżej;
- 2) w przypadku etanerceptu – pacjenci powyżej 4 roku życia.

C. Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach

W przypadku kontynuowania terapii badania należy powtarzać po każdym kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni).

W przypadku stosowania rytuksymabu w 180 dniu (+/- 14 dni) od podania każdej kolejnej dawki należy wykonać badania laboratoryjne jak w punkcie 2.2. – monitorowanie leczenia oraz dokonać oceny skuteczności leczenia.

W przypadku stosowania rytuksymabu w 180 dniu od podania pierwszej dawki należy ponadto zbadać stężenie immunoglobulin w surowicy oraz wykonać badanie EKG.

Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać EKG i RTG klatki piersiowej.

3) w przypadku chorych na MIZS po 180 dniach od początku terapii należy:

a) oznaczyć:

- morfologię krwi,
- odczyn Biernackiego (OB),
- stężenie białka C-reaktywnego (CRP),
- stężenie kreatyniny w surowicy,

b) dokonać:

- określenia liczby zajętych stawów,
- określenia liczby stawów z ograniczeniem ich ruchomości,
- oceny aktywności choroby przez lekarza na 10 cm skali VAS,
- oceny ogólnego samopoczucia przez rodzica lub pacjenta na 10 cm skali VAS.

W przypadku kontynuowania terapii badania należy powtarzać po każdym kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni).

Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać

farmakoterapii niestandardowej .

Do programu kwalifikowani są również pacjenci uprzednio leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej, cząsteczkami leków - inhibitorów TNF alfa (adalimumabem, etanerceptem lub infliksimabem), nieujętych wcześniej w opisach programów lub rytuksymabem, zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w programie.

Pacjent jest kwalifikowany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.

W przypadku gdy uprzednio zastosowane leczenie było zbyt krótkie, aby spowodowało niski poziom aktywności choroby lub remisję, w przypadku wystąpienia przerwy zmuszającej do zastosowania terapii od początku, należy ją kontynuować z użyciem leku wskazanego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Warunkiem kwalifikacji do programu jest wykazanie w dokumentacji medycznej adekwatnej odpowiedzi na leczenie,

rozumianej jako zmniejszenie DAS28 lub DAS o wartość większą niż 1,2, po pierwszych 3 miesiącach terapii inhibitorem TNF alfa lub 6 miesiącach w przypadku zastosowania rytuksymabu oraz stwierdzana w trakcie każdego następnego badania lekarskiego wykonywanego po każdym następnym 6 miesiącach terapii, począwszy od pierwszego badania, podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie.

D. Kryteria ponownego włączenia do programu

Świadczeniobiorca, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami, z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono nawrót choroby (u chorych na RZS wzrost wartości DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2 w stosunku do wartości obliczonej w momencie odstawienia leku, z tym że DAS 28 nie może być mniejsze niż 3,2, a DAS niż 2,4), jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji.

Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.

E. Kryteria i warunki zamiany terapii :

EKG i RTG klatki piersiowej.

1. Pacjent będący w trakcie terapii przy użyciu leku - inhibitora TNF alfa i u którego występuje adekwatna odpowiedź na prowadzoną terapię, nie ma zamienianej aktualnie stosowanej terapii na inną.
2. Terapia pierwszoliniowa jest prowadzona w najniższej dawce, zarejestrowanej jako skuteczna.
3. Każdorazowo zmiana terapii na terapię innym lekiem wymaga uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.
4. Zamiana terapii pierwszoliniowej na terapię inną cząsteczką leku - inhibitora TNF alfa, stosowaną razem z metotreksatem, lub jako monoterapia wymienioną w terapeutycznym programie zdrowotnym, możliwa jest tylko w następujących sytuacjach:
 - 1) brak skuteczności stosowania terapii pierwszoliniowej po 3 miesiącach jej stosowania;
 - 2) u chorych na MIZS brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 6 miesiącach leczenia pierwszym zastosowanym lekiem (z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w pkt. B.2.1);
 - 3) wystąpienie nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze;
 - 4) wystąpienie nadwrażliwości na cząsteczkę metotreksatu lub wystąpienie działań niepożądanych związanych z podaniem metotreksatu i w związku z tym brak możliwości zastosowania aktywnej cząsteczki leku biologicznego jeżeli ta musi być stosowana wraz z metotreksatem;
 - 5) wystąpienie istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po podaniu innej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa;
 - 6) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem lekarskim pacjenta (wykonanym w związku z realizacją programu) przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego lub metotreksatu.

F. Kryteria wyłączenia z programu i przeciwwskazania do kwalifikacji i ponownego włączenia do programu:

- 1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;
- 2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;
- 3) niewydolność serca (powyżej II klasy NYHA);
- 4) przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc, odmiedniczkowe zapalenie

<p>nerek w okresie ostatnich 3 miesięcy;</p> <p>5) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, odporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenia gruźlicze;</p> <p>6) udokumentowana infekcja HIV;</p> <p>7) nasilenie się objawów niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby w trakcie leczenia;</p> <p>8) stwierdzone choroby demielinizacyjne;</p> <p>9) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;</p> <p>10) stwierdzone stany przedrakowe, choroby nowotworowe, także rozpoznane i wyleczone w okresie ostatnich 5 lat;</p> <p>11) obecność aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub obecność każdej innej przewlekłej choroby wątroby.</p> <p>G. Kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej lub zakończenia udziału w danym rzucie terapii biologicznej:</p> <p>1) w przypadku pacjentów z RZS:</p> <p>a) uzyskanie przez pacjenta niskiej aktywności choroby, stwierdzonej w trakcie badania monitorującego, utrzymującej się przez okres przekraczający 6 miesięcy; miernikiem uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji jest, zgodnie z kryteriami EULAR, DAS 28 mniejszy niż 3,2, w przypadku konieczności zastosowania użytego w programie wskaźnika DAS, miernikiem niskiej aktywności choroby jest, zgodnie z kryteriami EULAR, DAS mniejszy lub równy 2,4; po tym okresie zaprzestaje się podawania pacjentowi leku biologicznego oraz wykonuje się badania zgodne z opisem programu, celem potwierdzenia wystąpienia niskiej aktywności choroby; w powyższej sytuacji, u pacjenta z niskim poziomem aktywności choroby lub w remisji należy utrzymać lub wdrożyć terapię innym lekiem modyfikującym przebieg choroby; częsteczką preferowaną jest metotreksat,</p> <p>b) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po pierwszych 3 miesiącach terapii pierwszoliniowej lub innym lekiem - inhibitorem TNF alfa braku zmniejszenia DAS 28 lub DAS o więcej niż 1,2),</p> <p>c) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie stwierdzone po pierwszych 3 miesiącach terapii lekiem - inhibitorem TNF alfa, licząc od momentu zastosowania pierwszej dawki po ponownym włączeniu pacjenta do leczenia po</p>		
---	--	--

zakończeniu okresu remisji (stwierdzenie braku zmniejszenia DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2),

d) w przypadku uprzedniego dokonania zmiany terapii pierwszoliniowej z powodu nieskuteczności po 3 miesiącach na inny lek - inhibitor TNF alfa - brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po kolejnych 3 miesiącach terapii braku zmniejszenia DAS 28 lub DAS o więcej niż 1,2),

e) w przypadku zastosowania rytuksymabu brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po 6 miesiącach od podania leku braku zmniejszenia DAS 28 lub DAS o więcej niż 1,2),

f) utrata adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzona w trakcie każdego kolejnego badania lekarskiego wykonywanego po każdym następnym 6 miesiącach terapii, począwszy od pierwszego badania, podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie), rozumiana jako brak zmniejszenia DAS28 lub DAS o wartość równą lub większą niż 1,2, w stosunku do wartości stwierdzonej podczas przeprowadzonej wcześniejszej kontroli,

g) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- reakcja alergiczna na lek,
- zakażenie o ciężkim przebiegu,
- objawy niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby,
- pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,
- stwierdzenie choroby nowotworowej.

Po stwierdzeniu uzyskania niskiego poziomu aktywności choroby lub wejścia pacjenta w remisję, po 30 dniach od jej stwierdzenia należy wykonać:

- 1) morfologię krwi;
- 2) OB;
- 3) oznaczenie białka C-reaktywnego;
- 4) obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub DAS.

2) w przypadku pacjentów z MIZS:

a) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie - stwierdzenie po 6 miesiącach terapii braku efektów terapii lub ponowne zaostrenie aktywności choroby, określane na podstawie kryteriów poprawy według Gianiniego (przynajmniej 30% polepszenie w 3 z 6 parametrów, z tym że w pozostałych parametrach nie może dojść do pogorszenia o 30% więcej niż w jednym parametrze),

b) utrata adekwatnej odpowiedzi na leczenie - stwierdzenie po każdym kolejnych 6 miesiącach terapii dalszego postępu efektów terapii lub ponowne

zaostrzenie aktywności choroby, określane na podstawie kryteriów poprawy według Gianiniego (przynajmniej 30% polepszenie w 3 z 6 parametrów, z tym że w pozostałych parametrach nie może dojść do pogorszenia o 30% więcej niż w jednym parametrze), ewentualne dalsze leczenie lekiem biologicznym jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych,

c) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- reakcja alergiczna na lek,
- zakażenie o ciężkim przebiegu,
- objawy niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby,
- wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej,
- stwierdzenie choroby nowotworowej.

Po stwierdzeniu uzyskania niskiego poziomu aktywności choroby lub wejścia pacjenta w remisję, po 30 dniach od jej stwierdzenia należy wykonać:

- 1) morfologię krwi;
- 2) OB;
- 3) białko C-reaktywne;
- 4) obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub DAS.

Po 18 miesiącach utrzymywania się niskiej aktywności choroby należy rozważyć zaprzestanie terapii lekiem biologicznym. W powyższej sytuacji należy utrzymać lub wdrożyć terapię innym lekiem modyfikującym przebieg choroby. Częsteczką preferowaną jest metotreksat.

Ewentualne dalsze leczenie lekiem biologicznym jest możliwe jedynie po uzyskaniu indywidualnej zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Po ukończeniu przez pacjenta 18 roku życia stosuje się program dla dorosłych z ograniczeniami rejestracyjnymi dotyczącymi MIZS, po zgłoszeniu i dokonaniu poprawnej rejestracji w aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

H. Określenie czasu leczenia w programie

Kryteria kwalifikacji i wyłączenia z programu (kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej lub zakończenia udziału w danej linii terapii

biologicznej) określają czas leczenia w programie.

II. METOTREKSAT

A. Kryteria kwalifikacji do leczenia metotreksatem podskórnym w ramach programu

1. Do leczenia metotreksatem podskórnym mogą zostać zakwalifikowani chorzy z RZS zakwalifikowani do programu, u których wystąpiły działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie w dawce wskazywanej w programie i uniemożliwiającego dalsze jego podawanie tą drogą, ale niestanowiące przeciwwskazania do jego stosowania. Rozpoczęcie leczenia metotreksatem podskórnym musi zostać poprawnie zarejestrowane w ewidencji RZS i MIZS (nie wymaga kwalifikacji przez Zespół Koordynujący do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).
2. Do leczenia metotreksatem podskórnym mogą zostać zakwalifikowani chorzy z MIZS zakwalifikowani do programu, u których wystąpiły objawy nietolerancji uniemożliwiające stosowanie metotreksatu doustnego w dawce wskazywanej w programie. Rozpoczęcie leczenia metotreksatem podskórnym musi zostać poprawnie zarejestrowane w ewidencji RZS i MIZS (nie wymaga kwalifikacji przez Zespół Koordynujący do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).

B. Określenie czasu leczenia w programie

Kryteria kwalifikacji i wyłączenia z programu określają czas leczenia w programie.

C. Kryteria wyłączenia z programu i przeciwwskazania do kwalifikacji do programu:

- 1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;
- 2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;
- 3) niewydolność serca (powyżej II klasy NYHA);
- 4) przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- 5) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane
Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, oporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenia gruźlicze;

<p>6) udokumentowana infekcja HIV;</p> <p>7) nasilenie się objawów niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby w trakcie leczenia;</p> <p>8) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;</p> <p>9) stwierdzone stany przedrakowe, choroby nowotworowe, także rozpoznane i wyleczone w okresie ostatnich 5 lat;</p> <p>10) stwierdzenie aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub innej przewlekłej choroby wątroby;</p> <p>11) źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.</p>		
--	--	--

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji:</p> <p>Do leczenia metotreksatem podskórnym kwalifikują się pacjenci z RZS o dużej oraz umiarkowanej aktywności choroby (określonej jako DAS 28 większy niż 3,2 lub DAS większy niż 2,4), u których wystąpiły działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie, uniemożliwiające dalsze jego stosowanie tą drogą, ale niestanowiące przeciwwskazania do jego zastosowania.</p> <p>W przypadku MIZS do programu kwalifikuje się pacjentów, u których wystąpiły objawy nietolerancji uniemożliwiające stosowanie metotreksatu doustnego.</p> <p>Włączenie pacjenta do programu nie wymaga kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Warunkiem kwalifikacji pacjenta do programu jest dokonanie poprawnej rejestracji w aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Do programu włączani są także świadczeniobiorcy z innymi niż wyżej wymienione postaci RZS i MIZS (niezależnie od wartości DAS 28 i DAS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) z zapaleniem błony naczyniowej oka, 2) z postacią uogólnioną (Zespół Still), 3) z RZS powikłanym krioglobulinemią, 4) z postacią skąpostawową rozszerzającą się i przetrwałą ponad 6 miesięcy 	<p>W przypadku RZS metotreksat jest podawany podskórnym w dawce do 25 mg na tydzień.</p> <p>W przypadku MIZS metotreksat jest podawany podskórnym w dawce 10 mg do 20 mg na m² powierzchni ciała na tydzień (maks. dawka 25 mg na tydzień).</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi; 2) płytki krwi (PLT); 3) odczyn Biernackiego (OB); 4) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 5) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 6) stężenie kreatyniny w surowicy; 7) obecność antygenu HBs; 8) przeciwciała anty-HCV; 9) obecność antygenu wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo). <p>Badania wymienione w pkt 7-9 należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed kwalifikacją.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) po każdym 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki należy oznaczyć: <ol style="list-style-type: none"> a) morfologię krwi, b) OB, c) poziom transaminaz w surowicy; 2) w przypadku zaostrzenia aktywności choroby należy oznaczyć wartość DAS lub DAS 28.

- u których wystąpiła nietolerancja leku podawanego doustnie.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia (kryteriami zakończenia terapii metotreksatem podskórnym).

3. Wyłączenie z programu

Do programu nie można kwalifikować świadczeniobiorców w następujących przypadkach:

- 1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;
- 2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;
- 3) świeżo przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek;
- 4) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, odporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenie gruźlicze;
- 5) udokumentowana infekcja HIV;
- 6) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;
- 7) obecność aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub obecność każdej innej przewlekłej choroby wątroby.

4. Kryteria zakończenia terapii metotreksatem podskórnym - wystąpienie działań niepożądanych:

- 1) uszkodzenie wątroby (wzrost aktywności transaminaz trzykrotnie powyżej normy);
- 2) zaburzenia hematologiczne, które mogą być związane z leczeniem;
- 3) narastające włóknienie płuc;
- 4) inne ciężkie powikłania związane z leczeniem.

LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>A. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu lub do terapii alternatywnej przewidzianej w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej), zostają przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się:</p> <p>3.1 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem ŁZS:</p> <p>Rozpoznanie ŁZS należy postawić na podstawie kryteriów Benneta lub CASPAR, jak poniżej:</p> <p>1) kryteria diagnostyczne Benneta:</p> <p>a) kryterium obowiązkowe: wywiad dotyczący łuszczycy (skóry lub paznokci) potwierdzonej klinicznie i skojarzonej z bólem oraz obrzękiem tkanek miękkich lub ograniczeniem</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>1) adalimumab należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 40 mg co 2 tygodnie;</p> <p>2) etanercept należy podawać 50 mg podskórnym co tydzień;</p> <p>3) infliksymab należy podać w dawce 5 mg/kg masy ciała w infuzji dożylną trwającą ponad 2 godziny w dniach 0, 14 i 42, a następnie co 8 tygodni.</p> <p>Terapia powyższymi lekami nie wymaga równoczesnego podawania metotreksatu, ale u chorego z zapaleniem stawów obwodowych zalecane jest równoczesne jego podawanie w pełnej dawce 25 mg/tydzień, jeżeli nie ma przeciwwskazań.</p> <p>2. Kryteria i warunki zamiany terapii na inną:</p> <p>1) pacjent, będący w trakcie terapii u którego występuje adekwatna odpowiedź na prowadzoną terapię, nie ma zamienianej aktualnie stosowanej terapii na inną;</p> <p>2) terapia będzie prowadzona w najniższej, zarejestrowanej jako skuteczna dawce;</p> <p>3) każdorazowo zmiana terapii wymaga uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych;</p> <p>4) zamiana terapii na terapię inną częsteczką inhibitora TNF alfa, wymienioną w przedmiotowym terapeutycznym programie</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji:</p> <p>W ramach kwalifikacji chorego do udziału w programie konieczne jest wykonanie następujących badań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi; 2) płytki krwi (PLT); 3) odczyn Biernackiego (OB); 4) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 5) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 6) stężenie kreatyniny w surowicy; 7) białko C-reaktywne; 8) badanie ogólne moczu; 9) próba tuberkulinowa lub Quantiferone; 10) obecność czynnika reumatoidalnego (RF); 11) obecność antygeny HBs; 12) przeciwciała HCV; 13) obecność antygeny wirusa HIV (HIV Ag/ Ab Combo). <p>Ponadto wymagane jest wykonanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RTG klatki piersiowej do 3 miesięcy przed kwalifikacją; 2) wskazane jest, aby u kobiet przed rozpoczęciem terapii było wykonane badanie ginekologiczne, mammograficzne lub badanie USG piersi. <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Chory powinien być poddany dokładnej ocenie skuteczności zastosowanego leczenia po 12 tygodniach od rozpoczęcia</p>

<p>ruchomości co najmniej 1 stawu, utrzymującym się 6 tygodni lub dłużej,</p> <p>b) kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obecność zapalenia stawów międzypaliczkowych dalszych (wykluczenie: guzki Heberdena i Boucharda), – obecność palców „kielbaskowatych” głównie stóp (dactylitis), – niesymetryczne zapalenie stawów rąk i stóp, – nieobecność guzków reumatoidalnych, – negatywne testy na obecność czynnika reumatoidalnego w surowicy, – nadżerkowe zapalenie małych stawów, stwierdzone w badaniu radiologicznym, bez cech współistniejącej osteoporozy (wykluczenie nadżerkowej postaci choroby zwyrodnieniowej rąk), – obecność zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych lub syndesmotów (czasami nietypowych) lub kostnienia okołokręgosłupowego stwierdzona w badaniu radiologicznym. <p>Chorobę można rozpoznać, gdy spełnione jest kryterium obowiązkowe i co najmniej 3 kryteria dodatkowe.</p> <p>2) kryteria klasyfikacyjne łuszczycowego zapalenia stawów wg CASPAR Należy ustalić zapalną chorobę stawów oraz co najmniej 3 punkty według systemu punktacji przedstawionej poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) łuszczyca obecnie – 2 pkt, b) wywiad łuszczycy – 1 pkt, c) wywiad rodzinny w kierunku łuszczycy – 1 pkt, d) dactylitis – 1 pkt, e) brak czynnika reumatoidalnego – 1 pkt, f) dystrofia paznokci – 1 pkt. <p>3.2 pacjentów z aktywną i ciężką postacią choroby:</p> <p>W przypadku zajęcia stawów obwodowych aktywna i ciężka postać choroby musi być udokumentowana podczas dwóch różnych wizyt w odstępie przynajmniej 4 tygodni przy stabilnym leczeniu, po zastosowaniu w terapii przynajmniej dwóch leków modyfikujących podawanych przez okres 4 miesięcy (lub krócej, jeżeli wystąpiły objawy nietolerancji) w monoterapii lub kombinacji, jak w punkcie 3.3.1.</p> <p>Należy aktywną postać choroby udokumentować tak, aby były spełnione wszystkie z 5 wymienionych poniżej kryteriów zapalenia stawów lub wszystkie kryteria dermatologiczne:</p> <p>1) kryteria reumatologiczne:</p>	<p>zdrowotnym, możliwa jest tylko w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z sytuacji wymienionych poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wystąpienia nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze, b) wystąpienia istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po podaniu innej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa, c) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniami klinicznym pacjenta, przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego. 	<p>leczenia inhibitorami TNF-alfa.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) W przypadku zajęcia stawów obwodowych za adekwatną odpowiedź na leczenie należy uznać zmniejszenie przynajmniej o 30% liczby bolesnych lub obrzękniętych stawów oraz zmniejszenie w skali Likerta o przynajmniej jedną jednostkę w aktywności choroby według chorego, jak i lekarza. 2) U chorych z zajęciem kręgosłupa za adekwatną odpowiedź na leczenie, której uzyskanie warunkuje powodzenie dalszej kontynuacji terapii, należy uznać zmniejszenie wartości BASDAI przynajmniej o 50% w stosunku do wartości sprzed leczenia lub o 2 jednostki, ale wówczas jego wartość nie może być wyższa jak 4. 3) Analizie należy również poddać w tym okresie: <ul style="list-style-type: none"> a) zmniejszenie wskaźników ostrej fazy we krwi (OB i CRP), b) dane z badania przedmiotowego. <p>Wizyty monitorujące powinny się odbywać co 12 tygodni. W celu monitorowania leczenia świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pobranie krwi i wykonanie następujących badań: morfologia krwi, OB, CRP, Aspat, Alat; 2) wywiad lekarski dotyczący efektów leczenia i możliwych działań niepożądanych; 3) badanie przedmiotowe lekarskie; 4) na podstawie oceny skuteczności i bezpieczeństwa podawanego leku zadecydowanie o kontynuowaniu lub wyłączeniu chorego z programu.
--	---	---

- a) co najmniej 5 obrzękniętych stawów z 66 możliwych – w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 4 tygodni ,
- b) co najmniej 5 tkliwych stawów z 68 możliwych – w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 4 tygodni,
- c) ogólna ocena przez pacjenta aktywności choroby jest określana jako aktywność w dużym lub bardzo dużym stopniu, co odpowiada wartości 4 lub 5 w pięciostopniowej skali Likerta,
- d) ogólna ocena przez lekarza aktywności choroby jest określana jako aktywność w dużym lub bardzo dużym stopniu, co odpowiada wartości 4 lub 5 w pięciostopniowej skali Likerta,
- e) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która wynosi więcej niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; taka ocena powinna być dokonana również przez lekarza-eksperta doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób zapalnych stawów;
w tej ocenie ekspert opiera się w szczególności na takich parametrach, jak: czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużego stężenia we krwi CRP lub wartości OB, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, liczbą podawanych uprzednio leków modyfikujących i możliwością alternatywnych sposobów leczenia, współistnieniem zapalenia przyczepów ścięgniastych, początkiem choroby przed 16 rokiem życia, statusem aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zaostrzeniami zapalenia błony naczyniowej, oceną progresji zmian radiologicznych oraz dawki podawanych jednocześnie kortykosteroidów; ocenę należy przeprowadzić jednokrotnie po drugim pomiarze liczby bolesnych i obrzękniętych stawów oraz aktywności choroby wg pacjenta i lekarza opiekującego się chorym;

2) kryteria dermatologiczne:

- a) zmiany skórne spełniające kryteria; PASI więcej niż 10,
- b) DLQI więcej niż 10,
- c) BSA więcej niż 10,
- d) przy spełnieniu wszystkich powyższych kryteriów dermatologicznych wymagane dla kwalifikacji jest zajęcie 3 stawów; ocena powinna być dokonana przez lekarza-eksperta doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób zapalnych stawów,
- e) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która wynosi więcej niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; taka ocena powinna być dokonana również przez lekarza -

eksperta doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób zapalnych stawów;

w tej ocenie ekspert opiera się w szczególności na takich parametrach, jak: czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużego stężenia we krwi CRP lub wartości OB, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, liczbą podawanych uprzednio leków modyfikujących i możliwością alternatywnych sposobów leczenia, współistnieniem zapalenia przyczepów ścięgniastych, początkiem choroby przed 16 rokiem życia, statusem aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zaostrzeniami zapalenia błony naczyniowej, oceną progresji zmian radiologicznych oraz dawki podawanych jednocześnie kortykosteroidów; ocenę należy przeprowadzić jednokrotnie po drugim pomiarze liczby bolesnych i obrzękniętych stawów oraz aktywności choroby według pacjenta i lekarza opiekującego się chorym.

W przypadku dominującego obrazu zajęcia stawów osiowych należy kwalifikować chorych z:

- 1) zajęciem stawów krzyżowo – biodrowych odpowiadającym nowojorskim kryteriom rozpoznania zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
- 2) aktywną i ciężką postacią choroby, która musi być udokumentowana podczas dwóch różnych wizyt w odstępie przynajmniej 12 tygodni, przy braku zmian leczenia w tym okresie; należy wykazać niezadawalającą odpowiedź na co najmniej 2 tradycyjnie stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane przez przynajmniej 3 miesiące każdy (nie podawane w tym samym czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce; aby wykazać, że odpowiedź na tradycyjnie stosowane leki jest niezadawalająca należy udokumentować nieskuteczność leczenia objawów zajęcia kręgosłupa, stawów obwodowych lub przyczepów ścięgniastych.

Aktywną postać choroby należy udokumentować tak, aby były spełnione wszystkie 3 poniższe kryteria:

- 1) wartość BASDAI większy lub równy 4 – w dwukrotnych pomiarach, w odstępie co najmniej 12 tygodni;
- 2) ból kręgosłupa na wizualnej skali 10 cm większy lub równy 4 cm - w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 12 tygodni;

3) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która powinna być większa niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; takiej oceny dokonuje również lekarz doświadczony w leczeniu blokerami TNF – alfa chorób zapalnych stawów; w tej ocenie ekspert powinien oprzeć się w szczególności na takich parametrach, jak czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużych stężeń CRP we krwi lub wartości OB, kielbaskowatych palców stóp, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ograniczenia ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zajęcia stawów obwodowych, początku choroby przed 16 rokiem życia, wartością BASFI, BASMI, statusu aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zapaleniami błony naczyniowej, oceny postępujących zmian radiologicznych ze zwróceniem uwagi na ankylozę kręgosłupa, czy skostnienie mostków międzykręgowych; ocena ta powinna być przeprowadzona jednokrotnie po drugim pomiarze wartości BASDAI i VAS bólu kręgosłupa.

3.3 pacjentów z niezadawalającą odpowiedzią na tradycyjnie stosowane leki

Aby wykazać, że odpowiedź na tradycyjnie stosowane leki modyfikujące jest niezadawalająca, należy udokumentować nieskuteczność takiego leczenia:

- 1) w zakresie stawów obwodowych - nieskuteczność leczenia stwierdza się, gdy podawano co najmniej dwa leki modyfikujące chorobę, w tym metotreksat, z których każdy powinien być stosowany przez przynajmniej 4 miesiące w monoterapii lub w przypadku leczenia kombinowanego nie krócej niż 6 miesięcy, chyba że wystąpiły objawy nietolerancji; rekomendowane dawki dla metotreksatu wynoszą 25 mg jeden raz w tygodniu, sulfasalazyny 3 g/dobę, leflunomidu 20 mg jeden raz dziennie, a cyklosporyny od 3-5mg/kg m.c./dobę;
- 2) w przypadku dominującego obrazu zajęcia stawów osiowych - jako nieskuteczność leczenia przyjmuje się niezadawalającą odpowiedź na co najmniej 2 tradycyjnie stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane przez przynajmniej 3 miesiące każdy (nie podawane w tym samym czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce.

W przypadku kobiet wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu.

B. Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach

farmakoterapii niestandardowej, świadczenia za zgodą płatnika lub w ramach jednorodnych grup pacjentów

Do programu włączani są również chorzy, którzy uprzednio byli już leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej lub według świadczeń za zgodą płatnika, lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) częściami leków - inhibitorów TNF alfa, pod warunkiem, że spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli terapia ta była nieprzerwana do momentu wejścia w życie programu i wykazano w tym czasie skuteczność podawanego leku, wtedy terapia powinna być realizowana z wykorzystaniem tej samej cząsteczki leku z grupy inhibitorów TNF alfa.

W przypadku wystąpienia przerwy w leczeniu trwającej dłużej niż 12 tygodni, a krótszej niż 26 tygodni, należy u chorego wykonać jedynie badania pozwalające na określenie bezpieczeństwa podawanego leku oraz parametry aktywności i ciężkości choroby zgodnie z warunkami zawartymi w podrozdziale aktywna i ciężka postać choroby (punkt A.3.2 – kryteria kwalifikacji) i określić, czy chory spełnia nadal warunki udziału w programie terapeutycznym. Terapia jest realizowana lekiem stosowanym uprzednio, jeżeli był skuteczny.

Jeżeli przerwa była dłuższa niż 26 tygodni chory wymaga ponownej kwalifikacji do programu.

C. Kryteria niepozwalające na włączenie do programu ze względu na bezpieczeństwo

Do programu nie można kwalifikować chorych w następujących przypadkach (przeciwwskazania bezwzględne):

- 1) okresu ciąży i laktacji;
- 2) aktywnego zakażenia (ostrego lub przewlekłego) bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego lub pasożytniczego (szczególnie gruźlicy, infekcji wirusem HIV lub przewlekłego zapalenia wątroby typu B);
- 3) przebycia zakażenia oportunistycznego w okresie ostatnich 2 miesięcy (np. półpasiec), aktywnej infekcji cytomegalowirusem, Pneumocystis carinii;
- 4) infekcyjnego zapalenia stawu w okresie ostatnich 12 miesięcy;
- 5) zakażenia endoprotezy w okresie ostatnich 12 miesięcy lub w nieokreślonym czasie, jeżeli sztuczny staw nie został wymieniony;
- 6) ciężkiej niewydolności krążenia (klasa III lub IV wg NYHA);
- 7) udokumentowanego zespołu demielinizacyjnego lub w przypadkach wystąpienia objawów przypominających ten zespół;
- 8) przebycia w okresie ostatnich 5 lat chorób nowotworowych, w tym raków litych i układu krwiotwórczego lub chłonnego z możliwością progresji choroby lub jej wznowy.

Względnymi przeciwwskazaniami do stosowania leków - inhibitorów TNF alfa, w

których podawanie tych leków jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych, są:

- 1) okoliczności związane z dużym ryzykiem zakażenia;
- 2) przewlekłe owrzodzenia podudzi;
- 3) wcześniej przebyta gruźlica - w okresie ostatnich 12 miesięcy lub niedawny kontakt z osobą chorą na gruźlicę;
- 4) cewnik w drogach moczowych utrzymywany na stałe;
- 5) u chorych, u których w okresie ostatnich 12 miesięcy występowały nawracające infekcje w wywiadzie (co najmniej 4); należy zwrócić uwagę na infekcje dróg moczowych, zatok i zębopochodne;
- 6) źle kontrolowana cukrzyca;
- 7) przewlekła obturacyjna choroba płuc;
- 8) przebycie w okresie dłuższym niż 5 lat choroby nowotworowej, leczonej skutecznie i która uważana jest za wyleczoną;
- 9) zmiany przednowotworowe, w tym polipy jelita grubego, pęcherza moczowego, dysplazji szyjki macicy, mielodysplazji;
- 10) duże miano przeciwciał przeciwwjadrowych, w tym dodatnie miano przeciwnemu DNA.

U chorych leczonych inhibitorami TNF alfa należy liczyć się z możliwością uaktywnienia przebytej wcześniej gruźlicy. W grupie chorych z przebytym kiedykolwiek w przeszłości procesem gruźliczym lub wówczas, gdy podejmowane jest profilaktyczne leczenie tuberkulostatykami, należy rozważyć wykonanie kontrolnego badania klatki piersiowej po 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia inhibitorami TNF alfa.

Leczenie inhibitorami TNF alfa kobiet w okresie przed menopauzą powinno być prowadzone, gdy jest stosowana przez nie skuteczna antykoncepcja.

D. Kryteria zakończenia udziału w programie

W przypadku zajęcia stawów obwodowych:

- 1) nie uzyskano u chorego adekwatnej dobrej odpowiedzi na leczenie po 12 tygodniach leczenia (zgodnie z pkt 2 – monitorowanie leczenia);
- 2) jeżeli u chorego w trakcie zaplanowanych wizyt co 12 tygodni stwierdza się w następujących po sobie dwóch badaniach kontrolnych (w odstępie nie dłuższym niż 3 miesiące) ponowne zwiększenie któregokolwiek z czterech parametrów (liczby bolesnych, obrzękniętych stawów, aktywności choroby wg chorego i lekarza) tak, że chory ponownie nie spełnia warunków poprawy określonych w punkcie 2 - monitorowania leczenia;

3) uzyskaniu przez chorego małej aktywności choroby wyrażonej 50% zmniejszeniem czterech mierzonych parametrów (liczby bolesnych, obrzękniętych stawów, aktywności choroby według chorego i lekarza), utrzymującej się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy;

4) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- a) reakcja alergiczna na lek,
- b) zakażenie o ciężkim przebiegu,
- c) objawy niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby (nie związanych z amyloidozą),
- d) pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna
- e) stwierdzenie choroby nowotworowej,
- f) zespołu toczniopodobnego,
- g) wystąpienia innych objawów wymienionych poprzednio jako bezwzględne przeciwwskazania.

W przypadku zajęcia stawów osiowych:

1) nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 12 tygodniach leczenia (zgodnie z pkt 2 – monitorowanie leczenia);

2) jeżeli w trakcie zaplanowanych wizyt po każdym, dwóch kolejnych okresach 12 tygodniowych stwierdza się nieutrzymanie kryteriów zgodnych z definicją adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia jest przerywana i pacjent kończy udział w programie;

3) uzyskaniu przez chorego małej aktywności choroby wyrażonej wartością BASDAI mniejszą niż 3, która będzie utrzymywała się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy;

4) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- a) reakcja alergiczna na lek,
- b) zakażenie o ciężkim przebiegu,
- c) objawy niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby (nie związanych z amyloidozą),
- d) pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,
- e) stwierdzenie choroby nowotworowej,
- f) zespołu toczniopodobnego,
- g) wystąpienia innych objawów wymienionych poprzednio jako

bezwzględne przeciwwskazania.

E. Kryteria kontynuacji programu terapii biologicznej lub zamiany jednej cząsteczki inhibitora TNF alfa na inną:

Po 9-12 miesiącach terapii inhibitorami TNF alfa i uzyskaniu przez chorego małej aktywności choroby:

a) wyrażonej 50% zmniejszeniem czterech mierzonych parametrów (liczby bolesnych, obrzękniętych stawów, aktywności choroby według chorego i lekarza), utrzymującej się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy w przypadku zapalenia stawów obwodowych

lub

b) wyrażonej wartością BASDAI mniejszym niż 3 utrzymującym się dłużej niż przez okres 6 miesięcy w przypadku zapalenia stawów osiowych

- leczenie należy odstawić.

W przypadku pacjenta, u którego stwierdzono nietolerancję na lek - inhibitor TNF alfa, od którego rozpoczęto leczenie, można rozważyć zastosowanie innego inhibitora TNF alfa wskazanego jako terapia alternatywna, ale jest to możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania uzyskania adekwatnej odpowiedzi na lek, który spowodował nietolerancję oraz nie utracenia jej po kolejnych 12 tygodniowych okresach oceny wyników leczenia. Wymagane jest też udokumentowanie dokonania zgłoszenia działania niepożądanego zastosowanego leku, które spowodowało zaprzestanie jego stosowania.

Nie należy zamieniać jednego leku - inhibitora TNF alfa na drugi w przypadku braku skuteczności pierwszego.

F . Kryteria ponownego włączenia do programu

Pacjent, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami, z powodu uzyskania małej aktywności choroby i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono zaostrzenie choroby o 30% w każdym z kryteriów podanych w punkcie 2 – monitorowanie leczenia w stosunku do stanu chorego na wizycie kończącej leczenie w programie w przypadku dominującego zajęcia stawów obwodowych,
lub pacjent, który spełnia kryteria włączenia do programu w przypadku dominującego

<p>zajęcia stawów osiowych, jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji. Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało małą aktywność choroby.</p>		
--	--	--

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kryteria kwalifikacji:</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego przewidzianych przez program przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej) muszą zostać przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się pacjentów z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpoznaniem ZZSK ustalonym na podstawie zmodyfikowanych kryteriów nowojorskich; 2) aktywną i ciężką postacią choroby, która musi być udokumentowana dwukrotnie w odstępie przynajmniej 12 tygodni, przy braku zmian leczenia w tym okresie, którzy wykazują niezadowolającą odpowiedź na co najmniej dwa tradycyjnie 	<p>Adalimumab należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 40 mg co 2 tygodnie.</p> <p>Etanercept należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 50 mg co tydzień.</p> <p>Infliksymab należy podawać w dawce 5 mg/kg masy ciała w infuzji dożylniej trwającej ponad 2 godziny w dniach 0, 14 i 42, a następnie co 8 tygodni.</p> <p>Kryteria i warunki zamiany terapii na inną</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U pacjenta będącego w trakcie terapii przy użyciu cząsteczki leku - inhibitora TNF-alfa u którego występuje adekwatna odpowiedź na leczenie nie dokonuje się zmiany terapii. 2. Zmiana terapii każdorazowo wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zespołu Koordynującego. 3. Zmiana terapii na inną, wymienioną w programie, możliwa jest tylko w następujących sytuacjach: <ol style="list-style-type: none"> 1) wystąpienia nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze; 2) wystąpienia istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po 	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oznaczenie antygeny HLA B27 kiedykolwiek w przeszłości; 2) morfologia krwi; 3) płytki krwi (PLT); 4) odczyn Biernackiego (OB); 5) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 6) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 7) stężenie kreatyniny w surowicy; 8) białko C-reaktywne; 9) badanie ogólne moczu; 10) próba tuberkulinowa lub Quantiferone; 11) obecność antygeny HBs; 12) przeciwciała HCV; 13) obecność antygeny wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo) – po uzyskaniu zgody pacjenta; 14) stężenie elektrolitów w surowicy. <p>Ponadto wymagane jest wykonanie przed kwalifikacją do programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rtg klatki piersiowej (maksymalnie do 3 miesięcy przed kwalifikacją); 2) EKG z opisem; 3) badanie stawów krzyżowo-biodrowych, które potwierdza rozpoznanie ZZSK; 4) opcjonalnie wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii stawów

stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane przez co najmniej 3 miesiące (niepodawane w tym samym czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce; aby wykazać, że odpowiedź na tradycyjnie stosowane leki jest niezadowalająca należy udokumentować nieskuteczność leczenia objawów zajęcia kręgosłupa lub stawów obwodowych, lub przyczepów ścięgniastych.

Aktywną postać choroby należy udokumentować tak, aby były spełnione wszystkie 3 poniższe kryteria:

- 1) wartość BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) większy lub równy 4 – w dwukrotnych pomiarach, w odstępie co najmniej 12 tygodni;
- 2) ból kręgosłupa na wizualnej skali 10 cm większy lub równy 4 cm - w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 12 tygodni;
- 3) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która powinna być większa niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; taka ocena powinna być dokonana również przez drugiego lekarza doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób z kręgu spondyloartropatii zapalnych; w tej ocenie ekspert powinien oprzeć się w szczególności na takich parametrach, jak czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużych stężeń CRP we krwi lub wartości OB, kielbaskowatych palców stóp, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ograniczenia ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zajęcia stawów obwodowych, początku choroby przed 16 rokiem życia, wartością BASFI, BASMI, statusu aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zapaleniami błony naczyniowej, oceny postępujących zmian radiologicznych ze zwróceniem uwagi na ankylozę kręgosłupa czy skostnienie mostków międzykręgowych; ocena ta powinna być przeprowadzona jednokrotnie po drugim pomiarze wartości

podaniu innej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa;

- 3) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem pacjenta, przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego.

krzyżowo-biodrowych jeżeli wynik RTG stawów krzyżowo-biodrowych jest niejednoznaczny a objawy kliniczne wskazują na ich zajęcie;

- 5) wskazane wykonanie u kobiet przed rozpoczęciem terapii badania ginekologicznego, mammograficznego lub badania USG piersi.

2. Monitorowanie leczenia

Pacjenta poddaje się dokładnej ocenie skuteczności zastosowanego leczenia po 12 tygodniach od rozpoczęcia leczenia inhibitorami TNF alfa, celem ustalenia, czy została osiągnięta adekwatna odpowiedź na leczenie.

Za adekwatną odpowiedź na leczenie, której uzyskanie warunkuje powodzenie dalszej kontynuacji terapii, należy uznać

zmniejszenie wartości BASDAI przynajmniej o 50% w stosunku do wartości sprzed leczenia lub o 2 cm oraz zmniejszenie bólu kręgosłupa na skali VAS o co najmniej 2 cm.

Wizyty monitorujące mają się odbywać po każdym kolejnych 12 tygodniach.

W celu monitorowania leczenia świadczeniodawca jest obowiązany wykonać następujące czynności:

- 1) badanie morfologii z rozmazem, OB, CRP, AspAT, AlAT;
- 2) wypełnienie przez pacjenta skali VAS bólu kręgosłupa i kwestionariusza BASDAI oraz obliczenie przez lekarza wartości BASDAI.

BASDAI i VAS bólu kręgosłupa.

Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów z ZZSK leczonych uprzednio w ramach farmakoterapii niestandardowej, świadczeń za zgodą płatnika lub w ramach jednorodnych grup pacjentów:

Do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy uprzednio byli już leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej, świadczeń za zgodą płatnika lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) cząsteczkami leków - inhibitorów TNF alfa. Jeżeli terapia ta była nieprzerwana i trwała dłużej niż 12 tygodni oraz wykazano w tym czasie wystąpienie i utrzymanie adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia powinna być realizowana z wykorzystaniem tej samej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa.

W przypadku wystąpienia przerwy w leczeniu trwającej dłużej niż 12 tygodni, a krótszej niż 26 tygodni, należy u pacjenta wykonać badania pozwalające na określenie bezpieczeństwa podawanego leku oraz parametry aktywności i ciężkości choroby zgodnie z warunkami dotyczącymi aktywnej i ciężkiej postaci choroby i określić, czy u pacjenta wystąpiła i utrzymała się adekwatna odpowiedź na leczenie oraz czy spełnia nadal warunki udziału w programie.

Kontynuacja terapii w tym przypadku powinna odbywać się z zastosowaniem leku wskazanego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Kryteria ponownej kwalifikacji do programu pacjentów z ZZSK:

Świadczeniobiorca, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono nawrót choroby (wzrost BASDAI do wartości większej lub równej 4), jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji. Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.

2. Określenie czasu leczenia w programie.

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o

wylączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wylączenia.

3. Wylączenie z leczenia

Kryteria stanowiące przeciwwskazania do kwalifikacji do programu:

1) przeciwwskazania bezwzględne:

- a) okres ciąży i laktacji,
- b) aktywne zakażenie (ostre lub przewlekłe) bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze (szczególnie gruźlica, infekcji wirusem HIV lub przewlekłego zapalenia wątroby typu B),
- c) przebycia zakażenia oportunistycznego w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywnej infekcji Cytomegalowirusem, Pneumocystis carinii,
- d) infekcyjnego zapalenia stawu w okresie ostatnich 12 miesięcy,
- e) zakażenia endoprotezy w okresie ostatnich 12 miesięcy lub w nieokreślonym czasie, jeżeli sztuczny staw nie został wymieniony,
- f) ciężkiej niewydolności krążenia (klasa III lub IV według NYHA),
- g) udokumentowanego zespołu demielinizacyjnego lub w przypadkach wystąpienia objawów przypominających ten zespół,
- h) przebycia w okresie ostatnich 5 lat chorób nowotworowych, w tym raków litych i układu krwiotwórczego lub chłonnego z możliwością progresji choroby lub jej wznowy;

2) przeciwwskazania względne do stosowania leków - inhibitorów TNF alfa, w których ich podawanie jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych:

- a) okoliczności związane z dużym ryzykiem zakażenia:
 - przewlekłe owrzodzenia podudzi,
 - wcześniej przebyta gruźlica - w okresie ostatnich 12 miesięcy lub niedawny kontakt z osobą chorą na gruźlicę,
 - cewnik w drogach moczowych utrzymywany na stałe,
 - nawracające infekcje (co najmniej 4) w okresie ostatnich 12 miesięcy, w szczególności infekcje dróg moczowych, zatok i zębopochodne,
 - źle kontrolowana cukrzyca,
 - przewlekła obturacyjna choroba płuc,

- b) przebycie w okresie dłuższym niż 5 lat choroby nowotworowej, leczonej skutecznie i która uważana jest za wyleczoną,
- c) zmiany przednowotworowe, w tym polipy jelita grubego pęcherza moczowego, dysplazji szyjki macicy, mielodysplazji.
- d) wysokie miano przeciwciał przeciwjądrowych, w tym dodatnie miano przeciwko natywnemu DNA.

U świadczeniobiorców leczonych inhibitorami TNF alfa należy liczyć się z możliwością uaktywnienia przebytej wcześniej gruźlicy. W grupie świadczeniobiorców z przebyłym kiedykolwiek w przeszłości procesem gruźliczym lub wówczas, gdy podejmowane jest profilaktyczne leczenie tuberkulostatykami, należy rozważyć wykonanie kontrolnego badania klatki piersiowej po 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia inhibitorami TNF alfa.

Leczenie inhibitorami TNF alfa kobiet w okresie przed menopauzą powinno być prowadzone, gdy stosowana jest przez nie skuteczna antykoncepcja. Wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu.

3) kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej:

- a) nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 12 tygodniach leczenia (zgodnie z definicją),
- b) stwierdzenie w trakcie zaplanowanych wizyt po każdych dwóch kolejnych okresach 12 tygodniowych nieutrzymania kryteriów zgodnych z definicją adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia jest przerywana i świadczeniobiorca kończy udział w programie,
- c) uzyskanie przez świadczeniobiorcę małej aktywności choroby wyrażonej wartością BASDAI < 3 , która będzie utrzymywała się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy,
- d) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:
 - reakcja alergiczna na lek,
 - zakażenie o ciężkim przebiegu,
 - objawy niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby (niezwiązanych z amyloidozą),
 - pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,
 - stwierdzenie choroby nowotworowej,

e) wystąpienie innych objawów wymienionych w pkt 1 jako bezwzględne przeciwwskazania.		
---	--	--

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIETYDOLNOŚCI NEREK (ICD-10 N 18)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 11 g/dl. (hematokryt poniżej 30%) pod warunkiem wykluczenia innych przyczyn, takich jak niedobór żelaza, krwawienia, hemoliza, zakażenia, ciężka nadczynność przytarczyc, zatrucie glinem i inne;</p> <p>2) upośledzenie funkcji nerek wykazane w badaniu GFR poniżej 30ml/min. u świadczeniobiorców bez cukrzycy, a u świadczeniobiorców z cukrzycą mniej niż 45 ml/min.;</p> <p>3) wiek powyżej 3 roku życia w przypadku preparatów zawierających alkohol benzylowy;</p> <p>4) wiek powyżej 18 roku życia w przypadku glikolu metoksy polietylenowego epoetyny beta;</p> <p>5) świadczeniobiorcy niedializowani.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie: Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na składniki stosowanego preparatu;</p> <p>2) ciąża;</p> <p>3) wystąpienie ciężkiego, opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego;</p> <p>4) schyłkowa niewydolność nerek.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Darbepoetyna alfa 10 µg - 1 raz w tygodniu, 20 µg - 1 raz na dwa tygodnie, 40 µg - 1 raz w miesiącu iv. lub sc. (średnia dawka tygodniowa/ dwutygodniowa/ miesięczna dla świadczeniobiorcy w danym ośrodku prowadzącym program).</p> <p>1.2 Erytropoetyna beta 2.000 j.m. raz na tydzień lub 2.000 j.m. raz na 2 tygodnie sc. (średnia dawka tygodniowa/ dwutygodniowa dla świadczeniobiorcy w danym ośrodku prowadzącym program).</p> <p>1.3 Epoetyna alfa średnia dawka tygodniowa dla świadczeniobiorcy w danym ośrodku prowadzącym program 2.000 j.m. 1 raz w tygodniu, iv. lub sc. (sc. w przypadku braku stałego dostępu do żyły).</p> <p>1.4 Epoetyna beta (PEG) 50 µg sc. / miesiąc (średnia dawka miesięczna). Leczenie trwa do czasu rozwinięcia schyłkowej niewydolności nerek .</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) poziom hemoglobiny;</p> <p>2) hematokryt;</p> <p>3) GFR;</p> <p>4) TSAT;</p> <p>5) CRP.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia Badania przeprowadzane co 2 tygodnie, po rozpoczęciu terapii oraz w okresie dostosowywania dawki:</p> <p>1) poziom hemoglobiny;</p> <p>2) hematokryt.</p> <p>Po osiągnięciu stabilnego docelowego Hb/Ht oznaczane raz w miesiącu:</p> <p>1) poziom hemoglobiny;</p> <p>2) hematokryt.</p>

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN) (ICD-10 N 18)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia..</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) klirens kreatyniny niższy aniżeli 75 ml/1,73m²/min.;</p> <p>2) wysokość ciała dziecka poniżej -1,88 odchylenia standardowego (SDS), dla płci i wieku metrykalnego lub tempo wzrastania SDS poniżej - 2.0;</p> <p>3) opóźniony wiek szkieletowy, poniżej 12,5 lat dla chłopców i poniżej 11,5 lat dla dziewczynek, według norm Greulich'a i Pyle;</p> <p>4) wykluczenie innych przyczyn niskorosłości.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) inna aniżeli PNN przyczyna niskorosłości;</p> <p>2) zaburzenia przemian węglowodanowych;</p> <p>3) choroba nowotworowa,</p> <p>4) niezadowalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała świadczeniobiorcy leczonego hormonem wzrostu poniżej 3cm na rok (nie dotyczy dziewcząt z wiekiem kostnym powyżej 14 lat oraz chłopców z wiekiem kostnym powyżej 16 lat);</p> <p>5) osiągnięcie wieku kostnego powyżej 16 lat przez dziewczynkę i powyżej 18 lat przez chłopca.</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,33 mg-0,37 mg (1,0-1,1 IU)/kg masy ciała/tydzień.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać: pomiar stężenia IGF-1, badania densytometryczne, RTG stawów biodrowych.</p> <p>Badania wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością nerek.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach - pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>2.2 Przed rozpoczęciem leczenia</p> <p>1) badania densytometryczne;</p> <p>2) RTG stawów biodrowych.</p> <p>2.3 Co 90 dni</p> <p>1) krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja</p> <p>2) konsultacja dietetyka (w ramach hospitalizacji).</p> <p>2.4 Co 30 dni (pomiar 4 krotnie wykonywane w ośrodku uprawnionym do terapii hormonem wzrostu, a pozostałe pomiary (8 razy) wykonywane w ośrodkach terenowych; w 3 - 4 stadium choroby co 30 dni, a w 2 stadium choroby co 90 dni)</p> <p>a) jonogram w surowicy krwi (Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Ca zjonizowany⁺, P⁻);</p> <p>b) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>c) gazometria.</p> <p>2.5 Co 365 dni</p> <p>1) w uzasadnionych przypadkach: badania densytometryczne; RTG stawów biodrowych;</p> <p>2) przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (u około 2-3% leczonych), u innych w zależności od potrzeb:</p> <p>a) konsultacja ortopedyczna,</p>

		<p>b) RTG/USG stawów biodrowych, c) TK z kontrastem stawów biodrowych.</p> <p>2.6 Co 90 dni (dotyczy dzieci z wadami układu moczowo-płciowego (około 10%), u innych w zależności od potrzeb: 1) konsultacja urologiczna; 2) USG jamy brzusznej.</p> <p>2.7 Co 365 dni (dotyczy dzieci z wadami układu moczowo-płciowego (około 10%) u innych w zależności od potrzeb) 1) badanie ogólne i posiew moczu</p> <p>2.8 Co 30 dni (w 3 - 4 stadium choroby co 30 dni, a w 2 stadium choroby co 90 dni) 1) pomiar stężenia parathormonu (intact PTH) 2) pomiar fosfatazy alkalicznej; 3) proteinogram; 4) pomiar stężenia glukozy we krwi; 5) pomiar stężenia kreatyniny; 6) pomiar stężenia mocznika.</p> <p>2.9 Co 365 dni 1) pomiar stężeń triglicerydów; 2) pomiar stężeń całkowitego cholesterolu; 3) pomiar stężenia IGF-1; 4) RTG śródreżca z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego)</p> <p>2.10 Co 365 dni (w zależności od potrzeb): 1) konsultacja okulistyczna; 2) konsultacja ortopedyczna; 3) cystouretografia</p> <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania wykonywane według standardów monitorowania terapii hormonem wzrostu świadczeniobiorców PNN.</p>
--	--	---

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOSCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH (ICD-10 N 25.8)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) wtórna nadczynność przytarczyc; 2) długotrwałe leczenie hemodializą z powodu schyłkowej niewydolności nerek; 3) przeciwwskazania do zastosowania innych opcji terapeutycznych (np. dla paratyroidektomii); 4) stężenie iPTH > 500pg/ml. <p>2. Kryteria wyłączenia</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) osiągnięcie normalizacji wskaźników gospodarki wapniowo - fosforanowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative - US National Kidney Foundation); 2) przeszczepienie nerki; 3) nadwrażliwość na lek lub substancje pomocnicze; 4) wystąpienie ciężkich działań niepożądanych w trakcie leczenia. 	<p>Zalecana dawka początkowa cynakalcetu u dorosłych wynosi 30 mg raz na dobę. Dawkę cynakalcetu można zwiększać co 2-4 tygodnie aż do maksymalnej dawki 180 mg raz na dobę w celu osiągnięcia pożądanego stężenia hormonu przytarczyc (PTH) u dializowanych pacjentów, czyli 150-300pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) w teście intact PTH (iPTH).</p>	<p>1. Monitorowanie leczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) stężenie iPTH - przez 1-4 tygodnie od rozpoczęcia leczenia następnie kontrola co 1-3 miesiące; 2) stężenie w surowicy Ca x P; 3) stężenie wapnia w surowicy; 4) stężenie fosforu w surowicy.

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS (ICD-10 P 07.2, P 27.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikację do udziału w programie zatwierdza konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w porozumieniu z konsultantem krajowym na podstawie dokumentacji z ośrodka.</p> <p>Program polega na podaniu maksymalnie 5 dawek paliwizumabu (w odstępach miesięcznych) w sezonie zakażeń wirusem RS, trwającym od 1 października do 30 kwietnia.</p> <p>Immunizację paliwizumabem przeprowadza się jednorazowo i należy ją rozpocząć przed ukończeniem pierwszego roku życia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia paliwizumabem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy, którzy w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyli pierwszego roku życia i spełniają następujące kryteria: <ol style="list-style-type: none"> a) wiek ciążowy \leq 28 tygodni, 0 dni (ICD-10 P07.2) lub b) dysplazja oskrzelowo-płucna (ICD-10 P27.1). 2) Jeżeli świadczeniobiorca, który spełnia opisane powyżej kryteria kwalifikacji do programu, zostanie wypisany ze szpitala w trakcie trwania sezonu zakażeń wirusem RS, wówczas otrzymuje od 3 do 5 dawek paliwizumabu, jednak nie mniej niż 3 dawki. Liczba podanych dawek jest uzależniona od okresu pozostałego od dnia wypisu ze szpitala do zakończenia sezonu zakażeń. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Lek podawany jest podczas sezonu zakażeń wirusem RS (od 1 października do 30 kwietnia) co miesiąc - 5 razy, a w sytuacji opisanej w ust.1 pkt 2 – od 3 do 5 razy.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) objawy nadwrażliwości na paliwizumab lub jakiegokolwiek ze składników występujących w preparacie; 2) objawy nadwrażliwości na inne humanizowane przeciwciała monoklonalne; 3) brak zgody pacjenta. 	<p>1. Dawkowanie paliwizumabu</p> <p>Lek podawany jest w dawce 15mg/kg masy ciała raz w miesiącu.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>W przypadku kwalifikacji do leczenia paliwizumabem w oparciu o kryterium z ust. 1 pkt 1 lit. b (dysplazja oskrzelowo-płucna): kliniczne potwierdzenie dysplazji oskrzelowo-płucnej.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Dzieci zakwalifikowane do leczenia paliwizumabem wymagają comiesięcznych wizyt w ośrodku realizującym program do końca sezonu zakażeń RSV celem oceny stanu ogólnego pacjenta (wywiad i badanie fizykalne) przed otrzymaniem kolejnej dawki leku.</p> <p>Dane dotyczące monitorowania pacjenta należy przelać do konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii po zakończeniu sezonu zakażeń.</p>

LECZENIE DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER – WILLI (ICD-10 Q 87.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Do Programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpoznanie zespołu Prader-Willi, na podstawie cech klinicznych potwierdzonych badaniem genetycznym; 2) wiek poniżej 18 roku życia, optymalnie między 2. a 4. rokiem życia; 3) dojrzałość szkieletu (wiek kostny), poniżej 16 lat u dziewcząt i poniżej 18 lat u chłopców; 4) stan odżywienia, mierzony wielkością wskaźnika BMI, poniżej 97 centyla dla płci i wieku (wymagany co najmniej 6 miesięczny okres obserwacji w ośrodku prowadzącym terapię hormonem wzrostu); 5) wyrównane przemiany węglowodanowe, wymagane wykonanie testu obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii; 6) konsultacja laryngologiczna, z uwagi na możliwość nasilenia lub wystąpienia nocnych bezdechów; 7) wprowadzone leczenie dietetyczne i rehabilitacja (wymagany co najmniej 6 miesięczny okres obserwacji w ośrodku prowadzącym terapię hormonem wzrostu); 8) inne badania i konsultacje zależne od stanu świadczeniobiorcy i innych powikłań choroby zasadniczej lub innych towarzyszących PWS chorób; 9) brak innych przeciwwskazań do stosowania hormonu wzrostu. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p>	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,18 - 0,47 mg/kg/tydzień (0,54 - 1,4 IU/kg/tydzień).</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać: pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>Badania laboratoryjne i inne według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z zespołem Prader-Willi.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach: pomiar stężenia IGF-1</p> <p>2.2 Po 30 dniach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konsultacja laryngologiczna, 2) po 90 dniach kolejne konsultacje laryngologiczne w zależności od potrzeb <p>2.3 Co 90 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) krótką 24- lub 48-godzinna hospitalizacja 2) konsultacja dietetyka (w ramach hospitalizacji); 3) konsultacja rehabilitanta (w ramach hospitalizacji). <p>2.4 Co 180 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pomiar stężenia glukozy we krwi; 2) pomiar stężenia TSH; 3) pomiar stężenia fT₄. 4) jonogram w surowicy krwi. <p>Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjenta z zespołem Prader-Willi.</p> <p>2.5 Co 365 dni (dotyczy dziewcząt)</p> <p>- konsultacja przez ginekologa zajmującego się dziećmi (dotyczy dziewcząt powyżej 10 roku życia, a u dziewcząt poniżej 10 roku życia - w zależności od potrzeb).</p>

- 1) brak współpracy z rodzicami lub świadczeniobiorcą;
- 2) wystąpienie powikłań zastosowanej terapii;
- 3) zaniechanie systematycznego leczenia rehabilitacyjnego lub dietetycznego;
- 4) narastanie otyłości, pomimo stosowania kompleksowego leczenia hormonem wzrostu, leczenia dietetycznego i rehabilitacji (wzrost wielkości wskaźnika BMI w odniesieniu do norm populacyjnych przyjętych dla wieku i płci o 2 odchylenia standardowe lub więcej);
- 5) pojawienie się lub nasilenie nocnych bezdechów;
- 6) cukrzyca lub ujawnienie się tej choroby w czasie prowadzonej terapii hormonem wzrostu.

2.6 Co 365 dni (dotyczy dzieci z wadami układu sercowo-naczyniowego - około 5%):

- 1) konsultacja kardiologiczna;
- 2) USG serca.

2.7 Co 365 dni (dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia - około 1/3 leczonych, a u dzieci poniżej 7 roku życia - ocena rozwoju psychoruchowego)
- konsultacja psychologa z oceną rozwoju intelektualnego

2.8 Co 365 dni

- 1) pomiar stężeń triglicerydów;
- 2) pomiar stężeń całkowitego cholesterolu;
- 3) pomiar frakcji HDL cholesterolu;
- 4) pomiar frakcji LDL cholesterolu;
- 5) pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny (HbA_{1c});
- 6) test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii;
- 7) pomiar stężenia IGF-1;
- 8) konsultacja laryngologiczna;
- 9) konsultacja ortopedyczna;
- 10) RTG śródreżcza z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego).

2.9 Co 365 dni (dotyczy świadczeniobiorców z zaburzeniami pokwitania - około 10-15% leczonych)
- test stymulacji wydzielania gonadotropin, z użyciem preparatu do stymulacji wydzielania gonadotropin (4 pomiary stężeń FSH i LH oraz 1 pomiar stężeń estrogenów i androgenów).

2.10 Co 365 dni (w przypadku nawracających zakażeń układu moczowego lub wad wrodzonych tego układu)

- 1) konsultacja nefrologiczna;
- 2) konsultacja urologiczna; 3) USG jamy brzusznej;
- 4) badanie ogólne i posiew moczu.

2.11 Co 365 dni - przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (2-3% leczonych):

- 1) konsultacja ortopedyczna;
- 2) RTG lub USG stawów biodrowych, poszerzone o TK lub MRI stawów biodrowych;

		<p>2.12 Co 365 dni (w przypadku wystąpienia objawów pseudo tumor cerebri - około 3-5% leczonych):</p> <ol style="list-style-type: none">1) konsultacja okulistyczna;2) konsultacja neurologiczna;3) obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI). <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Badania według standardów monitorowania świadczeniobiorców z zespołem Prader-Willi.</p>
--	--	---

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT) (ICD-10 Q 96)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY I SUBSTANCJE CZYNNIE STOSOWANE W RAMACH PROGRAMU	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	KWALIFIKACJA I BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stygmaty Zespołu Turnera; 2) niskorosłość, tj. wysokość ciała poniżej 3 centyla dla wieku, na siatkach centylowych dla populacji dziewcząt polskich; 3) upośledzone tempo wzrastania, poniżej -1 SD w odniesieniu do tempa wzrastania populacji dziewcząt polskich (wymagany co najmniej 6. miesięczny okres obserwacji w ośrodku uprawnionym do terapii hormonem wzrostu), z określeniem przewidywanego wzrostu ostatecznego metodą Baley- Pineau; 4) opóźniony wiek kostny, oceniany metodą Greulich'a-Pyle; 5) wykluczenie innych, aniżeli ZT, przyczyn niskorosłości (niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, zaburzenia wchłaniania i trawienia jelitowego, obciążenia dotyczące przebiegu ciąży i porodu, itp.); 6) inne nieprawidłowości, szczególnie nieprawidłowości anatomiczne układu sercowonaczyniowego i moczowo-płciowego; 7) konsultacja genetyczna, potwierdzona dodatnim wynikiem badania kariotypu. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wystąpienie objawów złuszczenia główki kości udowej; 	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,33 - 0,47 mg (1,0-1,4 IU)/kg m.c. /tydzień.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>Badania laboratoryjne wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z zespołem Turnera (ZT).</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach: pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>2.2 Co 180 dni: pomiar stężenia glukozy we krwi i odsetka glikowanej hemoglobiny HbA_{1c} lub co 365 dni: test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii.</p> <p>2.3 Co 90 dni</p> <p>- krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja</p> <p>2.4 Co 180 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pomiar stężenia glukozy we krwi: pomiar stężenia TSH; pomiar stężenia fT₄; 2) jonogram w surowicy krwi. <p>2.5 Co 365 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konsultacja przez ginekologa zajmującego się dziećmi (dotyczy przede wszystkim dziewcząt powyżej 10 roku życia (około 90%); 2) konsultacja kardiologiczna, USG serca (dotyczy dzieci z wadami układu sercowo-naczyniowego (około 5%)); 3) konsultacja nefrologiczna; konsultacja urologiczna; USG jamy brzusznej; badanie ogólne i posiew moczu (dzieci z wadami układu moczowo-płciowego (około

<p>2) wystąpienie objawów pseudo-tumor cerebri; 3) wystąpienie lub ujawnienie się cukrzycy; 4) ujawnienie lub wznowa choroby rozrostowej; 5) osiągnięcie przez świadczeniobiorcę niewyróżniającej wysokości ciała, tj. wysokości ciała równej lub większej aniżeli 158 cm; 6) zakończenie procesów wzrastania (brak przyrostu wysokości ciała między dwiema kolejnymi wizytami przeprowadzonymi w odstępach 6 miesięcznych); 7) niezadawalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała świadczeniobiorcy leczonego hormonem wzrostu poniżej 3 cm na rok; 8) osiągnięcie wieku kostnego powyżej 14 lat.</p>		<p>10%)); 4) pomiar stężenia IGF-1; 5) RTG śródreźcza z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego); 6) przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (2-3% leczonych): konsultacja ortopedyczna; RTG lub USG stawów biodrowych, poszerzone o TK lub MRI stawów biodrowych; 7) w przypadku wystąpienia objawów pseudo tumor cerebri (około 3-5% leczonych): konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI). Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania wykonywane według standardów monitorowania terapii hormonem wzrostu świadczeniobiorców z ZT.</p>
--	--	--

Załącznik B.43.

LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM (ICD-10 B 18, W TYM B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9; B 19 W CAŁOŚCI; C 82; C 83; Z 94)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1 Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy po zabiegu transplantacji narządu, u których wykrywa się przeciwciała anty-HBc total, a nie stwierdza się HBs Ag i HBV DNA.</p> <p>1.2. Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z rozpoznaniem chłoniaka, leczeni rytuksymabem, z wykrywalnymi przeciwciałami HBc total (HBs Ag ujemny, HBV DNA ujemny) i wykrywalnymi przeciwciałami HBc total (HBs Ag dodatni, HBV DNA ujemny).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>U pacjentów z rozpoznaniem chłoniakiem, leczonych rytuksymabem, lamiwudyna stosowana jest przez okres leczenia rytuksymabem oraz nie dłużej niż trzy miesiące od jego zakończenia.</p> <p>W przypadku pacjentów po przeszczepach, terapię można stosować bez ograniczeń czasowych.</p>	<p>1. Lamiwudyna</p> <p>- tabletki po 100 mg - raz dziennie 1 tabletką.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none">1) oznaczenie przeciwciał anty-HBc total;2) oznaczenie antygenu HBs;3) poziom wirerii HBV DNA;4) morfologia krwi;5) oznaczenie poziomu transaminaz. <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Co 3 miesiące:<ol style="list-style-type: none">a) oznaczenie poziomu ALAT i AspAT;2) Co 12 miesięcy:<ol style="list-style-type: none">a) oznaczenie antygenu HBs;b) poziom wirerii HBV DNA.

LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM (ICD-10 J.45)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria włączenia do programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pacjenci powyżej 12 roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową (wg GINA 2009) z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE; 2) konieczność stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów (>1000 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę lub innego wziewnego glikokortykosteroidu w dawce równoważnej) w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę (długo działający agonista receptora β-2 adrenergicznego, modyfikator leukotrienów, pochodna teofiliny); 3) częste stosowanie doustnych glikokortykosteroidów w przeszłości, w tym w okresie ostatnich 6 miesięcy; 4) całkowite stężenie IgE w surowicy 30-1500 IU/ml; 5) stwierdzenie jednoznacznej reaktywności <i>in vitro</i> (RAST) na alergeny całoroczne u pacjentów z całkowitym stężeniem IgE w surowicy poniżej 76 j.m./ml; 6) spełnienie co najmniej 3 z poniższych kryteriów: <ol style="list-style-type: none"> a) objawy niekontrolowanej astmy (brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ >1.5 pkt), b) 3 lub więcej epizodów zaostrzeń w roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększania ich dawki u osób, które stosują je przewlekłe, 	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Omalizumab podawany jest w dawce od 75 do 600 mg w 1 do 4 wstrzyknięć. Maksymalna zalecana dawka wynosi 600 mg omalizumabu przy schemacie dawkowania co 2 tygodnie.</p> <p>Szczegółowy schemat dawkowania określony na podstawie wyjściowego stężenia IgE (j.m./ml), oznaczanego przed rozpoczęciem leczenia oraz masy ciała pacjenta (kg) należy odczytać z tabel dawkowania zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>Lek powinien być podawany w ramach hospitalizacji w oddziale alergologicznym lub pulmonologicznym, tylko przez lekarza specjalistę z zakresu alergologii lub pulmonologii, doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu ciężkiej astmy alergicznej oraz leczeniu anafilaksji. Pacjenci powinni być obserwowani przez co najmniej 2 godziny po pierwszym podaniu leku. Jeśli pierwsze podanie leku było dobrze tolerowane po każdym następnym podaniu pacjent powinien być obserwowany przez 30 minut.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji pacjenta do programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) całkowite stężenie IgE (aktualny wynik – ważność badań maksymalnie 4 tygodnie); 2) test RAST (opcjonalnie); 3) pomiar masy ciała; 4) punktowe testy skórne lub swoiste IgE (mogą być z dokumentacji medycznej); 5) kwestionariusz kontroli astmy ACQ (minimum 2 tygodnie od ostatniego zaostrzenia, ważność testu - 1 tydzień); 6) test kontroli jakości życia chorego na astmę mini-AQLQ (minimum 2 tygodnie od ostatniego zaostrzenia, ważność testu – 2 tygodnie); 7) spirometria (minimum 2 tygodnie od ostatniego zaostrzenia) lub badanie szczytowego przepływu wydechowego PEF; 8) morfologia krwi i badania i biochemiczne: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie kreatyniny, b) stężenie mocznika, c) OB, d) stężenie białka C-reaktywnego (CRP), e) stężenie AIAT, f) stężenie AspAT, 9) próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.

<p>c) hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy,</p> <p>d) incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości,</p> <p>e) utrzymująca się obturacja dróg oddechowych (natężona objętość wydechowowa pierwszosekundowa FEV1 <60% wartości należnej lub zmienność dzienna szczytowego przepływu wydechowego PEF>30%),</p> <p>f) pogorszenie jakości życia z powodu astmy (średnia punktów w teście kontroli jakości życia chorego na astmę AQLQ<5.0 punktów),</p> <p>7) masa ciała 20-150 kg;</p> <p>8) niepalenie tytoniu;</p> <p>9) wykluczenie innych mechanizmów (chorób współistniejących) powodujących ciężki przebieg astmy innych niż reakcja organizmu na całoroczne alergeny wziewne.</p> <p>2. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach farmakoterapii niestandardowej, świadczenia za zgodą płatnika lub w ramach jednorodnych grup pacjentów</p> <p>Do programu włączani są również pacjenci, którzy uprzednio byli już leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej lub według świadczeń za zgodą płatnika, lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) omalizumabem, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii omalizumabem spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli terapia ta była nieprzerwana do momentu wejścia w życie programu i wykazano w tym czasie skuteczność podawanego leku, wtedy terapia powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.</p> <p>3. Przeciwwskazania do stosowania omalizumabu:</p> <p>1) nadwrażliwość na omalizumab lub substancje pomocnicze;</p> <p>2) występowanie chorób współistniejących powodujących ciężki przebieg astmy;</p>		<p>Ponadto przeprowadzana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta na podstawie wywiadu; 2) analiza leków przeciwastmatycznych i ich dawek stosowanych przewlekłe w ciągu ostatniego roku na podstawie dokumentacji medycznej; 3) analiza liczby i ciężkości zaostrzeń w ostatnim roku na podstawie dokumentacji medycznej. <p>2. Badania przeprowadzane przed każdym podaniem leku zgodnie z harmonogramem dawkowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) spirometria; 2) kwestionariusz kontroli astmy ACQ; 3) test kontroli jakości życia chorego na astmę mini-AQLQ (co 4 tygodnie); 4) ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu. <p>3. Monitorowanie leczenia:</p> <p>Po 16, 52 i 104 tygodniu leczenia wizyta oceniająca skuteczność dotychczasowej terapii z decyzją o kontynuacji lub zaprzestaniu dalszego leczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwestionariusz kontroli astmy ACQ (minimum 2 tygodnie od ostatniego zaostrzenia, - ważność testu – 1 tydzień); 2) test kontroli jakości życia chorego na astmę mini-AQLQ (minimum 2 tygodnie od ostatniego zaostrzenia, - ważność testu – 2 tygodnie); 3) spirometria (minimum 2 tygodnie od ostatniego zaostrzenia) lub badanie szczytowego przepływu wydechowego PEF; 4) morfologia krwi i badania biochemiczne:
--	--	--

- 3) ciąża;
- 4) karmienie piersią;
- 5) jednoczesna terapia lekami immunosupresyjnymi, przeciwnowotworowymi, wlewami z immunoglobulin lub innymi lekami biologicznymi.

4. Kryteria wyłączenia:

- 1) wystąpienie zaostrzeń astmy w okresie leczenia omalizumabem w ilości równej lub przewyższającej okres poprzedzający leczenie w obserwacji rocznej;
- 2) niespełnienie kryteriów skuteczności leczenia:
 - a) ocena odpowiedzi na terapię przez lekarza prowadzącego wg skali GETE niższa niż: bardzo dobra (całkowita kontrola astmy), dobra (znacząca poprawa kontroli astmy);
 - b) spełnienie 2 z 3 poniższych kryteriów:
 - poprawa kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ o $\geq 0,5$ punktu (w porównaniu z wizytą w tygodniu zakwalifikowania pacjenta do leczenia omalizumabem);
 - poprawa jakości życia w teście kontroli jakości życia chorego na astmę AQLQ o $\geq 0,5$ punktu (w porównaniu z wizytą w tygodniu zakwalifikowania pacjenta do leczenia omalizumabem);
 - zmniejszenie dawki doustnego glikokortykosteroidu o ≥ 5 mg w przeliczeniu na prednizon (w porównaniu z wizytą w tygodniu zakwalifikowania pacjenta do leczenia omalizumabem);
- 3) palenie tytoniu;
- 4) niestosowanie się do zaleceń lekarskich lub niepoprawne przyjmowanie leków;
- 5) podjęcie leczenia lekami immunosupresyjnymi, przeciwnowotworowymi, wlewami z immunoglobulin lub innymi lekami biologicznymi;
- 6) wystąpienie któregośkolwiek z przeciwwskazań do stosowania omalizumabu;
- 7) ciąża lub karmienie piersią.

5. Określenie czasu leczenia w programie:

Czas leczenia w programie określa lekarz prowadzący na podstawie kryteriów wyłączenia. Po upływie 24 miesięcy

- a) stężenie kreatyniny,
 - b) stężenie mocznika,
 - c) OB,
 - d) stężenie białka C-reaktywnego (CRP),
 - e) stężenie AIAT,
 - f) stężenie AspAT,
- 5) próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.

Ponadto przeprowadzana jest:

- 1) ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta na podstawie wywiadu;
- 2) analiza leków przeciwastmatycznych i ich dawek stosowanych przewlekłe w ciągu ostatniego roku na podstawie dokumentacji medycznej;
- 3) analiza liczby i ciężkości zaostrzeń w ostatnim roku na podstawie dokumentacji medycznej.

<p>leczenia omalizumabem może ono być przerwane, a pacjent powinien być obserwowany w zakresie kontroli astmy przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. W przypadku istotnego pogorszenia kontroli astmy, pacjent może być ponownie włączony do programu, jeśli spełnia warunki określone w kryteriach włączenia do programu.</p>		
---	--	--

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>A. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej) zostają przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowanie zastosowania substancji czynnej wymienionej w opisie programu (z wyjątkiem metotreksatu podskórnego dla pacjentów uprzednio zakwalifikowanych do programu leczenia tą formą leku) następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się:</p>	<p>Dawkowanie</p> <p>1. Tocilizumab podaje się raz na 4 tygodnie (+/-3 dni) we wlewie dożylnym trwającym 1 godzinę w dawce 8 mg/kg masy ciała. Dla pacjentów z masą ciała powyżej 100 kg maksymalna dawka wynosi 800 mg na infuzję. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wyników badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach monitorowania leczenia należy odpowiednio dostosować dawkę tocilizumabu zgodnie z zaleceniami opisanymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego. Leczenie tocilizumabem wymaga równoczesnego podawania metotreksatu. Jednak w przypadku niemożności podania metotreksatu, tocilizumab może być podany jako monoterapia.</p> <p>Wszyscy chorzy leczeni tocilizumabem powinni otrzymać Kartę Ostrzegawczą dla Pacjenta</p> <p>2. Certolizumab pegol podaje się w dawce 400 mg podskórnym w tygodniach 0, 2 i 4, a następnie w dawce 200 mg podskórnym co dwa tygodnie.</p> <p>Leczenie certolizumabem pegol wymaga równoczesnego podawania metotreksatu. Certolizumab pegol może być stosowany w monoterapii kiedy niemożliwe jest stosowanie metotreksatu w przypadkach określonych w opisie programu.</p>	<p>A. Badania przy kwalifikacji do programu</p> <p>W ramach kwalifikacji świadczeniobiorcy do udziału w programie konieczne jest wykonanie następujących badań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) czynnik reumatoidalny w surowicy – u pacjentów z RZS; 2) morfologia krwi; w przypadku terapii tocilizumabem wykonuje się morfologię krwi z rozmazem oraz oznaczeniem bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych, a w przypadku terapii certolizumabem pegol wykonuje się morfologię krwi z oznaczeniem bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych oraz limfocytów; 3) płytki krwi (PLT); 4) odczyn Biernackiego (OB); 5) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 6) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 7) stężenie kreatyniny w surowicy; 8) stężenie białka C-reaktywnego (CRP); 9) badanie ogólne moczu; 10) próba tuberkulinowa lub Quantiferon test; 11) obecność antygenu HBS; 12) przeciwciała anti-HCV; 13) obecność antygenu wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo); 14) stężenie elektrolitów w surowicy; 15) RTG klatki piersiowej z opisem (maksymalnie do 3 miesięcy przed kwalifikacją); 16) EKG z opisem; 17) dwukrotne obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub

<p>1) pacjentów w wieku 18 lat i powyżej;</p> <p>2) pacjentów z agresywną postacią RZS, u których nastąpiło niepowodzenie w stosowaniu terapii co najmniej dwoma tradycyjnymi lekami modyfikującymi przebieg choroby przez okres co najmniej 6 miesięcy każdym, w tym terapii maksymalnymi dawkami metotreksatu (ewentualnie w postaci podskórnej) przez okres co najmniej 3 miesięcy (o ile nie było objawów nietolerancji, zmuszających do ich zmniejszenia); Okres leczenia metotreksatem, jako jednym z dwóch leków, musi uwzględniać dodatkowo okres dochodzenia do dawkowania maksymalnego.</p> <p>3) pacjentów z RZS o agresywnym przebiegu choroby - stopień aktywności schorzenia określony jako DAS28 większy niż 5,1, którego wartość była określona dwukrotnie w odstępie 1 miesiąca (w trakcie 2 badań lekarskich); nie dotyczy kwalifikacji do leczenia RZS lekiem drugiej linii, w przypadku niepowodzenia w leczeniu lub nietolerancji pierwszoliniowego leku biologicznego;</p> <p>4) pacjentów z RZS z dominującym zajęciem kończyn dolnych, u których aktywność choroby wyrażona współczynnikiem DAS jest wyższa niż 3,7;</p> <p>5) pacjentów z innymi niż wymienione w pkt 2 – 4 postaciami RZS, niezależnie od wartości DAS28 i DAS:</p> <p>a) z zapaleniem błony naczyniowej oka, b) z postacią uogólnioną (Zespół Still), c) z RZS powikłanym krioglobulinemią, d) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>W przypadkach, w których pacjentowi grozi kalectwo lub zagrożone jest jego życie, decyzją Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, leczenie biologiczne może być rozpoczęte</p>	<p>Wszyscy chorzy leczeni certolizumabem pegol powinni otrzymać Kartę Ostrzegawczą dla Pacjenta.</p> <p>Metotreksat (w formie doustnej lub podskórnej) należy podawać w dawce 25 mg/tydzień, jeżeli taka dawka jest tolerowana.</p>	<p>DAS w RZS, w odstępie 1 miesiąca; ostatnie oznaczenie nie wcześniej niż dwa tygodnie przed podaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>18) u kobiet zaleca się wykonanie mammografii lub USG piersi;</p> <p>19) u pacjentów kwalifikowanych do leczenia tocilizumabem oznacza się profil lipidów: stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów .</p> <p>B. Monitorowanie leczenia</p> <p>W celu monitorowania leczenia wykonuje się nie rzadziej, niż w wyznaczonych terminach następujące badania:</p> <p>1) u pacjentów z RZS po 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki terapii pierwszoliniowej należy oznaczyć:</p> <p>a) morfologię krwi, b) odczyn Biernackiego (OB), c) stężenie białka C-reaktywnego (CRP), d) stężenie kreatyniny w surowicy oraz obliczyć wartość wskaźnika DAS 28 lub DAS.</p> <p>W przypadku kontynuowania terapii wszystkie wymienione powyżej badania należy powtarzać po każdych kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni).</p> <p>Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać EKG i RTG klatki piersiowej.</p> <p>2) u pacjentów z RZS w przypadku zastosowania terapii drugiej linii po kolejnych 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki leku drugiej linii należy oznaczyć:</p> <p>a) morfologię krwi, b) odczyn Biernackiego (OB), c) stężenie białka C-reaktywnego (CRP), d) stężenie kreatyniny w surowicy oraz obliczyć wartość wskaźnika DAS 28 lub DAS.</p> <p>W przypadku kontynuowania terapii badania należy</p>
---	---	--

<p>jeszcze przed zakończeniem obowiązkowego dla pozostałych postaci RZS okresu leczenia klasycznymi lekami DMARD.</p> <p>W przypadku kobiet wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń do 3 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki tocilizumabu, a w przypadku certolizumabu do 5 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki.</p> <p>B. Zasady kwalifikacji do leczenia tocilizumabem i certolizumabem</p> <p>1. Tocilizumab, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest stosowany w pierwszej albo kolejnych liniach leczenia dorosłych pacjentów, z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o przebiegu agresywnym, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (ang. DMARDs) lub niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia w ramach niniejszego lub innych programów lekowych dedykowanych leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. TNF), pod warunkiem, że tocilizumab nie został zastosowany we wcześniejszej linii leczenia.</p> <p>W przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana tocilizumab może być podawany w monoterapii.</p> <p>2. Certolizumab pegol, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest stosowany w pierwszej albo drugiej linii leczenia pacjentów w wieku 18 lat i powyżej, z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o przebiegu agresywnym, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (ang. DMARDs) lub niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia w ramach niniejszego lub innych programów</p>		<p>powtarzać po każdych kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni). Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać EKG i RTG klatki piersiowej.</p> <p>3) W przypadku zastosowania tocilizumabu w terapii pierwszej lub kolejnej linii leczenia biologicznego niezależnie od powyższych oceniających poprawę należy wykonać: Nie później niż po 60 dniach (+/- 14 dni), 120 dniach (+/- 14 dni) i 180 dniach (+/- 14dni) od podania pierwszej dawki w terapii kolejnej linii tocilizumabem należy oznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none">a) aktywność AspAT i AlATb) profil lipidów: stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydówc) morfologię krwi z rozmazemd) płytki krwi (PLT); <p>W przypadku kontynuowania terapii aktywność AspAT i AlAT należy powtarzać nie rzadziej niż po kolejnych 90 dniach (± 14 dni).</p> <p>Pozostałe wymienione powyżej badania należy powtarzać po każdych kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni). Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać EKG i RTG klatki piersiowej.</p>
--	--	---

lekowych dedykowanych leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, pod warunkiem, że certolizumab pegol nie został zastosowany we wcześniejszej linii leczenia

W przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana certolizumab pegol może być podawany w monoterapii.

W trakcie całej terapii pacjenta lekami biologicznymi ramach programów lekowych dedykowanych leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym dopuszcza się zastosowanie kolejno nie więcej niż dwóch inhibitorów TNF alfa u tego pacjenta.

C. Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach farmakoterapii niestandardowej lub Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP).

Do programu kwalifikowani są również pacjenci uprzednio leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej lub Jednorodnych Grup Pacjentów, certolizumabem lub tocilizumabem, nieujętych wcześniej w opisach programów, zakwalifikowanych zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w programie.

Pacjent jest kwalifikowany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.

W przypadku gdy uprzednio zastosowane leczenie było zbyt krótkie, aby spowodowało niski poziom aktywności choroby lub remisję, w przypadku wystąpienia przerwy zmuszającej do zastosowania terapii od początku, należy ją kontynuować z użyciem leku wskazanego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Warunkiem kwalifikacji do programu jest wykazanie w dokumentacji medycznej spełnienia przez chorego w momencie wdrożenia leczenia kryteriów kwalifikacji obowiązujących w obecnym programie i adekwatnej odpowiedzi na leczenie, rozumianej jako zmniejszenie DAS28 lub DAS o wartość

większą niż 1,2, po pierwszych 3 miesiącach terapii certolizumabem lub tocilizumabem, oraz stwierdzana w trakcie każdego następnego badania lekarskiego wykonywanego po każdym następnym 6 miesiącach terapii, począwszy od pierwszego badania, podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie.

D. Kryteria ponownego włączenia do programu

Świadczeniobiorca, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z zapisami programu, z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono nawrót choroby (u chorych na RZS wzrost wartości DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2 w stosunku do wartości obliczonej w momencie odstawienia leku, z tym że DAS28 nie może być mniejsze niż 3,2, a DAS niż 2,4), jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji.

Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.

E. Kryteria i warunki zamiany terapii:

1. Pacjent będący w trakcie terapii przy użyciu certolizumabu lub tocilizumabu i u którego występuje adekwatna odpowiedź na prowadzoną terapię, nie ma zamienianej aktualnie stosowanej terapii na inną.
2. Terapia jest prowadzona w najniższej dawce, zarejestrowanej jako skuteczna.
3. Każdorazowo zmiana terapii na terapię innym lekiem wymaga uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.
4. Zamiana terapii pierwszoliniowej na terapię inną cząsteczką leku biologicznego (stosowaną razem z metotreksatem, lub jako monoterapia) wymienioną w

programach lekowych dedykowanych leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, możliwa jest tylko w następujących sytuacjach:

- 1) brak skuteczności stosowania terapii pierwszoliniowej po 3 miesiącach jej stosowania;
- 2) wystąpienie nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze;
- 3) wystąpienie nadwrażliwości na cząsteczkę metotreksatu lub wystąpienie działań niepożądanych związanych z podaniem metotreksatu i w związku z tym brak możliwości zastosowania aktywnej cząsteczki leku biologicznego, jeżeli ta musi być stosowana wraz z metotreksatem;
- 4) wystąpienie istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po podaniu innej cząsteczki leku biologicznego;
- 5) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem lekarskim pacjenta (wykonanym w związku z realizacją programów lekowych dedykowanych leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub o przebiegu agresywnym) przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego lub metotreksatu.
- 6) Pkt 2,3 i 5 mają zastosowanie także w kolejnych liniach leczenia

F. Kryteria wyłączenia z programu i przeciwwskazania do kwalifikacji i ponownego włączenia do programu:

- 1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;
- 2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;
- 3) niewydolność serca (powyżej II klasy NYHA);
- 4) czynne ciężkie zakażenia
- 5) przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc,

<p>odmiedniczkowe zapalenie nerek w okresie ostatnich 3 miesięcy;</p> <p>6) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, oporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenia gruźlicze;</p> <p>7) udokumentowana infekcja HIV;</p> <p>8) nasilenie się objawów niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby w trakcie leczenia;</p> <p>9) stwierdzone choroby demielinizacyjne;</p> <p>10) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;</p> <p>11) stwierdzone stany przedrakowe, choroby nowotworowe, także rozpoznane i wyleczone w okresie ostatnich 5 lat;</p> <p>12) obecność aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub obecność każdej innej przewlekłej choroby wątroby;</p> <p>13) Leczenie tocilizumabem jest przeciwwskazane u chorych z aktywnością AIAT lub AspAT większą jak pięć razy powyżej normy lub jeśli bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza od $0,5 \times 10^9 / l$ lub liczba płytek krwi mniejsza od $50 \times 10^3 / \mu l$.</p> <p>14) Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tocilizumabem u chorych z aktywnością AIAT lub AspAT przekraczającą trzy razy normę (potwierdzone w kolejnych oznaczeniach) lub jeśli bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych jest niższa od $2 \times 10^9 / \text{litr}$ lub liczba płytek niższa od $100 \times 10^3 // \mu l$. W takich przypadkach potrzebna jest zgoda Zespołu Koordynującego z ustalonym indywidualnie dla każdego pacjenta schematem badań monitorujących.</p>		
---	--	--

G. Kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej lub zakończenia udziału w danej linii terapii biologicznej:

W przypadku pacjentów z RZS:

- a) uzyskanie przez pacjenta niskiej aktywności choroby, stwierdzonej w trakcie badania monitorującego, utrzymującej się przez okres przekraczający 6 miesięcy; miernikiem uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji jest, zgodnie z kryteriami EULAR, DAS28 mniejszy niż 3,2, w przypadku konieczności zastosowania użytego w programie wskaźnika DAS, miernikiem niskiej aktywności choroby lub remisji jest, zgodnie z kryteriami EULAR, DAS mniejszy lub równy 2,4; po tym okresie zaprzestaje się podawania pacjentowi leku biologicznego oraz wykonuje się badania zgodne z opisem programu, celem potwierdzenia wystąpienia remisji; w powyższej sytuacji, u pacjenta z niskim poziomem aktywności choroby lub w remisji należy utrzymać lub wdrożyć terapię innym lekiem modyfikującym przebieg choroby; częsteczką preferowaną jest metotreksat,
- b) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie tj.: stwierdzenie po pierwszych 3 miesiącach terapii pierwszoliniowej tocilizumabem lub certolizumabem braku zmniejszenia DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2),
- c) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie stwierdzone po pierwszych 3 miesiącach terapii tocilizumabem lub certolizumabem, licząc od momentu zastosowania pierwszej dawki po ponownym włączeniu pacjenta do leczenia po zakończeniu okresu remisji (stwierdzenie braku zmniejszenia DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2),
- d) w przypadku uprzedniego dokonania zmiany terapii pierwszoliniowej z powodu nieskuteczności po 3 miesiącach na tocilizumab lub certolizumab- brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po kolejnych 3 miesiącach terapii braku zmniejszenia DAS28

<p>lub DAS o więcej niż 1,2),</p> <p>e) utrata adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzona w trakcie każdego kolejnego badania lekarskiego wykonywanego po każdym następnym 6 miesiącach terapii, począwszy od pierwszego badania podczas którego, stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie), rozumiana jako brak zmniejszenia DAS28 lub DAS o wartość równa lub większą niż 1,2, w stosunku do wartości wyjściowej stwierdzonej podczas przeprowadzonej wcześniejszej kontroli;</p> <p>f) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none">- reakcja alergiczna na substancję czynną lub substancję pomocniczą,- zakażenie o ciężkim przebiegu,- objawy niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby,- pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,- stwierdzenie choroby nowotworowej. <p>g) leczenie tocilizumabem należy przerwać w przypadku utrzymania się w kolejnych oznaczeniach co 4 tygodnie aktywności ALAT lub AspAT większej niż trzy razy powyżej górnej granicy normy lub po jednorazowym stwierdzeniu aktywności większej niż pięć razy powyżej górnej granicy normy</p> <p>h) leczenie tocilizumabem należy przerwać w przypadku obniżenia bezwzględnej liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej $0,5 \times 10^9$ /litr lub liczba płytek krwi mniejsza niż 50×10^3 /μl.</p> <p>Po stwierdzeniu uzyskania niskiego poziomu aktywności choroby lub wejścia pacjenta w remisję, po 30 dniach od jej stwierdzenia należy wykonać:</p> <ol style="list-style-type: none">1) morfologię krwi;2) OB;3) białko C-reaktywne;4) obliczenie wartości wskaźnika DAS28 lub DAS.		
---	--	--

<p>H. Określenie czasu leczenia w programie Kryteria kwalifikacji i wyłączenia z programu (kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej lub zakończenia udziału w danej linii leczenia terapii biologicznej) określają czas leczenia w programie.</p>		
---	--	--

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia fingolimodem w ramach programu:</p> <p>Do leczenia substancją czynną fingolimod kwalifikowani są pacjenci spełniający łącznie następujące kryteria:</p> <p>1.1. Wiek od 18 roku życia;</p> <p>1.2. Rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozсіяnego (RRMS) - oparte na kryteriach diagnostycznych McDonalda (Polman i wsp. 2005), włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po kontraście, w którym w okresie kwalifikacji w obrazie T-2 zależnym stwierdzono obecność co najmniej 9 zmian lub obecność co najmniej 1 zmiany po wzmocnieniu gadolinem;</p> <p>1.3. Pacjenci, u których stwierdza się brak odpowiedzi na pełny, minimum roczny cykl leczenia interferonem beta, definiowany jako spełnienie obu poniższych warunków:</p> <p>1) liczba i ciężkość rzutów:</p> <p>a) 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych, lub o 1 pkt w zakresie czterech lub większej liczby układów funkcjonalnych) lub</p> <p>b) 1 ciężki rzut po 6 miesiącach leczenia (wzrost w EDSS większy niż w definicji rzutu umiarkowanego);</p> <p>2) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdym 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych:</p> <p>a) więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+),</p> <p>b) więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2.</p>	<p>1. Fingolimod</p> <p>Substancja czynna finansowana w ramach programu: chlorowodorek fingolimodu</p> <p>Postać farmaceutyczna, dawka: kapsułka twarda 0.5 mg.</p> <p>Zalecane dawkowanie fingolimodu to 0.5 mg doustnie raz na dobę.</p> <p>2. Natalizumab</p> <p>Substancja czynna finansowana w ramach programu: natalizumab</p> <p>Postać farmaceutyczna, dawka: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg natalizumabu.</p> <p>Zalecane dawkowanie natalizumabu to 300 mg dożylnie, we wlewie kroplowym 100 ml 0,9% NaCl co 4 tygodnie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia fingolimodem:</p> <p>1.1. Badania biochemiczne, w tym oceniające funkcję wątroby;</p> <p>1.2. Morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>1.3. Rezonans magnetyczny z kontrastem; rezonans magnetyczny wykonuje się w okresie kwalifikacji do programu. Jeżeli leczenie nie zostanie rozpoczęte do 30 dni od jego wykonania to badanie powtarza się tuż przed zastosowaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>1.4. Konsultacja kardiologiczna przed włączeniem leczenia fingolimodem u pacjentów otrzymujących leki mogące zwalniać akcję serca (betablokery, werapamil, digoksyna, leki cholinolityczne, pilokarpina itp.) oraz u pacjentów z wywiadem w kierunku zaburzeń rytmu i przewodzenia, niewydolności serca, omdleń kardiogennych, lub innej znaczącej choroby serca;</p> <p>1.5. Konsultacja okulistyczna - u pacjentów z wywiadem w kierunku cukrzycy lub zapalenia błony naczyniowej oka;</p> <p>1.6. Oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZV); w razie braku przeciwciał przeciw VZV konieczne jest przeprowadzenie szczepienia przeciw VZV miesiąc przed włączeniem leczenia fingolimodem;</p> <p>1.7. U kobiet w wieku reprodukcyjnym – test ciąży, który musi być negatywny przed rozpoczęciem leczenia fingolimodem;</p> <p>1.8. Konsultacja dermatologiczna w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia.</p> <p>Ponadto pacjenci włączeni do leczenia fingolimodem powinni obowiązkowo zapoznać się z materiałami edukacyjnymi</p>

<p>2. Do programu kwalifikują się również pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie fingolimodem przed dniem 1 stycznia 2013 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:</p> <p>1.1. Leczenie zostało włączone zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, i powyższe znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta.</p> <p>1.2. Nie podlegają kryteriom wyłączenia określonym w pkt. 5</p> <p>3. Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania fingolimodu:</p> <p>Przeciwwskazaniem do leczenia fingolimodem jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakażeń oportunistycznych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) pacjenci z rozpoznany zespół niedoboru odporności, b) osoby przyjmujące aktualnie leki immunosupresyjne, c) pacjenci ze zmniejszoną odpornością powstałą w wyniku wcześniejszego leczenia immunosupresyjnego; 2) Ciężkie aktywne zakażenia oraz aktywne przewlekłe zakażenia w szczególności zapalenie wątroby, gruźlica; 3) Rozpoznane czynne choroby nowotworowe, z wyjątkiem pacjentów z rakiem podstawnokomórkowym skóry; 4) Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (stopnia C wg Child-Pugh); 5) Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 6) Pacjenci z chorobą niedokrwinną serca, chorobą węzła zatokowego, wywiadem w kierunku zawału serca oraz leczeni lekami antyarytmicznymi klasy Ia lub III; 7) Pacjenci, którzy nie przebyli ospy wietrznej lub nie zostali przeciw niej zaszczepieni i nie występują u nich przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-Zoster virus, VZV); 8) Pacjenci z wtórnie postępującą postacią choroby. 	<p>Przerywając podawanie natalizumabu przed zastosowaniem alternatywnego leczenia należy uwzględnić, że natalizumab utrzymuje się we krwi i jego działania farmakodynamiczne trwają przez około 12 tygodni po podaniu ostatniej dawki.</p>	<p>dostarczonymi przez producenta leku w ramach tzw. „planu zarządzania ryzykiem” i potwierdzić ten fakt pisemnie w dokumentacji medycznej.</p> <p>2. Inicjacja leczenia:</p> <p>2.1. Inicjacja leczenia musi być przeprowadzona w warunkach krótkotrwałej hospitalizacji bądź w poradni przyszpitalnej, gdzie istnieje możliwość ciągłego monitorowania zapisu EKG, oraz pilnej hospitalizacji w razie konieczności leczenia zaburzeń rytmu lub w razie konieczności leczenia zaburzeń przewodzenia. Wszyscy pacjenci w dniu inicjacji leczenia muszą być poddani 6-godzinnej ciągłej obserwacji w kierunku potencjalnie mogących wystąpić zaburzeń rytmu lub przewodzenia.</p> <p>2.2. W toku opisanej inicjacji wykonuje się badania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badanie EKG z 12 odprowadzeniami oraz pomiar ciśnienia tętniczego bezpośrednio przez podaniem leku oraz po 6 godzinach od momentu podania leku; 2) Ciągłe monitorowanie EKG w czasie rzeczywistym (z użyciem kardiomonitora) w trakcie 6-godzinnej obserwacji po pierwszej dawce leku; 3) Pomiary ciśnienia tętniczego krwi i tętna co godzinę do zakończenia obserwacji, których wyniki muszą być odnotowane w dokumentacji pacjenta; 4) W razie wystąpienia zaburzeń rytmu lub przewodzenia konieczne może być wykonanie dodatkowego badania EKG oraz przedłużenie monitorowania EKG do dnia następnego lub włączenie leczenia farmakologicznego; 5) W przypadku pacjentów z kardiologicznymi czynnikami ryzyka zdefiniowanymi w przeciwwskazaniach względnych obowiązkowa jest obserwacja do następnego dnia po włączeniu leczenia fingolimodem. U takich pacjentów konieczne jest przeprowadzenie konsultacji kardiologicznej przed planowanym włączeniem leczenia, a w przypadku pacjentów leczonych lekami zwalniającymi akcję serca zaleca się o ile jest to możliwe zmianę leczenia na takie, które nie powoduje zwolnienia akcji serca. Identyczną procedurę monitorowania należy przeprowadzić
--	--	---

4. Przeciwwskazania względne do stosowania:

Nie zaleca się stosowania fingolimodu:

1) U pacjentów spełniających co najmniej jedno kryterium z niżej wymienionych :

- a) blok drugiego stopnia typu Mobitz II lub blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia;
- b) blok zatokowo-predsionkowy;
- c) istotne wydłużenie QT (QTc>470 milisekund u kobiet lub>450 milisekund u mężczyzn);
- d) wywiad w kierunku objawowej bradykardii lub nawracających omdleń;
- e) choroba naczyń mózgowych;
- f) wywiad w kierunku zastoinowej niewydolności krążenia;
- g) wywiad w kierunku zatrzymania krążenia;
- h) niekontrolowane nadciśnienie tętnicze;
- i) ciężki zespół bezdechu sennego;
- j) obrzęk płamki żółtej.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płamki żółtej lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z wywiadem w kierunku cukrzycy oraz zapalenia błony naczyniowej oka.

2) U pacjentów przyjmujących następujące leki przeciwyrtmiczne lub zwalniające rytm serca:

- a) leki beta-adrenolityczne;
- b) antagoniści kanału wapniowego zwalniający akcję serca (np. werapamil, diltiazem lub iwabradyna);
- c) inne substancje mogące zwalniać akcję serca (np. digoksylna, antagoniści cholinesterazy lub pilokarpina).

5. Kryteria wyłączenia:

Kryterium wyłączenia z leczenia fingolimodem jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

1) Rezygnacja pacjenta

również u pacjentów, u których doszło do przerwy w podawaniu fingolimodu trwającej dłużej niż 14 dni;

6) W przypadku wystąpienia istotnego wpływu na układ krążenia, obserwację pacjenta należy przedłużyć do czasu jego ustąpienia, nie krócej jednak niż do następnego dnia. Kryteria przedłużenia obserwacji obejmują:

- a) wystąpienie w dowolnym momencie podczas 6-godzinnego okresu monitorowania pacjenta po podaniu pierwszej dawki fingolimodu bloku serca III stopnia,
- b) obecność poniższych objawów w momencie zakończenia 6-godzinnej obserwacji:

- akcja serca poniżej 45 uderzeń na minutę,
- wydłużenie odstępu QT >500 milisekund,
- utrzymujący się nowo rozpoznany blok serca II stopnia typu Mobitz I lub blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia.

U takich pacjentów konieczna jest konsultacja kardiologiczna (bądź internistyczna) celem oceny bezpieczeństwa dalszego leczenia fingolimodem. W razie wątpliwości należy rozważyć zmianę terapii.

3. Monitorowanie leczenia:

- 1) Badanie morfologii krwi oraz poziomu transaminaz wątrobowych w 1., 3., 6., 9. i 12. miesiącu leczenia, a następnie nie rzadziej, niż co 6 miesięcy lub zależnie od wskazań klinicznych;
- 2) Rezonans magnetyczny z kontrastem – po każdym 12 miesiącach leczenia;
- 3) Konsultacja okulistyczna 3-4 miesiące po rozpoczęciu leczenia w celu wykluczenia obrzęku płamki, a następnie zależnie od opinii okulisty, jednak nie rzadziej niż raz w roku;
- 4) Konsultacja okulistyczna jest konieczna również w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń widzenia w trakcie leczenia fingolimodem;
- 5) Okresowa kontrola ciśnienia tętniczego krwi, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;
- 6) Konsultacja dermatologiczna po każdym 12 miesiącach

<p>2) Cięża;</p> <p>3) Spełnienie kryteriów nieskuteczności leczenia zawartych w pkt 6;</p> <p>4) Utrzymujący się, spadek liczby limfocytów poniżej $0.2 \times 10^9/l$;</p> <p>5) Utrzymujące się i niebędące wynikiem innego procesu chorobowego zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych powyżej pięciokrotności górnej granicy normy lub zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy;</p> <p>6) Wystąpienie innych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem, niepoddających się rutynowemu postępowaniu;</p> <p>7) Przejście w postać wtórnie postępującą.</p> <p>6. Określenie czasu leczenia w programie:</p> <p>Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po każdym pełnym 12 miesiącach terapii.</p> <p>U chorych odpowiadających na leczenie po ocenie skuteczności, terapię fingolimodem można przedłużać o kolejne 12 miesięcy.</p> <p>Łączny czas leczenia pacjenta, lekami modyfikującymi przebieg choroby, zależy od decyzji lekarza, nie może jednak przekraczać 60 miesięcy.</p> <p>W przypadku wystąpienia, w początkowym okresie leczenia, objawów niepożądanych lub ze względu na bezpieczeństwo chorego, dopuszcza się w ramach programu zamianę na lek o innym mechanizmie działania.</p> <p>Przesłanki do zmiany terapii, wymienione w poprzednim zdaniu nie są tożsame z brakiem skuteczności wdrożonego leczenia.</p> <p>Za brak skuteczności leczenia fingolimodem, uzasadniający zmianę leczenia lub przerwanie leczenia, przyjmuje się wystąpienie jednej z poniższych sytuacji:</p> <p>1) Przejście w postać wtórnie postępującą lub</p> <p>2) Wystąpienie 2 z 3 poniższych kryteriów:</p> <p>a) liczba i ciężkość rzutów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w zakresie czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych) lub 		<p>leczenia.</p> <p>4. Badania przy kwalifikacji do leczenia natalizumabem:</p> <p>4.1. Morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4.2. Badania biochemiczne krwi, w tym oceniające funkcję nerek i wątroby;</p> <p>4.3. Badanie ogólne moczu;</p> <p>4.4. Test ciążowy w moczu;</p> <p>4.5. Badanie MRI mózgu bez i po podaniu kontrastu w okresie nie dłuższym niż 30 dni do podania leku, wg ustalonej metodologii (natężenie pola skanera $\geq 1,0$ T, grubość przekroju ≤ 5 mm, bez przerw, sekwencje: FLAIR, TSE PD/T2, SE T1);</p> <p>4.6. Ocena stanu neurologicznego z określeniem EDSS;</p> <p>4.7. Wykonanie testu na obecność przeciwciał anti-JCV w celu kwalifikacji do leczenia i stratyfikacji ryzyka PML.</p> <p>Ponadto w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem lekarze przepisujący produkt leczniczy zawierający natalizumab otrzymują pakiet dla lekarza zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charakterystykę Produktu Leczniczego oraz Ulotkę dla Pacjenta - Informację dla lekarza o produkcie leczniczym zawierającym natalizumab - Kartę Ostrzegawczą Pacjenta - formularz wdrożenia i kontynuacji leczenia - pacjenci włączeni do programu muszą otrzymać kartę ostrzegawczą pacjenta i kopię formularza rozpoczęcia terapii. Potwierdzenie otrzymania kopii formularza i karty ostrzegawczej pacjenta pozostaje w dokumentacji medycznej <p>5. Monitorowanie leczenia:</p> <p>1) badanie podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychicznego i funkcji poznawczych, przed każdym podaniem leku oraz w sytuacji pojawienia się nowych objawów;</p>
--	--	--

- 1 ciężki rzut wymagający leczenia sterydami po 6 miesiącach leczenia (wzrost EDSS większy niż w definicji rzutu umiarkowanego)
b) progresja choroby mimo leczenia, co oznacza utrzymujące się przez co najmniej 3 miesiące pogorszenie się stanu neurologicznego o co najmniej:

- 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5,
- 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0;

c) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdym 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych:

- więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+),
- więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2.

7. Kryteria przedłużenia leczenia o kolejne 12 miesięcy:

Leczenie może zostać przedłużone o kolejne 12 miesięcy, jeżeli zostaną spełnione 2 z 3 niżej wymienionych kryteriów:

1) liczba i ciężkość rzutów:

- brak rzutów lub rzuty łagodne (wzrost EDSS w trakcie rzutu o 0.5 pkt lub o 1 pkt w zakresie jednego do trzech układów funkcjonalnych) lub
- 1 rzut umiarkowany (wzrost EDSS w trakcie rzutu o 1 do 2 pkt lub 2 pkt w zakresie jednego do dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych), lub

2) brak progresji choroby w okresie ostatniego roku leczenia: różnica w skali EDSS poniżej 1 pkt;

3) brak wyraźnych cech aktywności i progresji choroby w badaniu MRI z podaniem kontrastu (nie więcej niż jedna nowa zmiana Gd+ lub dwie nowe zmiany w sekwencji T2).

8. Kryteria kwalifikacji do leczenia natalizumabem w ramach programu:

Do leczenia substancją czynną natalizumab kwalifikowani są pacjenci spełniający łącznie następujące kryteria:

8.1. Wiek od 18 roku życia;

- 2) badania laboratoryjne, w tym: morfologia krwi z rozmazem, badania funkcji nerek, wątroby;
- 3) badanie ogólne moczu co 3 miesiące w ciągu pierwszego roku, a następnie co 6 miesięcy lub w razie wskazań medycznych;
- 4) MRI bez i po podaniu kontrastu po każdym 12-tu miesiącach leczenia;
- 5) w przypadku podejrzenia PML badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność wirusa JC, badanie rezonansu magnetycznego bez i po podaniu kontrastu;
- 6) Powtarzanie testu u pacjenta z ujemnym mianem przeciwciał anti- JCV co 6 miesięcy

6. Specjalne środki ostrożności:

- 1) Stosowanie produktu TYSABRI wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia PML – oportunistycznego zakażenia wywołanego przez wirusa JC.
Lekarz powinien być szczególnie wyczulony na objawy sugerujące PML, których pacjent może nie dostrzegać (np. objawy zaburzenia funkcji poznawczych lub psychiczne).
- 2) Pacjentów należy uprzedzić, aby poinformowali o swoim leczeniu partnera lub opiekunów, gdyż mogą oni zauważyć objawy, których obecności pacjent nie jest świadomy.
- 3) Jeśli u pacjenta rozwinie się PML, podawanie produktu TYSABRI trzeba przerwać na stałe.
- 4) W celu oszacowania ryzyka przed lub w trakcie leczenia produktem TYSABRI, badanie na obecność przeciwciał anti-JCV może dostarczyć wspierających informacji.
Przed rozpoczęciem leczenia produktem TYSABRI wymagane jest niedawne badanie MRI, jako obraz odniesienia, a następnie powtarzanie tego badania co roku w celu aktualizacji obrazu odniesienia. Należy regularnie monitorować pacjentów.

8.2. Rozpoznanie postaci rzutowej (nawracająco-ustępującej) stwardnienia rozsianego – oparte na kryteriach diagnostycznych McDonalda (Polman i wsp. 2005) i spełnianie kryteriów określonych w pkt. 8.3. i 8.7. albo pkt.8.4. i 8.7.

8.3. Pacjenci, u których stwierdza się brak skuteczności terapii interferonem beta po minimum 12-tu miesiącach terapii, definiowany jako spełnienie obu poniższych warunków:

1) liczba i ciężkość rzutów:

- a) 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych) lub
- b) 1 ciężki rzut po 6 miesiącach wymagający leczenia sterydami (wzrost w EDSS większy niż w definicji rzutu umiarkowanego)

2) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdym 12 miesiącach gdy stwierdza się jedno z poniższych:

- a) więcej niż jedna nowa zmiana GD(+)
- b) więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2 (w sumie nie mniej niż 9 zmian);

8.4. Szybko rozwijająca się, ciężka postać choroby rozpoznawana kiedy zostaną spełnione oba poniższe parametry :

a) liczba i ciężkość rzutów:

- co najmniej dwa rzuty wymagające leczenia sterydami powodujące niesprawność (w czasie rzutu wzrost EDSS o minimum 2 pkt)

b) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego

- więcej niż jedna nowa zmiana GD(+) lub
- więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2 (w sumie nie mniej niż 9 zmian)

8.5. Zapoznanie się przez pacjenta z ustną i pisemną informacją dotyczącą programu. Podpisanie formularza świadomej zgody przez pacjenta i lekarza prowadzącego. Jeden komplet dokumentów pozostaje w Ośrodku, drugi zostaje przekazany pacjentowi;

8.6. Przekazanie i potwierdzenie otrzymania karty pacjenta;

8.7. Brak stwierdzonej obecności przeciwciał anty-JCV.

5) Po 2 latach należy ponownie poinformować pacjenta o zagrożeniach związanych z leczeniem produktem TYSABRI. Pacjenci włączeni do programu muszą otrzymać kartę ostrzegawczą pacjenta i kopię formularza kontynuacji leczenia. Potwierdzenie otrzymania kopii formularza i karty ostrzegawczej pacjenta pozostaje w dokumentacji medycznej. W przypadku podejrzenia PML należy wstrzymać dalsze podawanie leku do czasu wykluczenia PML. Lekarz powinien ocenić pacjenta i określić, czy objawy wskazują na dysfunkcję neurologiczną. W potwierdzonych przypadkach lekarz powinien stwierdzić, czy objawy są typowe dla stwardnienia rozsianego, czy wskazują na możliwe rozpoznanie PML. W razie wątpliwości należy rozważyć dalszą diagnostykę, w tym badanie MRI, najlepiej z podaniem kontrastu (dla porównania z wynikiem MRI sprzed leczenia), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku DNA wirusa JC oraz powtórne badanie neurologiczne.

6) Po wykluczeniu przez lekarza PML (jeśli to konieczne, przez powtórzenie badań klinicznych, obrazowych i laboratoryjnych, gdy nadal istnieje podejrzenie kliniczne) można wznowić leczenie natalizumabem.

7. Monitorowanie programu:

- 1) Dane dotyczące monitorowania leczenia należy gromadzić w dokumentacji pacjenta i każdorazowo przedstawiać na żądanie kontrolerom NFZ;
- 2) Przekazywanie do NFZ wymaganych informacji sprawozdawczo- rozliczeniowych.

<p>9. Do programu kwalifikują się również pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie natalizumabem przed dniem 1 lipca 2013 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:</p> <p>9.1.Leczenie zostało włączone zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, i powyższe znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta;</p> <p>9.2.Nie podlegają kryteriom wyłączenia określonym w pkt 11.</p> <p>10. Przeciwwskazania do stosowania natalizumabu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Wiek poniżej 18 roku życia;2) Ciąża i karmienie piersią;3) Postać wtórnie postępująca i pierwotnie postępująca SM;4) Skojarzenie z interferonem beta, octanem glatirameru;5) Zwiększone ryzyko zakażeń oportunistycznych, w tym pacjenci z upośledzoną odpornością (obecnie leczeni lekami immunosupresyjnymi lub z upośledzoną odpornością z powodu wcześniej stosowanej terapii, np. mitoksantronem lub cyklofosfamidem). W przypadku braku zaburzeń odporności dopuszczalne jest leczenie po upłynięciu 6-ciu miesięcy od podania ostatniej dawki leku immunosupresyjnego;6) Przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego. <p>11. Kryteria wyłączenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rezygnacja pacjenta;2) Ciąża.3) Nieprzestrzeganie zasad leczenia- pominięcie dwóch kolejnych dawek;4) Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML);<ol style="list-style-type: none">a) w przypadku podejrzenia PML wstrzymanie podawania leku do czasu jego wykluczenia,b) w przypadku potwierdzenia PML trwale odstawienie leku.5) Brak stabilizacji lub postęp choroby pomimo leczenia (dwa rzuty wymagające sterydoterapii lub pogorszenie o 2 punkty w EDSS w ciągu roku);		
---	--	--

<p>6) Reakcje nadwrażliwości przy podaniu leku;</p> <p>7) Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych związane z leczeniem produktem leczniczym Tysabri (powyżej 3 górna granica normy);</p> <p>8) Nowotwory złośliwe;</p> <p>9) Inne zakażenia oportunistyczne;</p> <p>12. Określenie czasu leczenia w programie:</p> <p>Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po każdym pełnych 12 miesiącach terapii.</p> <p>U chorych odpowiadających na leczenie po ocenie skuteczności, terapię natalizumabem można przedłużać o kolejne 12 miesięcy.</p> <p>Z uwagi na podwyższone ryzyko PML, lekarz specjalista i pacjent powinni ponownie po 2 latach indywidualnie rozważyć korzyści i ryzyko leczenia produktem TYSABRI. Łączny czas leczenia pacjenta, lekami modyfikującymi przebieg choroby, zależy od decyzji lekarza, nie może jednak przekraczać 60 miesięcy.</p> <p>W przypadku wystąpienia, w początkowym okresie leczenia, objawów niepożądanych lub ze względu na bezpieczeństwo chorego, dopuszcza się w ramach programu, zamianę na lek o innym mechanizmie działania. Przesłanki do zmiany terapii, wymienione w poprzednim zdaniu, nie są tożsame z brakiem skuteczności wdrożonego leczenia.</p> <p>Za brak skuteczności leczenia natalizumabem, uzasadniający zmianę leczenia lub przerwanie leczenia, przyjmuje się wystąpienie jednej z poniższych sytuacji:</p> <p>1) Przejście w postać wtórnie postępującą,</p> <p>2) Wystąpienie 2 z 3 poniższych kryteriów:</p> <p>a) liczba i ciężkość rzutów:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 lub więcej rzutów umiarkowanych wymagających leczenia sterydami (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w zakresie czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych) lub- 1 ciężki rzut wymagający leczenia sterydami po 6 miesiącach leczenia (wzrost w EDSS większy niż w definicji rzutu umiarkowanego) <p>b) progresja choroby mimo leczenia, co oznacza utrzymujące się przez</p>		
--	--	--

co najmniej 3 miesiące pogorszenie się stanu neurologicznego o co najmniej:

- 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5,
- 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0;

c) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdym 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych:

- więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+),
- więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2.

13. Kryteria przedłużenia leczenia o kolejne 12 miesięcy:

Leczenie może zostać przedłużone o kolejne 12 miesięcy, jeżeli zostaną spełnione 2 z 3 niżej wymienionych kryteriów:

1) liczba i ciężkość rzutów:

- brak rzutów lub rzuty łagodne (wzrost EDSS w trakcie rzutu o 0.5 pkt lub o 1 pkt w zakresie jednego do trzech układów funkcjonalnych) lub
- 1 rzut umiarkowany (wzrost EDSS w trakcie rzutu o 1 do 2 pkt lub 2 pkt w zakresie jednego do dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych), lub

2) brak progresji choroby w okresie ostatniego roku leczenia: różnica w skali EDSS poniżej 1 pkt;

3) brak wyraźnych cech aktywności i progresji choroby w badaniu MRI z podaniem kontrastu (nie więcej niż jedna nowa zmiana Gd+ lub dwie nowe zmiany w sekwencji T2).

LECZENIE CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>Kwalifikacja do programu</p> <p>A. Kryteria kwalifikacji do leczenia ustekinumabem albo adalimumabem w ramach programu</p> <p>1. Do programu mogą być zakwalifikowani dorośli pacjenci (w wieku 18 lat i powyżej) spełniający łącznie następujące kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pacjenci z ciężką postacią łuszczycy plackowatej, którzy przestali reagować na leczenie lub mają przeciwwskazania lub nie tolerują innych metod leczenia ogólnego 2) pacjenci, u których uzyskano następującą ocenę nasilenia procesu łuszczycowego ze wskaźnikami: <ol style="list-style-type: none"> a) PASI większym niż 18 oraz b) DLQI większym niż 10 oraz c) BSA większym niż 10 3) pacjenci, u których w okresie poprzedzającym kwalifikację do programu nie uzyskano poprawy po leczeniu z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych metod klasycznej terapii ogólnej: <ol style="list-style-type: none"> a) Leczenie metotreksatem w dawce maksymalnej 15mg/tydzień, oceniane po trzech miesiącach b) Leczenie retinoidami w dawce równej lub większej niż 0,5mg/kg m.c./dobę, oceniane po dwóch miesiącach c) Leczenie cyklosporyną w dawce od 3 do 5 mg/kg m.c./dobę, oceniane po trzech miesiącach d) Leczenie metodą PUVA (psoralen+UVA), oceniane po trzech miesiącach 	<p>Dawkowanie</p> <p>Ustekinumab: dawka początkowa 45 mg podana podskórnie, następnie 45mg po 4 tygodniach, a potem 45 mg co 12 tygodni. U pacjentów z masą ciała powyżej 100 kg dawka początkowa wynosi 90 mg podawana podskórnie, następnie ta sama dawka po 4 tygodniach, a potem co 12 tygodni.</p> <p>Adalimumab: dawka początkowa adalimumabu u dorosłych pacjentów wynosi 80 mg podskórnie, a następnie po upływie jednego tygodnia od podania dawki początkowej stosuje się dawkę 40 mg podskórnie co drugi tydzień.</p>	<p>A. Badania przy kwalifikacji</p> <p>W ramach kwalifikacji pacjenta do udziału w programie konieczne jest wykonanie następujących badań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi z rozmazem, 2) badanie ogólne moczu, 3) odczyn Biernackiego OB, 4) aminotransferaza asparaginowa AspAT, 5) aminotransferaza alaninowa AlAT, 6) stężenie kreatyniny w surowicy, 7) próba tuberkulinowa lub Quantiferon test, 8) RTG klatki piersiowej z opisem (maksymalnie do 3 miesięcy przed kwalifikacją), 9) EKG z opisem, 10) obecność antygenu HBS, 11) przeciwciała anty-HCV, 12) przeciwciała anty-HIV, 13) przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi, 14) USG jamy brzusznej, 15) ASO, 16) przeciwciała ANA, 17) VDRL, 18) konsultacje lekarskie w kierunku ognisk siejących (laryngologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna), 19) wykluczenie ciąży 20) wykonanie zdjęć miejsc dotkniętych łuszczycą. 21) CRP

lub pacjenci, u których występują przeciwwskazania do stosowania wyżej wymienionych metod terapii ogólnej, przy czym przeciwwskazania do stosowania terapii ogólnej muszą być oparte na Charakterystyce Produktu Leczniczego lub aktualnej wiedzy medycznej

lub pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane po stosowaniu wyżej wymienionych metod terapii ogólnej uniemożliwiające ich kontynuowanie.

2. Do programu mogą być kwalifikowani również pacjenci uprzednio leczeni terapią biologiczną w ramach świadczenia za zgodą płatnika lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) lub w ramach farmakoterapii niestandardowej, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem leczenia biologicznego spełniali kryteria kwalifikacji do programu oraz nie spełnili kryteriów zakończenia udziału w programie. W szczególnych przypadkach braku spełnienia kryteriów kwalifikacji do programu przed rozpoczęciem leczenia biologicznego w ramach świadczenia za zgodą płatnika lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) lub w ramach farmakoterapii niestandardowej decyzję o kwalifikacji do programu podejmuje Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, pod warunkiem, że nie zostały spełnione kryteria zakończenia udziału w programie.

3. W przypadku kobiet w wieku rozrodczym wymagana jest zgoda na stosowanie skutecznej antykoncepcji w czasie leczenia oraz przez 15 tygodni od podania ostatniej dawki ustekinumabu albo przez co najmniej 5 miesięcy po podaniu ostatniej dawki adalimumabu.

4. Zgłoszenia pacjenta do programu dokonuje lekarz dermatolog prowadzący pacjenta, który posiada odpowiednią dokumentację dotychczasowego leczenia. Do dokumentacji dołącza się **zdjęcia-pliki*jgp zmian miejsc dotkniętych łuszczycą**, które następnie wczytuje się w aplikację komputerową wskazaną przez Prezesa

B. Monitorowanie leczenia:

1. W celu oceny skuteczności leczenia wykonuje się:

1) Ocenę wskaźnika nasilenia zmian łuszczykowych – PASI.

Ocenę PASI należy wykonać po 4 tygodniach (+/-7dni) od pierwszego podania a następnie co 12 tygodni (+/-7dni). Ocenę skuteczności leczenia w oparciu o wskaźnik PASI dokonuje się w 28 tygodniu od podania pierwszej dawki ustekinumabu albo w 16 i 28 tygodniu od podania pierwszej dawki adalimumabu, a następnie w 40 tygodniu (**do dokumentacji dołącza się zdjęcia-pliki*jgp. tak jak przy kwalifikacji do programu**).

2) Leczenie może być kontynuowane u pacjentów, u których w 28 i 40 tygodniu stwierdzono zmniejszenie wartości PASI o 75% w przypadku leczenia ustekinumabem albo w 16 i 28 tygodniu w przypadku leczenia adalimumabem..

3) Pacjent może być kwalifikowany do dalszego leczenia ustekinumabem również jeżeli w 28 i 40 tygodniu poprawa wskaźnika PASI mieści się w przedziale 50-75% i jednocześnie stwierdzono poprawę jakości życia ocenioną za pomocą skali DLQI (spadek wartości o minimum 5 punktów) a w przypadku leczenia adalimumabem w 16 i 28 tygodniu.

4) Ostateczną decyzję o kontynuacji leczenia podejmuje lekarz prowadzący po uzyskaniu akceptacji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej.

2. Kontrola pacjentów w trakcie leczenia ustekinumabem albo adalimumabem:

Nie rzadziej, niż w wyznaczonych terminach należy wykonać:

1) w 4 tygodniu od pierwszego podania wywiad lekarski dotyczący efektów leczenia i możliwych działań niepożądanych.

2) w 4 tygodniu od podania pierwszej dawki należy wykonać

<p>NFZ, o której mowa poniżej. Pacjent jest następnie kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej powoływany jest przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej) zostają przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Finansowanie zastosowania substancji czynnej wymienionej w opisie programu nastąpi dopiero po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej.</p> <p>5. Pacjenci stosujący ustekinumab albo adalimumab otrzymują Kartę ostrzegawczą dla pacjenta przyjmującego lek.</p> <p>B. Kryteria nie pozwalające na włączenie do programu ze względu na bezpieczeństwo</p> <p>Do programu nie kwalifikuje się pacjentów w następujących przypadkach::</p> <ol style="list-style-type: none">1. okresu ciąży i laktacji,2. nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocniczą leku;3. czynnych lub utajonych infekcji wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pierwotniakowych, zwłaszcza zakażenia HIV, HBV i HCV oraz <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (nie dotyczy infekcji <i>Propionibacterium</i>		<p>ocenę nasilenia procesu łuszczycowego w skali PASI, DLQI i BSA.</p> <p>3) w 4 tygodniu od podania pierwszej dawki należy ocenić:</p> <ol style="list-style-type: none">a) morfologię krwi z rozmazem,b) odczyn Biernackiego OB.,c) CRP,d) aminotransferazę alaninową AlAT,e) aminotransferazę asparaginową AspATf) stężenie kreatyniny w surowicy. <p>Kontrolę pacjentów należy następnie powtarzać co 12 tygodni.</p> <p>5) co najmniej raz na 365 dni należy wykonać EKG i RTG klatki piersiowej lub Quantiferon. W indywidualnych przypadkach należy rozważyć wykonanie innych koniecznych badań.</p>
---	--	--

acnes oraz nawrotowej opryszczki)

4. tocznia rumieniowatego układowego;
5. chorób demielinizacyjnych;
6. ciężkiej niewydolności układu krążenia (powyżej NYHA III i NYHA IV);
7. czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej, której leczenie zakończono w ostatnich 5 latach (z wyjątkiem raka podstawnokomórkowego skóry);
8. wystąpienia pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej.

C. Kryteria zakończenia udziału w programie :

1. brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie stwierdzone w przypadku nieuzyskania poprawy klinicznej to znaczy: zmniejszenia wartości PASI o 75%, nieuzyskania poprawy wskaźnika PASI w przedziale 50-75% wraz z jednoczesnym nieuzyskaniem poprawy jakości życia ocenionej za pomocą skali DLQI o minimum 5 punktów,

lub

2. utrata odpowiedzi na leczenie po uzyskaniu adekwatnej odpowiedzi na leczenie to znaczy PASI większy niż 18, BSA większy niż 10 i DLQI większy niż 10,

lub

3. wystąpienie działań niepożądanych takich jak:

- a) reakcja alergiczna na lek
- b) zakażenie o ciężkim przebiegu
- c) objawy niewydolności nerek, serca, płuc, wątroby
- d) pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna
- e) stwierdzenie choroby nowotworowej
- f) stwierdzenie wykładników wskazujących na rozwój ciężkiej choroby ogólnoustrojowej o podłożu autoimmunologicznym, jeżeli nie ustąpiły po przerwaniu terapii biologicznej bądź zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

<p>D. Określenie czasu leczenia w programie:</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w opisie przedmiotowego programu. Leczenie w ramach programu należy kontynuować do momentu osiągnięcia remisji, nie dłużej niż do 48 tygodni. W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych decyzją Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej u niektórych pacjentów można zastosować w ramach programu terapię trwającą powyżej 48 tygodni. Długość trwania takiej terapii określa Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej.</p> <p>U pacjentów, u których nie stwierdzono adekwatnej odpowiedzi na leczenie po 28 tygodniach od podania pierwszej dawki ustekinumabu albo po 16 i 28 tygodniach od podania adalimumabu, należy przerwać leczenie i udział pacjenta w programie.</p> <p>Decyzja o zakończeniu leczenia zostaje przekazana do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej za pośrednictwem aplikacji komputerowej stosowanej w przedmiotowym programie.</p> <p>E. Kryteria ponownego włączenia do programu pacjentów leczonych ustekinumabem albo adalimumabem</p> <p>Pacjent, u którego zaprzestano podawania ustekinumabu albo adalimumabu zastosowanego zgodnie z treścią programu, u którego osiągnięto niską aktywność choroby lub remisję może być ponownie włączony do programu po zakwalifikowaniu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, jeżeli podczas badania kontrolnego stwierdzono nawrót choroby (wzrost wartości wskaźników PASI, DLQI, oraz BSA o co najmniej 50% w stosunku do wartości obliczonej w momencie odstawienia leku). Wartość wskaźnika PASI w przypadku ponownego włączenia do programu musi być większa niż 10, a do dokumentacji dołącza się zdjęcia-pliki*jgp. tak jak przy kwalifikacji do programu. Do programu</p>		
---	--	--

<p>może być ponownie włączony również pacjent, u którego zaprzestano podawania ustekinumabu albo adalimumabu zastosowanego zgodnie z treścią programu, z powodu wystąpienia działań niepożądanych, które ustąpiły po odstawieniu leku, bądź zastosowanego leczenia, lub z powodu planowanej przerwy w leczeniu po dokonaniu ponownej kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego Łuszczycy Plackowatej.</p>		
---	--	--

LECZENIE CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO SKÓRY (ICD-10 C43)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKU W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznanie nieresekcyjnego lub uogólnionego czerniaka skóry;</p> <p>2) potwierdzenie mutacji <i>BRAF V600</i> w komórkach nowotworowych za pomocą zwalidowanego testu;</p> <p>3) zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według kryteriów aktualnej wersji RECIST;</p> <p>4) wiek ≥ 18 lat;</p> <p>5) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>6) brak objawowych przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego lub stan bezobjawowy po przebytych leczeniu chirurgicznym lub radioterapii przerzutów w mózgu;</p> <p>7) wielkość odstępu QTc w badaniu EKG ≤ 500 ms;</p> <p>8) wyniki badania morfologii oraz badań biochemicznych krwi umożliwiające leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba białych krwinek $\geq 2000/\mu\text{l}$; - liczba granulocytów obojętnochłonnych $\geq 1500/\mu\text{l}$; - liczba płytek $\geq 100 \times 10^3/\mu\text{l}$; - stężenie hemoglobiny ≥ 9 g/dl (możliwe przetoczenie krwi/produktów krwiopochodnych); - stężenie kreatyniny $\leq 1,5 \times$ GGN (górną granicą normy); - aktywność AST/ALT $\leq 2,5 \times$ GGN u pacjentów bez przerzutów do wątroby i $\leq 5 \times$ GGN u pacjentów z przerzutami do wątroby; 	<p>1. Zalecana dawka wemurafenibu wynosi 960 mg (cztery tabletki po 240 mg) dwa razy na dobę (równowartość dobowej dawki wynoszącej 1 920 mg). Pierwsza dawka powinna zostać przyjęta rano, a druga dawka po około 12 godzinach-wieczorem.</p> <p>2. Każdy cykl leczenia obejmuje 28 dni – 224 tabletki. W przypadku jednoczesnego stosowania substratów i leków wpływających na CYP1A2 lub CYP3A4 lub w przypadkach wystąpienia działań niepożądanych może być konieczna modyfikacja dawki.</p> <p>Postępowanie w przypadku objawowych reakcji niepożądanych na produkt lub wydłużenia odstępu QT może wymagać zmniejszenia dawki produktu, czasowego przerwania leczenia lub jego zakończenia. Nie zaleca się zmieniać dawkowania na dawkę mniejszą niż 480 mg dwa razy na dobę.</p> <p>Kryteria i sposób modyfikacji dawkowania są określone w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p>	<p>1. Badania przed włączeniem leczenia</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie czerniaka zgodnie z kryteriami włączenia;</p> <p>2) ocena obecności mutacji <i>BRAF V600</i>;</p> <p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) oznaczenia stężenia kreatyniny;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;</p> <p>9) oznaczenie poziomu elektrolitów (w tym magnezu);</p> <p>10) elektrokardiogram (EKG);</p> <p>11) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>12) badanie tomografii komputerowej głowy;</p> <p>13) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej;</p> <p>14) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy;</p> <p>15) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia – USG, z ewentualną dokumentacją fotograficzną zmian nowotworowych na skórze, rezonans magnetyczny – MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej;</p> <p>16) ocena przedmiotowa całej skóry,</p>

- stężenie bilirubiny $\leq 1,5 \times$ GGN (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta, u których stężenie bilirubiny całkowitej musi być niższe niż 3,0 mg/dl);

9) brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego;

10) brak schorzeń towarzyszących lub zaburzeń uniemożliwiających leczenie;

11) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie, wykluczenie współistniejącego innego nowotworu złośliwego z wyjątkiem nowotworów złośliwych skóry;

12) wykluczenie ciąży lub karmienia piersią u pacjentek.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu zgodnie z kryteriami wyłączenia.

3. Kryteria wyłączenia z programu:

1) progresja choroby;

2) pogorszenie stanu pacjenta w związku z nowotworem bez progresji potwierdzonej w badaniu przedmiotowym lub obrazowym;

3) toksyczność leczenia z wystąpieniem przynajmniej jednego niepożądanego działania będącego zagrożeniem życia według kryteriów CTC (Common Toxicity Criteria);

4) utrzymująca się/ nawracająca nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według kryteriów CTC (Common Toxicity Criteria) z wyjątkiem wtórnych nowotworów skóry;

5) nadwrażliwość na lek lub na substancję pomocniczą;

6) obniżenie sprawności do stopnia 2-4 według kryteriów WHO

17) badanie głowy i szyi obejmujące przynajmniej wzrokową ocenę błon śluzowych jamy ustnej oraz palpacyjną ocenę węzłów chłonnych,

18) badania obrazowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według aktualnych kryteriów RECIST (nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej dawki leku).

2. Monitorowanie leczenia

1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy co 6-10 tygodni;

2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia – USG, dokumentacja fotograficzna zmian na skórze, rezonans magnetyczny – MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej;

3) ocena skóry w kierunku występowania raków płaskonabłonkowych według opisu w Charakterystyce Produktu Leczniczego wykonywana przez specjalistę onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej (w przypadkach wątpliwych – konsultacja dermatologiczna);

4) elektrokardiogram (EKG) oraz oznaczenie poziomu elektrolitów (w tym magnezu) według aktualnej;

Charakterystyki Produktu Leczniczego, co 6-10 tygodni;

5) badania morfologii i biochemii krwi co 6-10 tygodni;

6) badania obrazowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według aktualnych kryteriów RECIST (co dwa 28-dniowe cykle leczenia, tj. co 56 dni - ważność badania 14 dni, czyli przedział czasowy co 6-10 tygodni).

<p>lub ECOG; 7) pogorszenie jakości życia o istotnym znaczeniu według oceny lekarza lub pacjenta; 8) rezygnacja pacjenta – wycofanie zgody na udział w programie.</p>		
---	--	--

LECZENIE DOUSTNE STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE (ICD-10 E.83.1)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kwalifikacja świadczeniobiorców do terapii Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Kryteria włączenia</p> <p>1) przewlekłe obciążenie żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi (≥ 7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 6 do 18 r.ż.;</p> <p>2) przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane częstymi transfuzjami krwi (≥ 7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych), gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 2 do 5 r.ż.</p> <p>3) przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane nieczęstymi transfuzjami krwi (< 7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych), gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 6 do 18 r.ż.</p> <p>4) przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane transfuzjami krwi, gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów w wieku pomiędzy 2 i 18 r.ż. ze schorzeniami wg klasyfikacji ICD-10: a) D46 - zespoły mielodysplastyczne (MDS); b) D55 - niedokrwistości hemolityczne;</p>	<p>1. Leczenie początkowe Leczenie deferazyroksem powinno być rozpoczynane po przetoczeniu około 20 jednostek (około 100 ml/kg m.c.) koncentratu krwinek czerwonych, lub gdy istnieją dane potwierdzające występowanie przewlekłego obciążenia żelazem (np. stężenie ferrytyny w surowicy $> 1\ 000\ \mu\text{g/l}$).</p> <p>1.1 Dawkowanie deferazyroksu</p> <p>1) podaje się 20 mg/kg m.c. na dobę z wyjątkiem: a) pacjentów wymagających obniżenia stężenia żelaza w organizmie i otrzymujących jednocześnie ponad 14 ml koncentratu krwinek czerwonych/kg m.c. na miesiąc, u których można rozważyć podanie dawki początkowej 30 mg/kg m.c. na dobę, b) pacjentów niewymagających zmniejszenia stężenia żelaza w organizmie i otrzymujących jednocześnie mniej niż 7 ml koncentratu krwinek czerwonych/kg m.c. na miesiąc, u których możliwe jest obniżenie dawki początkowej deferazyroksu do 10 mg/kg m.c. na dobę.</p> <p>W każdym przypadku należy monitorować efekt leczenia i w przypadku braku jego skuteczności rozważyć zwiększenie dawki leku.</p> <p>2) U pacjentów leczonych dotychczas skutecznie deferoksaminą można rozważyć podanie deferazyroksu w dawce początkowej odpowiadającej połowie dotychczasowej dawki deferoksaminy. Jeżeli obliczona w ten sposób dobową dawką deferazyroksu będzie mniejsza niż 20 mg/kg m.c., należy bardzo uważnie monitorować efekt</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji pacjenta do programu</p> <p>1) badanie podmiotowe i przedmiotowe: a) masa ciała, b) wysokość, c) powierzchnia ciała;</p> <p>2) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>3) parametry biochemiczne krwi: a) elektrolity, b) aktywność aminotransferaz, c) fosfatazy alkalicznej, d) dehydrogenazy mleczanowej, e) stężenie bilirubiny, f) poziom mocznika;</p> <p>4) dwukrotne oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi;</p> <p>5) klirens kreatyniny;</p> <p>6) stężenie ferrytyny, całkowita zdolność wiązania żelaza, stężenie żelaza, transferyny;</p> <p>7) badanie ogólne moczu;</p> <p>8) EKG;</p> <p>9) stężenie hormonów: a) TSH, b) fT4;</p> <p>10) objętość wątroby i śledziony mierzona w USG lub TK;</p> <p>11) badanie okulistyczne (w tym badanie dna oka);</p> <p>12) badanie kardiologiczne obejmujące echokardiografię;</p> <p>13) badanie endokrynologiczne;</p> <p>14) badanie słuchu.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia Należy w sposób ciągły monitorować ilości przetaczanego</p>

<p>c) D57 - niedokrwistość sierpowatokrwinkowa; d) D61 - niedokrwistości aplastyczne, w tym: - zespół Diamonda- Blackfana; - anemia Fanconiego; e) D64 - inne bardzo rzadkie niedokrwistości wrodzone lub nabyte; f) Z94.8 - transplantacja innego narządu lub tkanki.</p> <p>5) pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed 18 r.ż. w ramach programu lekowego, po ukończeniu 18 r.ż. kontynuują leczenie pod warunkiem nie spełniania kryteriów wykluczenia</p> <p>3. Kryteria wykluczenia</p> <p>1) nadwrażliwość na substancję czynną (deferazyroks) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 2) jednoczesne podawanie innych środków chelatujących żelazo, ponieważ bezpieczeństwo takiego leczenia skojarzonego nie zostało ustalone; 3) pacjenci z klirens kreatyniny < 60 ml/min; 4) pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (aktywność aminotransferaz wątrobowych przekraczająca 5 razy górną granicę normy); 5) pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy/galaktozy lub ciężkim niedoborem laktazy; 6) jednoczesne stosowanie z produktami zaobojętniającymi zawierającymi glin.</p>	<p>terapii i w przypadku jej niewystarczającej skuteczności zwiększyć dawkę deferazyroksu.</p> <p>2. Leczenie podtrzymujące</p> <p>1) Dostosowywanie dawki deferazyroksu należy przeprowadzać stopniowo, zmieniając ją jednorazowo o 5 do 10 mg/kg m.c., w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta i celów terapeutycznych (utrzymanie lub zmniejszenie obciążenia żelazem). W tym celu zaleca się comiesięczną kontrolę stężenia ferrytyny w surowicy, a w razie konieczności dostosowanie dawki deferazyroksu co 3 do 6 miesięcy w zależności od tendencji w stężeniu ferrytyny w surowicy.</p> <p>2) Nie zaleca się podawania dawek deferazyroksu powyżej 30 mg/kg m.c., ponieważ istnieje ograniczone doświadczenie z zastosowaniem dawek tej wysokości.</p> <p>3) Jeżeli stężenie ferrytyny w surowicy zmniejszy się do wartości utrzymujących się poniżej 500 µg/l, należy rozważyć przerwanie leczenia.</p> <p>4) Dawkę deferazyroksu można zmniejszyć o 10 mg/kg m.c., jeśli klirens kreatyniny zmniejszy się poniżej dolnej granicy normy (< 90 ml/min.) lub stężenie kreatyniny w surowicy podczas dwóch kolejnych wizyt zwiększy się do wartości powyżej górnej granicy normy odpowiedniej dla wieku pacjenta.</p> <p>5) Należy przerwać leczenie, jeśli po zmniejszeniu dawki wystąpi zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy > 33% powyżej wartości oznaczonych przed leczeniem lub klirens kreatyniny zmniejszy się poniżej dolnej granicy normy. Leczenie można wznowić w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej.</p> <p>6) Można rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia w przypadku nieprawidłowych wartości wskaźników czynności kanalików nerkowych lub w razie wystąpienia wskazań klinicznych. Jeśli pomimo zmniejszenia dawki i przerwy w podawaniu leku stężenie kreatyniny w surowicy pozostaje >33% powyżej wartości oznaczonej przed leczeniem i utrzymują się nieprawidłowe wartości innych wskaźników czynności nerek (np. proteinuria, zespół Fanconiego), pacjenta należy skierować do specjalisty nefrologa i można rozważyć dalsze badanie specjalistyczne (takie jak biopsja nerki).</p>	<p>koncentratu krwinek czerwonych.</p> <p>2.1 Badania wykonywane w trakcie leczenia</p> <p>1) badanie podmiotowe i przedmiotowe: a) masa ciała – co 1 miesiąc, b) wysokość – co 3 miesiące, 2) morfologia krwi z rozmazem – co 1 miesiąc; 3) parametry biochemiczne krwi: a) elektrolity, b) aktywność aminotransferaz, c) fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej, d) gammaglutamylotranspeptydazy, e) stężenie bilirubiny, f) mocznika, – co 2 tygodnie w trakcie pierwszego miesiąca leczenia, następnie co 1 miesiąc; 4) stężenie ferrytyny – co 1 miesiąc; 5) stężenie kreatyniny w surowicy – co 1 tydzień w trakcie pierwszego miesiąca leczenia lub po modyfikacji leczenia deferazyroksem, następnie co 1 miesiąc; 6) klirens kreatyniny (szacowany za pomocą wzoru Schwartz'a u dzieci) lub stężenie cystatyny C w surowicy – co 1 tydzień w trakcie pierwszego miesiąca leczenia lub po modyfikacji leczenia deferazyroksem, następnie co 1 miesiąc; 7) badanie ogólne moczu – co 1 miesiąc; 8) kontrola dodatkowych wskaźników czynności kanalików nerkowych – w razie potrzeby; 9) EKG – co 3 miesiące; 10) stężenie hormonów: a) TSH, b) fT4, – co 6 miesięcy; 11) objętość wątroby i śledziony mierzona w USG lub TK – co 1 rok; 12) badanie okulistyczne (w tym badanie dna oka) – co 1 rok; 13) badanie słuchu – co 1 rok; 14) badanie kardiologiczne obejmujące echokardiografię – co 1 rok; 15) badanie endokrynologiczne – co 1 rok; 16) kontrola masy ciała, wzrostu i rozwoju seksualnego</p>
--	---	--

- 7) Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia stałego, progresywnego zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy, którego nie można przypisać innym czynnikom. Po ustaleniu przyczyny nieprawidłowych wartości prób czynnościowych wątroby, lub po uzyskaniu prawidłowych wartości aktywności aminotransferaz, można rozważyć ostrożne wznowienie leczenia mniejszą dawką, ze stopniowym zwiększaniem dawki.
- 8) Jeśli stężenie ferrytyny w surowicy ulegnie stałemu zmniejszaniu poniżej 500 µg/l, należy rozważyć przerwanie leczenia.

3. Sposób podawania

Do podania doustnego.

Deferazyroks musi być przyjmowany raz na dobę na czczo, co najmniej 30 minut przed posiłkiem, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

Tabletki rozpuszczają się w wyniku rozmieszania w szklance wody, soku pomarańczowego lub jabłkowego (100 do 200 ml), aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Po zażyciu zawiesiny wszelkie resztki leku należy ponownie rozpuścić w niewielkiej ilości wody lub soku i wypić. Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości.

pacjentów – co 1 rok.

LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA (ICD-10 C 56, C57, C48)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab.</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. histologiczne rozpoznanie raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej; 2. stopień zaawansowania FIGO IV lub III z chorobą resztkową po zabiegu cytoredukcji > 1cm (suboptymalna cytoredukcja) 3. niestosowanie wcześniejszego leczenia systemowego raka jajnika. Wcześniejsza chemioterapia neoadjuwantowa jest dopuszczalna 4. stan sprawności ogólnej w stopniach 0-1 według klasyfikacji Zubroda-WHO; 5. wiek powyżej 18 roku życia; 6. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: <ol style="list-style-type: none"> a. liczba płytek krwi większa lub równa $1,5 \times 10^5/\text{mm}^3$, b. bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa $1500/\text{mm}^3$, c. stężenie hemoglobiny większe lub równe 12 g/dl,; 7. wskaźniki koagulacyjne <ol style="list-style-type: none"> a. czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) w zakresie wartości prawidłowych, b. czas protrombinowy (PT) lub międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) w zakresie wartości prawidłowych c. wartość stężenia produktu degradacji fibryny (D-dimer) poniżej 500 $\mu\text{g/l}$; 8. wskaźniki czynności wątroby i nerek: <ol style="list-style-type: none"> a. stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych 	<p>1. Karboplatyna z paklitakselem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) karboplatyna (AUC 5-6) – dzień 1; 2) paklitaksel 175 mg/m² – dzień 1; <p>Rytm: co trzy tygodnie. 6 cykli.</p> <p>2. Bewacyzumab -7,5 mg/kg masy ciała dożylnie we wlewie trwającym 30-90 minut - dzień 1</p> <p>Rytm: co 3 tygodnie. 18 cykli</p> <p>a) Chore będą otrzymywać bewacyzumab w skojarzeniu z 3-tygodniowymi cyklami chemioterapii (maksymalnie 6 cykli).</p> <p>b) Po zakończeniu chemioterapii leczenie będzie kontynuowane w 3-tygodniowych cyklach do wyczerpania 18 cykli leczenia bewacyzumabem lub do czasu wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowanych działań niepożądanych (w zależności od tego, co wystąpi pierwsze).</p> <p>c) W przypadku konieczności zakończenia chemioterapii lub jednego z jej składników przed ukończeniem 6 cykli leczenia bewacyzumab można kontynuować według zasad opisanych w punkcie b.</p> <p>d) Bewacyzumab będzie podawany od pierwszego cyklu chemioterapii lub od drugiego cyklu w przypadku kiedy chemioterapia zostanie rozpoczęta przed upływem 28 dni od poważnego zabiegu operacyjnego.</p> <p>e) W przypadku konieczności przerwania leczenia karboplatyną lek ten można zastąpić cisplatyną i kontynuować leczenie.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia bewacyzumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne potwierdzenie raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenie stężenia: <ol style="list-style-type: none"> a. mocznika, b. kreatyniny, c. bilirubiny w surowicy; d. D-dimerów 4) oznaczenie aktywności transaminaz (AspAT, AlAT), 5) oznaczenie czasu kaolinowokefalinowego (APTT); 6) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego (PT); 7) oznaczenie stężenia CA125; 8) badanie ogólne moczu; 9) próba ciążowa – u kobiet w okresie prokreacyjnym; 10) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań klinicznych; 11) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu w przypadku wskazań klinicznych w celu obrazowania przerzutów do OUN; 12) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy; 13) EKG; 14) pomiar ciśnienia tętniczego;

<p>z zespołem Gilberta),</p> <p>b. aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>c. stężenie kreatyniny w granicach normy,</p> <p>9. wykluczenie ciąży;</p> <p>10. brak przeciwwskazań do chemioterapii karboplatiną oraz paklitakselem.</p> <p>11. nieobecność przeciwwskazań do zastosowania bewacyzumabu, którymi są:</p> <p>a. zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,</p> <p>b. czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,</p> <p>c. niestabilne nadciśnienie tętnicze,</p> <p>d. niestabilna choroba niedokrwienna serca,</p> <p>e. naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,</p> <p>f. wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,</p> <p>g. stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,</p> <p>h. stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych (z wyłączeniem stosowania w dawkach profilaktycznych)</p> <p>i. niegojące się rany,</p> <p>j. białkomocz,</p> <p>k. nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) objawy nadwrażliwości na bewacyzumab; 2) podanie 18 cykli leczenia bewacyzumabem; 3) progresja choroby w trakcie leczenia; 4) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub 	<p>f) W przypadku konieczności wtórnego zabiegu operacyjnego, zabieg można wykonać nie wcześniej niż 28 dni od podania bewacyzumabu a wznowienie leczenia bewacyzumabem nie może rozpocząć się wcześniej niż 28 dni po zabiegu operacyjnym.</p> <p>f) Modyfikacje dawkowania oraz rytmu podawania leków zgodnie z zapisami odpowiednich Charakterystyk Produktów Leczniczych.</p>	<p>15) inne badania w razie wskazań klinicznych.</p> <p>Pooperacyjne (przed rozpoczęciem leczenia bewacyzumabem) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej i mednicy należy wykonać nie wcześniej niż 4 tygodnie po operacji, ale nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu chemioterapii.</p> <p>Celem wstępnych badań obrazowych jest umożliwienie późniejszego monitorowania progresji choroby.</p> <p>2. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia bewacyzumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) oznaczenie stężenia: <ol style="list-style-type: none"> a) kreatyniny, b) bilirubiny – w surowicy; c) D-dimerów oraz APTT i PT lub INR; 3) oznaczenie aktywności transaminaz (AspAT, AlAT), 4) badanie ogólne moczu; 5) pomiar ciśnienia tętniczego; 6) inne badanie w razie wskazań klinicznych. <p>Badania wykonuje się co 3 tygodnie lub przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii jeżeli podanie leku było opóźnione.</p> <p>3. Monitorowanie skuteczności leczenia bewacyzumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) badanie tomografii komputerowej odpowiednich obszarów ciała w zależności od wskazań klinicznych; 2) oznaczenie stężenia CA125; 3) inne badania w razie wskazań klinicznych. <p>Badania tomografii komputerowej wykonuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) po zakończeniu chemioterapii; 2) W trakcie leczenia bewacyzumabem: nie rzadziej niż co 24 tygodnie;
---	---	---

<p>większym od 3 według klasyfikacji WHO; 5) utrzymujące się pogorszenie sprawności ogólnej.</p>		<p>3) w chwili wyłączenia z programu, o ile nastąpiło z innych przyczyn niż udokumentowana progresja choroby; 4) zawsze przy wzroście stężenia CA125 powyżej dwukrotnej wartości nadiru; 5) zawsze w przypadku wskazań klinicznych.</p> <p>Badanie stężenia CA125 wykonuje się nie rzadziej niż co 3 cykle leczenia:</p> <p>Oceny skuteczności leczenia dokonuje się zgodnie z kryteriami RECIST.</p> <p>4. Monitorowanie realizacji programu: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów leczonych w ramach programu terapeutycznego dostępny za pomocą aplikacji internetowej.</p>
--	--	--

LECZENIE BENDAMUSTYNĄ CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH O POWOLNYM PRZEBIEGU OPORNÝCH NA RYTUKSYMAB (ICD-10 C 82, C 83, C 85, C 88.0)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bendamustyną</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Potwierdzony histopatologicznie chłoniak nieziarniczy o powolnym przebiegu; 2) Udokumentowany brak odpowiedzi lub progresja choroby w trakcie lub w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem lub schematami zawierającymi rytuksymab; 3) Wiek co najmniej 18 lat; 4) Stan sprawności wg WHO 0-2; 5) ANC (całkowita liczba neutrofilów) $\geq 1\ 000/\mu\text{l}$; 6) Liczba trombocytów $\geq 75\ 000/\mu\text{l}$; 7) Klirens kreatyniny $> 10\ \text{mL}/\text{min}$; 8) Prawidłowe funkcjonowanie wątroby (poniżej 2,5 raza przekroczona górna granica normy dla aminotransferazy asparaginowej i alaninowej oraz poniżej 1,5 raza dla całkowitej bilirubiny). <p>Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie bendamustyną należy kontynuować do 6 cykli. W przypadku pacjentów, którzy osiągnęli częściową remisję po 6 cyklach dopuszcza się przedłużenie terapii do 8 cykli.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>Decyzję o wyłączeniu pacjenta z programu lekowego podejmuje lekarz prowadzący po zaistnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wystąpienie nadwrażliwości na bendamustynę 	<p>1. Dawkowanie</p> <p>Bendamustynę należy podawać we wlewie dożylnym, trwającym 30 – 60 min. w dawce maksymalnej $120\text{mg}/\text{m}^2$ powierzchni ciała w dniu 1. i 2. cyklu trwającego 21 dni.</p> <p>Jeśli pacjent wymaga zmiany dawkowania, nową obliczoną indywidualnie, zredukowaną dawkę należy zastosować zarówno w 1. jak i 2. dniu modyfikowanego cyklu leczenia.</p> <p>Jeżeli w dniu planowanego rozpoczęcia następnego cyklu leczenia utrzymuje się leukopenia lub małopłytkowość, podanie kolejnego cyklu leczenia należy odroczyć do czasu wystąpienia odnowy hematologicznej, jednak nie dłużej niż 14 dni.</p>	<p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Morfologia krwi z rozmazem, klirens kreatyniny, poziom kreatyniny, aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AIAT), stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH), stężenie wapnia i fosforu, poziom bilirubiny, poziom fosfatazy zasadowej; 2) Fluorocytometria przepływowa w celu oceny immunofenotypu klonu komórek chłoniakowych we krwi lub szpiku, w oparciu o wyznaczenie ich przeciwciałami monoklonalnymi; 3) Badania obrazowe (TK lub MR) w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego choroby właściwe dla danego przypadku; 4) Należy ocenić stan sprawności pacjenta według WHO. <p>Inne badania laboratoryjne stosownie do wskazań lekarskich w zależności od lokalizacji chłoniaka i stopnia jego zaawansowania.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1. Badania laboratoryjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem, b) oznaczenie stężenia kreatyniny, c) oznaczenie stężenia bilirubiny, d) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej, e) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginowej,

<p>lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Toksyczność niehematologiczna wg WHO powyżej 3; 3) Stan sprawności wg WHO 3-4; 4) Chłoniak centralnego układu nerwowego lub chłoniak opon mózgowo – rdzeniowych; 5) Ciężka niewydolność wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy >3,0mg/dl); 6) Ciężkie upośledzenie czynności szpiku potwierdzone badaniem laboratoryjnym (morfologia krwi) przeprowadzonym przed planowanym rozpoczęciem następnego cyklu leczenia obejmujące zmiany w morfologii krwi: <ol style="list-style-type: none"> a) bezwzględna liczba neutrofilii poniżej 1 000/μl lub b) zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 75 000/μl - utrzymujące się dłużej niż 14 dni od dnia tego badania; 7) Czynne ciężkie zakażenia, zwłaszcza przebiegające z leukocytopenią; 8) Poważny zabieg chirurgiczny wykonany w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem leczenia; 9) Cięża lub laktacja; 10) Brak częściowej remisji po 3 cyklach leczenia; 11) Progresja choroby w trakcie leczenia bendamustyną. 		<ol style="list-style-type: none"> f) oznaczenie aktywności LDH, g) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej. <p>Powyższe badania powinny być przeprowadzone przed każdym podaniem leku. Ponadto zalecane jest kontrolowanie morfologii krwi w trakcie przerw między kolejnymi wlewami.</p> <p>2.2. Badania obrazowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) badanie TK lub MR odpowiedniego obszaru; b) inne badania obrazowe w razie wskazań klinicznych. <p>Badania obrazowe wykonuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) po 3 cyklach leczenia; 2) po zakończeniu leczenia; 3) w przypadku wskazań medycznych. <p>Wykonane badania obrazowe muszą umożliwić obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>Ocena odpowiedzi na leczenie powinna być przeprowadzona zgodnie z kryteriami zaproponowanymi przez <i>International Workshop to Standardize Response Criteria for Non-Hodgkin Lymphomas</i>.</p> <p>3. Monitorowanie programu</p> <ol style="list-style-type: none"> a) przekazywanie do NFZ zakresu informacji sprawozdawczo – rozliczeniowych, b) uzupełnianie danych zawartych w rejestrze SMPT, dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez oddziały wojewódzkie NFZ, nie rzadziej niż co 3 miesiące oraz na zakończenie leczenia. <p>Dane dotyczące monitorowania leczenia należy gromadzić w dokumentacji pacjenta i każdorazowo przedstawiać na żądanie kontrolerom NFZ.</p>
--	--	--

C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Wysokość limitu finansowania	Oznaczenie załącznika zawierającego zakres wskazań objętych refundacją (wg ICD-10)	Poziom odpłatność	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acidum levofolinicum	Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml	1 fiolek a 4 ml	5909990648818	2012-07-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	56,16	59,53	59,53	C.0.01.	bezpłatne	0 zł
2	Acidum levofolinicum	Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml	1 fiolek a 9 ml	5909990648825	2012-07-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	126,36	133,94	133,94	C.0.01.	bezpłatne	0 zł
3	Aprepitant	Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg	3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	5909990007387	2013-05-01	2 lata	1114.0, Aprepitant	199,80	211,79	211,79	C.0.12.	bezpłatne	0 zł
4	Arsenicum trioxidum	Trisenox, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 1 mg/ml	10 amp. Po 10ml	5909990016433	2013-03-01	2 lata	1109.0, Trójtlenek arsenu	13 608,00	14 424,48	14 424,48	C.65.	bezpłatne	0 zł
5	Asparaginasum	Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m.	5 fiolek.s.subs.	5909990945528	2012-01-01	2 lata	1001.0, Asparaginasum	1 933,20	2 049,19	2 049,19	C.1.	bezpłatne	0 zł
6	Asparaginasum	Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.	5 fiolek.s.subs.	5909990945429	2012-01-01	2 lata	1001.0, Asparaginasum	1 393,20	1 476,79	1 476,79	C.1.	bezpłatne	0 zł
7	Bendamustinum hydrochloridum	Levact, proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml	5 fiolek a 25 mg	5909990802210	2013-07-01	2 lata	1115.0, Bendamustyna	1 620,00	1 717,20	1 717,20	C.67.	bezpłatne	0 zł
8	Bendamustinum hydrochloridum	Levact, proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml	5 fiolek a 100 mg	5909990802234	2013-07-01	2 lata	1115.0, Bendamustyna	6 480,00	6 868,80	6 868,80	C.67.	bezpłatne	0 zł
9	Bicalutamidum	BICALUTAMIDE KABI, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990870950	2012-01-01	2 lata	1002.0, Bicalutamidum	16,20	17,17	17,17	C.2.	bezpłatne	0 zł
10	Bicalutamidum	BINABIC, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990696963	2012-11-01	2 lata	1002.0, Bicalutamidum	75,60	80,14	80,14	C.2.	bezpłatne	0 zł
11	Bicalutamidum	Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990052981	2012-01-01	2 lata	1002.0, Bicalutamidum	98,28	104,18	104,18	C.2.	bezpłatne	0 zł
12	Bicalutamidum	Bicalutamide Teva, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990057436	2012-01-01	2 lata	1002.0, Bicalutamidum	67,44	71,49	71,49	C.2.	bezpłatne	0 zł
13	Bicalutamidum	Bicastad, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990651368	2012-01-01	2 lata	1002.0, Bicalutamidum	27,22	28,85	28,85	C.2.	bezpłatne	0 zł
14	Bleomycini sulphas	Bleomedac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolek	1 fiolek a 10 ml	5909990946983	2012-07-01	2 lata	1003.0, Bleomycynum	97,20	103,03	103,03	C.3.	bezpłatne	0 zł
15	Busulfanum	Myleran, tabl. powł., 2 mg	100 tabl. powł.	5909990277926	2012-07-01	2 lata	1101.0, Busulfanum	1 105,92	1 172,28	1 172,28	C.4.	bezpłatne	0 zł
16	Calcii folinas	Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml	1 fiolek a 10 ml	5909990885077	2012-07-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	27,86	29,53	19,23	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
17	Calcii folinas	Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml	5 fiolek a 10 ml	5909990885084	2012-07-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	139,32	147,68	96,16	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
18	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml	1 fiolek a 35 ml	5909990042043	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	48,82	51,75	51,75	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
19	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml	1 fiolek a 60 ml	5909990042050	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	72,04	76,36	76,36	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
20	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg	5 amp a 10ml	5909990356522	2013-03-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	81,54	86,43	86,43	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
21	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 fiolek a 20ml	5909990356546	2013-03-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	32,61	34,57	34,57	C.0.02.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg	20 kaps.	5909990356713	2012-11-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	21,60	22,90	22,90	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
23	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 0,01 g/ml	1 fiol.a 100 ml	5909990750412	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	101,60	107,70	107,70	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
24	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	10 fiol.	5909990123421	2012-07-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	69,12	73,27	19,23	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
25	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 25 mg	10 fiol.	5909990123520	2012-07-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	77,76	82,43	48,08	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
26	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol.a 10 ml	5909991117511	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	21,06	22,32	19,23	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
27	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol.a 20 ml	5909991117528	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	36,72	38,92	38,46	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
28	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol. po 50 ml	5909991117566	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	90,72	96,16	96,16	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
29	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol.a 100 ml	5909991117597	2012-01-01	2 lata	1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego	163,08	172,86	172,86	C.0.02.	bezpłatne	0 zł
30	Capecitabinum	Xeloda, tabl. powl., 150 mg	60 tabl.	5909990893416	2012-07-01	2 lata	1006.0, Capecitabinum	267,79	283,86	283,86	C.5.	bezpłatne	0 zł
31	Capecitabinum	Xeloda, tabl. powl., 500 mg	120 tabl.	5909990893515	2012-07-01	2 lata	1006.0, Capecitabinum	1 776,33	1 882,91	1 882,91	C.5.	bezpłatne	0 zł
32	Carboplatinum	Carbomedac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. po 5 ml	5909990816156	2013-05-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	18,90	20,03	16,60	C.6.	bezpłatne	0 zł
33	Carboplatinum	Carbomedac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. po 15 ml	5909990816163	2013-05-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	41,90	44,41	44,41	C.6.	bezpłatne	0 zł
34	Carboplatinum	Carbomedac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. po 45 ml	5909990816170	2013-05-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	102,06	108,18	108,18	C.6.	bezpłatne	0 zł
35	Carboplatinum	Carbomedac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. po 60 ml	5909990816187	2013-05-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	193,32	204,92	199,24	C.6.	bezpłatne	0 zł
36	Carboplatinum	Carbomedac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. po 100 ml	5909990816194	2013-05-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	270,00	286,20	286,20	C.6.	bezpłatne	0 zł
37	Carboplatinum	Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol.a 5 ml	5909990450015	2012-07-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	22,68	24,04	16,60	C.6.	bezpłatne	0 zł
38	Carboplatinum	Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 150 mg	1 fiol.a 15 ml	5909990450022	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	58,32	61,82	49,81	C.6.	bezpłatne	0 zł
39	Carboplatinum	Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 450 mg	1 fiol.a 45 ml	5909990450039	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	168,48	178,59	149,43	C.6.	bezpłatne	0 zł
40	Carboplatinum	Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 600 mg	1 fiol.a 60 ml	5909990662753	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	194,40	206,06	199,24	C.6.	bezpłatne	0 zł
41	Carboplatinum	Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg	1 fiol.a 100 ml	5909990662760	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	270,00	286,20	286,20	C.6.	bezpłatne	0 zł
42	Carboplatinum	Carboplatin Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. a 15 ml	5909990776733	2013-03-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	46,99	49,81	49,81	C.6.	bezpłatne	0 zł
43	Carboplatinum	Carboplatin Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. a 45 ml	5909990776740	2013-03-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	123,90	131,33	131,33	C.6.	bezpłatne	0 zł
44	Carboplatinum	Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol.a 45 ml	5909990787371	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	172,80	183,17	149,43	C.6.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Carboplatinum	Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol.a 5 ml	5909990787388	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	19,44	20,61	16,60	C.6.	bezpłatne	0 zł
46	Carboplatinum	Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol.a 15 ml	5909990787395	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	43,20	45,79	45,79	C.6.	bezpłatne	0 zł
47	Carboplatinum	Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol.a 60 ml	5909990787401	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	216,00	228,96	199,24	C.6.	bezpłatne	0 zł
48	Carboplatinum	Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol.a 5 ml	5909990477418	2012-07-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	24,84	26,33	16,60	C.6.	bezpłatne	0 zł
49	Carboplatinum	Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol.a 15 ml	5909990477425	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	41,91	44,42	44,42	C.6.	bezpłatne	0 zł
50	Carboplatinum	Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml	1 fiol. po 45 ml	5909990477432	2012-01-01	2 lata	1005.0, Carboplatinum	102,29	108,43	108,43	C.6.	bezpłatne	0 zł
51	Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg	25 tabl.	5909990345618	2012-07-01	2 lata	1099.0, Chlorambucilum	259,20	274,75	274,75	C.8.	bezpłatne	0 zł
52	Ciclosporinum	Sandimmun , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml	10 amp. a 1 ml	5909990119813	2012-01-01	2 lata	1007.0, Ciclosporinum	140,40	148,82	148,82	C.10.	bezpłatne	0 zł
53	Cisplatinum	Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg	1 fiol. a 20 ml	5909990180813	2012-01-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	9,03	9,57	9,57	C.11.	bezpłatne	0 zł
54	Cisplatinum	Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 25 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990180820	2012-01-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	21,60	22,90	22,90	C.11.	bezpłatne	0 zł
55	Cisplatinum	Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol. a 100 ml	5909990180837	2012-01-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	37,80	40,07	40,07	C.11.	bezpłatne	0 zł
56	Cisplatinum	Cisplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990722600	2012-01-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	8,64	9,16	9,16	C.11.	bezpłatne	0 zł
57	Cisplatinum	Cisplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990722631	2012-01-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	34,56	36,63	36,63	C.11.	bezpłatne	0 zł
58	Cisplatinum	Cisplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990722648	2012-01-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	67,50	71,55	71,55	C.11.	bezpłatne	0 zł
59	Cisplatinum	Cisplatinum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990838745	2013-03-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	8,64	9,16	9,16	C.11.	bezpłatne	0 zł
60	Cisplatinum	Cisplatinum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990838769	2013-03-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	34,56	36,63	36,63	C.11.	bezpłatne	0 zł
61	Cisplatinum	Cisplatinum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990894772	2013-03-01	2 lata	1008.0, Cisplatinum	66,96	70,98	70,98	C.11.	bezpłatne	0 zł
62	Cladribinum	BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg	1 fiol. a 10 ml	5909990713417	2012-07-01	2 lata	1009.0, Cladribinum	493,34	522,94	522,94	C.12.	bezpłatne	0 zł
63	Clofarabinum	Evoltra, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990710997	2013-03-01	2 lata	1111.0, Klofarabina	6 905,52	7 319,85	7 319,85	C.66.	bezpłatne	0 zł
64	Cyclophosphamidum	Endoxan, dra etki, 50 mg	50 dra .	5909990240814	2012-01-01	2 lata	1010.2, Cyclophosphamidum p.o.	72,52	76,87	76,87	C.13.	bezpłatne	0 zł
65	Cyclophosphamidum	Endoxan, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 200 mg	1 fiol.s.subs.	5909990240913	2012-01-01	2 lata	1010.1, Cyclophosphamidum inj.	14,58	15,45	15,45	C.13.	bezpłatne	0 zł
66	Cyclophosphamidum	Endoxan, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1 g	1 fiol.s.subs.	5909990241019	2012-01-01	2 lata	1010.1, Cyclophosphamidum inj.	54,96	58,26	58,26	C.13.	bezpłatne	0 zł
67	Cytarabinum	Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 500 mg	1 fiol. a 10 ml	5909990181216	2012-01-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	42,12	44,65	44,65	C.14.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	Cytarabinum	Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 1000 mg	1 fiol. a 20 ml	5909990181223	2012-01-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	84,24	89,29	89,29	C.14.	bezpłatne	0 zł
69	Cytarabinum	Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 0,05 g/ml	1 fiol. a 40 ml	5909990624935	2012-01-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	168,48	178,59	178,59	C.14.	bezpłatne	0 zł
70	Cytarabinum	Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/5ml	1 fiol. a 5 ml	5909990640188	2012-01-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	8,42	8,93	8,93	C.14.	bezpłatne	0 zł
71	Cytarabinum	Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 100 mg	1 amp. (+1 rozp.)	5909990154715	2012-07-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	11,03	11,69	8,93	C.14.	bezpłatne	0 zł
72	Cytarabinum	Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 500 mg	1 fiol.s.subs. (+ rozp.)	5909990314515	2012-01-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	42,12	44,65	44,65	C.14.	bezpłatne	0 zł
73	Cytarabinum	Cytosar, proszek do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa , 1 g	1 fiol.s.subs.	5909990314614	2012-01-01	2 lata	1011.1, Cytarabinum	84,24	89,29	89,29	C.14.	bezpłatne	0 zł
74	Cytarabinum	DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwa , 50 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990219278	2012-07-01	2 lata	1011.2, Cytarabinum depocyte	6 318,00	6 697,08	6 697,08	C.15.	bezpłatne	0 zł
75	Dacarbazinum	DACARBAZIN TEVA, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 100 mg	10 fiol.	5909990466924	2012-07-01	2 lata	1012.0, Dacarbazinum	196,73	208,53	123,25	C.16.	bezpłatne	0 zł
76	Dacarbazinum	DACARBAZIN TEVA, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 200 mg	10 fiol.	5909990467020	2012-07-01	2 lata	1012.0, Dacarbazinum	310,07	328,67	246,50	C.16.	bezpłatne	0 zł
77	Dacarbazinum	Detimedac 100 mg, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 100 mg	10 fiol. po 100 mg	5909991029500	2013-07-01	2 lata	1012.0, Dacarbazinum	116,27	123,25	123,25	C.16.	bezpłatne	0 zł
78	Dacarbazinum	Detimedac 1000 mg, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg	1 fiol. po 1000 mg	5909991029807	2013-07-01	2 lata	1012.0, Dacarbazinum	116,27	123,25	123,25	C.16.	bezpłatne	0 zł
79	Dacarbazinum	Detimedac 200 mg, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 200 mg	10 fiol. po 200 mg	5909991029609	2013-07-01	2 lata	1012.0, Dacarbazinum	232,56	246,51	246,50	C.16.	bezpłatne	0 zł
80	Dacarbazinum	Detimedac 500 mg, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol. po 500 mg	5909991029708	2013-07-01	2 lata	1012.0, Dacarbazinum	58,14	61,63	61,63	C.16.	bezpłatne	0 zł
81	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 10 mcg/0,4ml	1 amp.-strz. a 0,4 ml (b/op/blist.)	5909990007608	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	68,04	72,12	72,12	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
82	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml	1 wstrz. 1 ml	5909990340330	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	3 402,00	3 606,12	3 606,08	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
83	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 15 mcg/0,375ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,375 ml	5909990738755	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	102,06	108,18	108,18	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
84	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 20 mcg/0,5 ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,5 ml	5909990738779	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	136,08	144,24	144,24	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
85	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,3 ml	5909990738793	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	204,12	216,37	216,37	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
86	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 40 mcg/0,4ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,4 ml	5909990738847	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	272,16	288,49	288,49	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
87	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 50 mcg/0,5 ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,5 ml	5909990738861	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	340,20	360,61	360,61	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
88	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 60 mcg/0,3ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,3 ml	5909990738885	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	408,24	432,73	432,73	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
89	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 80 mcg/0,4ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,4 ml	5909990738908	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	544,32	576,98	576,97	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
90	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 100 mcg/0,5 ml	1 amp.-strz. (z zab.igły(blist.)) 0,5 ml	5909990738939	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoez - darbepoetyna	680,40	721,22	721,22	C.0.03.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	Darbepoetinum alfa	Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml	1 amp.-strz. a 1 ml	5909990739035	2012-07-01	2 lata	1043.1, czynniki stymuluj ce erytropocz - darbepoetyna	3 402,00	3 606,12	3 606,08	C.0.03.	bezpłatne	0 zł
92	Docetaxelum	Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 1 ml	5909990810987	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	228,42	242,13	242,13	C.19.	bezpłatne	0 zł
93	Docetaxelum	Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 4 ml	5909990810994	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	857,84	909,31	909,31	C.19.	bezpłatne	0 zł
94	Docetaxelum	Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 7 ml	5909990811007	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	2 247,70	2 382,56	2 382,56	C.19.	bezpłatne	0 zł
95	Docetaxelum	Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg	1 fiol. a 2 ml	5909990777006	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	246,02	260,78	260,78	C.19.	bezpłatne	0 zł
96	Docetaxelum	Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg	1 fiol. a 8 ml	5909990777020	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	997,27	1 057,11	1 057,11	C.19.	bezpłatne	0 zł
97	Docetaxelum	Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 160 mg	1 fiol. a 16 ml	5909990850280	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	1 053,97	1 117,21	1 117,21	C.19.	bezpłatne	0 zł
98	Docetaxelum	Docetaxel Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 1 ml	5909990994557	2013-03-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	64,80	68,69	68,69	C.19.	bezpłatne	0 zł
99	Docetaxelum	Docetaxel Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 4 ml	5909990994564	2013-03-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	263,87	279,70	279,70	C.19.	bezpłatne	0 zł
100	Docetaxelum	Docetaxel Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 8 ml	5909990994601	2013-03-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	496,07	525,83	525,83	C.19.	bezpłatne	0 zł
101	Docetaxelum	Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. a 2 ml	5909990786466	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	64,80	68,69	68,69	C.19.	bezpłatne	0 zł
102	Docetaxelum	Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. a 8 ml	5909990786473	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	259,20	274,75	274,75	C.19.	bezpłatne	0 zł
103	Docetaxelum	Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol. a 16 ml	5909990786480	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	486,00	515,16	515,16	C.19.	bezpłatne	0 zł
104	Docetaxelum	Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml	1 fiol. 0,5 ml + 1 fiol. rozp. 1,5 ml	5909990744688	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	70,92	75,18	75,18	C.19.	bezpłatne	0 zł
105	Docetaxelum	Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml	1 fiol. a 2 ml +1fiol. rozp. a 6 ml	5909990744695	2012-07-01	2 lata	1013.0, Docetaxelum	283,69	300,71	300,71	C.19.	bezpłatne	0 zł
106	Doxorubicinum	Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990471010	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	10,93	11,59	9,16	C.20.	bezpłatne	0 zł
107	Doxorubicinum	Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990471027	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	36,72	38,92	38,92	C.20.	bezpłatne	0 zł
108	Doxorubicinum	Adriblastina R.D., proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	1 fiol.liof. (+ rozp.5 ml)	5909990235612	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	10,93	11,59	9,16	C.20.	bezpłatne	0 zł
109	Doxorubicinum	Adriblastina R.D., proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg	1 fiol.liof.	5909990235711	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	36,72	38,92	38,92	C.20.	bezpłatne	0 zł
110	Doxorubicinum	BIORUBINA , proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	1 fiol. a 10 ml	5909990129515	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	8,96	9,50	9,16	C.20.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Doxorubicinum	BIORUBINA, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg	1 fiol. a 36 ml	5909990842216	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	37,80	40,07	40,07	C.20.	bezpłatne	0 zł
112	Doxorubicinum	BIORUBINA , roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 10 mg	1 fiol. a 5 ml	5909991128517	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	8,96	9,50	9,16	C.20.	bezpłatne	0 zł
113	Doxorubicinum	BIORUBINA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg	1 fiol. a 25 ml	5909991128524	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	34,56	36,63	36,63	C.20.	bezpłatne	0 zł
114	Doxorubicinum	Caelyx, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990983018	2012-07-01	2 lata	1014.3, Doxorubicinum liposomanum pegylatum	1 836,00	1 946,16	1 946,16	C.22.	bezpłatne	0 zł
115	Doxorubicinum	Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990429011	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	9,01	9,55	9,16	C.20.	bezpłatne	0 zł
116	Doxorubicinum	Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol. a 25 ml	5909990429028	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	43,20	45,79	45,79	C.20.	bezpłatne	0 zł
117	Doxorubicinum	Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990614837	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	86,40	91,58	91,58	C.20.	bezpłatne	0 zł
118	Doxorubicinum	Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol. a 100 ml	5909990614844	2012-07-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	172,80	183,17	183,16	C.20.	bezpłatne	0 zł
119	Doxorubicinum	Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990859405	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	16,09	17,06	9,16	C.20.	bezpłatne	0 zł
120	Doxorubicinum	Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990859443	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	30,24	32,05	18,32	C.20.	bezpłatne	0 zł
121	Doxorubicinum	Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990859474	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	38,88	41,21	41,21	C.20.	bezpłatne	0 zł
122	Doxorubicinum	Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 75 ml	5909990859481	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	103,68	109,90	109,90	C.20.	bezpłatne	0 zł
123	Doxorubicinum	Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990859535	2012-01-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	138,24	146,53	146,53	C.20.	bezpłatne	0 zł
124	Doxorubicinum	Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 25ml	5909990851393	2013-03-01	2 lata	1014.1, Doxorubicinum	36,73	38,93	38,93	C.20.	bezpłatne	0 zł
125	Doxorubicinum	Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporz. dziania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporz. dziania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg	2 zest. a 3 fiol. (1 proszek + 1 liposomy + 1 bufor), (2 zest. a 1 fiol. dla ka dego z 3 komponentów)	5909990213559	2012-07-01	2 lata	1014.2, Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum	4 297,32	4 555,16	4 555,16	C.21.	bezpłatne	0 zł
126	Epirubicini hydrochloridum	BIOEPICYNA, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	1 fiol. a 10 ml	5909990129416	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	39,96	42,36	38,40	C.23.	bezpłatne	0 zł
127	Epirubicini hydrochloridum	BIOEPICYNA , proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg	1 fiol. a 36 ml	5909991114213	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	169,56	179,73	179,73	C.23.	bezpłatne	0 zł
128	Epirubicini hydrochloridum	BIOEPICYNA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 10 mg	1 fiol. a 5 ml	5909991114312	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	30,78	32,63	32,63	C.23.	bezpłatne	0 zł
129	Epirubicini hydrochloridum	BIOEPICYNA , roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg	1 fiol. a 25 ml	5909991114329	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	141,48	149,97	149,97	C.23.	bezpłatne	0 zł
130	Epirubicini hydrochloridum	EPIRUBICIN KABI, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990779864	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	86,40	91,58	91,58	C.23.	bezpłatne	0 zł
131	Epirubicini hydrochloridum	EPIRUBICIN KABI, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990779871	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	334,80	354,89	354,89	C.23.	bezpłatne	0 zł
132	Epirubicini hydrochloridum	Epimedac, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990661497	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	43,20	45,79	38,40	C.23.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	Epirubicini hydrochloridum	Epimedac, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990661503	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	64,80	68,69	68,69	C.23.	bezpłatne	0 zł
134	Epirubicini hydrochloridum	Epimedac, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990661527	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	97,20	103,03	103,03	C.23.	bezpłatne	0 zł
135	Epirubicini hydrochloridum	Epimedac, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990661534	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	189,00	200,34	200,34	C.23.	bezpłatne	0 zł
136	Epirubicini hydrochloridum	Epimedac, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990661541	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	378,00	400,68	400,68	C.23.	bezpłatne	0 zł
137	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg	1 fiol. a 5 ml	5909991104313	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	41,19	43,66	38,40	C.23.	bezpłatne	0 zł
138	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol. a 25 ml	5909991104320	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	205,95	218,31	192,02	C.23.	bezpłatne	0 zł
139	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol. a 50 ml	5909991104337	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	410,40	435,02	384,04	C.23.	bezpłatne	0 zł
140	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol. a 100 ml	5909991104344	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	810,00	858,60	768,08	C.23.	bezpłatne	0 zł
141	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990796373	2013-03-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	31,32	33,20	33,20	C.23.	bezpłatne	0 zł
142	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990796397	2013-03-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	96,12	101,89	101,89	C.23.	bezpłatne	0 zł
143	Epirubicini hydrochloridum	Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990796403	2013-03-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	367,20	389,23	389,23	C.23.	bezpłatne	0 zł
144	Epirubicini hydrochloridum	Episindan, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990645275	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	33,67	35,69	35,69	C.23.	bezpłatne	0 zł
145	Epirubicini hydrochloridum	Episindan, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990645299	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	181,15	192,02	192,02	C.23.	bezpłatne	0 zł
146	Epirubicini hydrochloridum	Episindan, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990645305	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	199,15	211,10	211,10	C.23.	bezpłatne	0 zł
147	Epirubicini hydrochloridum	Episindan, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990645312	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	370,83	393,08	393,08	C.23.	bezpłatne	0 zł
148	Epirubicini hydrochloridum	Farmonubicin PFS, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 5 ml (szklana)	5909990752416	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	32,40	34,34	34,34	C.23.	bezpłatne	0 zł
149	Epirubicini hydrochloridum	Farmonubicin PFS, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990752515	2012-01-01	2 lata	1015.0, Epirubicinum	138,24	146,53	146,53	C.23.	bezpłatne	0 zł
150	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 1000 j.m./0,5 ml	6 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990654062	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoecz	86,40	91,58	91,58	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
151	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 2000 j.m./ml	6 amp.-strz. a 1 ml	5909990654086	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoecz	172,80	183,17	183,17	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
152	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 3000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strz. a 0,3 ml	5909990654109	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoecz	259,20	274,75	274,75	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
153	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 4000 j.m./0,4 ml	6 amp.-strz. a 0,4 ml	5909990654123	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoecz	345,60	366,34	366,34	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
154	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 5000 j.m./0,5 ml	6 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990654147	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoecz	432,00	457,92	457,92	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
155	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 6000 j.m./0,6 ml	6 amp.-strz. a 0,6 ml	5909990654161	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoecz	518,40	549,50	549,50	C.0.04.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 8000 j.m./0,8 ml	6 amp.-strz. a 0,8 ml	5909990654185	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	691,20	732,67	732,67	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
157	Epoetinum alfa	Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 10000 j.m./1 ml	6 amp.-strz. a 1 ml	5909990654208	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	864,00	915,84	915,84	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
158	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 1000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072378	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	172,80	183,17	91,58	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
159	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 2000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072392	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	345,60	366,34	183,17	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
160	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 3000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072439	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	518,40	549,50	274,75	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
161	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 4000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072453	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	691,20	732,67	366,34	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
162	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072477	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	864,00	915,84	457,92	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
163	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 6000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072491	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 036,80	1 099,01	549,50	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
164	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 8000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072538	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 382,40	1 465,34	732,67	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
165	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m.	6 amp-strz.	5909990072552	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 728,00	1 831,68	915,84	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
166	Epoetinum alfa	Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 40000 j.m./ml	6 amp.-strz. a 1 ml	5909990845170	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	6 912,00	7 326,72	3 663,36	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
167	Epoetinum alfa	Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 2000 j.m./ml	6 amp.-strz a 0,5 ml	5909990670956	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	183,12	194,11	91,58	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
168	Epoetinum alfa	Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 4000 j.m./ml	6 amp.-strz a 0,5 ml	5909990670963	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	366,25	388,23	183,17	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
169	Epoetinum alfa	Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml	6 amp.-strz 0,3 ml	5909990670970	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	549,37	582,33	274,75	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
170	Epoetinum alfa	Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml	6 amp.-strz a 0,4 ml	5909990670987	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	732,50	776,45	366,34	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
171	Epoetinum alfa	Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml	6 amp.-strz a 1 ml	5909990671045	2012-01-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 831,25	1 941,13	915,84	C.0.04.	bezpłatne	0 zł
172	Epoetinum beta	NeoRecomon, roztwór do wstrzykiwa , 30000 j.m.	1 amp.-strz.	5909990007134	2012-07-01	2 lata	1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez	1 081,40	1 146,28	457,92	C.0.05.	bezpłatne	0 zł
173	Etoposidum	Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol. a 2,5 ml	5909990776016	2012-07-01	2 lata	1016.0, Etoposidum	15,12	16,03	11,45	C.24.	bezpłatne	0 zł
174	Etoposidum	Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990776115	2012-07-01	2 lata	1016.0, Etoposidum	21,60	22,90	22,90	C.24.	bezpłatne	0 zł
175	Etoposidum	Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol. a 10 ml	5909990776214	2012-07-01	2 lata	1016.0, Etoposidum	43,20	45,79	45,79	C.24.	bezpłatne	0 zł
176	Etoposidum	Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 400 mg	1 fiol. a 20 ml	5909990776313	2012-07-01	2 lata	1016.0, Etoposidum	86,40	91,58	91,58	C.24.	bezpłatne	0 zł
177	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 300 mcg/ml	5 fiol. a 1 ml	5909990312214	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	607,50	643,95	643,95	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
178	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 600 mcg/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990830510	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	121,50	128,79	128,79	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
179	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 960 mcg/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990830619	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	194,40	206,06	206,06	C.0.06.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml	5 amp.-strz. á 0,2 ml	5909990904747	2012-07-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	486,00	515,16	271,89	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
181	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml	5 amp.-strz. á 0,5 ml	5909990904778	2012-07-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	621,00	658,26	658,26	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
182	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml	5 amp.-strz. á 0,5 ml	5909990904808	2012-07-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	1 026,00	1 087,56	1 087,56	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
183	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml	1 amp.-strz a 0,5 ml z osłon zabezpieczaj c igł	5909990739387	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	130,13	137,94	135,95	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
184	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml	1 amp.-strz a 0,8 ml z osłon zabezpieczaj c igł	5909990739448	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	214,79	227,68	217,51	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
185	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 60 mln j/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990687763	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	127,44	135,09	135,09	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
186	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 96 mln j/ml	1 amp.-strz. a 0,5 ml	5909990687800	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	215,27	228,19	217,51	C.0.06.	bezpłatne	0 zł
187	Fludarabini phosphas	Fludalym, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg	5 fioł.	5909990683567	2012-01-01	2 lata	1017.1, Fludarabinum inj	406,08	430,44	430,44	C.25.	bezpłatne	0 zł
188	Fludarabini phosphas	Fludara Oral, tabl. powł., 10 mg	15 tabl.	5909991183318	2012-07-01	2 lata	1017.2, Fludarabinum p.o.	1 247,81	1 322,68	1 322,68	C.25.	bezpłatne	0 zł
189	Fludarabini phosphas	Fludara Oral, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909991183325	2012-07-01	2 lata	1017.2, Fludarabinum p.o.	1 663,74	1 763,56	1 763,56	C.25.	bezpłatne	0 zł
190	Fludarabini phosphas	Fludarabin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 50 mg	1 fioł. a 2 ml	5909990661466	2012-01-01	2 lata	1017.1, Fludarabinum inj	432,00	457,92	343,44	C.25.	bezpłatne	0 zł
191	Fludarabini phosphas	Fludarabine Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 25 mg/ml	1 fioł. a 2 ml	5909990082377	2012-01-01	2 lata	1017.1, Fludarabinum inj	324,00	343,44	343,44	C.25.	bezpłatne	0 zł
192	Fluorouracilum	5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg/ml	1 fioł. a 100 ml	5909990336258	2012-01-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	72,36	76,70	76,70	C.26.	bezpłatne	0 zł
193	Fluorouracilum	5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 1000 mg	1 fioł. a 20 ml	5909990450633	2012-07-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	14,57	15,44	15,44	C.26.	bezpłatne	0 zł
194	Fluorouracilum	5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 250 mg	5 amp. a 5 ml	5909990450657	2012-07-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	18,21	19,30	19,30	C.26.	bezpłatne	0 zł
195	Fluorouracilum	Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	1 fioł. a 20 ml	5909990477913	2012-01-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	14,57	15,44	15,44	C.26.	bezpłatne	0 zł
196	Fluorouracilum	Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	1 fioł. a 10 ml	5909990477814	2012-01-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	7,56	8,01	7,72	C.26.	bezpłatne	0 zł
197	Fluorouracilum	Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml	1 fioł. a 100 ml	5909990478019	2012-01-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	72,85	77,22	77,22	C.26.	bezpłatne	0 zł
198	Fluorouracilum	Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 50 mg/ml	1 fioł. a 5 ml	5909990774777	2013-03-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	3,53	3,74	3,74	C.26.	bezpłatne	0 zł
199	Fluorouracilum	Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 50 mg/ml	1 fioł. a 10 ml	5909990774784	2013-03-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	7,34	7,78	7,72	C.26.	bezpłatne	0 zł
200	Fluorouracilum	Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 50 mg/ml	1 fioł. a 20 ml	5909990774791	2013-03-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	14,15	15,00	15,00	C.26.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	Fluorouracilum	Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 50 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990774807	2013-03-01	2 lata	1018.0, Fluorouracilum	70,25	74,47	74,47	C.26.	bezpłatne	0 zł
202	Fulvestrantum	Faslodex, roztwór do wstrzykiwa, 250 mg/5ml	2 amp.-strz. a 5 ml+2igły z syst.osł.	5909990768875	2012-07-01	2 lata	1019.0, Fulvestrant	2 700,00	2 862,00	2 862,00	C.27.	bezpłatne	0 zł
203	Gemcitabinum	GEMCIT, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990775200	2012-07-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	19,44	20,61	20,61	C.28.	bezpłatne	0 zł
204	Gemcitabinum	GEMCIT, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990775224	2012-07-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	72,36	76,70	76,70	C.28.	bezpłatne	0 zł
205	Gemcitabinum	GEMCIT, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 2 g	5909990818143	2012-07-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	140,40	148,82	148,82	C.28.	bezpłatne	0 zł
206	Gemcitabinum	Gembin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990832941	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	170,50	180,73	109,90	C.28.	bezpłatne	0 zł
207	Gemcitabinum	Gembin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990832958	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	36,78	38,99	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
208	Gemcitabinum	Gembin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990832965	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	493,13	522,72	219,80	C.28.	bezpłatne	0 zł
209	Gemcitabinum	Gemcitabine Polfa Łód, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol.	5909990850297	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	20,74	21,98	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
210	Gemcitabinum	Gemcitabine Polfa Łód, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 g	1 fiol.	5909990850365	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	64,10	67,95	67,95	C.28.	bezpłatne	0 zł
211	Gemcitabinum	Gemcitabine medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990766390	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	32,40	34,34	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
212	Gemcitabinum	Gemcitabine medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990766406	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	108,00	114,48	109,90	C.28.	bezpłatne	0 zł
213	Gemcitabinum	Gemcitabine medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990766437	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	162,00	171,72	164,85	C.28.	bezpłatne	0 zł
214	Gemcitabinum	Gemliquin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol. a 20 ml	5909990770052	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	54,00	57,24	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
215	Gemcitabinum	Gemliquin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990770069	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	135,00	143,10	54,95	C.28.	bezpłatne	0 zł
216	Gemcitabinum	Gemliquin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg	1 fiol. a 100 ml	5909990770076	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	270,00	286,20	109,90	C.28.	bezpłatne	0 zł
217	Gemcitabinum	Gemsol, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990870998	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	54,00	57,24	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
218	Gemcitabinum	Gemsol, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg	1 fiol. a 25 ml	5909990871032	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	270,00	286,20	109,90	C.28.	bezpłatne	0 zł
219	Gemcitabinum	Gemsol, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 2000 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990871049	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	540,00	572,40	219,80	C.28.	bezpłatne	0 zł
220	Gemcitabinum	Gitrabin, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 0,2 g	5909990714612	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	36,78	38,99	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
221	Gemcitabinum	Gitrabin, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 1g	5909990783434	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	170,50	180,73	109,90	C.28.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	Gemcitabinum	Gitrafin, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 38 mg/ml	1 fiol. a 2 g	5909990783441	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	341,00	361,46	219,80	C.28.	bezpłatne	0 zł
223	Gemcitabinum	Symtabin, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 200 mg	1 fiol. a 0,2 g	5909990828128	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	43,20	45,79	21,98	C.28.	bezpłatne	0 zł
224	Gemcitabinum	Symtabin, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1000 mg	5 fiol. a 0,2g	5909990828142	2012-01-01	2 lata	1020.0, Gemcitabinum	216,00	228,96	109,90	C.28.	bezpłatne	0 zł
225	Hydroxycarbamidum	Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg	100 kaps.	5909990836758	2012-01-01	2 lata	1021.0, Hydroxycarbamidum	64,58	68,45	68,45	C.29.	bezpłatne	0 zł
226	Hydroxycarbamidum	Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg	100 kaps.	5909990944927	2012-01-01	2 lata	1021.0, Hydroxycarbamidum	86,12	91,29	68,45	C.29.	bezpłatne	0 zł
227	Idarubicini hydrochloridum	Zavedos, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 5 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990236114	2012-01-01	2 lata	1022.0, Idarubicinum	410,40	435,02	435,02	C.30.	bezpłatne	0 zł
228	Idarubicini hydrochloridum	Zavedos, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	1 fiol. a 10 ml	5909990236213	2012-01-01	2 lata	1022.0, Idarubicinum	766,80	812,81	812,81	C.30.	bezpłatne	0 zł
229	Ifosfamidum	Holoxan, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1 g	1 fiol.	5909990241118	2012-07-01	2 lata	1023.0, Ifosfamidum	120,42	127,65	127,65	C.31.	bezpłatne	0 zł
230	Ifosfamidum	Holoxan, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 2 g	1 fiol.	5909990241217	2012-07-01	2 lata	1023.0, Ifosfamidum	217,62	230,68	230,68	C.31.	bezpłatne	0 zł
231	Interferonum alfa	Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 3000000 j.m.	1 amp. a 1 ml	5909990861118	2012-07-01	2 lata	1024.1, interferonum alfa	105,84	112,19	112,19	C.32.	bezpłatne	0 zł
232	Interferonum alfa	Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 6000000 j.m./ml	1 amp. a 1 ml	5909990861217	2012-07-01	2 lata	1024.1, interferonum alfa	211,68	224,38	224,38	C.32.	bezpłatne	0 zł
233	Interferonum alfa-2a	Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 3 mln j.m./0,5 ml	1 strzyk. a 0,5 ml (+igła)	5909990465118	2012-07-01	2 lata	1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a	50,33	53,35	53,35	C.33.	bezpłatne	0 zł
234	Interferonum alfa-2a	Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 6 mln j.m./0,5 ml	1 strzyk. a 0,5 ml (+igła)	5909990465316	2012-07-01	2 lata	1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a	100,67	106,71	106,70	C.33.	bezpłatne	0 zł
235	Interferonum alfa-2a	Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 9 mln j.m./0,5 ml	1 strzyk. a 0,5 ml (+igła)	5909990465415	2012-07-01	2 lata	1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a	150,99	160,05	160,05	C.33.	bezpłatne	0 zł
236	Interferonum alfa-2b	IntronA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 25 mln j.m./2,5 ml	1 fiol. a 2,5 ml + 6 zest. (1 zest.: strzykawka + igła do wstrzykiwa + 2 waciki)	5909990004805	2012-07-01	2 lata	1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b	419,58	444,75	444,75	C.34.	bezpłatne	0 zł
237	Interferonum alfa-2b	IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 15 mln j.m./ml	1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik)	5909990858118	2012-07-01	2 lata	1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b	302,10	320,23	320,23	C.34.	bezpłatne	0 zł
238	Interferonum alfa-2b	IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 25 mln j.m./ml	1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik)	5909990858217	2012-07-01	2 lata	1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b	503,49	533,70	533,70	C.34.	bezpłatne	0 zł
239	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Campto, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 15 ml (propyl.)	5909990645060	2012-07-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	1 965,96	2 083,92	2 083,92	C.35.	bezpłatne	0 zł
240	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Campto, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 2 ml (propyl.)	5909990645176	2012-07-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	237,39	251,63	251,63	C.35.	bezpłatne	0 zł
241	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Campto, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 5 ml (propyl.)	5909990645183	2012-07-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	651,02	690,08	690,08	C.35.	bezpłatne	0 zł
242	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Accord, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 2 ml	5909990739059	2013-03-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	20,44	21,67	21,67	C.35.	bezpłatne	0 zł
243	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Accord, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990739066	2013-03-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	47,19	50,02	50,02	C.35.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 2 ml	5909990013869	2012-07-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	34,56	36,63	36,63	C.35.	bezpłatne	0 zł
245	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990013876	2012-07-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	64,80	68,69	68,69	C.35.	bezpłatne	0 zł
246	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Kabi, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 2 ml	5909990726943	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	21,06	22,32	22,32	C.35.	bezpłatne	0 zł
247	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Kabi, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990726950	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	48,60	51,52	51,52	C.35.	bezpłatne	0 zł
248	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Kabi, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 15 ml	5909990796946	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	145,80	154,55	154,55	C.35.	bezpłatne	0 zł
249	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan Kabi, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990796953	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	248,40	263,30	263,30	C.35.	bezpłatne	0 zł
250	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 2 ml	5909990766482	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	37,80	40,07	40,07	C.35.	bezpłatne	0 zł
251	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990766499	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	75,60	80,14	80,14	C.35.	bezpłatne	0 zł
252	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml	1 fiol. a 15 ml	5909990766505	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	189,00	200,34	200,34	C.35.	bezpłatne	0 zł
253	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 40 mg	1 fiol. a 2 ml	5909990871056	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	36,18	38,35	38,35	C.35.	bezpłatne	0 zł
254	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990871087	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	81,00	85,86	85,86	C.35.	bezpłatne	0 zł
255	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 150 mg	1 fiol a 7,5 ml	5909990871124	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	129,60	137,38	137,38	C.35.	bezpłatne	0 zł
256	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 300 mg	1 fiol. a 15 ml	5909990871155	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	253,80	269,03	269,03	C.35.	bezpłatne	0 zł
257	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol a 25 ml	5909990871162	2012-01-01	2 lata	1025.0, Irinotecanum	426,60	452,20	452,20	C.35.	bezpłatne	0 zł
258	Isotretinoinum	Isoderm, kaps. mi kkie, 10 mg	30 kaps.	5909990864409	2012-07-01	2 lata	1097.0, Isotretinoinum	43,20	45,79	34,35	C.36.	bezpłatne	0 zł
259	Isotretinoinum	Isoderm, kaps. mi kkie, 20 mg	30 kaps.	5909990864447	2012-07-01	2 lata	1097.0, Isotretinoinum	64,80	68,69	68,69	C.36.	bezpłatne	0 zł
260	Lanreotidum	SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 30 mg	1 fiol.s.subs. (+zest.)	5909990420711	2012-07-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	2 148,12	2 277,01	2 277,01	C.37.	bezpłatne	0 zł
261	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg	1 amp.-strz.	5909991094416	2012-01-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	2 703,73	2 865,95	2 865,95	C.37.	bezpłatne	0 zł
262	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg	1 amp.-strz.	5909991094515	2012-01-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	3 604,62	3 820,90	3 820,90	C.37.	bezpłatne	0 zł
263	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg	1 amp.-strz a 0,5 ml	5909991094614	2012-01-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	4 514,86	4 785,75	4 785,75	C.37.	bezpłatne	0 zł
264	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU	1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909990742059	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	121,76	129,07	119,18	C.0.07.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU	5 fioł. z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G	5909990742066	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	608,76	645,29	595,89	C.0.07.	bezpłatne	0 zł
266	Melphalanum	Alkeran, tabl. powł., 2 mg	25 tabl.	5909990283514	2012-07-01	2 lata	1098.0, Melphalanum	311,04	329,70	329,70	C.39.	bezpłatne	0 zł
267	Mercaptopurinum	MERCAPTOPURINUM VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01	2 lata	1027.0, Mercaptopurinum	21,22	22,49	22,49	C.40.	bezpłatne	0 zł
268	Mesnum	Uromitexan, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml	15 amp. a 4 ml	5909990265831	2012-07-01	2 lata	1046.0, Mesnum	201,10	213,17	213,17	C.0.08.	bezpłatne	0 zł
269	Methotrexatum	Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 100 mg/ml	1 fioł. a 50 ml	5909990333936	2012-01-01	2 lata	1028.2, Methotrexatum inj.	378,00	400,68	400,68	C.41.	bezpłatne	0 zł
270	Methotrexatum	Methotrexat - Ebewe, tabl., 2,5 mg	50 tabl.	5909990453726	2012-07-01	2 lata	1028.3, Methotrexatum p.o	8,09	8,58	8,58	C.41.	bezpłatne	0 zł
271	Methotrexatum	Methotrexat - Ebewe, tabl., 5 mg	50 tabl.	5909990453825	2012-07-01	2 lata	1028.3, Methotrexatum p.o	16,18	17,15	17,15	C.41.	bezpłatne	0 zł
272	Methotrexatum	Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg	50 tabl.	5909990453924	2012-07-01	2 lata	1028.3, Methotrexatum p.o	32,36	34,30	34,30	C.41.	bezpłatne	0 zł
273	Methotrexatum	Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1000 mg	1 fioł. a 10 ml	5909990615742	2012-01-01	2 lata	1028.2, Methotrexatum inj.	86,40	91,58	80,14	C.41.	bezpłatne	0 zł
274	Methotrexatum	Trexan, tabl., 2,5 mg	100 tabl.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	1028.3, Methotrexatum p.o	16,19	17,16	17,15	C.41.	bezpłatne	0 zł
275	Methotrexatum	Trexan, tabl., 10 mg	100 tabl. (1 poj.)	5909990730346	2012-01-01	2 lata	1028.3, Methotrexatum p.o	64,80	68,69	68,60	C.41.	bezpłatne	0 zł
276	Mitomycinum	Mitomycin C Kyowa, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg	1 fioł.	5909990098118	2012-01-01	2 lata	1029.0, Mitomycinum	62,60	66,36	64,11	C.42.	bezpłatne	0 zł
277	Mitomycinum	Mitomycin C Kyowa, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 20 mg	1 fioł.	5909990098217	2012-01-01	2 lata	1029.0, Mitomycinum	120,96	128,22	128,22	C.42.	bezpłatne	0 zł
278	Mitotatum	Lysodren, tabl., 500 mg	100 tabl.	5909990335237	2012-07-01	2 lata	1030.0, Mitotatum	2 764,80	2 930,69	2 930,69	C.43.	bezpłatne	0 zł
279	Octreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 50 g/ml	5 amp. a 1 ml	5909990042715	2012-01-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	37,80	40,07	40,07	C.45.	bezpłatne	0 zł
280	Octreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 100 g/ml	5 amp. a 1 ml	5909990042913	2012-01-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	48,60	51,52	51,52	C.45.	bezpłatne	0 zł
281	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesiny do wstrzykiwa , 30 mg	1 fioł., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459513	2012-07-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	5 241,24	5 555,71	5 555,71	C.45.	bezpłatne	0 zł
282	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesiny do wstrzykiwa , 20 mg	1 fioł., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459612	2012-07-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	3 763,04	3 988,82	3 988,82	C.45.	bezpłatne	0 zł
283	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesiny do wstrzykiwa , 10 mg	1 fioł., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459711	2012-01-01	2 lata	1026.0, analogi somatostatyny	2 306,88	2 445,29	2 445,29	C.45.	bezpłatne	0 zł
284	Ondansetronum	Atossa, tabl. powł., 8 mg	10 tabl.	5909990744510	2012-07-01	2 lata	1047.2, ondansetronum p.o.	37,26	39,50	39,50	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
285	Ondansetronum	ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 amp. a 2 ml	5909990055180	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	1,38	1,46	1,46	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
286	Ondansetronum	ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	5 amp. a 2 ml	5909990055197	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	6,91	7,32	7,32	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
287	Ondansetronum	ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	10 amp. a 2 ml	5909990055203	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	13,82	14,65	14,65	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
288	Ondansetronum	ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	1 amp. a 4 ml	5909990055227	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	2,76	2,93	2,93	C.0.09.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	Ondansetronum	ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	5 amp. a 4 ml	5909990055234	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	13,82	14,65	14,65	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
290	Ondansetronum	ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	10 amp. a 4 ml	5909990055241	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	27,65	29,31	29,30	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
291	Ondansetronum	Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 2 mg/ml	5 amp. po 2 ml	5909990822225	2013-03-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	6,71	7,11	7,11	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
292	Ondansetronum	Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 2 mg/ml	5 amp. po 4 ml	5909990822249	2013-03-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	13,42	14,23	14,23	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
293	Ondansetronum	SETRONON, tabl. powl., 8 mg	10 tabl.	5909990994717	2012-07-01	2 lata	1047.2, ondansetronum p.o.	35,86	38,01	38,01	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
294	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg	10 tabl. powl.	5909990001811	2012-01-01	2 lata	1047.2, ondansetronum p.o.	31,86	33,77	19,75	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
295	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg	10 tabl. powl.	5909990001910	2012-01-01	2 lata	1047.2, ondansetronum p.o.	64,80	68,69	39,50	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
296	Ondansetronum	ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	5 amp. a 2 ml	5909990002016	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	6,91	7,32	7,32	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
297	Ondansetronum	ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml	5 amp. a 4 ml	5909990002023	2012-01-01	2 lata	1047.1, ondansetronum inj.	13,82	14,65	14,65	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
298	Ondansetronum	ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml	50 ml	5909990810611	2012-01-01	2 lata	1047.2, ondansetronum p.o.	72,65	77,01	19,75	C.0.09.	bezpłatne	0 zł
299	Oxaliplatinum	OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990798247	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	43,20	45,79	45,79	C.46.	bezpłatne	0 zł
300	Oxaliplatinum	OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990798254	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	86,40	91,58	91,58	C.46.	bezpłatne	0 zł
301	Oxaliplatinum	OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 40 ml	5909990827381	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	162,00	171,72	171,72	C.46.	bezpłatne	0 zł
302	Oxaliplatinum	OXALIPLATIN KABI, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 10 ml (50mg)	5909990859146	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	40,50	42,93	42,93	C.46.	bezpłatne	0 zł
303	Oxaliplatinum	OXALIPLATIN KABI, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml (100mg)	5909990859153	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	81,00	85,86	85,86	C.46.	bezpłatne	0 zł
304	Oxaliplatinum	Oksaliplatyna medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 10 ml (50mg)	5909990018369	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	45,54	48,27	48,27	C.46.	bezpłatne	0 zł
305	Oxaliplatinum	Oksaliplatyna medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml (100mg)	5909990018376	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	91,09	96,56	96,54	C.46.	bezpłatne	0 zł
306	Oxaliplatinum	Oksaliplatyna medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 0,15 g	5909990080656	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	136,63	144,83	144,81	C.46.	bezpłatne	0 zł
307	Oxaliplatinum	Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990641437	2012-07-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	43,20	45,79	45,79	C.46.	bezpłatne	0 zł
308	Oxaliplatinum	Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990641444	2012-07-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	86,40	91,58	91,58	C.46.	bezpłatne	0 zł
309	Oxaliplatinum	Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 40 ml	5909990686179	2012-07-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	162,00	171,72	171,72	C.46.	bezpłatne	0 zł
310	Oxaliplatinum	Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990084852	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	43,20	45,79	45,79	C.46.	bezpłatne	0 zł
311	Oxaliplatinum	Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990084869	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	81,00	85,86	85,86	C.46.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	Oxaliplatinum	Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 40 ml	5909990683291	2012-01-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	151,20	160,27	160,27	C.46.	bezpłatne	0 zł
313	Oxaliplatinum	Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporz. dzania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol. a 10 ml (50mg)	5909990018345	2012-07-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	194,40	206,06	48,27	C.46.	bezpłatne	0 zł
314	Oxaliplatinum	Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporz. dzania roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol. a 20 ml (100mg)	5909990018352	2012-07-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	378,00	400,68	96,54	C.46.	bezpłatne	0 zł
315	Oxaliplatinum	Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporz. dzania roztworu do infuzji, 150 mg	1 fiol. a 30 ml (150mg)	5909990081424	2012-07-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	540,00	572,40	144,81	C.46.	bezpłatne	0 zł
316	Oxaliplatinum	Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 10 ml	5909990796151	2013-03-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	43,74	46,36	46,36	C.46.	bezpłatne	0 zł
317	Oxaliplatinum	Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 20 ml	5909990796168	2013-03-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	81,00	85,86	85,86	C.46.	bezpłatne	0 zł
318	Oxaliplatinum	Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml	1 fiol. a 40 ml	5909990827206	2013-03-01	2 lata	1031.0, Oxaliplatinum	154,44	163,71	163,71	C.46.	bezpłatne	0 zł
319	Paclitaxelum	PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	5 ml	5909990874347	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	31,32	33,20	33,20	C.47.	bezpłatne	0 zł
320	Paclitaxelum	PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 16,7 ml	5909990874361	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	54,00	57,24	57,24	C.47.	bezpłatne	0 zł
321	Paclitaxelum	PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 25 ml	5909990874385	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	75,60	80,14	80,14	C.47.	bezpłatne	0 zł
322	Paclitaxelum	PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990874408	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	151,20	160,27	160,27	C.47.	bezpłatne	0 zł
323	Paclitaxelum	PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 100 ml	5909990874446	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	313,20	331,99	331,99	C.47.	bezpłatne	0 zł
324	Paclitaxelum	Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 5ml	5909990216406	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	32,40	34,34	34,34	C.47.	bezpłatne	0 zł
325	Paclitaxelum	Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 25ml	5909990216482	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	145,80	154,55	154,55	C.47.	bezpłatne	0 zł
326	Paclitaxelum	Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 50ml	5909990216499	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	291,60	309,10	309,10	C.47.	bezpłatne	0 zł
327	Paclitaxelum	Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 16,7ml	5909990935406	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	97,20	103,03	103,03	C.47.	bezpłatne	0 zł
328	Paclitaxelum	Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 30 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990018383	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	48,12	51,01	51,01	C.47.	bezpłatne	0 zł
329	Paclitaxelum	Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol. a 16,7 ml	5909990018390	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	160,41	170,03	170,03	C.47.	bezpłatne	0 zł
330	Paclitaxelum	Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 150 mg	1 fiol. a 25 ml	5909990018406	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	240,61	255,05	255,05	C.47.	bezpłatne	0 zł
331	Paclitaxelum	Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz. dzania roztworu do infuzji, 300 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990018420	2012-01-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	481,23	510,10	510,10	C.47.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
332	Paclitaxelum	Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990840267	2013-03-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	31,49	33,38	33,38	C.47.	bezpłatne	0 zł
333	Paclitaxelum	Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 16,7 ml	5909990840274	2013-03-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	55,08	58,38	58,38	C.47.	bezpłatne	0 zł
334	Paclitaxelum	Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990840281	2013-03-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	153,68	162,90	162,90	C.47.	bezpłatne	0 zł
335	Paclitaxelum	Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1sz. - 1 fiol. a 300 mg	5909990422463	2012-09-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	481,14	510,01	510,01	C.47.	bezpłatne	0 zł
336	Paclitaxelum	Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 szt. - 1 fiol. a 30 mg	5909991060619	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	68,04	72,12	51,01	C.47.	bezpłatne	0 zł
337	Paclitaxelum	Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1sz. - 1 fiol. a 100 mg	5909991060633	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	226,80	240,41	170,03	C.47.	bezpłatne	0 zł
338	Paclitaxelum	Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 50 ml	5909990668878	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	1 026,86	1 088,47	510,10	C.47.	bezpłatne	0 zł
339	Paclitaxelum	Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990976010	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	100,22	106,23	51,01	C.47.	bezpłatne	0 zł
340	Paclitaxelum	Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 16,67 ml	5909990976027	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	313,63	332,45	170,03	C.47.	bezpłatne	0 zł
341	Paclitaxelum	Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml	1 fiol. a 43,33 ml	5909990976034	2012-07-01	2 lata	1032.0, Paclitaxelum	843,48	894,09	442,09	C.47.	bezpłatne	0 zł
342	Pegasparagasum	Oncaspar, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 750 j.m./ml	1 fiol. a 5 ml	5909990950812	2012-07-01	2 lata	1033.0, Pegasparagasum	5 238,00	5 552,28	5 552,28	C.48.	bezpłatne	0 zł
343	Pegfilgrastimum	Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml	1 amp.-strz. a 0,6 ml (z zab.igly)	5909990007523	2012-01-01	2 lata	1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez	3 286,98	3 484,20	3 172,05	C.0.10.	bezpłatne	0 zł
344	Pemetreksedum	Alimta 100 mg, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol.s.subs.	5909990080205	2012-07-01	2 lata	1034.0, Pemetreksed	764,10	809,95	809,95	C.49.	bezpłatne	0 zł
345	Pemetreksedum	Alimta 500 mg, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol.s.subs.	5909990009664	2012-07-01	2 lata	1034.0, Pemetreksed	3 822,12	4 051,45	4 049,75	C.49.	bezpłatne	0 zł
346	Rasburicasum	Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporz dzania roztworu do infuzji , 1,5 mg/ml	3 fiol. a 1,5mg (+ 3 amp. rozp.)	5909990943111	2012-01-01	2 lata	1048.0, Rasburicasum	692,84	734,41	734,41	C.0.11.	bezpłatne	0 zł
347	Rituximabum	MabThera, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg	2 fiol. a 10 ml	5909990418817	2012-07-01	2 lata	1035.0, Rituximabum	2 445,01	2 591,71	2 591,71	C.51.	bezpłatne	0 zł
348	Rituximabum	MabThera, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg	1 fiol. a 50 ml	5909990418824	2012-07-01	2 lata	1035.0, Rituximabum	6 112,52	6 479,27	6 479,27	C.51.	bezpłatne	0 zł
349	Tamoxifenum	Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990127412	2012-01-01	2 lata	1036.0, Tamoxifenum	17,28	18,32	10,60	C.52.	bezpłatne	0 zł
350	Tamoxifenum	Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990775316	2012-01-01	2 lata	1036.0, Tamoxifenum	10,01	10,61	10,60	C.52.	bezpłatne	0 zł
351	Tamoxifenum	Tamoxifen-Ebewe 10, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990722518	2012-01-01	2 lata	1036.0, Tamoxifenum	5,35	5,67	5,30	C.52.	bezpłatne	0 zł
352	Tamoxifenum	Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg	30 tabl.	5909990722419	2012-01-01	2 lata	1036.0, Tamoxifenum	10,00	10,60	10,60	C.52.	bezpłatne	0 zł
353	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps.	5909990805082	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	27,00	28,62	28,62	C.64.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
354	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps.	5909990805105	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	108,00	114,48	114,48	C.64.	bezpłatne	0 zł
355	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps.	5909990805136	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	518,40	549,50	549,50	C.64.	bezpłatne	0 zł
356	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg	5 kaps.	5909990805150	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	756,00	801,36	801,36	C.64.	bezpłatne	0 zł
357	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps.	5909990805174	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	972,00	1 030,32	1 030,32	C.64.	bezpłatne	0 zł
358	Temozolomidum	TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps.	5909990805198	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 447,20	1 534,03	1 534,03	C.64.	bezpłatne	0 zł
359	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672158	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	218,16	231,25	152,26	C.64.	bezpłatne	0 zł
360	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672172	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 090,80	1 156,25	761,29	C.64.	bezpłatne	0 zł
361	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672196	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	2 727,00	2 890,62	1 903,23	C.64.	bezpłatne	0 zł
362	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 0,14 g	5 kaps. (saszet.)	5909990672219	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 527,12	1 618,75	1 065,81	C.64.	bezpłatne	0 zł
363	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990672233	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 963,44	2 081,25	1 370,33	C.64.	bezpłatne	0 zł
364	Temozolomidum	Temodal, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps. (saszet.)	5909990716999	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	54,54	57,81	38,06	C.64.	bezpłatne	0 zł
365	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps. (but.)	4037353009967	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	35,91	38,06	38,06	C.64.	bezpłatne	0 zł
366	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps. (but.)	4037353009974	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	143,64	152,26	152,26	C.64.	bezpłatne	0 zł
367	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps. (but.)	4037353009981	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	718,20	761,29	761,29	C.64.	bezpłatne	0 zł
368	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 140 mg	5 kaps. (but.)	4037353009998	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 005,48	1 065,81	1 065,81	C.64.	bezpłatne	0 zł
369	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps. (but.)	4037353010000	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 292,76	1 370,33	1 370,33	C.64.	bezpłatne	0 zł
370	Temozolomidum	Temomedac, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps. (but.)	4037353010017	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 795,50	1 903,23	1 903,23	C.64.	bezpłatne	0 zł
371	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 5 mg	5 kaps. (but.)	5909990744701	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	35,91	38,06	38,06	C.64.	bezpłatne	0 zł
372	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 20 mg	5 kaps. (but.)	5909990744725	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	143,64	152,26	152,26	C.64.	bezpłatne	0 zł
373	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 100 mg	5 kaps. (but.)	5909990744749	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	718,20	761,29	761,29	C.64.	bezpłatne	0 zł
374	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 140 mg	5 kaps. (but.)	5909990744763	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 005,48	1 065,81	1 065,81	C.64.	bezpłatne	0 zł
375	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 180 mg	5 kaps. (but.)	5909990744787	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 292,76	1 370,33	1 370,33	C.64.	bezpłatne	0 zł
376	Temozolomidum	Temozolomide Teva, kaps. twarde, 250 mg	5 kaps. (but.)	5909990746057	2012-07-01/2012-09-01	2 lata	1080.0, Temozolomidum	1 795,50	1 903,23	1 903,23	C.64.	bezpłatne	0 zł
377	Thiotepa	Tepadina, proszek do sporz. dzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg	1 fiol.	5909990893546	2012-07-01	2 lata	1037.0, Thiotepa	577,80	612,47	556,37	C.55.	bezpłatne	0 zł
378	Thiotepa	Tepadina, proszek do sporz. dzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg	1 fiol.	5909990893553	2012-07-01	2 lata	1037.0, Thiotepa	3 499,20	3 709,15	3 709,15	C.55.	bezpłatne	0 zł
379	Tioguaninum	Lanvis, tabl., 40 mg	25 tabl.	5909990185214	2012-07-01	2 lata	1100.0, Tioguaninum	706,32	748,70	748,70	C.56.	bezpłatne	0 zł
380	Topotecanum	HYCAMTIN, proszek do sporz. dzania koncentratu do infuzji, 1 mg	5 fiol.	5909990223244	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	1 193,40	1 265,00	858,60	C.57.2	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	Topotecanum	HYCAMTIN, proszek do sporz dzania koncentratu do sporz dzania roztworu do infuzji, 4 mg	1 fiol. a 17 ml	5909990489626	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	954,72	1 012,00	686,88	C.57.2	bezpłatne	0 zł
382	Topotecanum	HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg	10 kaps.	5909990643134	2012-01-01	2 lata	1038.2, Topotecanum p.o.	386,10	409,27	409,27	C.57.1	bezpłatne	0 zł
383	Topotecanum	HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg	10 kaps.	5909990643141	2012-01-01	2 lata	1038.2, Topotecanum p.o.	1 544,40	1 637,06	1 637,06	C.57.1	bezpłatne	0 zł
384	Topotecanum	Potactasol, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg	1 fiol.	5909990845187	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	97,20	103,03	103,03	C.57.2	bezpłatne	0 zł
385	Topotecanum	Potactasol, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 4 mg	1 fiol.	5909990845194	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	625,03	662,53	662,53	C.57.2	bezpłatne	0 zł
386	Topotecanum	TOPOTECAN KABI, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg	1 fiol. a 6 ml	5909990896448	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	321,30	340,58	340,58	C.57.2	bezpłatne	0 zł
387	Topotecanum	TOPOTECAN KABI, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg	5 fiol. a 6 ml	5909990896455	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	1 606,50	1 702,89	1 702,89	C.57.2	bezpłatne	0 zł
388	Topotecanum	Topotecan Accord, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg	1 fiol. a 4 ml	5909990796595	2013-03-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	319,36	338,52	338,52	C.57.2	bezpłatne	0 zł
389	Topotecanum	Topotecan Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 4 mg/4ml	5 fiolek a 4 ml	5909990904297	2012-07-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	1 836,00	1 946,16	1 946,16	C.57.2	bezpłatne	0 zł
390	Topotecanum	Topotecan Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	5 fiol. a 1 ml	5909990717125	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	864,00	915,84	858,60	C.57.2	bezpłatne	0 zł
391	Topotecanum	Topotecan Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	5 fiol. a 4 ml	5909990717149	2012-01-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	3 240,00	3 434,40	3 434,40	C.57.2	bezpłatne	0 zł
392	Topotecanum	Topotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiolka a 1ml	5909990924660	2012-07-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	102,60	108,76	108,76	C.57.2	bezpłatne	0 zł
393	Topotecanum	Topotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiolka a 2ml	5909990924677	2012-07-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	205,20	217,51	217,51	C.57.2	bezpłatne	0 zł
394	Topotecanum	Topotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiolka a 4ml	5909990924684	2012-07-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	313,20	331,99	331,99	C.57.2	bezpłatne	0 zł
395	Topotecanum	Topotecanum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 1 ml	5909990984756	2013-03-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	98,29	104,19	104,19	C.57.2	bezpłatne	0 zł
396	Topotecanum	Topotecanum Accord, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml	1 fiol. a 4 ml	5909990984770	2013-03-01	2 lata	1038.1, Topotecanum inj.	319,36	338,52	338,52	C.57.2	bezpłatne	0 zł
397	Tretinoinum	Vesanoid, kaps. mi kkie, 10 mg	100 kaps.	5909990668311	2012-07-01	2 lata	1039.0, Tretinoinum	1 046,74	1 109,54	1 109,54	C.58.	bezpłatne	0 zł
398	Vinblastini sulfas	Vinblastin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 5 mg	10 fiol.s.subs. (+ rozp.)	5909990117321	2012-01-01	2 lata	1040.0, Vinblastinum	216,00	228,96	228,96	C.60.	bezpłatne	0 zł
399	Vincristini sulfas	Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1 mg	10 fiol.s.subs. (+ rozp.)	5909990117413	2012-01-01	2 lata	1041.0, Vincristinum	259,20	274,75	274,75	C.61.	bezpłatne	0 zł
400	Vincristini sulfas	Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwa , 1 mg/ml	1 fiol. a 1 ml	5909990669493	2012-07-01	2 lata	1041.0, Vincristinum	26,19	27,76	27,76	C.61.	bezpłatne	0 zł
401	Vincristini sulfas	Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwa , 1 mg/ml	1 fiol. a 5 ml	5909990669523	2012-07-01	2 lata	1041.0, Vincristinum	125,71	133,25	133,25	C.61.	bezpłatne	0 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402	Vinorelbinum	Navelbine, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	10 amp. a 1 ml	5909990173617	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	740,84	785,29	785,28	C.63.	bezpłatne	0 zł
403	Vinorelbinum	Navelbine, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	10 amp. a 5 ml	5909990173624	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	3 704,17	3 926,42	3 926,42	C.63.	bezpłatne	0 zł
404	Vinorelbinum	Navelbine, kaps. mi kkie, 20 mg	1 kaps.	5909990945016	2012-07-01	2 lata	1042.2, Vinorelbinum p.o.	174,59	185,07	185,07	C.63.	bezpłatne	0 zł
405	Vinorelbinum	Navelbine, kaps. mi kkie, 30 mg	1 kaps.	5909990945115	2012-07-01	2 lata	1042.2, Vinorelbinum p.o.	261,88	277,59	277,59	C.63.	bezpłatne	0 zł
406	Vinorelbinum	Navirel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	10 fiol. a 1 ml	5909990573325	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	745,20	789,91	785,28	C.63.	bezpłatne	0 zł
407	Vinorelbinum	Navirel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	10 fiol. a 5 ml	5909990573349	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	1 490,40	1 579,82	1 579,82	C.63.	bezpłatne	0 zł
408	Vinorelbinum	Neocitec, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol.po 1ml	5909990668045	2013-07-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	64,80	68,69	68,69	C.63.	bezpłatne	0 zł
409	Vinorelbinum	Neocitec, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	1 fiol.po 5ml	5909990668052	2013-07-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	291,60	309,10	309,10	C.63.	bezpłatne	0 zł
410	Vinorelbinum	Vinorelbin-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg	1 fiol. a 1 ml	5909990573172	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	64,80	68,69	68,69	C.63.	bezpłatne	0 zł
411	Vinorelbinum	Vinorelbin-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg	1 fiol. a 5 ml	5909990573189	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	291,60	309,10	309,10	C.63.	bezpłatne	0 zł
412	Vinorelbinum	Vinorelbine Polpharma, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml	10 fiol. a 5 ml	5909990731374	2012-01-01	2 lata	1042.1, Vinorelbinum inj	1 058,40	1 121,90	1 121,90	C.63.	bezpłatne	0 zł

Załącznik C.0.01.

ACIDUM LEVOFOLINICUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	ACIDUM LEVOFOLINICUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.02.

CALCII FOLINAS

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	CALCII FOLINAS	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.03.

DARBEPOETIN ALFA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	DARBEPOETIN ALFA	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.04.

EPOETINUM ALPHA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	EPOETINUM ALPHA	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.05.

EPOETINUM BETA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	EPOETINUM BETA	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.06.

FILGRASTIMUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	FILGRASTIMUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.07.

LENOGRASTIMUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	LENOGRASTIMUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.08.

MESNUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	MESNUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.09.

ONDANSETRONUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	ONDANSETRONUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.10.

PEGFILGRASTIMUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	PEGFILGRASTIMUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.11

RASBURICASUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	RASBURICASUM	WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI

Załącznik C.0.12

APREPITANTUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŚLI DOTYCZY – DROGA PODANIA	ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ
1	APREPITANTUM	WCZESNE ALBO OPÓŹNIONE WYMIOTY U OSÓB DOROSŁYCH ZWIĄZANE Z SILNIE EMETOGENNĄ CHEMIOTERAPIĄ Z ZASTOSOWANIEM CISPLATYNY W DAWCE >70 MG/M ² – PROFILAKTYKA

Załącznik C.1.

ASPARAGINASUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	ASPARAGINASUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2	ASPARAGINASUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
3	ASPARAGINASUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
4	ASPARAGINASUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
5	ASPARAGINASUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
6	ASPARAGINASUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
7	ASPARAGINASUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
8	ASPARAGINASUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
9	ASPARAGINASUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
10	ASPARAGINASUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
11	ASPARAGINASUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY)
12	ASPARAGINASUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
13	ASPARAGINASUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
14	ASPARAGINASUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
15	ASPARAGINASUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
16	ASPARAGINASUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
17	ASPARAGINASUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
18	ASPARAGINASUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
19	ASPARAGINASUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
20	ASPARAGINASUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
21	ASPARAGINASUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
22	ASPARAGINASUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23	ASPARAGINASUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
24	ASPARAGINASUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
25	ASPARAGINASUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
26	ASPARAGINASUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
27	ASPARAGINASUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
28	ASPARAGINASUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
29	ASPARAGINASUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
30	ASPARAGINASUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
31	ASPARAGINASUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
32	ASPARAGINASUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
33	ASPARAGINASUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
34	ASPARAGINASUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
35	ASPARAGINASUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
36	ASPARAGINASUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
37	ASPARAGINASUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
38	ASPARAGINASUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
39	ASPARAGINASUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
40	ASPARAGINASUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
41	ASPARAGINASUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
42	ASPARAGINASUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
43	ASPARAGINASUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
44	ASPARAGINASUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
45	ASPARAGINASUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
46	ASPARAGINASUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
47	ASPARAGINASUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.2.

BICALUTAMIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	BICALUTAMIDUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO

Załącznik C.3.

BLEOMYCIN SULPHATE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	BLEOMYCIN SULPHATE	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	BLEOMYCIN SULPHATE	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	BLEOMYCIN SULPHATE	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	BLEOMYCIN SULPHATE	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	BLEOMYCIN SULPHATE	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	BLEOMYCIN SULPHATE	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	BLEOMYCIN SULPHATE	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	BLEOMYCIN SULPHATE	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	BLEOMYCIN SULPHATE	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	BLEOMYCIN SULPHATE	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	BLEOMYCIN SULPHATE	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	BLEOMYCIN SULPHATE	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	BLEOMYCIN SULPHATE	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	BLEOMYCIN SULPHATE	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	BLEOMYCIN SULPHATE	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	BLEOMYCIN SULPHATE	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	BLEOMYCIN SULPHATE	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	BLEOMYCIN SULPHATE	C05.2	JĘZYCZEK
33	BLEOMYCIN SULPHATE	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	BLEOMYCIN SULPHATE	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	BLEOMYCIN SULPHATE	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	BLEOMYCIN SULPHATE	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	BLEOMYCIN SULPHATE	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	BLEOMYCIN SULPHATE	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	BLEOMYCIN SULPHATE	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	BLEOMYCIN SULPHATE	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	BLEOMYCIN SULPHATE	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	BLEOMYCIN SULPHATE	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	BLEOMYCIN SULPHATE	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	BLEOMYCIN SULPHATE	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	BLEOMYCIN SULPHATE	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	BLEOMYCIN SULPHATE	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	BLEOMYCIN SULPHATE	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	BLEOMYCIN SULPHATE	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	BLEOMYCIN SULPHATE	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	BLEOMYCIN SULPHATE	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	BLEOMYCIN SULPHATE	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	BLEOMYCIN SULPHATE	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	BLEOMYCIN SULPHATE	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	BLEOMYCIN SULPHATE	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	BLEOMYCIN SULPHATE	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	BLEOMYCIN SULPHATE	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	BLEOMYCIN SULPHATE	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	BLEOMYCIN SULPHATE	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	BLEOMYCIN SULPHATE	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	BLEOMYCIN SULPHATE	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	BLEOMYCIN SULPHATE	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	BLEOMYCIN SULPHATE	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	BLEOMYCIN SULPHATE	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	BLEOMYCIN SULPHATE	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	BLEOMYCIN SULPHATE	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	BLEOMYCIN SULPHATE	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	BLEOMYCIN SULPHATE	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	BLEOMYCIN SULPHATE	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	BLEOMYCIN SULPHATE	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	BLEOMYCIN SULPHATE	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	BLEOMYCIN SULPHATE	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	BLEOMYCIN SULPHATE	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU
79	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
80	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
81	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
82	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
83	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
84	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
85	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
86	BLEOMYCIN SULPHATE	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
87	BLEOMYCIN SULPHATE	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
88	BLEOMYCIN SULPHATE	C38.0	SERCE
89	BLEOMYCIN SULPHATE	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
90	BLEOMYCIN SULPHATE	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
91	BLEOMYCIN SULPHATE	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
92	BLEOMYCIN SULPHATE	C38.4	OPLUCNA
93	BLEOMYCIN SULPHATE	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
94	BLEOMYCIN SULPHATE	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
95	BLEOMYCIN SULPHATE	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
96	BLEOMYCIN SULPHATE	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
97	BLEOMYCIN SULPHATE	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
98	BLEOMYCIN SULPHATE	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
99	BLEOMYCIN SULPHATE	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
100	BLEOMYCIN SULPHATE	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
101	BLEOMYCIN SULPHATE	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
102	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
103	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.1	ŻUCHWA
104	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
105	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
106	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
107	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
108	BLEOMYCIN SULPHATE	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
109	BLEOMYCIN SULPHATE	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
110	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
111	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
112	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
113	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
114	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
115	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
116	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
117	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
118	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
119	BLEOMYCIN SULPHATE	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
120	BLEOMYCIN SULPHATE	C44	INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
121	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.0	SKÓRA WARGI
122	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.1	SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
123	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.2	SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
124	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.3	SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
125	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.4	SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
126	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.5	SKÓRA TUŁOWIA
127	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.6	SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
128	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.7	SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
129	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
130	BLEOMYCIN SULPHATE	C44.9	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
131	BLEOMYCIN SULPHATE	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNIEJ
132	BLEOMYCIN SULPHATE	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	BLEOMYCIN SULPHATE	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
134	BLEOMYCIN SULPHATE	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
135	BLEOMYCIN SULPHATE	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
136	BLEOMYCIN SULPHATE	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
137	BLEOMYCIN SULPHATE	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
138	BLEOMYCIN SULPHATE	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
139	BLEOMYCIN SULPHATE	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
140	BLEOMYCIN SULPHATE	C51.2	ŁECHTACZKA
141	BLEOMYCIN SULPHATE	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
142	BLEOMYCIN SULPHATE	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
143	BLEOMYCIN SULPHATE	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
144	BLEOMYCIN SULPHATE	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
145	BLEOMYCIN SULPHATE	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
146	BLEOMYCIN SULPHATE	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
147	BLEOMYCIN SULPHATE	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
148	BLEOMYCIN SULPHATE	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
149	BLEOMYCIN SULPHATE	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
150	BLEOMYCIN SULPHATE	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
151	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
152	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
153	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
154	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.3	PRZYMATICZA
155	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
156	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.7	INNE OKRESŁONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
157	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
158	BLEOMYCIN SULPHATE	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
159	BLEOMYCIN SULPHATE	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
160	BLEOMYCIN SULPHATE	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
161	BLEOMYCIN SULPHATE	C60.0	NAPLETEK
162	BLEOMYCIN SULPHATE	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
163	BLEOMYCIN SULPHATE	C60.2	TRZON PRĄCIA
164	BLEOMYCIN SULPHATE	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
165	BLEOMYCIN SULPHATE	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
166	BLEOMYCIN SULPHATE	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
167	BLEOMYCIN SULPHATE	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
168	BLEOMYCIN SULPHATE	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
169	BLEOMYCIN SULPHATE	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
170	BLEOMYCIN SULPHATE	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
171	BLEOMYCIN SULPHATE	C63.0	NAJĄDRZE
172	BLEOMYCIN SULPHATE	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
173	BLEOMYCIN SULPHATE	C63.2	MOSZNA
174	BLEOMYCIN SULPHATE	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
175	BLEOMYCIN SULPHATE	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
176	BLEOMYCIN SULPHATE	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
177	BLEOMYCIN SULPHATE	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
178	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
179	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
180	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
181	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
182	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
183	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
184	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.6	MÓZDZEK
185	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.7	PIEŃ MÓZGU
186	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
187	BLEOMYCIN SULPHATE	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
188	BLEOMYCIN SULPHATE	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
189	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
190	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
191	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.2	BRZUCH
192	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.3	MIEDNICA
193	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
194	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
195	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
196	BLEOMYCIN SULPHATE	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
197	BLEOMYCIN SULPHATE	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
198	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
199	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
200	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
201	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
202	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
203	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
204	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
205	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
206	BLEOMYCIN SULPHATE	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
207	BLEOMYCIN SULPHATE	C81	CHOROBA HODGKINA
208	BLEOMYCIN SULPHATE	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
209	BLEOMYCIN SULPHATE	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
210	BLEOMYCIN SULPHATE	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
211	BLEOMYCIN SULPHATE	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
212	BLEOMYCIN SULPHATE	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
213	BLEOMYCIN SULPHATE	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
214	BLEOMYCIN SULPHATE	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
215	BLEOMYCIN SULPHATE	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
216	BLEOMYCIN SULPHATE	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
217	BLEOMYCIN SULPHATE	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
218	BLEOMYCIN SULPHATE	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
219	BLEOMYCIN SULPHATE	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
220	BLEOMYCIN SULPHATE	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
221	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
222	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
223	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
224	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.3	WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY)
225	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
226	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
227	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
228	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
229	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
230	BLEOMYCIN SULPHATE	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
231	BLEOMYCIN SULPHATE	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
232	BLEOMYCIN SULPHATE	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
233	BLEOMYCIN SULPHATE	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
234	BLEOMYCIN SULPHATE	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
235	BLEOMYCIN SULPHATE	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
236	BLEOMYCIN SULPHATE	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
237	BLEOMYCIN SULPHATE	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
238	BLEOMYCIN SULPHATE	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
239	BLEOMYCIN SULPHATE	C85.0	MIEŚAK LIMFATYCZNY
240	BLEOMYCIN SULPHATE	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
241	BLEOMYCIN SULPHATE	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
242	BLEOMYCIN SULPHATE	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
243	BLEOMYCIN SULPHATE	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
244	BLEOMYCIN SULPHATE	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
245	BLEOMYCIN SULPHATE	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
246	BLEOMYCIN SULPHATE	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
247	BLEOMYCIN SULPHATE	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
248	BLEOMYCIN SULPHATE	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
249	BLEOMYCIN SULPHATE	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
250	BLEOMYCIN SULPHATE	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
251	BLEOMYCIN SULPHATE	C90.0	SZPICZAK MNOGI
252	BLEOMYCIN SULPHATE	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
253	BLEOMYCIN SULPHATE	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
254	BLEOMYCIN SULPHATE	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
255	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
256	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
257	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
258	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
259	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
260	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
261	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
262	BLEOMYCIN SULPHATE	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
263	BLEOMYCIN SULPHATE	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
264	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
265	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
266	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
267	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
268	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
269	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
270	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
271	BLEOMYCIN SULPHATE	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
272	BLEOMYCIN SULPHATE	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
273	BLEOMYCIN SULPHATE	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
274	BLEOMYCIN SULPHATE	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
275	BLEOMYCIN SULPHATE	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
276	BLEOMYCIN SULPHATE	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
277	BLEOMYCIN SULPHATE	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
278	BLEOMYCIN SULPHATE	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
279	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
280	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
281	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
282	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
283	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
284	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
285	BLEOMYCIN SULPHATE	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
286	BLEOMYCIN SULPHATE	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
287	BLEOMYCIN SULPHATE	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
288	BLEOMYCIN SULPHATE	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
289	BLEOMYCIN SULPHATE	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
290	BLEOMYCIN SULPHATE	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
291	BLEOMYCIN SULPHATE	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
292	BLEOMYCIN SULPHATE	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
293	BLEOMYCIN SULPHATE	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
294	BLEOMYCIN SULPHATE	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
295	BLEOMYCIN SULPHATE	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
296	BLEOMYCIN SULPHATE	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
297	BLEOMYCIN SULPHATE	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
298	BLEOMYCIN SULPHATE	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
299	BLEOMYCIN SULPHATE	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
300	BLEOMYCIN SULPHATE	D03	CZERNIAK IN SITU
301	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
302	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
303	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
304	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
305	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
306	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
307	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
308	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
309	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
310	BLEOMYCIN SULPHATE	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
311	BLEOMYCIN SULPHATE	D39.1	JAJNIK
312	BLEOMYCIN SULPHATE	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
313	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
314	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
315	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
316	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
317	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.4	OTRZEWNA
318	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.5	SKÓRA
319	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.6	SUTEK
320	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
321	BLEOMYCIN SULPHATE	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
322	BLEOMYCIN SULPHATE	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
323	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
324	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
325	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
326	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
327	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
328	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
329	BLEOMYCIN SULPHATE	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.4.

BUSULFANUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	BUSULFANUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
2	BUSULFANUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
3	BUSULFANUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
4	BUSULFANUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
5	BUSULFANUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
6	BUSULFANUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
7	BUSULFANUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
8	BUSULFANUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
9	BUSULFANUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
10	BUSULFANUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
11	BUSULFANUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
12	BUSULFANUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
13	BUSULFANUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
14	BUSULFANUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
15	BUSULFANUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
16	BUSULFANUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
17	BUSULFANUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
18	BUSULFANUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
19	BUSULFANUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
20	BUSULFANUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
21	BUSULFANUM	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
22	BUSULFANUM	D75.2	NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA

Załącznik C.5.

CAPECITABINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CAPECITABINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
2	CAPECITABINUM	C16.0	WPUST
3	CAPECITABINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
4	CAPECITABINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
5	CAPECITABINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
6	CAPECITABINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
7	CAPECITABINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
8	CAPECITABINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
9	CAPECITABINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
10	CAPECITABINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
11	CAPECITABINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
12	CAPECITABINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
13	CAPECITABINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
14	CAPECITABINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
15	CAPECITABINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
16	CAPECITABINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
17	CAPECITABINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
18	CAPECITABINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
19	CAPECITABINUM	C18.7	ESICA
20	CAPECITABINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
21	CAPECITABINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
22	CAPECITABINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
23	CAPECITABINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	CAPECITABINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
25	CAPECITABINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
26	CAPECITABINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
27	CAPECITABINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
28	CAPECITABINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
29	CAPECITABINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
30	CAPECITABINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
31	CAPECITABINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
32	CAPECITABINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
33	CAPECITABINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.6.

CARBOPLATINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CARBOPLATINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	CARBOPLATINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	CARBOPLATINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	CARBOPLATINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	CARBOPLATINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	CARBOPLATINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	CARBOPLATINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	CARBOPLATINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	CARBOPLATINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	CARBOPLATINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	CARBOPLATINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	CARBOPLATINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	CARBOPLATINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	CARBOPLATINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	CARBOPLATINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	CARBOPLATINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	CARBOPLATINUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	CARBOPLATINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	CARBOPLATINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	CARBOPLATINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	CARBOPLATINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	CARBOPLATINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	CARBOPLATINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	CARBOPLATINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	CARBOPLATINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	CARBOPLATINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	CARBOPLATINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	CARBOPLATINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	CARBOPLATINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	CARBOPLATINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	CARBOPLATINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	CARBOPLATINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	CARBOPLATINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	CARBOPLATINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	CARBOPLATINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	CARBOPLATINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	CARBOPLATINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	CARBOPLATINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	CARBOPLATINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	CARBOPLATINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	CARBOPLATINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	CARBOPLATINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	CARBOPLATINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	CARBOPLATINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	CARBOPLATINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	CARBOPLATINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	CARBOPLATINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	CARBOPLATINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	CARBOPLATINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	CARBOPLATINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	CARBOPLATINUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	CARBOPLATINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	CARBOPLATINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	CARBOPLATINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	CARBOPLATINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	CARBOPLATINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	CARBOPLATINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	CARBOPLATINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	CARBOPLATINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	CARBOPLATINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	CARBOPLATINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	CARBOPLATINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	CARBOPLATINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	CARBOPLATINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	CARBOPLATINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	CARBOPLATINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	CARBOPLATINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	CARBOPLATINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	CARBOPLATINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	CARBOPLATINUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	CARBOPLATINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	CARBOPLATINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	CARBOPLATINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	CARBOPLATINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	CARBOPLATINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	CARBOPLATINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	CARBOPLATINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	CARBOPLATINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79	CARBOPLATINUM	C16.0	WPUST
80	CARBOPLATINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81	CARBOPLATINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82	CARBOPLATINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83	CARBOPLATINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84	CARBOPLATINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85	CARBOPLATINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86	CARBOPLATINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87	CARBOPLATINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88	CARBOPLATINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89	CARBOPLATINUM	C17.0	DWUNASTNICA
90	CARBOPLATINUM	C17.1	JELITO CZCZE
91	CARBOPLATINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92	CARBOPLATINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93	CARBOPLATINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94	CARBOPLATINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95	CARBOPLATINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96	CARBOPLATINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97	CARBOPLATINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98	CARBOPLATINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99	CARBOPLATINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100	CARBOPLATINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101	CARBOPLATINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
102	CARBOPLATINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103	CARBOPLATINUM	C18.7	ESICA
104	CARBOPLATINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105	CARBOPLATINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	CARBOPLATINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107	CARBOPLATINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108	CARBOPLATINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109	CARBOPLATINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110	CARBOPLATINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111	CARBOPLATINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112	CARBOPLATINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113	CARBOPLATINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114	CARBOPLATINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115	CARBOPLATINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116	CARBOPLATINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117	CARBOPLATINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118	CARBOPLATINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119	CARBOPLATINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120	CARBOPLATINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121	CARBOPLATINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122	CARBOPLATINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123	CARBOPLATINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124	CARBOPLATINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125	CARBOPLATINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126	CARBOPLATINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127	CARBOPLATINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
128	CARBOPLATINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129	CARBOPLATINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130	CARBOPLATINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131	CARBOPLATINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132	CARBOPLATINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	CARBOPLATINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134	CARBOPLATINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135	CARBOPLATINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136	CARBOPLATINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137	CARBOPLATINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138	CARBOPLATINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139	CARBOPLATINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140	CARBOPLATINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141	CARBOPLATINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142	CARBOPLATINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143	CARBOPLATINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144	CARBOPLATINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145	CARBOPLATINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146	CARBOPLATINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147	CARBOPLATINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148	CARBOPLATINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149	CARBOPLATINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150	CARBOPLATINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151	CARBOPLATINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
152	CARBOPLATINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
153	CARBOPLATINUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
154	CARBOPLATINUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
155	CARBOPLATINUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
156	CARBOPLATINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
157	CARBOPLATINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
158	CARBOPLATINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
159	CARBOPLATINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
160	CARBOPLATINUM	C38.0	SERCE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
161	CARBOPLATINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
162	CARBOPLATINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
163	CARBOPLATINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
164	CARBOPLATINUM	C38.4	OPLUCNA
165	CARBOPLATINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
166	CARBOPLATINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
167	CARBOPLATINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
168	CARBOPLATINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
169	CARBOPLATINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBREMBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
170	CARBOPLATINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
171	CARBOPLATINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYN Y GÓRNEJ
172	CARBOPLATINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYN Y GÓRNEJ
173	CARBOPLATINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYN Y DOLNEJ
174	CARBOPLATINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYN Y DOLNEJ
175	CARBOPLATINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
176	CARBOPLATINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
177	CARBOPLATINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
178	CARBOPLATINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
179	CARBOPLATINUM	C41.1	ŻUCHWA
180	CARBOPLATINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
181	CARBOPLATINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
182	CARBOPLATINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
183	CARBOPLATINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
184	CARBOPLATINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
185	CARBOPLATINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
186	CARBOPLATINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
187	CARBOPLATINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
188	CARBOPLATINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
189	CARBOPLATINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
190	CARBOPLATINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
191	CARBOPLATINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
192	CARBOPLATINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
193	CARBOPLATINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
194	CARBOPLATINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
195	CARBOPLATINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
196	CARBOPLATINUM	C45	MIĘDZYBŁONIAK
197	CARBOPLATINUM	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
198	CARBOPLATINUM	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
199	CARBOPLATINUM	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
200	CARBOPLATINUM	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
201	CARBOPLATINUM	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
202	CARBOPLATINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
203	CARBOPLATINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
204	CARBOPLATINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
205	CARBOPLATINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
206	CARBOPLATINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
207	CARBOPLATINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
208	CARBOPLATINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
209	CARBOPLATINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
210	CARBOPLATINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
211	CARBOPLATINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
212	CARBOPLATINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
213	CARBOPLATINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
214	CARBOPLATINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
215	CARBOPLATINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
216	CARBOPLATINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
217	CARBOPLATINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
218	CARBOPLATINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
219	CARBOPLATINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
220	CARBOPLATINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
221	CARBOPLATINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
222	CARBOPLATINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
223	CARBOPLATINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
224	CARBOPLATINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
225	CARBOPLATINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
226	CARBOPLATINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
227	CARBOPLATINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
228	CARBOPLATINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
229	CARBOPLATINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
230	CARBOPLATINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
231	CARBOPLATINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
232	CARBOPLATINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
233	CARBOPLATINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
234	CARBOPLATINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
235	CARBOPLATINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
236	CARBOPLATINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
237	CARBOPLATINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
238	CARBOPLATINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
239	CARBOPLATINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
240	CARBOPLATINUM	C51.2	ŁECHTACZKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
241	CARBOPLATINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
242	CARBOPLATINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
243	CARBOPLATINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
244	CARBOPLATINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
245	CARBOPLATINUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
246	CARBOPLATINUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
247	CARBOPLATINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
248	CARBOPLATINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
249	CARBOPLATINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
250	CARBOPLATINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
251	CARBOPLATINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
252	CARBOPLATINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
253	CARBOPLATINUM	C54.3	DNO MACICY
254	CARBOPLATINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
255	CARBOPLATINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
256	CARBOPLATINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
257	CARBOPLATINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
258	CARBOPLATINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
259	CARBOPLATINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
260	CARBOPLATINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
261	CARBOPLATINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
262	CARBOPLATINUM	C57.3	PRZYMATICZA
263	CARBOPLATINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
264	CARBOPLATINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
265	CARBOPLATINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
266	CARBOPLATINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
267	CARBOPLATINUM	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
268	CARBOPLATINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
269	CARBOPLATINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
270	CARBOPLATINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
271	CARBOPLATINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
272	CARBOPLATINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
273	CARBOPLATINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
274	CARBOPLATINUM	C63.0	NAJĄDRZE
275	CARBOPLATINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
276	CARBOPLATINUM	C63.2	MOSZNA
277	CARBOPLATINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
278	CARBOPLATINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
279	CARBOPLATINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
280	CARBOPLATINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
281	CARBOPLATINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
282	CARBOPLATINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
283	CARBOPLATINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
284	CARBOPLATINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
285	CARBOPLATINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
286	CARBOPLATINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
287	CARBOPLATINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
288	CARBOPLATINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
289	CARBOPLATINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
290	CARBOPLATINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
291	CARBOPLATINUM	C67.7	MOCZOWNIK
292	CARBOPLATINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
293	CARBOPLATINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
294	CARBOPLATINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
295	CARBOPLATINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
296	CARBOPLATINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
297	CARBOPLATINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
298	CARBOPLATINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
299	CARBOPLATINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
300	CARBOPLATINUM	C69.0	SPOJÓWKA
301	CARBOPLATINUM	C69.1	ROGÓWKA
302	CARBOPLATINUM	C69.2	SIATKÓWKA
303	CARBOPLATINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
304	CARBOPLATINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
305	CARBOPLATINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
306	CARBOPLATINUM	C69.6	OCZODÓŁ
307	CARBOPLATINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
308	CARBOPLATINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
309	CARBOPLATINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
310	CARBOPLATINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
311	CARBOPLATINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
312	CARBOPLATINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
313	CARBOPLATINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
314	CARBOPLATINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
315	CARBOPLATINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
316	CARBOPLATINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
317	CARBOPLATINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
318	CARBOPLATINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
319	CARBOPLATINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
320	CARBOPLATINUM	C71.6	MÓZDŻEK
321	CARBOPLATINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
322	CARBOPLATINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
323	CARBOPLATINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
324	CARBOPLATINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
325	CARBOPLATINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
326	CARBOPLATINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
327	CARBOPLATINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
328	CARBOPLATINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
329	CARBOPLATINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
330	CARBOPLATINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
331	CARBOPLATINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
332	CARBOPLATINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
333	CARBOPLATINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
334	CARBOPLATINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
335	CARBOPLATINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
336	CARBOPLATINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
337	CARBOPLATINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
338	CARBOPLATINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
339	CARBOPLATINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
340	CARBOPLATINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
341	CARBOPLATINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
342	CARBOPLATINUM	C75.3	SZYSZYŃKA
343	CARBOPLATINUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
344	CARBOPLATINUM	C75.5	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
345	CARBOPLATINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
346	CARBOPLATINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
347	CARBOPLATINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
348	CARBOPLATINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
349	CARBOPLATINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
350	CARBOPLATINUM	C76.2	BRZUCH
351	CARBOPLATINUM	C76.3	MIEDNICA
352	CARBOPLATINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
353	CARBOPLATINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
354	CARBOPLATINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
355	CARBOPLATINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
356	CARBOPLATINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
357	CARBOPLATINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
358	CARBOPLATINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
359	CARBOPLATINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
360	CARBOPLATINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
361	CARBOPLATINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
362	CARBOPLATINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
363	CARBOPLATINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
364	CARBOPLATINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
365	CARBOPLATINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
366	CARBOPLATINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
367	CARBOPLATINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
368	CARBOPLATINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
369	CARBOPLATINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
370	CARBOPLATINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
371	CARBOPLATINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
372	CARBOPLATINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
373	CARBOPLATINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
374	CARBOPLATINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
375	CARBOPLATINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
376	CARBOPLATINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
377	CARBOPLATINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
378	CARBOPLATINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
379	CARBOPLATINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
380	CARBOPLATINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
381	CARBOPLATINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
382	CARBOPLATINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
383	CARBOPLATINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
384	CARBOPLATINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
385	CARBOPLATINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
386	CARBOPLATINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
387	CARBOPLATINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
388	CARBOPLATINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
389	CARBOPLATINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
390	CARBOPLATINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
391	CARBOPLATINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
392	CARBOPLATINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
393	CARBOPLATINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
394	CARBOPLATINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
395	CARBOPLATINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
396	CARBOPLATINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
397	CARBOPLATINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
398	CARBOPLATINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
399	CARBOPLATINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
400	CARBOPLATINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
401	CARBOPLATINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
402	CARBOPLATINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
403	CARBOPLATINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
404	CARBOPLATINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
405	CARBOPLATINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
406	CARBOPLATINUM	C83.6	NIEZRÓZNICOWANY (ROZLANY)
407	CARBOPLATINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
408	CARBOPLATINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
409	CARBOPLATINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
410	CARBOPLATINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
411	CARBOPLATINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
412	CARBOPLATINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
413	CARBOPLATINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
414	CARBOPLATINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
415	CARBOPLATINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
416	CARBOPLATINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
417	CARBOPLATINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
418	CARBOPLATINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
419	CARBOPLATINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
420	CARBOPLATINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
421	CARBOPLATINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
422	CARBOPLATINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
423	CARBOPLATINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
424	CARBOPLATINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
425	CARBOPLATINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
426	CARBOPLATINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
427	CARBOPLATINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
428	CARBOPLATINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
429	CARBOPLATINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
430	CARBOPLATINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
431	CARBOPLATINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
432	CARBOPLATINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
433	CARBOPLATINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
434	CARBOPLATINUM	C91.0	OŚTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
435	CARBOPLATINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
436	CARBOPLATINUM	C91.2	PODOŚTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
437	CARBOPLATINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
438	CARBOPLATINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
439	CARBOPLATINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
440	CARBOPLATINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
441	CARBOPLATINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
442	CARBOPLATINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
443	CARBOPLATINUM	C92.0	OŚTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
444	CARBOPLATINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
445	CARBOPLATINUM	C92.2	PODOŚTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
446	CARBOPLATINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
447	CARBOPLATINUM	C92.4	OŚTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
448	CARBOPLATINUM	C92.5	OŚTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
449	CARBOPLATINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
450	CARBOPLATINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
451	CARBOPLATINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
452	CARBOPLATINUM	C93.0	OŚTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
453	CARBOPLATINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
454	CARBOPLATINUM	C93.2	PODOŚTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
455	CARBOPLATINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
456	CARBOPLATINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
457	CARBOPLATINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
458	CARBOPLATINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
459	CARBOPLATINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
460	CARBOPLATINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
461	CARBOPLATINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
462	CARBOPLATINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
463	CARBOPLATINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
464	CARBOPLATINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
465	CARBOPLATINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
466	CARBOPLATINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
467	CARBOPLATINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
468	CARBOPLATINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
469	CARBOPLATINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
470	CARBOPLATINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
471	CARBOPLATINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
472	CARBOPLATINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
473	CARBOPLATINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
474	CARBOPLATINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
475	CARBOPLATINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
476	CARBOPLATINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
477	CARBOPLATINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
478	CARBOPLATINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
479	CARBOPLATINUM	D00.2	ŻOŁĄDEK
480	CARBOPLATINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
481	CARBOPLATINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
482	CARBOPLATINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
483	CARBOPLATINUM	D01.2	ODBYTNICA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
484	CARBOPLATINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
485	CARBOPLATINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
486	CARBOPLATINUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
487	CARBOPLATINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
488	CARBOPLATINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
489	CARBOPLATINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
490	CARBOPLATINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
491	CARBOPLATINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
492	CARBOPLATINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
493	CARBOPLATINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
494	CARBOPLATINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
495	CARBOPLATINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
496	CARBOPLATINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
497	CARBOPLATINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
498	CARBOPLATINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
499	CARBOPLATINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
500	CARBOPLATINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
501	CARBOPLATINUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
502	CARBOPLATINUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
503	CARBOPLATINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
504	CARBOPLATINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
505	CARBOPLATINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
506	CARBOPLATINUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
507	CARBOPLATINUM	D07.1	SROM
508	CARBOPLATINUM	D07.2	POCHWA
509	CARBOPLATINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
510	CARBOPLATINUM	D07.4	PRĄCIE
511	CARBOPLATINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
512	CARBOPLATINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
513	CARBOPLATINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
514	CARBOPLATINUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
515	CARBOPLATINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
516	CARBOPLATINUM	D09.2	OKO
517	CARBOPLATINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
518	CARBOPLATINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
519	CARBOPLATINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
520	CARBOPLATINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
521	CARBOPLATINUM	D10.0	WARGA
522	CARBOPLATINUM	D10.1	JĘZYK
523	CARBOPLATINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
524	CARBOPLATINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
525	CARBOPLATINUM	D10.4	MIGDAŁEK
526	CARBOPLATINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
527	CARBOPLATINUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
528	CARBOPLATINUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
529	CARBOPLATINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
530	CARBOPLATINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
531	CARBOPLATINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
532	CARBOPLATINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
533	CARBOPLATINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
534	CARBOPLATINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
535	CARBOPLATINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
536	CARBOPLATINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
537	CARBOPLATINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
538	CARBOPLATINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
539	CARBOPLATINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
540	CARBOPLATINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
541	CARBOPLATINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
542	CARBOPLATINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
543	CARBOPLATINUM	D12.8	ODBYTNICA
544	CARBOPLATINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
545	CARBOPLATINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
546	CARBOPLATINUM	D13.0	PRZĘLYK
547	CARBOPLATINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
548	CARBOPLATINUM	D13.2	DWUNASTNICA
549	CARBOPLATINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
550	CARBOPLATINUM	D13.4	WĄTROBA
551	CARBOPLATINUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
552	CARBOPLATINUM	D13.6	TRZUSTKA
553	CARBOPLATINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
554	CARBOPLATINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
555	CARBOPLATINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
556	CARBOPLATINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
557	CARBOPLATINUM	D14.1	KRTAŃ
558	CARBOPLATINUM	D14.2	TCHAWICA
559	CARBOPLATINUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
560	CARBOPLATINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
561	CARBOPLATINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
562	CARBOPLATINUM	D15.0	GRASICA
563	CARBOPLATINUM	D15.1	SERCE
564	CARBOPLATINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
565	CARBOPLATINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
566	CARBOPLATINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
567	CARBOPLATINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
568	CARBOPLATINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
569	CARBOPLATINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
570	CARBOPLATINUM	D16.2	KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
571	CARBOPLATINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
572	CARBOPLATINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
573	CARBOPLATINUM	D16.5	ŻUCHWA
574	CARBOPLATINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
575	CARBOPLATINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
576	CARBOPLATINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
577	CARBOPLATINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
578	CARBOPLATINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
579	CARBOPLATINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
580	CARBOPLATINUM	D20.1	OTRZEWNA
581	CARBOPLATINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
582	CARBOPLATINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
583	CARBOPLATINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
584	CARBOPLATINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
585	CARBOPLATINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
586	CARBOPLATINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
587	CARBOPLATINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
588	CARBOPLATINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
589	CARBOPLATINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
590	CARBOPLATINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
591	CARBOPLATINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
592	CARBOPLATINUM	D28.0	SROM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
593	CARBOPLATINUM	D28.1	POCHWA
594	CARBOPLATINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
595	CARBOPLATINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
596	CARBOPLATINUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
597	CARBOPLATINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
598	CARBOPLATINUM	D29.0	PRĄCIE
599	CARBOPLATINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
600	CARBOPLATINUM	D29.2	JĄDRO
601	CARBOPLATINUM	D29.3	NAJĄDRZE
602	CARBOPLATINUM	D29.4	MOSZNA
603	CARBOPLATINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
604	CARBOPLATINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
605	CARBOPLATINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
606	CARBOPLATINUM	D30.0	NERKA
607	CARBOPLATINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
608	CARBOPLATINUM	D30.2	MOCZOWÓD
609	CARBOPLATINUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
610	CARBOPLATINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
611	CARBOPLATINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
612	CARBOPLATINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
613	CARBOPLATINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
614	CARBOPLATINUM	D31.0	SPOJÓWKA
615	CARBOPLATINUM	D31.1	ROGÓWKA
616	CARBOPLATINUM	D31.2	SIATKÓWKA
617	CARBOPLATINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
618	CARBOPLATINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
619	CARBOPLATINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
620	CARBOPLATINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
621	CARBOPLATINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
622	CARBOPLATINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
623	CARBOPLATINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
624	CARBOPLATINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
625	CARBOPLATINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
626	CARBOPLATINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
627	CARBOPLATINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMBIOTOWE
628	CARBOPLATINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMBIOTOWE
629	CARBOPLATINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
630	CARBOPLATINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
631	CARBOPLATINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
632	CARBOPLATINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
633	CARBOPLATINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
634	CARBOPLATINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
635	CARBOPLATINUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
636	CARBOPLATINUM	D35.0	NADNERCZA
637	CARBOPLATINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
638	CARBOPLATINUM	D35.2	PRZYSADKA
639	CARBOPLATINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
640	CARBOPLATINUM	D35.4	SZYSZYŃKA
641	CARBOPLATINUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
642	CARBOPLATINUM	D35.6	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
643	CARBOPLATINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
644	CARBOPLATINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
645	CARBOPLATINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
646	CARBOPLATINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
647	CARBOPLATINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
648	CARBOPLATINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
649	CARBOPLATINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
650	CARBOPLATINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
651	CARBOPLATINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
652	CARBOPLATINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
653	CARBOPLATINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
654	CARBOPLATINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
655	CARBOPLATINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
656	CARBOPLATINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
657	CARBOPLATINUM	D37.5	ODBYTNICA
658	CARBOPLATINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
659	CARBOPLATINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
660	CARBOPLATINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
661	CARBOPLATINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
662	CARBOPLATINUM	D38.0	KRTAŃ
663	CARBOPLATINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
664	CARBOPLATINUM	D38.2	OPLUCNA
665	CARBOPLATINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
666	CARBOPLATINUM	D38.4	GRASICA
667	CARBOPLATINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
668	CARBOPLATINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
669	CARBOPLATINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
670	CARBOPLATINUM	D39.0	MACICA
671	CARBOPLATINUM	D39.1	JAJNIK
672	CARBOPLATINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
673	CARBOPLATINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
674	CARBOPLATINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
675	CARBOPLATINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
676	CARBOPLATINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
677	CARBOPLATINUM	D40.1	JĄDRO
678	CARBOPLATINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
679	CARBOPLATINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
680	CARBOPLATINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
681	CARBOPLATINUM	D41.0	NERKA
682	CARBOPLATINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
683	CARBOPLATINUM	D41.2	MOCZOWÓD
684	CARBOPLATINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
685	CARBOPLATINUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY
686	CARBOPLATINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
687	CARBOPLATINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
688	CARBOPLATINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
689	CARBOPLATINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
690	CARBOPLATINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
691	CARBOPLATINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
692	CARBOPLATINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
693	CARBOPLATINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIAOTOWE
694	CARBOPLATINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIAOTOWE
695	CARBOPLATINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
696	CARBOPLATINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
697	CARBOPLATINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
698	CARBOPLATINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
699	CARBOPLATINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
700	CARBOPLATINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
701	CARBOPLATINUM	D44.0	TARCZYCA
702	CARBOPLATINUM	D44.1	NADNERCZA
703	CARBOPLATINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
704	CARBOPLATINUM	D44.3	PRZYSADKA
705	CARBOPLATINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
706	CARBOPLATINUM	D44.5	SZYSZYNKA
707	CARBOPLATINUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
708	CARBOPLATINUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
709	CARBOPLATINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
710	CARBOPLATINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
711	CARBOPLATINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
712	CARBOPLATINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
713	CARBOPLATINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
714	CARBOPLATINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
715	CARBOPLATINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
716	CARBOPLATINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
717	CARBOPLATINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
718	CARBOPLATINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
719	CARBOPLATINUM	D48.4	OTRZEWNA
720	CARBOPLATINUM	D48.5	SKÓRA
721	CARBOPLATINUM	D48.6	SUTEK
722	CARBOPLATINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
723	CARBOPLATINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
724	CARBOPLATINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
725	CARBOPLATINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
726	CARBOPLATINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
727	CARBOPLATINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
728	CARBOPLATINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
729	CARBOPLATINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
730	CARBOPLATINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
731	CARBOPLATINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
732	CARBOPLATINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
733	CARBOPLATINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.8.

CHLORAMBUCILUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CHLORAMBUCILUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
2	CHLORAMBUCILUM	C81	CHOROBA HODGKINA
3	CHLORAMBUCILUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
4	CHLORAMBUCILUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
5	CHLORAMBUCILUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
6	CHLORAMBUCILUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
7	CHLORAMBUCILUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
8	CHLORAMBUCILUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
9	CHLORAMBUCILUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
10	CHLORAMBUCILUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
11	CHLORAMBUCILUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
12	CHLORAMBUCILUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
13	CHLORAMBUCILUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
14	CHLORAMBUCILUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
15	CHLORAMBUCILUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
16	CHLORAMBUCILUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
17	CHLORAMBUCILUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
18	CHLORAMBUCILUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
19	CHLORAMBUCILUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
20	CHLORAMBUCILUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
21	CHLORAMBUCILUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
22	CHLORAMBUCILUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
23	CHLORAMBUCILUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
24	CHLORAMBUCILUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
25	CHLORAMBUCILUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
26	CHLORAMBUCILUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
27	CHLORAMBUCILUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
28	CHLORAMBUCILUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
29	CHLORAMBUCILUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
30	CHLORAMBUCILUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
31	CHLORAMBUCILUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
32	CHLORAMBUCILUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
33	CHLORAMBUCILUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
34	CHLORAMBUCILUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
35	CHLORAMBUCILUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
36	CHLORAMBUCILUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
37	CHLORAMBUCILUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
38	CHLORAMBUCILUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
39	CHLORAMBUCILUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
40	CHLORAMBUCILUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
41	CHLORAMBUCILUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
42	CHLORAMBUCILUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
43	CHLORAMBUCILUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
44	CHLORAMBUCILUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
45	CHLORAMBUCILUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
46	CHLORAMBUCILUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
47	CHLORAMBUCILUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.10.

CICLOSPORINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CICLOSPORINUM	D61	INNE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE
2	CICLOSPORINUM	D61.0	NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA KONSTYTUCJONALNA
3	CICLOSPORINUM	D61.1	NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA WYWOŁANA LEKAMI
4	CICLOSPORINUM	D61.2	NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA SPOWODOANA INNYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
5	CICLOSPORINUM	D61.3	NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA IDIOPATYCZNA
6	CICLOSPORINUM	D61.8	INNE OKREŚLONE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE
7	CICLOSPORINUM	D61.9	NIEOKRESLONA NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA
8	CICLOSPORINUM	D76	NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO
9	CICLOSPORINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
10	CICLOSPORINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
11	CICLOSPORINUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
12	CICLOSPORINUM	D76.3	INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE
13	CICLOSPORINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
14	CICLOSPORINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
15	CICLOSPORINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
16	CICLOSPORINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ

Załącznik C.11.

CISPLATINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CISPLATINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	CISPLATINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	CISPLATINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	CISPLATINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	CISPLATINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	CISPLATINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	CISPLATINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	CISPLATINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	CISPLATINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	CISPLATINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	CISPLATINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	CISPLATINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	CISPLATINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	CISPLATINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	CISPLATINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	CISPLATINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	CISPLATINUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	CISPLATINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	CISPLATINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	CISPLATINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	CISPLATINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	CISPLATINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	CISPLATINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	CISPLATINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	CISPLATINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	CISPLATINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	CISPLATINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	CISPLATINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	CISPLATINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	CISPLATINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	CISPLATINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	CISPLATINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	CISPLATINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	CISPLATINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	CISPLATINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	CISPLATINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	CISPLATINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	CISPLATINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	CISPLATINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	CISPLATINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	CISPLATINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	CISPLATINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	CISPLATINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	CISPLATINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	CISPLATINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	CISPLATINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	CISPLATINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	CISPLATINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	CISPLATINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	CISPLATINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	CISPLATINUM	C09.9	MIGDALEK, NIEOKREŚLONY
52	CISPLATINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	CISPLATINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	CISPLATINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	CISPLATINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	CISPLATINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	CISPLATINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZELOWA
58	CISPLATINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	CISPLATINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	CISPLATINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	CISPLATINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	CISPLATINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	CISPLATINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	CISPLATINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	CISPLATINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	CISPLATINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	CISPLATINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	CISPLATINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	CISPLATINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	CISPLATINUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	CISPLATINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	CISPLATINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	CISPLATINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	CISPLATINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	CISPLATINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	CISPLATINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHLONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	CISPLATINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
78	CISPLATINUM	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
79	CISPLATINUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
80	CISPLATINUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
81	CISPLATINUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
82	CISPLATINUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
83	CISPLATINUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
84	CISPLATINUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
85	CISPLATINUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
86	CISPLATINUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
87	CISPLATINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
88	CISPLATINUM	C16.0	WPUST
89	CISPLATINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
90	CISPLATINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
91	CISPLATINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
92	CISPLATINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
93	CISPLATINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
94	CISPLATINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
95	CISPLATINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
96	CISPLATINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
97	CISPLATINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
98	CISPLATINUM	C17.0	DWUNASTNICA
99	CISPLATINUM	C17.1	JELITO CZCZE
100	CISPLATINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
101	CISPLATINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
102	CISPLATINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
103	CISPLATINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
104	CISPLATINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
105	CISPLATINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
106	CISPLATINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
107	CISPLATINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
108	CISPLATINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
109	CISPLATINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
110	CISPLATINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
111	CISPLATINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
112	CISPLATINUM	C18.7	ESICA
113	CISPLATINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
114	CISPLATINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
115	CISPLATINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
116	CISPLATINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
117	CISPLATINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
118	CISPLATINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
119	CISPLATINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
120	CISPLATINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
121	CISPLATINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
122	CISPLATINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
123	CISPLATINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
124	CISPLATINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
125	CISPLATINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
126	CISPLATINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
127	CISPLATINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
128	CISPLATINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
129	CISPLATINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
130	CISPLATINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
131	CISPLATINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
132	CISPLATINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
133	CISPLATINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
134	CISPLATINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
135	CISPLATINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
136	CISPLATINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
137	CISPLATINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
138	CISPLATINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
139	CISPLATINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
140	CISPLATINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
141	CISPLATINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
142	CISPLATINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
143	CISPLATINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
144	CISPLATINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
145	CISPLATINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
146	CISPLATINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
147	CISPLATINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
148	CISPLATINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
149	CISPLATINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
150	CISPLATINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
151	CISPLATINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
152	CISPLATINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
153	CISPLATINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
154	CISPLATINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
155	CISPLATINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
156	CISPLATINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
157	CISPLATINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
158	CISPLATINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
159	CISPLATINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
160	CISPLATINUM	C32	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI
161	CISPLATINUM	C32.0	GŁOŚNIA
162	CISPLATINUM	C32.1	NAGŁOŚNIA
163	CISPLATINUM	C32.2	JAMA PODGŁOŚNIOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
164	CISPLATINUM	C32.3	CHRZĄSTKI KRTANI
165	CISPLATINUM	C32.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI
166	CISPLATINUM	C32.9	KRTAŃ, NIEOKREŚLONA
167	CISPLATINUM	C33	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
168	CISPLATINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
169	CISPLATINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
170	CISPLATINUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
171	CISPLATINUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
172	CISPLATINUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
173	CISPLATINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
174	CISPLATINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
175	CISPLATINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
176	CISPLATINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
177	CISPLATINUM	C38.0	SERCE
178	CISPLATINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
179	CISPLATINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
180	CISPLATINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
181	CISPLATINUM	C38.4	OPLUCNA
182	CISPLATINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
183	CISPLATINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
184	CISPLATINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
185	CISPLATINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
186	CISPLATINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
187	CISPLATINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
188	CISPLATINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
189	CISPLATINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
190	CISPLATINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
191	CISPLATINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
192	CISPLATINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
193	CISPLATINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
194	CISPLATINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
195	CISPLATINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
196	CISPLATINUM	C41.1	ŻUCHWA
197	CISPLATINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
198	CISPLATINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
199	CISPLATINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
200	CISPLATINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
201	CISPLATINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
202	CISPLATINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
203	CISPLATINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
204	CISPLATINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
205	CISPLATINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
206	CISPLATINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
207	CISPLATINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
208	CISPLATINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
209	CISPLATINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
210	CISPLATINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
211	CISPLATINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
212	CISPLATINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
213	CISPLATINUM	C44	INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
214	CISPLATINUM	C44.0	SKÓRA WARGI
215	CISPLATINUM	C44.1	SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
216	CISPLATINUM	C44.2	SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
217	CISPLATINUM	C44.3	SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
218	CISPLATINUM	C44.4	SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
219	CISPLATINUM	C44.5	SKÓRA TUŁOWIA
220	CISPLATINUM	C44.6	SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
221	CISPLATINUM	C44.7	SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
222	CISPLATINUM	C44.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
223	CISPLATINUM	C44.9	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
224	CISPLATINUM	C45	MIĘDZYBŁONIAK
225	CISPLATINUM	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
226	CISPLATINUM	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
227	CISPLATINUM	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
228	CISPLATINUM	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
229	CISPLATINUM	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
230	CISPLATINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
231	CISPLATINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
232	CISPLATINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
233	CISPLATINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
234	CISPLATINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
235	CISPLATINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
236	CISPLATINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
237	CISPLATINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
238	CISPLATINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
239	CISPLATINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
240	CISPLATINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
241	CISPLATINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
242	CISPLATINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
243	CISPLATINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
244	CISPLATINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
245	CISPLATINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
246	CISPLATINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
247	CISPLATINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
248	CISPLATINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
249	CISPLATINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
250	CISPLATINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
251	CISPLATINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
252	CISPLATINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
253	CISPLATINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
254	CISPLATINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
255	CISPLATINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
256	CISPLATINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
257	CISPLATINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
258	CISPLATINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
259	CISPLATINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
260	CISPLATINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
261	CISPLATINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
262	CISPLATINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
263	CISPLATINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
264	CISPLATINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
265	CISPLATINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
266	CISPLATINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
267	CISPLATINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
268	CISPLATINUM	C51.2	ŁECHTACZKA
269	CISPLATINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
270	CISPLATINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
271	CISPLATINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
272	CISPLATINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
273	CISPLATINUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
274	CISPLATINUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
275	CISPLATINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
276	CISPLATINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
277	CISPLATINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
278	CISPLATINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
279	CISPLATINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
280	CISPLATINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
281	CISPLATINUM	C54.3	DNO MACICY
282	CISPLATINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
283	CISPLATINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
284	CISPLATINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
285	CISPLATINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
286	CISPLATINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
287	CISPLATINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
288	CISPLATINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
289	CISPLATINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
290	CISPLATINUM	C57.3	PRZYMATICZA
291	CISPLATINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
292	CISPLATINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
293	CISPLATINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
294	CISPLATINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
295	CISPLATINUM	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
296	CISPLATINUM	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
297	CISPLATINUM	C60.0	NAPLETEK
298	CISPLATINUM	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
299	CISPLATINUM	C60.2	TRZON PRĄCIA
300	CISPLATINUM	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
301	CISPLATINUM	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
302	CISPLATINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
303	CISPLATINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
304	CISPLATINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
305	CISPLATINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
306	CISPLATINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
307	CISPLATINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
308	CISPLATINUM	C63.0	NAJĄDRZE
309	CISPLATINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
310	CISPLATINUM	C63.2	MOSZNA
311	CISPLATINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
312	CISPLATINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
313	CISPLATINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
314	CISPLATINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
315	CISPLATINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
316	CISPLATINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
317	CISPLATINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
318	CISPLATINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
319	CISPLATINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
320	CISPLATINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
321	CISPLATINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
322	CISPLATINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
323	CISPLATINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
324	CISPLATINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
325	CISPLATINUM	C67.7	MOCZOWNIK
326	CISPLATINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
327	CISPLATINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
328	CISPLATINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
329	CISPLATINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
330	CISPLATINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
331	CISPLATINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
332	CISPLATINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
333	CISPLATINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
334	CISPLATINUM	C69.0	SPOJÓWKA
335	CISPLATINUM	C69.1	ROGÓWKA
336	CISPLATINUM	C69.2	SIATKÓWKA
337	CISPLATINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
338	CISPLATINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
339	CISPLATINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
340	CISPLATINUM	C69.6	OCZODÓŁ
341	CISPLATINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
342	CISPLATINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
343	CISPLATINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
344	CISPLATINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
345	CISPLATINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
346	CISPLATINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
347	CISPLATINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
348	CISPLATINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
349	CISPLATINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
350	CISPLATINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
351	CISPLATINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
352	CISPLATINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
353	CISPLATINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
354	CISPLATINUM	C71.6	MÓZDZEK
355	CISPLATINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
356	CISPLATINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
357	CISPLATINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
358	CISPLATINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
359	CISPLATINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
360	CISPLATINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
361	CISPLATINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
362	CISPLATINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
363	CISPLATINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
364	CISPLATINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
365	CISPLATINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
366	CISPLATINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
367	CISPLATINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
368	CISPLATINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
369	CISPLATINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
370	CISPLATINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
371	CISPLATINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
372	CISPLATINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
373	CISPLATINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
374	CISPLATINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
375	CISPLATINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
376	CISPLATINUM	C75.3	SZYSZYŃKA
377	CISPLATINUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
378	CISPLATINUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
379	CISPLATINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
380	CISPLATINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
381	CISPLATINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
382	CISPLATINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
383	CISPLATINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
384	CISPLATINUM	C76.2	BRZUCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
385	CISPLATINUM	C76.3	MIEDNICA
386	CISPLATINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
387	CISPLATINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
388	CISPLATINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
389	CISPLATINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
390	CISPLATINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
391	CISPLATINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
392	CISPLATINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
393	CISPLATINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
394	CISPLATINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
395	CISPLATINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
396	CISPLATINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
397	CISPLATINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
398	CISPLATINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
399	CISPLATINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
400	CISPLATINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
401	CISPLATINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
402	CISPLATINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ
403	CISPLATINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
404	CISPLATINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
405	CISPLATINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
406	CISPLATINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
407	CISPLATINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
408	CISPLATINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
409	CISPLATINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
410	CISPLATINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
411	CISPLATINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
412	CISPLATINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
413	CISPLATINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
414	CISPLATINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
415	CISPLATINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
416	CISPLATINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
417	CISPLATINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
418	CISPLATINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
419	CISPLATINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
420	CISPLATINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
421	CISPLATINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
422	CISPLATINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
423	CISPLATINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
424	CISPLATINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
425	CISPLATINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
426	CISPLATINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
427	CISPLATINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
428	CISPLATINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
429	CISPLATINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
430	CISPLATINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
431	CISPLATINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
432	CISPLATINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
433	CISPLATINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
434	CISPLATINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
435	CISPLATINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
436	CISPLATINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
437	CISPLATINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
438	CISPLATINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
439	CISPLATINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
440	CISPLATINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
441	CISPLATINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
442	CISPLATINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
443	CISPLATINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
444	CISPLATINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
445	CISPLATINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
446	CISPLATINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
447	CISPLATINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
448	CISPLATINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
449	CISPLATINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
450	CISPLATINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
451	CISPLATINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
452	CISPLATINUM	C85.0	MIEŚSAK LIMFATYCZNY
453	CISPLATINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
454	CISPLATINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
455	CISPLATINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
456	CISPLATINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
457	CISPLATINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
458	CISPLATINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
459	CISPLATINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
460	CISPLATINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
461	CISPLATINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
462	CISPLATINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
463	CISPLATINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
464	CISPLATINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
465	CISPLATINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
466	CISPLATINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
467	CISPLATINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
468	CISPLATINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
469	CISPLATINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
470	CISPLATINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
471	CISPLATINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
472	CISPLATINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
473	CISPLATINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
474	CISPLATINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
475	CISPLATINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
476	CISPLATINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
477	CISPLATINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
478	CISPLATINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
479	CISPLATINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
480	CISPLATINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
481	CISPLATINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
482	CISPLATINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
483	CISPLATINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
484	CISPLATINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
485	CISPLATINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
486	CISPLATINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
487	CISPLATINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
488	CISPLATINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
489	CISPLATINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
490	CISPLATINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
491	CISPLATINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
492	CISPLATINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
493	CISPLATINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
494	CISPLATINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
495	CISPLATINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
496	CISPLATINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
497	CISPLATINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
498	CISPLATINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
499	CISPLATINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
500	CISPLATINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
501	CISPLATINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
502	CISPLATINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
503	CISPLATINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
504	CISPLATINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
505	CISPLATINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
506	CISPLATINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
507	CISPLATINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
508	CISPLATINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
509	CISPLATINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
510	CISPLATINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
511	CISPLATINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
512	CISPLATINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
513	CISPLATINUM	D00.2	ŻOŁĄDEK
514	CISPLATINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
515	CISPLATINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
516	CISPLATINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
517	CISPLATINUM	D01.2	ODBYTNICA
518	CISPLATINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
519	CISPLATINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
520	CISPLATINUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
521	CISPLATINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
522	CISPLATINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
523	CISPLATINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
524	CISPLATINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
525	CISPLATINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
526	CISPLATINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
527	CISPLATINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
528	CISPLATINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
529	CISPLATINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
530	CISPLATINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
531	CISPLATINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
532	CISPLATINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
533	CISPLATINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
534	CISPLATINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
535	CISPLATINUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
536	CISPLATINUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
537	CISPLATINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
538	CISPLATINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
539	CISPLATINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
540	CISPLATINUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
541	CISPLATINUM	D07.1	SROM
542	CISPLATINUM	D07.2	POCHWA
543	CISPLATINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
544	CISPLATINUM	D07.4	PRĄCIE
545	CISPLATINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
546	CISPLATINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
547	CISPLATINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
548	CISPLATINUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
549	CISPLATINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
550	CISPLATINUM	D09.2	OKO
551	CISPLATINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
552	CISPLATINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
553	CISPLATINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
554	CISPLATINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
555	CISPLATINUM	D10.0	WARGA
556	CISPLATINUM	D10.1	JĘZYK
557	CISPLATINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
558	CISPLATINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
559	CISPLATINUM	D10.4	MIGDAŁEK
560	CISPLATINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
561	CISPLATINUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
562	CISPLATINUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
563	CISPLATINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
564	CISPLATINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
565	CISPLATINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
566	CISPLATINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
567	CISPLATINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
568	CISPLATINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
569	CISPLATINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
570	CISPLATINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
571	CISPLATINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
572	CISPLATINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
573	CISPLATINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
574	CISPLATINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
575	CISPLATINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
576	CISPLATINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
577	CISPLATINUM	D12.8	ODBYTNICA
578	CISPLATINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
579	CISPLATINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
580	CISPLATINUM	D13.0	PRZĘLYK
581	CISPLATINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
582	CISPLATINUM	D13.2	DWUNASTNICA
583	CISPLATINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
584	CISPLATINUM	D13.4	WĄTROBA
585	CISPLATINUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
586	CISPLATINUM	D13.6	TRZUSTKA
587	CISPLATINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
588	CISPLATINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
589	CISPLATINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
590	CISPLATINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
591	CISPLATINUM	D14.1	KRTAŃ
592	CISPLATINUM	D14.2	TCHAWICA
593	CISPLATINUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
594	CISPLATINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
595	CISPLATINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
596	CISPLATINUM	D15.0	GRASICA
597	CISPLATINUM	D15.1	SERCE
598	CISPLATINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
599	CISPLATINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
600	CISPLATINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
601	CISPLATINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
602	CISPLATINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
603	CISPLATINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
604	CISPLATINUM	D16.2	KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
605	CISPLATINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
606	CISPLATINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
607	CISPLATINUM	D16.5	ZUCHWA
608	CISPLATINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
609	CISPLATINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
610	CISPLATINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
611	CISPLATINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
612	CISPLATINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
613	CISPLATINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
614	CISPLATINUM	D20.1	OTRZEWNA
615	CISPLATINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
616	CISPLATINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
617	CISPLATINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
618	CISPLATINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
619	CISPLATINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
620	CISPLATINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
621	CISPLATINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
622	CISPLATINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
623	CISPLATINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
624	CISPLATINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
625	CISPLATINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
626	CISPLATINUM	D28.0	SROM
627	CISPLATINUM	D28.1	POCHWA
628	CISPLATINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
629	CISPLATINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
630	CISPLATINUM	D28.9	ZEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
631	CISPLATINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
632	CISPLATINUM	D29.0	PRĄCIE
633	CISPLATINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
634	CISPLATINUM	D29.2	JĄDRO
635	CISPLATINUM	D29.3	NAJĄDRZE
636	CISPLATINUM	D29.4	MOSZNA
637	CISPLATINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
638	CISPLATINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
639	CISPLATINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
640	CISPLATINUM	D30.0	NERKA
641	CISPLATINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
642	CISPLATINUM	D30.2	MOCZOWÓD
643	CISPLATINUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
644	CISPLATINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
645	CISPLATINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
646	CISPLATINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
647	CISPLATINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
648	CISPLATINUM	D31.0	SPOJÓWKA
649	CISPLATINUM	D31.1	ROGÓWKA
650	CISPLATINUM	D31.2	SIATKÓWKA
651	CISPLATINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
652	CISPLATINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
653	CISPLATINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
654	CISPLATINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
655	CISPLATINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
656	CISPLATINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
657	CISPLATINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
658	CISPLATINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
659	CISPLATINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
660	CISPLATINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
661	CISPLATINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIAOTOWE
662	CISPLATINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIAOTOWE
663	CISPLATINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
664	CISPLATINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
665	CISPLATINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
666	CISPLATINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
667	CISPLATINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
668	CISPLATINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
669	CISPLATINUM	D35.0	NADNERCZA
670	CISPLATINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
671	CISPLATINUM	D35.2	PRZYSADKA
672	CISPLATINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
673	CISPLATINUM	D35.4	SZYSZYNKI
674	CISPLATINUM	D35.5	KLĘBEK SZYJNY
675	CISPLATINUM	D35.6	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
676	CISPLATINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
677	CISPLATINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
678	CISPLATINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
679	CISPLATINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
680	CISPLATINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
681	CISPLATINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
682	CISPLATINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
683	CISPLATINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
684	CISPLATINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
685	CISPLATINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
686	CISPLATINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
687	CISPLATINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
688	CISPLATINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
689	CISPLATINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
690	CISPLATINUM	D37.5	ODBYTNICA
691	CISPLATINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
692	CISPLATINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
693	CISPLATINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
694	CISPLATINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
695	CISPLATINUM	D38.0	KRTAŃ
696	CISPLATINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
697	CISPLATINUM	D38.2	OPLUCNA
698	CISPLATINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
699	CISPLATINUM	D38.4	GRASICA
700	CISPLATINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
701	CISPLATINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
702	CISPLATINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
703	CISPLATINUM	D39.0	MACICA
704	CISPLATINUM	D39.1	JAJNIK
705	CISPLATINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
706	CISPLATINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
707	CISPLATINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
708	CISPLATINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
709	CISPLATINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
710	CISPLATINUM	D40.1	JĄDRO
711	CISPLATINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
712	CISPLATINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
713	CISPLATINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
714	CISPLATINUM	D41.0	NERKA
715	CISPLATINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
716	CISPLATINUM	D41.2	MOCZOWÓD
717	CISPLATINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
718	CISPLATINUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY
719	CISPLATINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
720	CISPLATINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
721	CISPLATINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
722	CISPLATINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
723	CISPLATINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
724	CISPLATINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
725	CISPLATINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
726	CISPLATINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
727	CISPLATINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
728	CISPLATINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
729	CISPLATINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
730	CISPLATINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
731	CISPLATINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
732	CISPLATINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
733	CISPLATINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
734	CISPLATINUM	D44.0	TARCZYCA
735	CISPLATINUM	D44.1	NADNERCZA
736	CISPLATINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
737	CISPLATINUM	D44.3	PRZYSADKA
738	CISPLATINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
739	CISPLATINUM	D44.5	SZYSZYNKA
740	CISPLATINUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
741	CISPLATINUM	D44.7	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
742	CISPLATINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
743	CISPLATINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
744	CISPLATINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
745	CISPLATINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
746	CISPLATINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
747	CISPLATINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
748	CISPLATINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
749	CISPLATINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
750	CISPLATINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
751	CISPLATINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
752	CISPLATINUM	D48.4	OTRZEWNA
753	CISPLATINUM	D48.5	SKÓRA
754	CISPLATINUM	D48.6	SUTEK
755	CISPLATINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
756	CISPLATINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
757	CISPLATINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
758	CISPLATINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
759	CISPLATINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
760	CISPLATINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
761	CISPLATINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
762	CISPLATINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
763	CISPLATINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
764	CISPLATINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
765	CISPLATINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
766	CISPLATINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.12.

CLADRIBINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CLADRIBINUM	D76	NIKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO
2	CLADRIBINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
3	CLADRIBINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
4	CLADRIBINUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
5	CLADRIBINUM	D76.3	INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE
6	CLADRIBINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
7	CLADRIBINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
8	CLADRIBINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
9	CLADRIBINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
10	CLADRIBINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
11	CLADRIBINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
12	CLADRIBINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
13	CLADRIBINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
14	CLADRIBINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
15	CLADRIBINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
16	CLADRIBINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
17	CLADRIBINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
18	CLADRIBINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
19	CLADRIBINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
20	CLADRIBINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
21	CLADRIBINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
22	CLADRIBINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
23	CLADRIBINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
24	CLADRIBINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
25	CLADRIBINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
26	CLADRIBINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
27	CLADRIBINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
28	CLADRIBINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
29	CLADRIBINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
30	CLADRIBINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
31	CLADRIBINUM	C85.0	MIEŚSAK LIMFATYCZNY
32	CLADRIBINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
33	CLADRIBINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
34	CLADRIBINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
35	CLADRIBINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
36	CLADRIBINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
37	CLADRIBINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
38	CLADRIBINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
39	CLADRIBINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
40	CLADRIBINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
41	CLADRIBINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
42	CLADRIBINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
43	CLADRIBINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
44	CLADRIBINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
45	CLADRIBINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
46	CLADRIBINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
47	CLADRIBINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
48	CLADRIBINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
49	CLADRIBINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
50	CLADRIBINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
51	CLADRIBINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
52	CLADRIBINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
53	CLADRIBINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
54	CLADRIBINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
55	CLADRIBINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
56	CLADRIBINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
57	CLADRIBINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
58	CLADRIBINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
59	CLADRIBINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
60	CLADRIBINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
61	CLADRIBINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
62	CLADRIBINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
63	CLADRIBINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
64	CLADRIBINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
65	CLADRIBINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
66	CLADRIBINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
67	CLADRIBINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
68	CLADRIBINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
69	CLADRIBINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
70	CLADRIBINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
71	CLADRIBINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
72	CLADRIBINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
73	CLADRIBINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
74	CLADRIBINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
75	CLADRIBINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
76	CLADRIBINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
77	CLADRIBINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	CLADRIBINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
79	CLADRIBINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
80	CLADRIBINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
81	CLADRIBINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
82	CLADRIBINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
83	CLADRIBINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
84	CLADRIBINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
85	CLADRIBINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
86	CLADRIBINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
87	CLADRIBINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
88	CLADRIBINUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
89	CLADRIBINUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
90	CLADRIBINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ

Załącznik C.13.

CYKLOPHOSPHAMIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX)
69	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.0	WPUST
80	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17.0	DWUNASTNICA
90	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17.1	JELITO CZCZE
91	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
102	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.7	ESICA
104	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
128	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C33	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
152	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
153	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
154	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34.1	PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
155	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34.2	PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
156	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34.3	PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
157	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
158	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
159	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
160	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
161	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38.0	SERCE
162	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
163	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
164	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
165	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38.4	OPLUCNA
166	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
167	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
168	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
169	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
170	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
171	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
172	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
173	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
174	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
175	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
176	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
177	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
178	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
179	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
180	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.1	ŻUCHWA
181	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
182	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
183	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
184	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
185	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
186	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
187	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
188	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
189	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
190	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
191	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
192	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
193	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
194	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
195	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
196	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
197	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44	INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
198	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.0	SKÓRA WARGI
199	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.1	SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
200	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.2	SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
201	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.3	SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
202	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.4	SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
203	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.5	SKÓRA TUŁOWIA
204	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.6	SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
205	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.7	SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
206	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
207	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C44.9	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
208	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
209	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
210	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
211	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
212	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
213	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
214	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
215	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
216	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
217	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
218	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
219	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
220	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
221	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
222	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
223	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
224	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
225	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
226	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
227	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
228	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
229	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
230	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
231	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
232	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
233	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
234	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
235	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
236	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
237	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
238	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
239	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
240	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.6	CZEŚĆ PACHOWA SUTKA
241	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
242	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
243	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
244	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
245	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
246	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C51.2	ŁECHTACZKA
247	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
248	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
249	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
250	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
251	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
252	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
253	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
254	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
255	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
256	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
257	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
258	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54.2	MIEŚNIÓWKA MACICY
259	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54.3	DNO MACICY
260	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
261	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
262	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
263	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
264	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
265	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
266	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
267	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
268	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.3	PRZYMACICZA
269	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
270	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
271	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
272	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
273	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
274	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
275	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C60.0	NAPLETEK
276	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
277	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C60.2	TRZON PRĄCIA
278	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
279	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
280	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
281	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
282	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
283	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
284	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
285	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
286	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63.0	NAJĄDRZE
287	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
288	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63.2	MOSZNA
289	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
290	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
291	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
292	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
293	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
294	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
295	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
296	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
297	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
298	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
299	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
300	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
301	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
302	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
303	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.7	MOCZOWNIK
304	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
305	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
306	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
307	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
308	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
309	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
310	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
311	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
312	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.0	SPOJÓWKA
313	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.1	ROGÓWKA
314	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.2	SIATKÓWKA
315	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
316	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
317	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
318	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.6	OCZODÓŁ
319	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
320	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
321	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
322	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
323	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
324	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
325	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
326	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
327	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
328	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
329	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
330	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
331	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
332	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.6	MÓZDZEK
333	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
334	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
335	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
336	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
337	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
338	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.1	OGON KOŃSKI
339	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
340	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.3	NERW WZROKOWY
341	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
342	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
343	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
344	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
345	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
346	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
347	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C74.0	KORA NADNERCZY
348	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
349	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
350	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
351	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
352	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
353	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
354	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.3	SZYSZYNKA
355	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
356	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.5	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
357	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
358	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
359	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
360	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
361	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
362	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.2	BRZUCH
363	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.3	MIEDNICA
364	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
365	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
366	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
367	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
368	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
369	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
370	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
371	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
372	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
373	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
374	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
375	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
376	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
377	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
378	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
379	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
380	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
381	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
382	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
383	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
384	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
385	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
386	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
387	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
388	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
389	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
390	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
391	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
392	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
393	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
394	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
395	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
396	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
397	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
398	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81	CHOROBA HODGKINA
399	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
400	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
401	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
402	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
403	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
404	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
405	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
406	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
407	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
408	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
409	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
410	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
411	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
412	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
413	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
414	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
415	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
416	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
417	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
418	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
419	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
420	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
421	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
422	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
423	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
424	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
425	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
426	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
427	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
428	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
429	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
430	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
431	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
432	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
433	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
434	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
435	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
436	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
437	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
438	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
439	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
440	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
441	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
442	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
443	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
444	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
445	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
446	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
447	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
448	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
449	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
450	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
451	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
452	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
453	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
454	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
455	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
456	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
457	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
458	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
459	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
460	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
461	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
462	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
463	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
464	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
465	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
466	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
467	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
468	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
469	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
470	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
471	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
472	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
473	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
474	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
475	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
476	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
477	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
478	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
479	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
480	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
481	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
482	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
483	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
484	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
485	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
486	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
487	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
488	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
489	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
490	CYKLOPHOSPHAMIDUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
491	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
492	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.0	OKRĘŻNICA
493	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
494	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.2	ODBYTNICA
495	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
496	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
497	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
498	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
499	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
500	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03	CZERNIAK IN SITU
501	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
502	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
503	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
504	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
505	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
506	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
507	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
508	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
509	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
510	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
511	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
512	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
513	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
514	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
515	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
516	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
517	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
518	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.1	SRÓM
519	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.2	POCHWA
520	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
521	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.4	PRĄCIE
522	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
523	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
524	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
525	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
526	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
527	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09.2	OKO
528	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
529	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
530	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
531	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
532	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.0	WARGA
533	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.1	JĘZYK
534	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
535	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
536	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.4	MIGDAŁEK
537	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
538	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
539	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
540	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
541	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
542	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
543	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
544	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
545	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
546	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
547	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
548	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
549	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
550	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
551	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
552	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
553	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
554	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.8	ODBYTNICA
555	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
556	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
557	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.0	PRZEŁYK
558	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
559	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.2	DWUNASTNICA
560	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
561	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.4	WĄTROBA
562	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
563	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.6	TRZUSTKA
564	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.7	WYSPIY TRZUSTKI
565	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
566	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
567	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
568	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D14.1	KRTAŃ
569	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D14.2	TCHAWICA
570	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
571	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
572	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
573	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D15.0	GRASICA
574	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D15.1	SERCE
575	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
576	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
577	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
578	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
579	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
580	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
581	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
582	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
583	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
584	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.5	ŻUCHWA
585	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
586	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.7	ZEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
587	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
588	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
589	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D18	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
590	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D18.0	NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
591	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D18.1	NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
592	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D19	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE MIĘDZYBŁONKA
593	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D19.0	MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ
594	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D19.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
595	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D19.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
596	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D19.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
597	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
598	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
599	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D20.1	OTRZEWNA
600	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
601	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
602	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
603	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
604	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
605	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
606	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
607	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
608	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
609	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
610	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
611	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D28.0	SROM
612	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D28.1	POCHWA
613	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
614	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
615	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
616	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
617	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.0	PRĄCIE
618	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
619	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.2	JĄDRO
620	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.3	NAJĄDRZE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
621	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.4	MOSZNA
622	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
623	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
624	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
625	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.0	NERKA
626	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
627	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.2	MOCZOWÓD
628	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
629	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
630	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
631	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
632	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
633	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.0	SPOJÓWKA
634	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.1	ROGÓWKA
635	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.2	SIATKÓWKA
636	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
637	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
638	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
639	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
640	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
641	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
642	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
643	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
644	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
645	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
646	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
647	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
648	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
649	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
650	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
651	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
652	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
653	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
654	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
655	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.0	NADNERCZA
656	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
657	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.2	PRZYSADKA
658	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
659	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.4	SZYSZYŃKA
660	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
661	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.6	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
662	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
663	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
664	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
665	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
666	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
667	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
668	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
669	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
670	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
671	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
672	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
673	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.2	JELITO CIENKIE
674	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
675	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.4	OKRĘŻNICA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
676	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.5	ODBYTNICA
677	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
678	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
679	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
680	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
681	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.0	KRTAŃ
682	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
683	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.2	OPLUCNA
684	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
685	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.4	GRASICA
686	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
687	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
688	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
689	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D39.0	MACICA
690	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D39.1	JAJNIK
691	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D39.2	ŁOŻYSKO
692	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
693	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
694	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
695	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
696	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D40.1	JĄDRO
697	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
698	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
699	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
700	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.0	NERKA
701	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
702	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.2	MOCZOWÓD
703	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
704	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY
705	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
706	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
707	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
708	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
709	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
710	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
711	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
712	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.0	MÓZG, NADNAMOTOWE
713	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.1	MÓZG, PODNAMOTOWE
714	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
715	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
716	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
717	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
718	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
719	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
720	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.0	TARCZYCA
721	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.1	NADNERCZA
722	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
723	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.3	PRZYSADKA
724	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
725	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.5	SZYSZYNKA
726	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
727	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
728	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
729	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
730	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
731	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
732	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
733	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
734	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
735	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
736	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
737	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
738	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
739	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
740	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
741	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
742	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
743	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
744	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
745	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
746	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.4	OTRZEWNA
747	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.5	SKÓRA
748	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.6	SUTEK
749	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
750	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
751	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
752	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
753	CYKLOPHOSPHAMIDUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
754	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
755	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
756	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
757	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
758	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
759	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
760	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
761	CYKLOPHOSPHAMIDUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.14.

CYTARABINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CYTARABINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
2	CYTARABINUM	C69.0	SPOJÓWKA
3	CYTARABINUM	C69.1	ROGÓWKA
4	CYTARABINUM	C69.2	SIATKÓWKA
5	CYTARABINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
6	CYTARABINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
7	CYTARABINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
8	CYTARABINUM	C69.6	OCZODÓŁ
9	CYTARABINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
10	CYTARABINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
11	CYTARABINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
12	CYTARABINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
13	CYTARABINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
14	CYTARABINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
15	CYTARABINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
16	CYTARABINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
17	CYTARABINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
18	CYTARABINUM	C71.6	MÓZDZEK
19	CYTARABINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
20	CYTARABINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
21	CYTARABINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
22	CYTARABINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
23	CYTARABINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	CYTARABINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
25	CYTARABINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
26	CYTARABINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
27	CYTARABINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
28	CYTARABINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
29	CYTARABINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
30	CYTARABINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
31	CYTARABINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
32	CYTARABINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
33	CYTARABINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
34	CYTARABINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
35	CYTARABINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
36	CYTARABINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
37	CYTARABINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
38	CYTARABINUM	C76.2	BRZUCH
39	CYTARABINUM	C76.3	MIEDNICA
40	CYTARABINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
41	CYTARABINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
42	CYTARABINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
43	CYTARABINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
44	CYTARABINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
45	CYTARABINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
46	CYTARABINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
47	CYTARABINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
48	CYTARABINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
49	CYTARABINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
50	CYTARABINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	CYTARABINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
52	CYTARABINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
53	CYTARABINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
54	CYTARABINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
55	CYTARABINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
56	CYTARABINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
57	CYTARABINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
58	CYTARABINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
59	CYTARABINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
60	CYTARABINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
61	CYTARABINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
62	CYTARABINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
63	CYTARABINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
64	CYTARABINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
65	CYTARABINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
66	CYTARABINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
67	CYTARABINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
68	CYTARABINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
69	CYTARABINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
70	CYTARABINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
71	CYTARABINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
72	CYTARABINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
73	CYTARABINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
74	CYTARABINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
75	CYTARABINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
76	CYTARABINUM	C85.0	MIEŚAK LIMFATYCZNY
77	CYTARABINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	CYTARABINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
79	CYTARABINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
80	CYTARABINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
81	CYTARABINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
82	CYTARABINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
83	CYTARABINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
84	CYTARABINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
85	CYTARABINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
86	CYTARABINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
87	CYTARABINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
88	CYTARABINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
89	CYTARABINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
90	CYTARABINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
91	CYTARABINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
92	CYTARABINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
93	CYTARABINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
94	CYTARABINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
95	CYTARABINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
96	CYTARABINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
97	CYTARABINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
98	CYTARABINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
99	CYTARABINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
100	CYTARABINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
101	CYTARABINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
102	CYTARABINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
103	CYTARABINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
104	CYTARABINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
105	CYTARABINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	CYTARABINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
107	CYTARABINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
108	CYTARABINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
109	CYTARABINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
110	CYTARABINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
111	CYTARABINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
112	CYTARABINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
113	CYTARABINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
114	CYTARABINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
115	CYTARABINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
116	CYTARABINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
117	CYTARABINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
118	CYTARABINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
119	CYTARABINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
120	CYTARABINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
121	CYTARABINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
122	CYTARABINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
123	CYTARABINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
124	CYTARABINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
125	CYTARABINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
126	CYTARABINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
127	CYTARABINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
128	CYTARABINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
129	CYTARABINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
130	CYTARABINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
131	CYTARABINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
132	CYTARABINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	CYTARABINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
134	CYTARABINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
135	CYTARABINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
136	CYTARABINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
137	CYTARABINUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
138	CYTARABINUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
139	CYTARABINUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
140	CYTARABINUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
141	CYTARABINUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
142	CYTARABINUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
143	CYTARABINUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
144	CYTARABINUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
145	CYTARABINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDEJ
146	CYTARABINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
147	CYTARABINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
148	CYTARABINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
149	CYTARABINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
150	CYTARABINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
151	CYTARABINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
152	CYTARABINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
153	CYTARABINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
154	CYTARABINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.15.

CYTARABINUM DEPOCYTE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
2	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
3	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
4	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
5	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
6	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
7	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
8	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
9	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
10	CYTARABINUM DEPOCYTE	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
11	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81	CHOROBA HODGKINA
12	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
13	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
14	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
15	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
16	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
17	CYTARABINUM DEPOCYTE	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
18	CYTARABINUM DEPOCYTE	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
19	CYTARABINUM DEPOCYTE	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
20	CYTARABINUM DEPOCYTE	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
21	CYTARABINUM DEPOCYTE	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
22	CYTARABINUM DEPOCYTE	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23	CYTARABINUM DEPOCYTE	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
24	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
25	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
26	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
27	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
28	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
29	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
30	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
31	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
32	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
33	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
34	CYTARABINUM DEPOCYTE	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
35	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
36	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
37	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
38	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
39	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
40	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
41	CYTARABINUM DEPOCYTE	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
42	CYTARABINUM DEPOCYTE	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
43	CYTARABINUM DEPOCYTE	C85.0	MIEŚAK LIMFATYCZNY
44	CYTARABINUM DEPOCYTE	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
45	CYTARABINUM DEPOCYTE	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
46	CYTARABINUM DEPOCYTE	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
47	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
48	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
49	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
50	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
52	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
53	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
54	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
55	CYTARABINUM DEPOCYTE	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
56	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
57	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
58	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
59	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
60	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
61	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
62	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
63	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
64	CYTARABINUM DEPOCYTE	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
65	CYTARABINUM DEPOCYTE	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY

Załącznik C.16.

DACARBAZINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	DACARBAZINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	DACARBAZINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	DACARBAZINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	DACARBAZINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	DACARBAZINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	DACARBAZINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	DACARBAZINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	DACARBAZINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	DACARBAZINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	DACARBAZINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	DACARBAZINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	DACARBAZINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	DACARBAZINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	DACARBAZINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	DACARBAZINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	DACARBAZINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	DACARBAZINUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	DACARBAZINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	DACARBAZINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	DACARBAZINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	DACARBAZINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	DACARBAZINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	DACARBAZINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	DACARBAZINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	DACARBAZINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	DACARBAZINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	DACARBAZINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	DACARBAZINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	DACARBAZINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	DACARBAZINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	DACARBAZINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	DACARBAZINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	DACARBAZINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	DACARBAZINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	DACARBAZINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	DACARBAZINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	DACARBAZINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	DACARBAZINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	DACARBAZINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	DACARBAZINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	DACARBAZINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	DACARBAZINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	DACARBAZINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	DACARBAZINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	DACARBAZINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	DACARBAZINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	DACARBAZINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	DACARBAZINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	DACARBAZINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	DACARBAZINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	DACARBAZINUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	DACARBAZINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	DACARBAZINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	DACARBAZINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	DACARBAZINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	DACARBAZINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	DACARBAZINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	DACARBAZINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	DACARBAZINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	DACARBAZINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	DACARBAZINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	DACARBAZINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	DACARBAZINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	DACARBAZINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	DACARBAZINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	DACARBAZINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	DACARBAZINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	DACARBAZINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	DACARBAZINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	DACARBAZINUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	DACARBAZINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	DACARBAZINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	DACARBAZINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	DACARBAZINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	DACARBAZINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	DACARBAZINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	DACARBAZINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	DACARBAZINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79	DACARBAZINUM	C16.0	WPUST
80	DACARBAZINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81	DACARBAZINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82	DACARBAZINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83	DACARBAZINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84	DACARBAZINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85	DACARBAZINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86	DACARBAZINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87	DACARBAZINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88	DACARBAZINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89	DACARBAZINUM	C17.0	DWUNASTNICA
90	DACARBAZINUM	C17.1	JELITO CZCZE
91	DACARBAZINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92	DACARBAZINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93	DACARBAZINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94	DACARBAZINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95	DACARBAZINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96	DACARBAZINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97	DACARBAZINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98	DACARBAZINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99	DACARBAZINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100	DACARBAZINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101	DACARBAZINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
102	DACARBAZINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103	DACARBAZINUM	C18.7	ESICA
104	DACARBAZINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105	DACARBAZINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	DACARBAZINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107	DACARBAZINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108	DACARBAZINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109	DACARBAZINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110	DACARBAZINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111	DACARBAZINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112	DACARBAZINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113	DACARBAZINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114	DACARBAZINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115	DACARBAZINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116	DACARBAZINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117	DACARBAZINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118	DACARBAZINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119	DACARBAZINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120	DACARBAZINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121	DACARBAZINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122	DACARBAZINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123	DACARBAZINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124	DACARBAZINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125	DACARBAZINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126	DACARBAZINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127	DACARBAZINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
128	DACARBAZINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129	DACARBAZINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130	DACARBAZINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131	DACARBAZINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132	DACARBAZINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	DACARBAZINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134	DACARBAZINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135	DACARBAZINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136	DACARBAZINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137	DACARBAZINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138	DACARBAZINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139	DACARBAZINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140	DACARBAZINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141	DACARBAZINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142	DACARBAZINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143	DACARBAZINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144	DACARBAZINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145	DACARBAZINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146	DACARBAZINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147	DACARBAZINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148	DACARBAZINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149	DACARBAZINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150	DACARBAZINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151	DACARBAZINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
152	DACARBAZINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
153	DACARBAZINUM	C38.0	SERCE
154	DACARBAZINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
155	DACARBAZINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
156	DACARBAZINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
157	DACARBAZINUM	C38.4	OPLUCNA
158	DACARBAZINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
159	DACARBAZINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
160	DACARBAZINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
161	DACARBAZINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
162	DACARBAZINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
163	DACARBAZINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
164	DACARBAZINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
165	DACARBAZINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
166	DACARBAZINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
167	DACARBAZINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
168	DACARBAZINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
169	DACARBAZINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
170	DACARBAZINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
171	DACARBAZINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
172	DACARBAZINUM	C41.1	ŻUCHWA
173	DACARBAZINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
174	DACARBAZINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
175	DACARBAZINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
176	DACARBAZINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
177	DACARBAZINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
178	DACARBAZINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
179	DACARBAZINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
180	DACARBAZINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
181	DACARBAZINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
182	DACARBAZINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
183	DACARBAZINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
184	DACARBAZINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
185	DACARBAZINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
186	DACARBAZINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
187	DACARBAZINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
188	DACARBAZINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
189	DACARBAZINUM	C44	INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
190	DACARBAZINUM	C44.0	SKÓRA WARGI
191	DACARBAZINUM	C44.1	SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
192	DACARBAZINUM	C44.2	SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
193	DACARBAZINUM	C44.3	SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
194	DACARBAZINUM	C44.4	SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
195	DACARBAZINUM	C44.5	SKÓRA TUŁOWIA
196	DACARBAZINUM	C44.6	SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
197	DACARBAZINUM	C44.7	SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
198	DACARBAZINUM	C44.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
199	DACARBAZINUM	C44.9	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
200	DACARBAZINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
201	DACARBAZINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
202	DACARBAZINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
203	DACARBAZINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
204	DACARBAZINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
205	DACARBAZINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
206	DACARBAZINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
207	DACARBAZINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
208	DACARBAZINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
209	DACARBAZINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
210	DACARBAZINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNIEJ
211	DACARBAZINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
212	DACARBAZINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNIEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
213	DACARBAZINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
214	DACARBAZINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
215	DACARBAZINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
216	DACARBAZINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
217	DACARBAZINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
218	DACARBAZINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
219	DACARBAZINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
220	DACARBAZINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
221	DACARBAZINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
222	DACARBAZINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
223	DACARBAZINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
224	DACARBAZINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
225	DACARBAZINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
226	DACARBAZINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
227	DACARBAZINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
228	DACARBAZINUM	C51.2	ŁECHTACZKA
229	DACARBAZINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
230	DACARBAZINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
231	DACARBAZINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
232	DACARBAZINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
233	DACARBAZINUM	C53.1	BLONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
234	DACARBAZINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
235	DACARBAZINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
236	DACARBAZINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
237	DACARBAZINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
238	DACARBAZINUM	C54.1	BLONA ŚLUZOWA MACICY
239	DACARBAZINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
240	DACARBAZINUM	C54.3	DNO MACICY
241	DACARBAZINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
242	DACARBAZINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
243	DACARBAZINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
244	DACARBAZINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
245	DACARBAZINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
246	DACARBAZINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
247	DACARBAZINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
248	DACARBAZINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
249	DACARBAZINUM	C57.3	PRZYMATICZA
250	DACARBAZINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
251	DACARBAZINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
252	DACARBAZINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
253	DACARBAZINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
254	DACARBAZINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
255	DACARBAZINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
256	DACARBAZINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
257	DACARBAZINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
258	DACARBAZINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
259	DACARBAZINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
260	DACARBAZINUM	C63.0	NAJĄDRZE
261	DACARBAZINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
262	DACARBAZINUM	C63.2	MOSZNA
263	DACARBAZINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
264	DACARBAZINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
265	DACARBAZINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
266	DACARBAZINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
267	DACARBAZINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
268	DACARBAZINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
269	DACARBAZINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
270	DACARBAZINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
271	DACARBAZINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
272	DACARBAZINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
273	DACARBAZINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
274	DACARBAZINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
275	DACARBAZINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
276	DACARBAZINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
277	DACARBAZINUM	C67.7	MOCZOWNIK
278	DACARBAZINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
279	DACARBAZINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
280	DACARBAZINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
281	DACARBAZINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
282	DACARBAZINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
283	DACARBAZINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
284	DACARBAZINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
285	DACARBAZINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
286	DACARBAZINUM	C69.0	SPOJÓWKA
287	DACARBAZINUM	C69.1	ROGÓWKA
288	DACARBAZINUM	C69.2	SIATKÓWKA
289	DACARBAZINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
290	DACARBAZINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
291	DACARBAZINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
292	DACARBAZINUM	C69.6	OCZODÓŁ
293	DACARBAZINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
294	DACARBAZINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
295	DACARBAZINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
296	DACARBAZINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
297	DACARBAZINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
298	DACARBAZINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
299	DACARBAZINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
300	DACARBAZINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
301	DACARBAZINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
302	DACARBAZINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
303	DACARBAZINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
304	DACARBAZINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
305	DACARBAZINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
306	DACARBAZINUM	C71.6	MÓZDŻEK
307	DACARBAZINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
308	DACARBAZINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
309	DACARBAZINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
310	DACARBAZINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
311	DACARBAZINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
312	DACARBAZINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
313	DACARBAZINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
314	DACARBAZINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
315	DACARBAZINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
316	DACARBAZINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
317	DACARBAZINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
318	DACARBAZINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
319	DACARBAZINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
320	DACARBAZINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
321	DACARBAZINUM	C74.0	KORA NADNERCZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
322	DACARBAZINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
323	DACARBAZINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
324	DACARBAZINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
325	DACARBAZINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
326	DACARBAZINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
327	DACARBAZINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
328	DACARBAZINUM	C75.3	SZYSZYNKA
329	DACARBAZINUM	C75.4	KŁĘBEK SZYJNY
330	DACARBAZINUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
331	DACARBAZINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
332	DACARBAZINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
333	DACARBAZINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
334	DACARBAZINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
335	DACARBAZINUM	C76.1	KŁATKA PIERSIOWA
336	DACARBAZINUM	C76.2	BRZUCH
337	DACARBAZINUM	C76.3	MIEDNICA
338	DACARBAZINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
339	DACARBAZINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
340	DACARBAZINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
341	DACARBAZINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
342	DACARBAZINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
343	DACARBAZINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
344	DACARBAZINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KŁATKI PIERSIOWEJ
345	DACARBAZINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
346	DACARBAZINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
347	DACARBAZINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
348	DACARBAZINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
349	DACARBAZINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
350	DACARBAZINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
351	DACARBAZINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGO I TRAWIENNEGO
352	DACARBAZINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
353	DACARBAZINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
354	DACARBAZINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
355	DACARBAZINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
356	DACARBAZINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
357	DACARBAZINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
358	DACARBAZINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
359	DACARBAZINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
360	DACARBAZINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
361	DACARBAZINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
362	DACARBAZINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
363	DACARBAZINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
364	DACARBAZINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
365	DACARBAZINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
366	DACARBAZINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
367	DACARBAZINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
368	DACARBAZINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
369	DACARBAZINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
370	DACARBAZINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
371	DACARBAZINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
372	DACARBAZINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
373	DACARBAZINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
374	DACARBAZINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
375	DACARBAZINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
376	DACARBAZINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
377	DACARBAZINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
378	DACARBAZINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
379	DACARBAZINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
380	DACARBAZINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
381	DACARBAZINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
382	DACARBAZINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
383	DACARBAZINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
384	DACARBAZINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
385	DACARBAZINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
386	DACARBAZINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
387	DACARBAZINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
388	DACARBAZINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
389	DACARBAZINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
390	DACARBAZINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
391	DACARBAZINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
392	DACARBAZINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
393	DACARBAZINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
394	DACARBAZINUM	C83.8	INNE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
395	DACARBAZINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
396	DACARBAZINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
397	DACARBAZINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
398	DACARBAZINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
399	DACARBAZINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
400	DACARBAZINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
401	DACARBAZINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
402	DACARBAZINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
403	DACARBAZINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
404	DACARBAZINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
405	DACARBAZINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
406	DACARBAZINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
407	DACARBAZINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
408	DACARBAZINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
409	DACARBAZINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
410	DACARBAZINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
411	DACARBAZINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
412	DACARBAZINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
413	DACARBAZINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
414	DACARBAZINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
415	DACARBAZINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
416	DACARBAZINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
417	DACARBAZINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
418	DACARBAZINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
419	DACARBAZINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
420	DACARBAZINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
421	DACARBAZINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
422	DACARBAZINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
423	DACARBAZINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
424	DACARBAZINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
425	DACARBAZINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
426	DACARBAZINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
427	DACARBAZINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
428	DACARBAZINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
429	DACARBAZINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
430	DACARBAZINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
431	DACARBAZINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
432	DACARBAZINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
433	DACARBAZINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
434	DACARBAZINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
435	DACARBAZINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
436	DACARBAZINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
437	DACARBAZINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
438	DACARBAZINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
439	DACARBAZINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
440	DACARBAZINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
441	DACARBAZINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
442	DACARBAZINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
443	DACARBAZINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
444	DACARBAZINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
445	DACARBAZINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
446	DACARBAZINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
447	DACARBAZINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
448	DACARBAZINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
449	DACARBAZINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
450	DACARBAZINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
451	DACARBAZINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
452	DACARBAZINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
453	DACARBAZINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
454	DACARBAZINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
455	DACARBAZINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
456	DACARBAZINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
457	DACARBAZINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
458	DACARBAZINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
459	DACARBAZINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
460	DACARBAZINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
461	DACARBAZINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
462	DACARBAZINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
463	DACARBAZINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
464	DACARBAZINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
465	DACARBAZINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
466	DACARBAZINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
467	DACARBAZINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
468	DACARBAZINUM	D01.2	ODBYTNICA
469	DACARBAZINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
470	DACARBAZINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
471	DACARBAZINUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
472	DACARBAZINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
473	DACARBAZINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
474	DACARBAZINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
475	DACARBAZINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
476	DACARBAZINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
477	DACARBAZINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
478	DACARBAZINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
479	DACARBAZINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
480	DACARBAZINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
481	DACARBAZINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
482	DACARBAZINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
483	DACARBAZINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
484	DACARBAZINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
485	DACARBAZINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
486	DACARBAZINUM	D06.0	BLONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
487	DACARBAZINUM	D06.1	BLONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
488	DACARBAZINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
489	DACARBAZINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
490	DACARBAZINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
491	DACARBAZINUM	D07.0	BLONA ŚLUZOWA MACICY
492	DACARBAZINUM	D07.1	SROM
493	DACARBAZINUM	D07.2	POCHWA
494	DACARBAZINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
495	DACARBAZINUM	D07.4	PRĄCIE
496	DACARBAZINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
497	DACARBAZINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
498	DACARBAZINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
499	DACARBAZINUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
500	DACARBAZINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
501	DACARBAZINUM	D09.2	OKO
502	DACARBAZINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
503	DACARBAZINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
504	DACARBAZINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
505	DACARBAZINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
506	DACARBAZINUM	D10.0	WARGA
507	DACARBAZINUM	D10.1	JĘZYK
508	DACARBAZINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
509	DACARBAZINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
510	DACARBAZINUM	D10.4	MIGDAŁEK

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
511	DACARBAZINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
512	DACARBAZINUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
513	DACARBAZINUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
514	DACARBAZINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
515	DACARBAZINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
516	DACARBAZINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
517	DACARBAZINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
518	DACARBAZINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
519	DACARBAZINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
520	DACARBAZINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
521	DACARBAZINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
522	DACARBAZINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
523	DACARBAZINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
524	DACARBAZINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
525	DACARBAZINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
526	DACARBAZINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
527	DACARBAZINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
528	DACARBAZINUM	D12.8	ODBYTNICA
529	DACARBAZINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
530	DACARBAZINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
531	DACARBAZINUM	D13.0	PRZĘLYK
532	DACARBAZINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
533	DACARBAZINUM	D13.2	DWUNASTNICA
534	DACARBAZINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
535	DACARBAZINUM	D13.4	WĄTROBA
536	DACARBAZINUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZ WĄTROBOWE
537	DACARBAZINUM	D13.6	TRZUSTKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
538	DACARBAZINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
539	DACARBAZINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
540	DACARBAZINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
541	DACARBAZINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
542	DACARBAZINUM	D14.1	KRTAŃ
543	DACARBAZINUM	D14.2	TCHAWICA
544	DACARBAZINUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
545	DACARBAZINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
546	DACARBAZINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
547	DACARBAZINUM	D15.0	GRASICA
548	DACARBAZINUM	D15.1	SERCE
549	DACARBAZINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
550	DACARBAZINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
551	DACARBAZINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
552	DACARBAZINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
553	DACARBAZINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
554	DACARBAZINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
555	DACARBAZINUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
556	DACARBAZINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
557	DACARBAZINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
558	DACARBAZINUM	D16.5	ŻUCHWA
559	DACARBAZINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
560	DACARBAZINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
561	DACARBAZINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
562	DACARBAZINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
563	DACARBAZINUM	D18	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
564	DACARBAZINUM	D18.0	NACZYNIANKA KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
565	DACARBAZINUM	D18.1	NACZYNIAK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
566	DACARBAZINUM	D19	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE MIĘDZYBŁONKA
567	DACARBAZINUM	D19.0	MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
568	DACARBAZINUM	D19.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
569	DACARBAZINUM	D19.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
570	DACARBAZINUM	D19.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
571	DACARBAZINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
572	DACARBAZINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
573	DACARBAZINUM	D20.1	OTRZEWNA
574	DACARBAZINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
575	DACARBAZINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
576	DACARBAZINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
577	DACARBAZINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
578	DACARBAZINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
579	DACARBAZINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
580	DACARBAZINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
581	DACARBAZINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
582	DACARBAZINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
583	DACARBAZINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
584	DACARBAZINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
585	DACARBAZINUM	D28.0	SRÓM
586	DACARBAZINUM	D28.1	POCHWA
587	DACARBAZINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
588	DACARBAZINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
589	DACARBAZINUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
590	DACARBAZINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
591	DACARBAZINUM	D29.0	PRĄCIE
592	DACARBAZINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
593	DACARBAZINUM	D29.2	JĄDRO
594	DACARBAZINUM	D29.3	NAJĄDRZE
595	DACARBAZINUM	D29.4	MOSZNA
596	DACARBAZINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
597	DACARBAZINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
598	DACARBAZINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
599	DACARBAZINUM	D30.0	NERKA
600	DACARBAZINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
601	DACARBAZINUM	D30.2	MOCZOWÓD
602	DACARBAZINUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
603	DACARBAZINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
604	DACARBAZINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
605	DACARBAZINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
606	DACARBAZINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
607	DACARBAZINUM	D31.0	SPOJÓWKA
608	DACARBAZINUM	D31.1	ROGÓWKA
609	DACARBAZINUM	D31.2	SIATKÓWKA
610	DACARBAZINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
611	DACARBAZINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
612	DACARBAZINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
613	DACARBAZINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
614	DACARBAZINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
615	DACARBAZINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
616	DACARBAZINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
617	DACARBAZINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
618	DACARBAZINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
619	DACARBAZINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
620	DACARBAZINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
621	DACARBAZINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
622	DACARBAZINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
623	DACARBAZINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
624	DACARBAZINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
625	DACARBAZINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
626	DACARBAZINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
627	DACARBAZINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
628	DACARBAZINUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
629	DACARBAZINUM	D35.0	NADNERCZA
630	DACARBAZINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
631	DACARBAZINUM	D35.2	PRZYSADKA
632	DACARBAZINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
633	DACARBAZINUM	D35.4	SZYSZYNKA
634	DACARBAZINUM	D35.5	KLĘBEK SZYJNY
635	DACARBAZINUM	D35.6	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
636	DACARBAZINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
637	DACARBAZINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
638	DACARBAZINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
639	DACARBAZINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
640	DACARBAZINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
641	DACARBAZINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
642	DACARBAZINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
643	DACARBAZINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
644	DACARBAZINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
645	DACARBAZINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
646	DACARBAZINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
647	DACARBAZINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
648	DACARBAZINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
649	DACARBAZINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
650	DACARBAZINUM	D37.5	ODBYTNICA
651	DACARBAZINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
652	DACARBAZINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
653	DACARBAZINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
654	DACARBAZINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
655	DACARBAZINUM	D38.0	KRTAŃ
656	DACARBAZINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
657	DACARBAZINUM	D38.2	OPLUCNA
658	DACARBAZINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
659	DACARBAZINUM	D38.4	GRASICA
660	DACARBAZINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
661	DACARBAZINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
662	DACARBAZINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
663	DACARBAZINUM	D39.0	MACICA
664	DACARBAZINUM	D39.1	JAJNIK
665	DACARBAZINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
666	DACARBAZINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
667	DACARBAZINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
668	DACARBAZINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
669	DACARBAZINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
670	DACARBAZINUM	D40.1	JĄDRO
671	DACARBAZINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
672	DACARBAZINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
673	DACARBAZINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
674	DACARBAZINUM	D41.0	NERKA
675	DACARBAZINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
676	DACARBAZINUM	D41.2	MOCZOWÓD
677	DACARBAZINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
678	DACARBAZINUM	D41.4	PĘCHERZ MOCZOWY
679	DACARBAZINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
680	DACARBAZINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
681	DACARBAZINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
682	DACARBAZINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
683	DACARBAZINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
684	DACARBAZINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
685	DACARBAZINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
686	DACARBAZINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMBIOTOWE
687	DACARBAZINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMBIOTOWE
688	DACARBAZINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
689	DACARBAZINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
690	DACARBAZINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
691	DACARBAZINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
692	DACARBAZINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
693	DACARBAZINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
694	DACARBAZINUM	D44.0	TARCZYCA
695	DACARBAZINUM	D44.1	NADNERCZA
696	DACARBAZINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
697	DACARBAZINUM	D44.3	PRZYSADKA
698	DACARBAZINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
699	DACARBAZINUM	D44.5	SZYSZYŃKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
700	DACARBAZINUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
701	DACARBAZINUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
702	DACARBAZINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
703	DACARBAZINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
704	DACARBAZINUM	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
705	DACARBAZINUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
706	DACARBAZINUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
707	DACARBAZINUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
708	DACARBAZINUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
709	DACARBAZINUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
710	DACARBAZINUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
711	DACARBAZINUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
712	DACARBAZINUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
713	DACARBAZINUM	D47	INNY NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
714	DACARBAZINUM	D47.0	GUZY HISTIOCYTÓW I KOMÓREK TUCZNYCH O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE
715	DACARBAZINUM	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
716	DACARBAZINUM	D47.2	GAMMOPATIA MONOKLONALNA
717	DACARBAZINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
718	DACARBAZINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
719	DACARBAZINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
720	DACARBAZINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
721	DACARBAZINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
722	DACARBAZINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
723	DACARBAZINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
724	DACARBAZINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
725	DACARBAZINUM	D48.4	OTRZEWNIA
726	DACARBAZINUM	D48.5	SKÓRA
727	DACARBAZINUM	D48.6	SUTEK
728	DACARBAZINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
729	DACARBAZINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
730	DACARBAZINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
731	DACARBAZINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
732	DACARBAZINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
733	DACARBAZINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
734	DACARBAZINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
735	DACARBAZINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
736	DACARBAZINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
737	DACARBAZINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
738	DACARBAZINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
739	DACARBAZINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.19.

DOCETAXELUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	DOCETAXELUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	DOCETAXELUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	DOCETAXELUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	DOCETAXELUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	DOCETAXELUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	DOCETAXELUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	DOCETAXELUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	DOCETAXELUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	DOCETAXELUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	DOCETAXELUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	DOCETAXELUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	DOCETAXELUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	DOCETAXELUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	DOCETAXELUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	DOCETAXELUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	DOCETAXELUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	DOCETAXELUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	DOCETAXELUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	DOCETAXELUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	DOCETAXELUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	DOCETAXELUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	DOCETAXELUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	DOCETAXELUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	DOCETAXELUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	DOCETAXELUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	DOCETAXELUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	DOCETAXELUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	DOCETAXELUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	DOCETAXELUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	DOCETAXELUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	DOCETAXELUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	DOCETAXELUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	DOCETAXELUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	DOCETAXELUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	DOCETAXELUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	DOCETAXELUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	DOCETAXELUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	DOCETAXELUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	DOCETAXELUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	DOCETAXELUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	DOCETAXELUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	DOCETAXELUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	DOCETAXELUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	DOCETAXELUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	DOCETAXELUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	DOCETAXELUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	DOCETAXELUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	DOCETAXELUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	DOCETAXELUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	DOCETAXELUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	DOCETAXELUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	DOCETAXELUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	DOCETAXELUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	DOCETAXELUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	DOCETAXELUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	DOCETAXELUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	DOCETAXELUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	DOCETAXELUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	DOCETAXELUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	DOCETAXELUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	DOCETAXELUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	DOCETAXELUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	DOCETAXELUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	DOCETAXELUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	DOCETAXELUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	DOCETAXELUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	DOCETAXELUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	DOCETAXELUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	DOCETAXELUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	DOCETAXELUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	DOCETAXELUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	DOCETAXELUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	DOCETAXELUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	DOCETAXELUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	DOCETAXELUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	DOCETAXELUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	DOCETAXELUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	DOCETAXELUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79	DOCETAXELUM	C16.0	WPUST
80	DOCETAXELUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81	DOCETAXELUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82	DOCETAXELUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83	DOCETAXELUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84	DOCETAXELUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85	DOCETAXELUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86	DOCETAXELUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87	DOCETAXELUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88	DOCETAXELUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
89	DOCETAXELUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
90	DOCETAXELUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
91	DOCETAXELUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
92	DOCETAXELUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
93	DOCETAXELUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
94	DOCETAXELUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
95	DOCETAXELUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
96	DOCETAXELUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
97	DOCETAXELUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
98	DOCETAXELUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
99	DOCETAXELUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
100	DOCETAXELUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
101	DOCETAXELUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
102	DOCETAXELUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
103	DOCETAXELUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
104	DOCETAXELUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
105	DOCETAXELUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
106	DOCETAXELUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
107	DOCETAXELUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
108	DOCETAXELUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
109	DOCETAXELUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
110	DOCETAXELUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO

Załącznik C.20.

DOXORUBICINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	DOXORUBICINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2.	DOXORUBICINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3.	DOXORUBICINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4.	DOXORUBICINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5.	DOXORUBICINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6.	DOXORUBICINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7.	DOXORUBICINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8.	DOXORUBICINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9.	DOXORUBICINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10.	DOXORUBICINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11.	DOXORUBICINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12.	DOXORUBICINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13.	DOXORUBICINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14.	DOXORUBICINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15.	DOXORUBICINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16.	DOXORUBICINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17.	DOXORUBICINUM	C02.4	MIGDALEK JĘZYKOWY
18.	DOXORUBICINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19.	DOXORUBICINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20.	DOXORUBICINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21.	DOXORUBICINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22.	DOXORUBICINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	DOXORUBICINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE
24.	DOXORUBICINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25.	DOXORUBICINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26.	DOXORUBICINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27.	DOXORUBICINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28.	DOXORUBICINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29.	DOXORUBICINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30.	DOXORUBICINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31.	DOXORUBICINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32.	DOXORUBICINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33.	DOXORUBICINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34.	DOXORUBICINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35.	DOXORUBICINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36.	DOXORUBICINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37.	DOXORUBICINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38.	DOXORUBICINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39.	DOXORUBICINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40.	DOXORUBICINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41.	DOXORUBICINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42.	DOXORUBICINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43.	DOXORUBICINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44.	DOXORUBICINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45.	DOXORUBICINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46.	DOXORUBICINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47.	DOXORUBICINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48.	DOXORUBICINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49.	DOXORUBICINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50.	DOXORUBICINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
51.	DOXORUBICINUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52.	DOXORUBICINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53.	DOXORUBICINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54.	DOXORUBICINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55.	DOXORUBICINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56.	DOXORUBICINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57.	DOXORUBICINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58.	DOXORUBICINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59.	DOXORUBICINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60.	DOXORUBICINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61.	DOXORUBICINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62.	DOXORUBICINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63.	DOXORUBICINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64.	DOXORUBICINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65.	DOXORUBICINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66.	DOXORUBICINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67.	DOXORUBICINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68.	DOXORUBICINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69.	DOXORUBICINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70.	DOXORUBICINUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FALDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71.	DOXORUBICINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72.	DOXORUBICINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73.	DOXORUBICINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74.	DOXORUBICINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
75.	DOXORUBICINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76.	DOXORUBICINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77.	DOXORUBICINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
78.	DOXORUBICINUM	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU
79.	DOXORUBICINUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
80.	DOXORUBICINUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
81.	DOXORUBICINUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
82.	DOXORUBICINUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
83.	DOXORUBICINUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
84.	DOXORUBICINUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
85.	DOXORUBICINUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
86.	DOXORUBICINUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
87.	DOXORUBICINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
88.	DOXORUBICINUM	C16.0	WPUST
89.	DOXORUBICINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
90.	DOXORUBICINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
91.	DOXORUBICINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
92.	DOXORUBICINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
93.	DOXORUBICINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
94.	DOXORUBICINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
95.	DOXORUBICINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
96.	DOXORUBICINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
97.	DOXORUBICINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
98.	DOXORUBICINUM	C17.0	DWUNASTNICA
99.	DOXORUBICINUM	C17.1	JELITO CZCZE
100.	DOXORUBICINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
101.	DOXORUBICINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
102.	DOXORUBICINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
103.	DOXORUBICINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
104.	DOXORUBICINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
105.	DOXORUBICINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
106.	DOXORUBICINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
107.	DOXORUBICINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
108.	DOXORUBICINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
109.	DOXORUBICINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
110.	DOXORUBICINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
111.	DOXORUBICINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
112.	DOXORUBICINUM	C18.7	ESICA
113.	DOXORUBICINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
114.	DOXORUBICINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
115.	DOXORUBICINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
116.	DOXORUBICINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
117.	DOXORUBICINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
118.	DOXORUBICINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
119.	DOXORUBICINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
120.	DOXORUBICINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
121.	DOXORUBICINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
122.	DOXORUBICINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
123.	DOXORUBICINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
124.	DOXORUBICINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
125.	DOXORUBICINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
126.	DOXORUBICINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
127.	DOXORUBICINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
128.	DOXORUBICINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
129.	DOXORUBICINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
130.	DOXORUBICINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
131.	DOXORUBICINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
132.	DOXORUBICINUM	C24.0	ZEWNĄTRZĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
133.	DOXORUBICINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
134.	DOXORUBICINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
135.	DOXORUBICINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
136.	DOXORUBICINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
137.	DOXORUBICINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
138.	DOXORUBICINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
139.	DOXORUBICINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
140.	DOXORUBICINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
141.	DOXORUBICINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZ WYDZIELNICZA TRZUSTKI
142.	DOXORUBICINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
143.	DOXORUBICINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
144.	DOXORUBICINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
145.	DOXORUBICINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
146.	DOXORUBICINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
147.	DOXORUBICINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
148.	DOXORUBICINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
149.	DOXORUBICINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
150.	DOXORUBICINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
151.	DOXORUBICINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
152.	DOXORUBICINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
153.	DOXORUBICINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
154.	DOXORUBICINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
155.	DOXORUBICINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
156.	DOXORUBICINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
157.	DOXORUBICINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
158.	DOXORUBICINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
159.	DOXORUBICINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
160.	DOXORUBICINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
161.	DOXORUBICINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
162.	DOXORUBICINUM	C34.1	PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
163.	DOXORUBICINUM	C34.2	PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
164.	DOXORUBICINUM	C34.3	PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
165.	DOXORUBICINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
166.	DOXORUBICINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
167.	DOXORUBICINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
168.	DOXORUBICINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
169.	DOXORUBICINUM	C38.0	SERCE
170.	DOXORUBICINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
171.	DOXORUBICINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
172.	DOXORUBICINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
173.	DOXORUBICINUM	C38.4	OPLUCNA
174.	DOXORUBICINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
175.	DOXORUBICINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
176.	DOXORUBICINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
177.	DOXORUBICINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
178.	DOXORUBICINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
179.	DOXORUBICINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
180.	DOXORUBICINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
181.	DOXORUBICINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
182.	DOXORUBICINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
183.	DOXORUBICINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
184.	DOXORUBICINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
185.	DOXORUBICINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
186.	DOXORUBICINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
187.	DOXORUBICINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
188.	DOXORUBICINUM	C41.1	ŻUCHWA
189.	DOXORUBICINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
190.	DOXORUBICINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
191.	DOXORUBICINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
192.	DOXORUBICINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
193.	DOXORUBICINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
194.	DOXORUBICINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
195.	DOXORUBICINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
196.	DOXORUBICINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
197.	DOXORUBICINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
198.	DOXORUBICINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
199.	DOXORUBICINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
200.	DOXORUBICINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
201.	DOXORUBICINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
202.	DOXORUBICINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
203.	DOXORUBICINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
204.	DOXORUBICINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
205.	DOXORUBICINUM	C45	MIĘDZYBŁONIAK
206.	DOXORUBICINUM	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ
207.	DOXORUBICINUM	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
208.	DOXORUBICINUM	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
209.	DOXORUBICINUM	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
210.	DOXORUBICINUM	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
211.	DOXORUBICINUM	C46	MIĘSAK KAPOS'I EGO
212.	DOXORUBICINUM	C46.0	MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY
213.	DOXORUBICINUM	C46.1	MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ
214.	DOXORUBICINUM	C46.2	MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA
215.	DOXORUBICINUM	C46.3	MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
216.	DOXORUBICINUM	C46.7	MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
217.	DOXORUBICINUM	C46.8	MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
218.	DOXORUBICINUM	C46.9	MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY
219.	DOXORUBICINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
220.	DOXORUBICINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
221.	DOXORUBICINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
222.	DOXORUBICINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
223.	DOXORUBICINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
224.	DOXORUBICINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
225.	DOXORUBICINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
226.	DOXORUBICINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
227.	DOXORUBICINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
228.	DOXORUBICINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
229.	DOXORUBICINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
230.	DOXORUBICINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
231.	DOXORUBICINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
232.	DOXORUBICINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
233.	DOXORUBICINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
234.	DOXORUBICINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
235.	DOXORUBICINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
236.	DOXORUBICINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
237.	DOXORUBICINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
238.	DOXORUBICINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
239.	DOXORUBICINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
240.	DOXORUBICINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
241.	DOXORUBICINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
242.	DOXORUBICINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
243.	DOXORUBICINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
244.	DOXORUBICINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
245.	DOXORUBICINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
246.	DOXORUBICINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
247.	DOXORUBICINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
248.	DOXORUBICINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
249.	DOXORUBICINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
250.	DOXORUBICINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
251.	DOXORUBICINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
252.	DOXORUBICINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
253.	DOXORUBICINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
254.	DOXORUBICINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
255.	DOXORUBICINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
256.	DOXORUBICINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
257.	DOXORUBICINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
258.	DOXORUBICINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
259.	DOXORUBICINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
260.	DOXORUBICINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
261.	DOXORUBICINUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
262.	DOXORUBICINUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
263.	DOXORUBICINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
264.	DOXORUBICINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
265.	DOXORUBICINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
266.	DOXORUBICINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
267.	DOXORUBICINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
268.	DOXORUBICINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
269.	DOXORUBICINUM	C54.3	DNO MACICY
270.	DOXORUBICINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
271.	DOXORUBICINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
272.	DOXORUBICINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
273.	DOXORUBICINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
274.	DOXORUBICINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
275.	DOXORUBICINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
276.	DOXORUBICINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
277.	DOXORUBICINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
278.	DOXORUBICINUM	C57.3	PRZYMAGICZA
279.	DOXORUBICINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
280.	DOXORUBICINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
281.	DOXORUBICINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
282.	DOXORUBICINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
283.	DOXORUBICINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
284.	DOXORUBICINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
285.	DOXORUBICINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
286.	DOXORUBICINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
287.	DOXORUBICINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
288.	DOXORUBICINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
289.	DOXORUBICINUM	C63.0	NAJĄDRZE
290.	DOXORUBICINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
291.	DOXORUBICINUM	C63.2	MOSZNA
292.	DOXORUBICINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
293.	DOXORUBICINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
294.	DOXORUBICINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
295.	DOXORUBICINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
296.	DOXORUBICINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
297.	DOXORUBICINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
298.	DOXORUBICINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
299.	DOXORUBICINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
300.	DOXORUBICINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
301.	DOXORUBICINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
302.	DOXORUBICINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
303.	DOXORUBICINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
304.	DOXORUBICINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
305.	DOXORUBICINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
306.	DOXORUBICINUM	C67.7	MOCZOWNIK
307.	DOXORUBICINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
308.	DOXORUBICINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
309.	DOXORUBICINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
310.	DOXORUBICINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
311.	DOXORUBICINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
312.	DOXORUBICINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
313.	DOXORUBICINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
314.	DOXORUBICINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
315.	DOXORUBICINUM	C69.0	SPOJÓWKA
316.	DOXORUBICINUM	C69.1	ROGÓWKA
317.	DOXORUBICINUM	C69.2	SIATKÓWKA
318.	DOXORUBICINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
319.	DOXORUBICINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
320.	DOXORUBICINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
321.	DOXORUBICINUM	C69.6	OCZODÓŁ
322.	DOXORUBICINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
323.	DOXORUBICINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
324.	DOXORUBICINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
325.	DOXORUBICINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
326.	DOXORUBICINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
327.	DOXORUBICINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
328.	DOXORUBICINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
329.	DOXORUBICINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
330.	DOXORUBICINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
331.	DOXORUBICINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
332.	DOXORUBICINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
333.	DOXORUBICINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
334.	DOXORUBICINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
335.	DOXORUBICINUM	C71.6	MÓZDŻEK
336.	DOXORUBICINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
337.	DOXORUBICINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
338.	DOXORUBICINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
339.	DOXORUBICINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
340.	DOXORUBICINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
341.	DOXORUBICINUM	C72.1	OGON KOŃSKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
342.	DOXORUBICINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
343.	DOXORUBICINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
344.	DOXORUBICINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
345.	DOXORUBICINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
346.	DOXORUBICINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
347.	DOXORUBICINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
348.	DOXORUBICINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
349.	DOXORUBICINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
350.	DOXORUBICINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
351.	DOXORUBICINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
352.	DOXORUBICINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
353.	DOXORUBICINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
354.	DOXORUBICINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
355.	DOXORUBICINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
356.	DOXORUBICINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
357.	DOXORUBICINUM	C75.3	SZYSZYNKA
358.	DOXORUBICINUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
359.	DOXORUBICINUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
360.	DOXORUBICINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
361.	DOXORUBICINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
362.	DOXORUBICINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
363.	DOXORUBICINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
364.	DOXORUBICINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
365.	DOXORUBICINUM	C76.2	BRZUCH
366.	DOXORUBICINUM	C76.3	MIEDNICA
367.	DOXORUBICINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
368.	DOXORUBICINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
369.	DOXORUBICINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
370.	DOXORUBICINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
371.	DOXORUBICINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
372.	DOXORUBICINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
373.	DOXORUBICINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
374.	DOXORUBICINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
375.	DOXORUBICINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
376.	DOXORUBICINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
377.	DOXORUBICINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
378.	DOXORUBICINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
379.	DOXORUBICINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
380.	DOXORUBICINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
381.	DOXORUBICINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
382.	DOXORUBICINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
383.	DOXORUBICINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ
384.	DOXORUBICINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
385.	DOXORUBICINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
386.	DOXORUBICINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
387.	DOXORUBICINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
388.	DOXORUBICINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
389.	DOXORUBICINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
390.	DOXORUBICINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
391.	DOXORUBICINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
392.	DOXORUBICINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
393.	DOXORUBICINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
394.	DOXORUBICINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
395.	DOXORUBICINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
396.	DOXORUBICINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
397.	DOXORUBICINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
398.	DOXORUBICINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
399.	DOXORUBICINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
400.	DOXORUBICINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
401.	DOXORUBICINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
402.	DOXORUBICINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
403.	DOXORUBICINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
404.	DOXORUBICINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
405.	DOXORUBICINUM	C81.3	ZMNIJSZENIE LIMFOCYTÓW
406.	DOXORUBICINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
407.	DOXORUBICINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
408.	DOXORUBICINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
409.	DOXORUBICINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
410.	DOXORUBICINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
411.	DOXORUBICINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
412.	DOXORUBICINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
413.	DOXORUBICINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
414.	DOXORUBICINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
415.	DOXORUBICINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
416.	DOXORUBICINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
417.	DOXORUBICINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
418.	DOXORUBICINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
419.	DOXORUBICINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
420.	DOXORUBICINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
421.	DOXORUBICINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
422.	DOXORUBICINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
423.	DOXORUBICINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
424.	DOXORUBICINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
425.	DOXORUBICINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
426.	DOXORUBICINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
427.	DOXORUBICINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
428.	DOXORUBICINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
429.	DOXORUBICINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
430.	DOXORUBICINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
431.	DOXORUBICINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
432.	DOXORUBICINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
433.	DOXORUBICINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
434.	DOXORUBICINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
435.	DOXORUBICINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
436.	DOXORUBICINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
437.	DOXORUBICINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
438.	DOXORUBICINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
439.	DOXORUBICINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
440.	DOXORUBICINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
441.	DOXORUBICINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
442.	DOXORUBICINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
443.	DOXORUBICINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
444.	DOXORUBICINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
445.	DOXORUBICINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
446.	DOXORUBICINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
447.	DOXORUBICINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
448.	DOXORUBICINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
449.	DOXORUBICINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
450.	DOXORUBICINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
451.	DOXORUBICINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
452.	DOXORUBICINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
453.	DOXORUBICINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
454.	DOXORUBICINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
455.	DOXORUBICINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
456.	DOXORUBICINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
457.	DOXORUBICINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
458.	DOXORUBICINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
459.	DOXORUBICINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
460.	DOXORUBICINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
461.	DOXORUBICINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
462.	DOXORUBICINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
463.	DOXORUBICINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
464.	DOXORUBICINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
465.	DOXORUBICINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
466.	DOXORUBICINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
467.	DOXORUBICINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
468.	DOXORUBICINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
469.	DOXORUBICINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
470.	DOXORUBICINUM	C96.3	PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
471.	DOXORUBICINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
472.	DOXORUBICINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
473.	DOXORUBICINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
474.	DOXORUBICINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
475.	DOXORUBICINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
476.	DOXORUBICINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
477.	DOXORUBICINUM	D01.2	ODBYTNICA
478.	DOXORUBICINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
479.	DOXORUBICINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
480.	DOXORUBICINUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
481.	DOXORUBICINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
482.	DOXORUBICINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
483.	DOXORUBICINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
484.	DOXORUBICINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
485.	DOXORUBICINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
486.	DOXORUBICINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
487.	DOXORUBICINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
488.	DOXORUBICINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
489.	DOXORUBICINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
490.	DOXORUBICINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
491.	DOXORUBICINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
492.	DOXORUBICINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
493.	DOXORUBICINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
494.	DOXORUBICINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
495.	DOXORUBICINUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
496.	DOXORUBICINUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
497.	DOXORUBICINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
498.	DOXORUBICINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
499.	DOXORUBICINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
500.	DOXORUBICINUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
501.	DOXORUBICINUM	D07.1	SROM
502.	DOXORUBICINUM	D07.2	POCHWA
503.	DOXORUBICINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
504.	DOXORUBICINUM	D07.4	PRĄCIE
505.	DOXORUBICINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
506.	DOXORUBICINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
507.	DOXORUBICINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
508.	DOXORUBICINUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
509.	DOXORUBICINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
510.	DOXORUBICINUM	D09.2	OKO
511.	DOXORUBICINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
512.	DOXORUBICINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
513.	DOXORUBICINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
514.	DOXORUBICINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
515.	DOXORUBICINUM	D10.0	WARGA
516.	DOXORUBICINUM	D10.1	JĘZYK
517.	DOXORUBICINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
518.	DOXORUBICINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
519.	DOXORUBICINUM	D10.4	MIGDAŁEK
520.	DOXORUBICINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
521.	DOXORUBICINUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
522.	DOXORUBICINUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
523.	DOXORUBICINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
524.	DOXORUBICINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
525.	DOXORUBICINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
526.	DOXORUBICINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
527.	DOXORUBICINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
528.	DOXORUBICINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
529.	DOXORUBICINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
530.	DOXORUBICINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
531.	DOXORUBICINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
532.	DOXORUBICINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
533.	DOXORUBICINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
534.	DOXORUBICINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
535.	DOXORUBICINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
536.	DOXORUBICINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
537.	DOXORUBICINUM	D12.8	ODBYTNICA
538.	DOXORUBICINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
539.	DOXORUBICINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
540.	DOXORUBICINUM	D13.0	PRZELYK
541.	DOXORUBICINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
542.	DOXORUBICINUM	D13.2	DWUNASTNICA
543.	DOXORUBICINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
544.	DOXORUBICINUM	D13.4	WĄTROBA
545.	DOXORUBICINUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
546.	DOXORUBICINUM	D13.6	TRZUSTKA
547.	DOXORUBICINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
548.	DOXORUBICINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
549.	DOXORUBICINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
550.	DOXORUBICINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
551.	DOXORUBICINUM	D14.1	KRTAŃ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
552.	DOXORUBICINUM	D14.2	TCHAWICA
553.	DOXORUBICINUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
554.	DOXORUBICINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
555.	DOXORUBICINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
556.	DOXORUBICINUM	D15.0	GRASICA
557.	DOXORUBICINUM	D15.1	SERCE
558.	DOXORUBICINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
559.	DOXORUBICINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
560.	DOXORUBICINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
561.	DOXORUBICINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
562.	DOXORUBICINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
563.	DOXORUBICINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
564.	DOXORUBICINUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
565.	DOXORUBICINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
566.	DOXORUBICINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
567.	DOXORUBICINUM	D16.5	ŻUCHWA
568.	DOXORUBICINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
569.	DOXORUBICINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
570.	DOXORUBICINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
571.	DOXORUBICINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
572.	DOXORUBICINUM	D17	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ
573.	DOXORUBICINUM	D17.0	TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ GŁOWY, TWARZY I SZYI
574.	DOXORUBICINUM	D17.1	TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ TUŁOWIA
575.	DOXORUBICINUM	D17.2	TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ KOŃCZYNY
576.	DOXORUBICINUM	D17.3	TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
577.	DOXORUBICINUM	D17.4	TŁUSZCZAK NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
578.	DOXORUBICINUM	D17.5	TŁUSZCZAK NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
579.	DOXORUBICINUM	D17.6	TŁUSZCZAK POWRÓZKA NASIENNEGO
580.	DOXORUBICINUM	D17.7	TŁUSZCZAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
581.	DOXORUBICINUM	D17.9	TŁUSZCZAK, NIEOKREŚLONY
582.	DOXORUBICINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
583.	DOXORUBICINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
584.	DOXORUBICINUM	D20.1	OTRZEWNA
585.	DOXORUBICINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
586.	DOXORUBICINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
587.	DOXORUBICINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
588.	DOXORUBICINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
589.	DOXORUBICINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
590.	DOXORUBICINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
591.	DOXORUBICINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
592.	DOXORUBICINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
593.	DOXORUBICINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
594.	DOXORUBICINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
595.	DOXORUBICINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
596.	DOXORUBICINUM	D28.0	SROM
597.	DOXORUBICINUM	D28.1	POCHWA
598.	DOXORUBICINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
599.	DOXORUBICINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
600.	DOXORUBICINUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
601.	DOXORUBICINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
602.	DOXORUBICINUM	D29.0	PRĄCIE
603.	DOXORUBICINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
604.	DOXORUBICINUM	D29.2	JĄDRO
605.	DOXORUBICINUM	D29.3	NAJĄDRZE
606.	DOXORUBICINUM	D29.4	MOSZNA
607.	DOXORUBICINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
608.	DOXORUBICINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
609.	DOXORUBICINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
610.	DOXORUBICINUM	D30.0	NERKA
611.	DOXORUBICINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
612.	DOXORUBICINUM	D30.2	MOCZOWÓD
613.	DOXORUBICINUM	D30.3	PĘCHERZ MOCZOWY
614.	DOXORUBICINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
615.	DOXORUBICINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
616.	DOXORUBICINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
617.	DOXORUBICINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
618.	DOXORUBICINUM	D31.0	SPOJÓWKA
619.	DOXORUBICINUM	D31.1	ROGÓWKA
620.	DOXORUBICINUM	D31.2	SIATKÓWKA
621.	DOXORUBICINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
622.	DOXORUBICINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
623.	DOXORUBICINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
624.	DOXORUBICINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
625.	DOXORUBICINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
626.	DOXORUBICINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
627.	DOXORUBICINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
628.	DOXORUBICINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
629.	DOXORUBICINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
630.	DOXORUBICINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
631.	DOXORUBICINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMBIOTOWE
632.	DOXORUBICINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMBIOTOWE
633.	DOXORUBICINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
634.	DOXORUBICINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
635.	DOXORUBICINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
636.	DOXORUBICINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
637.	DOXORUBICINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
638.	DOXORUBICINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
639.	DOXORUBICINUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
640.	DOXORUBICINUM	D35.0	NADNERCZA
641.	DOXORUBICINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
642.	DOXORUBICINUM	D35.2	PRZYSADKA
643.	DOXORUBICINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
644.	DOXORUBICINUM	D35.4	SZYSZYŃKA
645.	DOXORUBICINUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
646.	DOXORUBICINUM	D35.6	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
647.	DOXORUBICINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
648.	DOXORUBICINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
649.	DOXORUBICINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
650.	DOXORUBICINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
651.	DOXORUBICINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
652.	DOXORUBICINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
653.	DOXORUBICINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
654.	DOXORUBICINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
655.	DOXORUBICINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
656.	DOXORUBICINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
657.	DOXORUBICINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
658.	DOXORUBICINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
659.	DOXORUBICINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
660.	DOXORUBICINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
661.	DOXORUBICINUM	D37.5	ODBYTNICA
662.	DOXORUBICINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
663.	DOXORUBICINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
664.	DOXORUBICINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
665.	DOXORUBICINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
666.	DOXORUBICINUM	D38.0	KRTAŃ
667.	DOXORUBICINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
668.	DOXORUBICINUM	D38.2	OPŁUCNA
669.	DOXORUBICINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
670.	DOXORUBICINUM	D38.4	GRASICA
671.	DOXORUBICINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
672.	DOXORUBICINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
673.	DOXORUBICINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
674.	DOXORUBICINUM	D39.0	MACICA
675.	DOXORUBICINUM	D39.1	JAJNIK
676.	DOXORUBICINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
677.	DOXORUBICINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
678.	DOXORUBICINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
679.	DOXORUBICINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
680.	DOXORUBICINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
681.	DOXORUBICINUM	D40.1	JĄDRO
682.	DOXORUBICINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
683.	DOXORUBICINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
684.	DOXORUBICINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
685.	DOXORUBICINUM	D41.0	NERKA
686.	DOXORUBICINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
687.	DOXORUBICINUM	D41.2	MOCZOWÓD
688.	DOXORUBICINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
689.	DOXORUBICINUM	D41.4	PĘCHERZ MOCZOWY
690.	DOXORUBICINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
691.	DOXORUBICINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
692.	DOXORUBICINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
693.	DOXORUBICINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
694.	DOXORUBICINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
695.	DOXORUBICINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
696.	DOXORUBICINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
697.	DOXORUBICINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMBIOTOWE
698.	DOXORUBICINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMBIOTOWE
699.	DOXORUBICINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
700.	DOXORUBICINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
701.	DOXORUBICINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
702.	DOXORUBICINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
703.	DOXORUBICINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
704.	DOXORUBICINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
705.	DOXORUBICINUM	D44.0	TARCZYCA
706.	DOXORUBICINUM	D44.1	NADNERCZA
707.	DOXORUBICINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
708.	DOXORUBICINUM	D44.3	PRZYSADKA
709.	DOXORUBICINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
710.	DOXORUBICINUM	D44.5	SZYSZYNKA
711.	DOXORUBICINUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
712.	DOXORUBICINUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
713.	DOXORUBICINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
714.	DOXORUBICINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
715.	DOXORUBICINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
716.	DOXORUBICINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
717.	DOXORUBICINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
718.	DOXORUBICINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
719.	DOXORUBICINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
720.	DOXORUBICINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
721.	DOXORUBICINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
722.	DOXORUBICINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
723.	DOXORUBICINUM	D48.4	OTRZEWNA
724.	DOXORUBICINUM	D48.5	SKÓRA
725.	DOXORUBICINUM	D48.6	SUTEK
726.	DOXORUBICINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
727.	DOXORUBICINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
728.	DOXORUBICINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
729.	DOXORUBICINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
730.	DOXORUBICINUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
731.	DOXORUBICINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
732.	DOXORUBICINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
733.	DOXORUBICINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
734.	DOXORUBICINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
735.	DOXORUBICINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
736.	DOXORUBICINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
737.	DOXORUBICINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
738.	DOXORUBICINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.21.

DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
2.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
3.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
4.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
5.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
6.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
7.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
8.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
9.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
10.	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.22.

DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46	MIĘSAK KAPOS'I EGO
2	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.0	MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY
3	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.1	MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ
4	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.2	MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA
5	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.3	MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
6	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.7	MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
7	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.8	MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
8	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C46.9	MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY
9	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
10	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
11	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
12	DOXORUBICINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
	LIPOSOMANUM PEGYLATUM		
13	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
14	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
15	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
16	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
17	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
18	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
19	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
20	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
21	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
22	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
23	DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA

Załącznik C.23.

EPIRUBICINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	EPIRUBICINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
2	EPIRUBICINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
3	EPIRUBICINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
4	EPIRUBICINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
5	EPIRUBICINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
6	EPIRUBICINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
7	EPIRUBICINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
8	EPIRUBICINUM	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU
9	EPIRUBICINUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
10	EPIRUBICINUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
11	EPIRUBICINUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
12	EPIRUBICINUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
13	EPIRUBICINUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
14	EPIRUBICINUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
15	EPIRUBICINUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
16	EPIRUBICINUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
17	EPIRUBICINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
18	EPIRUBICINUM	C16.0	WPUST
19	EPIRUBICINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
20	EPIRUBICINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
21	EPIRUBICINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
22	EPIRUBICINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
23	EPIRUBICINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIejsza ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	EPIRUBICINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
25	EPIRUBICINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
26	EPIRUBICINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
27	EPIRUBICINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
28	EPIRUBICINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
29	EPIRUBICINUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
30	EPIRUBICINUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
31	EPIRUBICINUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
32	EPIRUBICINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
33	EPIRUBICINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
34	EPIRUBICINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
35	EPIRUBICINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
36	EPIRUBICINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
37	EPIRUBICINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
38	EPIRUBICINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
39	EPIRUBICINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
40	EPIRUBICINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
41	EPIRUBICINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
42	EPIRUBICINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
43	EPIRUBICINUM	C41.1	ŻUCHWA
44	EPIRUBICINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
45	EPIRUBICINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
46	EPIRUBICINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
47	EPIRUBICINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
48	EPIRUBICINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
49	EPIRUBICINUM	C46	MIĘSAK KAPOSI' EGO
50	EPIRUBICINUM	C46.0	MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	EPIRUBICINUM	C46.1	MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ
52	EPIRUBICINUM	C46.2	MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA
53	EPIRUBICINUM	C46.3	MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
54	EPIRUBICINUM	C46.7	MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
55	EPIRUBICINUM	C46.8	MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
56	EPIRUBICINUM	C46.9	MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY
57	EPIRUBICINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
58	EPIRUBICINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
59	EPIRUBICINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
60	EPIRUBICINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
61	EPIRUBICINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
62	EPIRUBICINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
63	EPIRUBICINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
64	EPIRUBICINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
65	EPIRUBICINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
66	EPIRUBICINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
67	EPIRUBICINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
68	EPIRUBICINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
69	EPIRUBICINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
70	EPIRUBICINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
71	EPIRUBICINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
72	EPIRUBICINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
73	EPIRUBICINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
74	EPIRUBICINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
75	EPIRUBICINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
76	EPIRUBICINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
77	EPIRUBICINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
78	EPIRUBICINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
79	EPIRUBICINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
80	EPIRUBICINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
81	EPIRUBICINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
82	EPIRUBICINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
83	EPIRUBICINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
84	EPIRUBICINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
85	EPIRUBICINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
86	EPIRUBICINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
87	EPIRUBICINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
88	EPIRUBICINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
89	EPIRUBICINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
90	EPIRUBICINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
91	EPIRUBICINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
92	EPIRUBICINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
93	EPIRUBICINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
94	EPIRUBICINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
95	EPIRUBICINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
96	EPIRUBICINUM	C54.3	DNO MACICY
97	EPIRUBICINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
98	EPIRUBICINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
99	EPIRUBICINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
100	EPIRUBICINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
101	EPIRUBICINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
102	EPIRUBICINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
103	EPIRUBICINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
104	EPIRUBICINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
105	EPIRUBICINUM	C57.3	PRZYMACICZA
106	EPIRUBICINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
107	EPIRUBICINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
108	EPIRUBICINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
109	EPIRUBICINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
110	EPIRUBICINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
111	EPIRUBICINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
112	EPIRUBICINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
113	EPIRUBICINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
114	EPIRUBICINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
115	EPIRUBICINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
116	EPIRUBICINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
117	EPIRUBICINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
118	EPIRUBICINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
119	EPIRUBICINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
120	EPIRUBICINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
121	EPIRUBICINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
122	EPIRUBICINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
123	EPIRUBICINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
124	EPIRUBICINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
125	EPIRUBICINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
126	EPIRUBICINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
127	EPIRUBICINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
128	EPIRUBICINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
129	EPIRUBICINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
130	EPIRUBICINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
131	EPIRUBICINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
132	EPIRUBICINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
133	EPIRUBICINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
134	EPIRUBICINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
135	EPIRUBICINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
136	EPIRUBICINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
137	EPIRUBICINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
138	EPIRUBICINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
139	EPIRUBICINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
140	EPIRUBICINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
141	EPIRUBICINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
142	EPIRUBICINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
143	EPIRUBICINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
144	EPIRUBICINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
145	EPIRUBICINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
146	EPIRUBICINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
147	EPIRUBICINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
148	EPIRUBICINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
149	EPIRUBICINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
150	EPIRUBICINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
151	EPIRUBICINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
152	EPIRUBICINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
153	EPIRUBICINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
154	EPIRUBICINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
155	EPIRUBICINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
156	EPIRUBICINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
157	EPIRUBICINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
158	EPIRUBICINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
159	EPIRUBICINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
160	EPIRUBICINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
161	EPIRUBICINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
162	EPIRUBICINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
163	EPIRUBICINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
164	EPIRUBICINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
165	EPIRUBICINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
166	EPIRUBICINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
167	EPIRUBICINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
168	EPIRUBICINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
169	EPIRUBICINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
170	EPIRUBICINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
171	EPIRUBICINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
172	EPIRUBICINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
173	EPIRUBICINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
174	EPIRUBICINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
175	EPIRUBICINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
176	EPIRUBICINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
177	EPIRUBICINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
178	EPIRUBICINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
179	EPIRUBICINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
180	EPIRUBICINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
181	EPIRUBICINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
182	EPIRUBICINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
183	EPIRUBICINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
184	EPIRUBICINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
185	EPIRUBICINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
186	EPIRUBICINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
187	EPIRUBICINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIANA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
188	EPIRUBICINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
189	EPIRUBICINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
190	EPIRUBICINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
191	EPIRUBICINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
192	EPIRUBICINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
193	EPIRUBICINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
194	EPIRUBICINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
195	EPIRUBICINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
196	EPIRUBICINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
197	EPIRUBICINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
198	EPIRUBICINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
199	EPIRUBICINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
200	EPIRUBICINUM	C96.3	PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
201	EPIRUBICINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
202	EPIRUBICINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
203	EPIRUBICINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
204	EPIRUBICINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
205	EPIRUBICINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
206	EPIRUBICINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
207	EPIRUBICINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
208	EPIRUBICINUM	D48.4	OTRZEWNA
209	EPIRUBICINUM	D48.5	SKÓRA
210	EPIRUBICINUM	D48.6	SUTEK
211	EPIRUBICINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
212	EPIRUBICINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
213	EPIRUBICINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
214	EPIRUBICINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
215	EPIRUBICINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
216	EPIRUBICINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
217	EPIRUBICINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
218	EPIRUBICINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
219	EPIRUBICINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
220	EPIRUBICINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.24.

ETOPOSIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	ETOPOSIDUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	ETOPOSIDUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	ETOPOSIDUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	ETOPOSIDUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	ETOPOSIDUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	ETOPOSIDUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	ETOPOSIDUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	ETOPOSIDUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	ETOPOSIDUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	ETOPOSIDUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	ETOPOSIDUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	ETOPOSIDUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	ETOPOSIDUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	ETOPOSIDUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	ETOPOSIDUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	ETOPOSIDUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	ETOPOSIDUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	ETOPOSIDUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	ETOPOSIDUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	ETOPOSIDUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	ETOPOSIDUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	ETOPOSIDUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	ETOPOSIDUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	ETOPOSIDUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	ETOPOSIDUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	ETOPOSIDUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	ETOPOSIDUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	ETOPOSIDUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	ETOPOSIDUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	ETOPOSIDUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	ETOPOSIDUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	ETOPOSIDUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	ETOPOSIDUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	ETOPOSIDUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	ETOPOSIDUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	ETOPOSIDUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	ETOPOSIDUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	ETOPOSIDUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	ETOPOSIDUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	ETOPOSIDUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	ETOPOSIDUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	ETOPOSIDUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	ETOPOSIDUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	ETOPOSIDUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	ETOPOSIDUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	ETOPOSIDUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	ETOPOSIDUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	ETOPOSIDUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	ETOPOSIDUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	ETOPOSIDUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	ETOPOSIDUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	ETOPOSIDUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	ETOPOSIDUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	ETOPOSIDUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	ETOPOSIDUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	ETOPOSIDUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	ETOPOSIDUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	ETOPOSIDUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	ETOPOSIDUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	ETOPOSIDUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	ETOPOSIDUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	ETOPOSIDUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	ETOPOSIDUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	ETOPOSIDUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	ETOPOSIDUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	ETOPOSIDUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	ETOPOSIDUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	ETOPOSIDUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX)
69	ETOPOSIDUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	ETOPOSIDUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	ETOPOSIDUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	ETOPOSIDUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	ETOPOSIDUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	ETOPOSIDUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	ETOPOSIDUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	ETOPOSIDUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	ETOPOSIDUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	ETOPOSIDUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79	ETOPOSIDUM	C16.0	WPUST
80	ETOPOSIDUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81	ETOPOSIDUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82	ETOPOSIDUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83	ETOPOSIDUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84	ETOPOSIDUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85	ETOPOSIDUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86	ETOPOSIDUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87	ETOPOSIDUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88	ETOPOSIDUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89	ETOPOSIDUM	C17.0	DWUNASTNICA
90	ETOPOSIDUM	C17.1	JELITO CZCZE
91	ETOPOSIDUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92	ETOPOSIDUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93	ETOPOSIDUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94	ETOPOSIDUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95	ETOPOSIDUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96	ETOPOSIDUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97	ETOPOSIDUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98	ETOPOSIDUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99	ETOPOSIDUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100	ETOPOSIDUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101	ETOPOSIDUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
102	ETOPOSIDUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103	ETOPOSIDUM	C18.7	ESICA
104	ETOPOSIDUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105	ETOPOSIDUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	ETOPOSIDUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107	ETOPOSIDUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108	ETOPOSIDUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109	ETOPOSIDUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110	ETOPOSIDUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111	ETOPOSIDUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112	ETOPOSIDUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113	ETOPOSIDUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114	ETOPOSIDUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115	ETOPOSIDUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116	ETOPOSIDUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117	ETOPOSIDUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118	ETOPOSIDUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119	ETOPOSIDUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120	ETOPOSIDUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121	ETOPOSIDUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122	ETOPOSIDUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123	ETOPOSIDUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124	ETOPOSIDUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125	ETOPOSIDUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126	ETOPOSIDUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127	ETOPOSIDUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
128	ETOPOSIDUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129	ETOPOSIDUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130	ETOPOSIDUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131	ETOPOSIDUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132	ETOPOSIDUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	ETOPOSIDUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134	ETOPOSIDUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135	ETOPOSIDUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136	ETOPOSIDUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137	ETOPOSIDUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138	ETOPOSIDUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139	ETOPOSIDUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140	ETOPOSIDUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141	ETOPOSIDUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142	ETOPOSIDUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143	ETOPOSIDUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144	ETOPOSIDUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145	ETOPOSIDUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146	ETOPOSIDUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147	ETOPOSIDUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148	ETOPOSIDUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149	ETOPOSIDUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150	ETOPOSIDUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151	ETOPOSIDUM	C33	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
152	ETOPOSIDUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
153	ETOPOSIDUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
154	ETOPOSIDUM	C34.1	PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
155	ETOPOSIDUM	C34.2	PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
156	ETOPOSIDUM	C34.3	PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
157	ETOPOSIDUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
158	ETOPOSIDUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
159	ETOPOSIDUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
160	ETOPOSIDUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
161	ETOPOSIDUM	C38.0	SERCE
162	ETOPOSIDUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
163	ETOPOSIDUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
164	ETOPOSIDUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
165	ETOPOSIDUM	C38.4	OPLUCNA
166	ETOPOSIDUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
167	ETOPOSIDUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
168	ETOPOSIDUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
169	ETOPOSIDUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
170	ETOPOSIDUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
171	ETOPOSIDUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
172	ETOPOSIDUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
173	ETOPOSIDUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
174	ETOPOSIDUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
175	ETOPOSIDUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
176	ETOPOSIDUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
177	ETOPOSIDUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
178	ETOPOSIDUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
179	ETOPOSIDUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
180	ETOPOSIDUM	C41.1	ŻUCHWA
181	ETOPOSIDUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
182	ETOPOSIDUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
183	ETOPOSIDUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
184	ETOPOSIDUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
185	ETOPOSIDUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
186	ETOPOSIDUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
187	ETOPOSIDUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
188	ETOPOSIDUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
189	ETOPOSIDUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
190	ETOPOSIDUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
191	ETOPOSIDUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
192	ETOPOSIDUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
193	ETOPOSIDUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
194	ETOPOSIDUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
195	ETOPOSIDUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
196	ETOPOSIDUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
197	ETOPOSIDUM	C46	MIĘSAK KAPOSI' EGO
198	ETOPOSIDUM	C46.0	MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY
199	ETOPOSIDUM	C46.1	MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ
200	ETOPOSIDUM	C46.2	MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA
201	ETOPOSIDUM	C46.3	MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
202	ETOPOSIDUM	C46.7	MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
203	ETOPOSIDUM	C46.8	MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
204	ETOPOSIDUM	C46.9	MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY
205	ETOPOSIDUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
206	ETOPOSIDUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
207	ETOPOSIDUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
208	ETOPOSIDUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
209	ETOPOSIDUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
210	ETOPOSIDUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
211	ETOPOSIDUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
212	ETOPOSIDUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
213	ETOPOSIDUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
214	ETOPOSIDUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
215	ETOPOSIDUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
216	ETOPOSIDUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
217	ETOPOSIDUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
218	ETOPOSIDUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
219	ETOPOSIDUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
220	ETOPOSIDUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
221	ETOPOSIDUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
222	ETOPOSIDUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
223	ETOPOSIDUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
224	ETOPOSIDUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
225	ETOPOSIDUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
226	ETOPOSIDUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
227	ETOPOSIDUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
228	ETOPOSIDUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
229	ETOPOSIDUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
230	ETOPOSIDUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
231	ETOPOSIDUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
232	ETOPOSIDUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
233	ETOPOSIDUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
234	ETOPOSIDUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
235	ETOPOSIDUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
236	ETOPOSIDUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
237	ETOPOSIDUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
238	ETOPOSIDUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
239	ETOPOSIDUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
240	ETOPOSIDUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
241	ETOPOSIDUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
242	ETOPOSIDUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
243	ETOPOSIDUM	C51.2	ŁECHTACZKA
244	ETOPOSIDUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
245	ETOPOSIDUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
246	ETOPOSIDUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
247	ETOPOSIDUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
248	ETOPOSIDUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
249	ETOPOSIDUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
250	ETOPOSIDUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
251	ETOPOSIDUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
252	ETOPOSIDUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
253	ETOPOSIDUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
254	ETOPOSIDUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
255	ETOPOSIDUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
256	ETOPOSIDUM	C54.3	DNO MACICY
257	ETOPOSIDUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
258	ETOPOSIDUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
259	ETOPOSIDUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
260	ETOPOSIDUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
261	ETOPOSIDUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
262	ETOPOSIDUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
263	ETOPOSIDUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
264	ETOPOSIDUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
265	ETOPOSIDUM	C57.3	PRZYMATICZA
266	ETOPOSIDUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
267	ETOPOSIDUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
268	ETOPOSIDUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
269	ETOPOSIDUM	C57.9	ZĘŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
270	ETOPOSIDUM	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
271	ETOPOSIDUM	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
272	ETOPOSIDUM	C60.0	NAPLETEK
273	ETOPOSIDUM	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
274	ETOPOSIDUM	C60.2	TRZON PRĄCIA
275	ETOPOSIDUM	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
276	ETOPOSIDUM	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
277	ETOPOSIDUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
278	ETOPOSIDUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
279	ETOPOSIDUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
280	ETOPOSIDUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
281	ETOPOSIDUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
282	ETOPOSIDUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
283	ETOPOSIDUM	C63.0	NAJĄDRZE
284	ETOPOSIDUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
285	ETOPOSIDUM	C63.2	MOSZNA
286	ETOPOSIDUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
287	ETOPOSIDUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
288	ETOPOSIDUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
289	ETOPOSIDUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
290	ETOPOSIDUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
291	ETOPOSIDUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
292	ETOPOSIDUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
293	ETOPOSIDUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
294	ETOPOSIDUM	C67.1	SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
295	ETOPOSIDUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
296	ETOPOSIDUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
297	ETOPOSIDUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
298	ETOPOSIDUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
299	ETOPOSIDUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
300	ETOPOSIDUM	C67.7	MOCZOWNIK
301	ETOPOSIDUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
302	ETOPOSIDUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
303	ETOPOSIDUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
304	ETOPOSIDUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
305	ETOPOSIDUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
306	ETOPOSIDUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
307	ETOPOSIDUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
308	ETOPOSIDUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
309	ETOPOSIDUM	C69.0	SPOJÓWKA
310	ETOPOSIDUM	C69.1	ROGÓWKA
311	ETOPOSIDUM	C69.2	SIATKÓWKA
312	ETOPOSIDUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
313	ETOPOSIDUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
314	ETOPOSIDUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
315	ETOPOSIDUM	C69.6	OCZODÓŁ
316	ETOPOSIDUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
317	ETOPOSIDUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
318	ETOPOSIDUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
319	ETOPOSIDUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
320	ETOPOSIDUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
321	ETOPOSIDUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
322	ETOPOSIDUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
323	ETOPOSIDUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
324	ETOPOSIDUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
325	ETOPOSIDUM	C71.2	PLAT SKRONIOWY
326	ETOPOSIDUM	C71.3	PLAT CIEMIENOWY
327	ETOPOSIDUM	C71.4	PLAT POTYLICZNY
328	ETOPOSIDUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
329	ETOPOSIDUM	C71.6	MÓZDZEK
330	ETOPOSIDUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
331	ETOPOSIDUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
332	ETOPOSIDUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
333	ETOPOSIDUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
334	ETOPOSIDUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
335	ETOPOSIDUM	C72.1	OGON KOŃSKI
336	ETOPOSIDUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
337	ETOPOSIDUM	C72.3	NERW WZROKOWY
338	ETOPOSIDUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
339	ETOPOSIDUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
340	ETOPOSIDUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
341	ETOPOSIDUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
342	ETOPOSIDUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
343	ETOPOSIDUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
344	ETOPOSIDUM	C74.0	KORA NADNERCZY
345	ETOPOSIDUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
346	ETOPOSIDUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
347	ETOPOSIDUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
348	ETOPOSIDUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
349	ETOPOSIDUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
350	ETOPOSIDUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
351	ETOPOSIDUM	C75.3	SZYSZYŃKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
352	ETOPOSIDUM	C75.4	KŁĘBEK SZYJNY
353	ETOPOSIDUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
354	ETOPOSIDUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
355	ETOPOSIDUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
356	ETOPOSIDUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
357	ETOPOSIDUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
358	ETOPOSIDUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
359	ETOPOSIDUM	C76.2	BRZUCH
360	ETOPOSIDUM	C76.3	MIEDNICA
361	ETOPOSIDUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
362	ETOPOSIDUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
363	ETOPOSIDUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
364	ETOPOSIDUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
365	ETOPOSIDUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
366	ETOPOSIDUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
367	ETOPOSIDUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
368	ETOPOSIDUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
369	ETOPOSIDUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
370	ETOPOSIDUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
371	ETOPOSIDUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
372	ETOPOSIDUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
373	ETOPOSIDUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
374	ETOPOSIDUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
375	ETOPOSIDUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
376	ETOPOSIDUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
377	ETOPOSIDUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ
378	ETOPOSIDUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
379	ETOPOSIDUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
380	ETOPOSIDUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
381	ETOPOSIDUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
382	ETOPOSIDUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
383	ETOPOSIDUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
384	ETOPOSIDUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
385	ETOPOSIDUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
386	ETOPOSIDUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
387	ETOPOSIDUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
388	ETOPOSIDUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
389	ETOPOSIDUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
390	ETOPOSIDUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
391	ETOPOSIDUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
392	ETOPOSIDUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
393	ETOPOSIDUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
394	ETOPOSIDUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
395	ETOPOSIDUM	C81	CHOROBA HODGKINA
396	ETOPOSIDUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
397	ETOPOSIDUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
398	ETOPOSIDUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
399	ETOPOSIDUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
400	ETOPOSIDUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
401	ETOPOSIDUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
402	ETOPOSIDUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
403	ETOPOSIDUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
404	ETOPOSIDUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
405	ETOPOSIDUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
406	ETOPOSIDUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
407	ETOPOSIDUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
408	ETOPOSIDUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
409	ETOPOSIDUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
410	ETOPOSIDUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
411	ETOPOSIDUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
412	ETOPOSIDUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
413	ETOPOSIDUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
414	ETOPOSIDUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
415	ETOPOSIDUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
416	ETOPOSIDUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
417	ETOPOSIDUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
418	ETOPOSIDUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
419	ETOPOSIDUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
420	ETOPOSIDUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
421	ETOPOSIDUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
422	ETOPOSIDUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
423	ETOPOSIDUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
424	ETOPOSIDUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
425	ETOPOSIDUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
426	ETOPOSIDUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
427	ETOPOSIDUM	C85.0	MIEŚSAK LIMFATYCZNY
428	ETOPOSIDUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
429	ETOPOSIDUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
430	ETOPOSIDUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
431	ETOPOSIDUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
432	ETOPOSIDUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
433	ETOPOSIDUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
434	ETOPOSIDUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
435	ETOPOSIDUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
436	ETOPOSIDUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
437	ETOPOSIDUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
438	ETOPOSIDUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
439	ETOPOSIDUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
440	ETOPOSIDUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
441	ETOPOSIDUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
442	ETOPOSIDUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
443	ETOPOSIDUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
444	ETOPOSIDUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
445	ETOPOSIDUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
446	ETOPOSIDUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
447	ETOPOSIDUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
448	ETOPOSIDUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
449	ETOPOSIDUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
450	ETOPOSIDUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
451	ETOPOSIDUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
452	ETOPOSIDUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
453	ETOPOSIDUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
454	ETOPOSIDUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
455	ETOPOSIDUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
456	ETOPOSIDUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
457	ETOPOSIDUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
458	ETOPOSIDUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
459	ETOPOSIDUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
460	ETOPOSIDUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
461	ETOPOSIDUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
462	ETOPOSIDUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
463	ETOPOSIDUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
464	ETOPOSIDUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
465	ETOPOSIDUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
466	ETOPOSIDUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
467	ETOPOSIDUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
468	ETOPOSIDUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
469	ETOPOSIDUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
470	ETOPOSIDUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
471	ETOPOSIDUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
472	ETOPOSIDUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
473	ETOPOSIDUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
474	ETOPOSIDUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
475	ETOPOSIDUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
476	ETOPOSIDUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
477	ETOPOSIDUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
478	ETOPOSIDUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
479	ETOPOSIDUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
480	ETOPOSIDUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
481	ETOPOSIDUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
482	ETOPOSIDUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
483	ETOPOSIDUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
484	ETOPOSIDUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
485	ETOPOSIDUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
486	ETOPOSIDUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
487	ETOPOSIDUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
488	ETOPOSIDUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
489	ETOPOSIDUM	D01.0	OKRĘŻNICA
490	ETOPOSIDUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
491	ETOPOSIDUM	D01.2	ODBYTNICA
492	ETOPOSIDUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
493	ETOPOSIDUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
494	ETOPOSIDUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
495	ETOPOSIDUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
496	ETOPOSIDUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
497	ETOPOSIDUM	D03	CZERNIAK IN SITU
498	ETOPOSIDUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
499	ETOPOSIDUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
500	ETOPOSIDUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
501	ETOPOSIDUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
502	ETOPOSIDUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
503	ETOPOSIDUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
504	ETOPOSIDUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
505	ETOPOSIDUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
506	ETOPOSIDUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
507	ETOPOSIDUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
508	ETOPOSIDUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
509	ETOPOSIDUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
510	ETOPOSIDUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
511	ETOPOSIDUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
512	ETOPOSIDUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
513	ETOPOSIDUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
514	ETOPOSIDUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
515	ETOPOSIDUM	D07.1	SROM
516	ETOPOSIDUM	D07.2	POCHWA
517	ETOPOSIDUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
518	ETOPOSIDUM	D07.4	PRĄCIE
519	ETOPOSIDUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
520	ETOPOSIDUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
521	ETOPOSIDUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
522	ETOPOSIDUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
523	ETOPOSIDUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
524	ETOPOSIDUM	D09.2	OKO
525	ETOPOSIDUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
526	ETOPOSIDUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
527	ETOPOSIDUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
528	ETOPOSIDUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
529	ETOPOSIDUM	D10.0	WARGA
530	ETOPOSIDUM	D10.1	JĘZYK
531	ETOPOSIDUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
532	ETOPOSIDUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
533	ETOPOSIDUM	D10.4	MIGDAŁEK
534	ETOPOSIDUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
535	ETOPOSIDUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
536	ETOPOSIDUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
537	ETOPOSIDUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
538	ETOPOSIDUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
539	ETOPOSIDUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
540	ETOPOSIDUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
541	ETOPOSIDUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
542	ETOPOSIDUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
543	ETOPOSIDUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
544	ETOPOSIDUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
545	ETOPOSIDUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
546	ETOPOSIDUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
547	ETOPOSIDUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
548	ETOPOSIDUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
549	ETOPOSIDUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
550	ETOPOSIDUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
551	ETOPOSIDUM	D12.8	ODBYTNICA
552	ETOPOSIDUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
553	ETOPOSIDUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
554	ETOPOSIDUM	D13.0	PRZĘLYK
555	ETOPOSIDUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
556	ETOPOSIDUM	D13.2	DWUNASTNICA
557	ETOPOSIDUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
558	ETOPOSIDUM	D13.4	WĄTROBA
559	ETOPOSIDUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
560	ETOPOSIDUM	D13.6	TRZUSTKA
561	ETOPOSIDUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
562	ETOPOSIDUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
563	ETOPOSIDUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
564	ETOPOSIDUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
565	ETOPOSIDUM	D14.1	KRTAŃ
566	ETOPOSIDUM	D14.2	TCHAWICA
567	ETOPOSIDUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
568	ETOPOSIDUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
569	ETOPOSIDUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
570	ETOPOSIDUM	D15.0	GRASICA
571	ETOPOSIDUM	D15.1	SERCE
572	ETOPOSIDUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
573	ETOPOSIDUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
574	ETOPOSIDUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
575	ETOPOSIDUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
576	ETOPOSIDUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
577	ETOPOSIDUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
578	ETOPOSIDUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
579	ETOPOSIDUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
580	ETOPOSIDUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
581	ETOPOSIDUM	D16.5	ZUCHWA
582	ETOPOSIDUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
583	ETOPOSIDUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
584	ETOPOSIDUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
585	ETOPOSIDUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
586	ETOPOSIDUM	D18	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
587	ETOPOSIDUM	D18.0	NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
588	ETOPOSIDUM	D18.1	NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
589	ETOPOSIDUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
590	ETOPOSIDUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
591	ETOPOSIDUM	D20.1	OTRZEWNA
592	ETOPOSIDUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
593	ETOPOSIDUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
594	ETOPOSIDUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
595	ETOPOSIDUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
596	ETOPOSIDUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
597	ETOPOSIDUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
598	ETOPOSIDUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
599	ETOPOSIDUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
600	ETOPOSIDUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
601	ETOPOSIDUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
602	ETOPOSIDUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
603	ETOPOSIDUM	D28.0	SROM
604	ETOPOSIDUM	D28.1	POCHWA
605	ETOPOSIDUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
606	ETOPOSIDUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
607	ETOPOSIDUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
608	ETOPOSIDUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
609	ETOPOSIDUM	D29.0	PRĄCIE
610	ETOPOSIDUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
611	ETOPOSIDUM	D29.2	JĄDRO
612	ETOPOSIDUM	D29.3	NAJĄDRZE
613	ETOPOSIDUM	D29.4	MOSZNA
614	ETOPOSIDUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
615	ETOPOSIDUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
616	ETOPOSIDUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
617	ETOPOSIDUM	D30.0	NERKA
618	ETOPOSIDUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
619	ETOPOSIDUM	D30.2	MOCZOWÓD
620	ETOPOSIDUM	D30.3	PĘCHERZ MOCZOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
621	ETOPOSIDUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
622	ETOPOSIDUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
623	ETOPOSIDUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
624	ETOPOSIDUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
625	ETOPOSIDUM	D31.0	SPOJÓWKA
626	ETOPOSIDUM	D31.1	ROGÓWKA
627	ETOPOSIDUM	D31.2	SIATKÓWKA
628	ETOPOSIDUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
629	ETOPOSIDUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
630	ETOPOSIDUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
631	ETOPOSIDUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
632	ETOPOSIDUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
633	ETOPOSIDUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
634	ETOPOSIDUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
635	ETOPOSIDUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
636	ETOPOSIDUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
637	ETOPOSIDUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
638	ETOPOSIDUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
639	ETOPOSIDUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
640	ETOPOSIDUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
641	ETOPOSIDUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
642	ETOPOSIDUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
643	ETOPOSIDUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
644	ETOPOSIDUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
645	ETOPOSIDUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
646	ETOPOSIDUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
647	ETOPOSIDUM	D35.0	NADNERCZA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
648	ETOPOSIDUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
649	ETOPOSIDUM	D35.2	PRZYSADKA
650	ETOPOSIDUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
651	ETOPOSIDUM	D35.4	SZYSZYNKA
652	ETOPOSIDUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
653	ETOPOSIDUM	D35.6	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
654	ETOPOSIDUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
655	ETOPOSIDUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
656	ETOPOSIDUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
657	ETOPOSIDUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
658	ETOPOSIDUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
659	ETOPOSIDUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
660	ETOPOSIDUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
661	ETOPOSIDUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
662	ETOPOSIDUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
663	ETOPOSIDUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
664	ETOPOSIDUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
665	ETOPOSIDUM	D37.2	JELITO CIENKIE
666	ETOPOSIDUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
667	ETOPOSIDUM	D37.4	OKRĘŻNICA
668	ETOPOSIDUM	D37.5	ODBYTNICA
669	ETOPOSIDUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
670	ETOPOSIDUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
671	ETOPOSIDUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
672	ETOPOSIDUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
673	ETOPOSIDUM	D38.0	KRTAŃ
674	ETOPOSIDUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
675	ETOPOSIDUM	D38.2	OPLUCNA
676	ETOPOSIDUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
677	ETOPOSIDUM	D38.4	GRASICA
678	ETOPOSIDUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
679	ETOPOSIDUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
680	ETOPOSIDUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
681	ETOPOSIDUM	D39.0	MACICA
682	ETOPOSIDUM	D39.1	JAJNIK
683	ETOPOSIDUM	D39.2	ŁOŻYSKO
684	ETOPOSIDUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
685	ETOPOSIDUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
686	ETOPOSIDUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
687	ETOPOSIDUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
688	ETOPOSIDUM	D40.1	JĄDRO
689	ETOPOSIDUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
690	ETOPOSIDUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
691	ETOPOSIDUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
692	ETOPOSIDUM	D41.0	NERKA
693	ETOPOSIDUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
694	ETOPOSIDUM	D41.2	MOCZOWÓD
695	ETOPOSIDUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
696	ETOPOSIDUM	D41.4	PĘCHERZ MOCZOWY
697	ETOPOSIDUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
698	ETOPOSIDUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
699	ETOPOSIDUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
700	ETOPOSIDUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
701	ETOPOSIDUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
702	ETOPOSIDUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
703	ETOPOSIDUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
704	ETOPOSIDUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIAOTOWE
705	ETOPOSIDUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIAOTOWE
706	ETOPOSIDUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
707	ETOPOSIDUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
708	ETOPOSIDUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
709	ETOPOSIDUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
710	ETOPOSIDUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
711	ETOPOSIDUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
712	ETOPOSIDUM	D44.0	TARCZYCA
713	ETOPOSIDUM	D44.1	NADNERCZA
714	ETOPOSIDUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
715	ETOPOSIDUM	D44.3	PRZYSADKA
716	ETOPOSIDUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
717	ETOPOSIDUM	D44.5	SZYSZYNKA
718	ETOPOSIDUM	D44.6	KLĘBEK SZYJNY
719	ETOPOSIDUM	D44.7	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
720	ETOPOSIDUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
721	ETOPOSIDUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
722	ETOPOSIDUM	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
723	ETOPOSIDUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
724	ETOPOSIDUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
725	ETOPOSIDUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
726	ETOPOSIDUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
727	ETOPOSIDUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
728	ETOPOSIDUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
729	ETOPOSIDUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
730	ETOPOSIDUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
731	ETOPOSIDUM	D47	INNY NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
732	ETOPOSIDUM	D47.0	GUZY HISTIOCYTÓW I KOMÓREK TUCZNYCH O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE
733	ETOPOSIDUM	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
734	ETOPOSIDUM	D47.2	GAMMOPATIA MONOKLONALNA
735	ETOPOSIDUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
736	ETOPOSIDUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
737	ETOPOSIDUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
738	ETOPOSIDUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
739	ETOPOSIDUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
740	ETOPOSIDUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
741	ETOPOSIDUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
742	ETOPOSIDUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
743	ETOPOSIDUM	D48.4	OTRZEWNA
744	ETOPOSIDUM	D48.5	SKÓRA
745	ETOPOSIDUM	D48.6	SUTEK
746	ETOPOSIDUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
747	ETOPOSIDUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
748	ETOPOSIDUM	D63.0	NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU CHOROBY NOWOTWOROWEJ (C00-D48□)
749	ETOPOSIDUM	D63.8	NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB PRZEWLEKŁYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
750	ETOPOSIDUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
751	ETOPOSIDUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
752	ETOPOSIDUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
753	ETOPOSIDUM	D81.9	ZŁOŻONE NIEDOBORY ODPORNOŚCI, NIEOKREŚLONE
754	ETOPOSIDUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
755	ETOPOSIDUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
756	ETOPOSIDUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
757	ETOPOSIDUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
758	ETOPOSIDUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
759	ETOPOSIDUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
760	ETOPOSIDUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
761	ETOPOSIDUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.25.

FLUDARABINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	FLUDARABINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
2	FLUDARABINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
3	FLUDARABINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
4	FLUDARABINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
5	FLUDARABINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
6	FLUDARABINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
7	FLUDARABINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
8	FLUDARABINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
9	FLUDARABINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
10	FLUDARABINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
11	FLUDARABINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
12	FLUDARABINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
13	FLUDARABINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
14	FLUDARABINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
15	FLUDARABINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
16	FLUDARABINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
17	FLUDARABINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
18	FLUDARABINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
19	FLUDARABINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
20	FLUDARABINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
21	FLUDARABINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
22	FLUDARABINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23	FLUDARABINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
24	FLUDARABINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
25	FLUDARABINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
26	FLUDARABINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
27	FLUDARABINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
28	FLUDARABINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
29	FLUDARABINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
30	FLUDARABINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
31	FLUDARABINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
32	FLUDARABINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
33	FLUDARABINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
34	FLUDARABINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
35	FLUDARABINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
36	FLUDARABINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
37	FLUDARABINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
38	FLUDARABINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
39	FLUDARABINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
40	FLUDARABINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
41	FLUDARABINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
42	FLUDARABINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
43	FLUDARABINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
44	FLUDARABINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
45	FLUDARABINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
46	FLUDARABINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
47	FLUDARABINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
48	FLUDARABINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
49	FLUDARABINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
50	FLUDARABINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	FLUDARABINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
52	FLUDARABINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
53	FLUDARABINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
54	FLUDARABINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
55	FLUDARABINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
56	FLUDARABINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
57	FLUDARABINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
58	FLUDARABINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
59	FLUDARABINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
60	FLUDARABINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
61	FLUDARABINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
62	FLUDARABINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
63	FLUDARABINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
64	FLUDARABINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
65	FLUDARABINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
66	FLUDARABINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
67	FLUDARABINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
68	FLUDARABINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
69	FLUDARABINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
70	FLUDARABINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
71	FLUDARABINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
72	FLUDARABINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
73	FLUDARABINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
74	FLUDARABINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
75	FLUDARABINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
76	FLUDARABINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
77	FLUDARABINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
78	FLUDARABINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
79	FLUDARABINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
80	FLUDARABINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
81	FLUDARABINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
82	FLUDARABINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
83	FLUDARABINUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
84	FLUDARABINUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
85	FLUDARABINUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
86	FLUDARABINUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
87	FLUDARABINUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
88	FLUDARABINUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
89	FLUDARABINUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
90	FLUDARABINUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.26.

FLUOROURACILUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	FLUOROURACILUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	FLUOROURACILUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	FLUOROURACILUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	FLUOROURACILUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	FLUOROURACILUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	FLUOROURACILUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	FLUOROURACILUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	FLUOROURACILUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	FLUOROURACILUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	FLUOROURACILUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	FLUOROURACILUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	FLUOROURACILUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	FLUOROURACILUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	FLUOROURACILUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	FLUOROURACILUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	FLUOROURACILUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	FLUOROURACILUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	FLUOROURACILUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	FLUOROURACILUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	FLUOROURACILUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	FLUOROURACILUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	FLUOROURACILUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	FLUOROURACILUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	FLUOROURACILUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	FLUOROURACILUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	FLUOROURACILUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	FLUOROURACILUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	FLUOROURACILUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	FLUOROURACILUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	FLUOROURACILUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	FLUOROURACILUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	FLUOROURACILUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	FLUOROURACILUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	FLUOROURACILUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	FLUOROURACILUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	FLUOROURACILUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	FLUOROURACILUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	FLUOROURACILUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	FLUOROURACILUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	FLUOROURACILUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	FLUOROURACILUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	FLUOROURACILUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	FLUOROURACILUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	FLUOROURACILUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	FLUOROURACILUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	FLUOROURACILUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	FLUOROURACILUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	FLUOROURACILUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	FLUOROURACILUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	FLUOROURACILUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	FLUOROURACILUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	FLUOROURACILUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	FLUOROURACILUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	FLUOROURACILUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	FLUOROURACILUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	FLUOROURACILUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	FLUOROURACILUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	FLUOROURACILUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	FLUOROURACILUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	FLUOROURACILUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	FLUOROURACILUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	FLUOROURACILUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	FLUOROURACILUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	FLUOROURACILUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	FLUOROURACILUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	FLUOROURACILUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	FLUOROURACILUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	FLUOROURACILUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	FLUOROURACILUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	FLUOROURACILUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	FLUOROURACILUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	FLUOROURACILUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	FLUOROURACILUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	FLUOROURACILUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	FLUOROURACILUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	FLUOROURACILUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	FLUOROURACILUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	FLUOROURACILUM	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU
79	FLUOROURACILUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
80	FLUOROURACILUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
81	FLUOROURACILUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
82	FLUOROURACILUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
83	FLUOROURACILUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
84	FLUOROURACILUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
85	FLUOROURACILUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
86	FLUOROURACILUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
87	FLUOROURACILUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
88	FLUOROURACILUM	C16.0	WPUST
89	FLUOROURACILUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
90	FLUOROURACILUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
91	FLUOROURACILUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
92	FLUOROURACILUM	C16.4	ODŹWIERNIK
93	FLUOROURACILUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
94	FLUOROURACILUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
95	FLUOROURACILUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
96	FLUOROURACILUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
97	FLUOROURACILUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
98	FLUOROURACILUM	C17.0	DWUNASTNICA
99	FLUOROURACILUM	C17.1	JELITO CZCZE
100	FLUOROURACILUM	C17.2	JELITO KRĘTE
101	FLUOROURACILUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
102	FLUOROURACILUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
103	FLUOROURACILUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
104	FLUOROURACILUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
105	FLUOROURACILUM	C18.0	JELITO ŚLEPE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	FLUOROURACILUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
107	FLUOROURACILUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
108	FLUOROURACILUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
109	FLUOROURACILUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
110	FLUOROURACILUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
111	FLUOROURACILUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
112	FLUOROURACILUM	C18.7	ESICA
113	FLUOROURACILUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
114	FLUOROURACILUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
115	FLUOROURACILUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
116	FLUOROURACILUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
117	FLUOROURACILUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
118	FLUOROURACILUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
119	FLUOROURACILUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
120	FLUOROURACILUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
121	FLUOROURACILUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
122	FLUOROURACILUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
123	FLUOROURACILUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
124	FLUOROURACILUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
125	FLUOROURACILUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
126	FLUOROURACILUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
127	FLUOROURACILUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
128	FLUOROURACILUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
129	FLUOROURACILUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
130	FLUOROURACILUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZYKA ŻÓLCIOWEGO
131	FLUOROURACILUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
132	FLUOROURACILUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	FLUOROURACILUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
134	FLUOROURACILUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
135	FLUOROURACILUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
136	FLUOROURACILUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
137	FLUOROURACILUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
138	FLUOROURACILUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
139	FLUOROURACILUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
140	FLUOROURACILUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
141	FLUOROURACILUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
142	FLUOROURACILUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
143	FLUOROURACILUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
144	FLUOROURACILUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
145	FLUOROURACILUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
146	FLUOROURACILUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
147	FLUOROURACILUM	C26.1	ŚLEDZIONA
148	FLUOROURACILUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
149	FLUOROURACILUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
150	FLUOROURACILUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
151	FLUOROURACILUM	C30.0	JAMA NOSOWA
152	FLUOROURACILUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
153	FLUOROURACILUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
154	FLUOROURACILUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
155	FLUOROURACILUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
156	FLUOROURACILUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
157	FLUOROURACILUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
158	FLUOROURACILUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
159	FLUOROURACILUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
160	FLUOROURACILUM	C32	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
161	FLUOROURACILUM	C32.0	GŁOŚNIA
162	FLUOROURACILUM	C32.1	NAGŁOŚNIA
163	FLUOROURACILUM	C32.2	JAMA PODGŁOŚNIOWA
164	FLUOROURACILUM	C32.3	CHRZĄSTKI KRTANI
165	FLUOROURACILUM	C32.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI
166	FLUOROURACILUM	C32.9	KRTAŃ, NIEOKREŚLONA
167	FLUOROURACILUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
168	FLUOROURACILUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
169	FLUOROURACILUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
170	FLUOROURACILUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
171	FLUOROURACILUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
172	FLUOROURACILUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
173	FLUOROURACILUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
174	FLUOROURACILUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
175	FLUOROURACILUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
176	FLUOROURACILUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
177	FLUOROURACILUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
178	FLUOROURACILUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
179	FLUOROURACILUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
180	FLUOROURACILUM	C51.2	ŁECHTACZKA
181	FLUOROURACILUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
182	FLUOROURACILUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
183	FLUOROURACILUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
184	FLUOROURACILUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
185	FLUOROURACILUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
186	FLUOROURACILUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
187	FLUOROURACILUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
188	FLUOROURACILUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
189	FLUOROURACILUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
190	FLUOROURACILUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
191	FLUOROURACILUM	C54.1	BŁONA ŚLIZOWA MACICY
192	FLUOROURACILUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
193	FLUOROURACILUM	C54.3	DNO MACICY
194	FLUOROURACILUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
195	FLUOROURACILUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
196	FLUOROURACILUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
197	FLUOROURACILUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
198	FLUOROURACILUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
199	FLUOROURACILUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
200	FLUOROURACILUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
201	FLUOROURACILUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
202	FLUOROURACILUM	C57.3	PRZYMATICZA
203	FLUOROURACILUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
204	FLUOROURACILUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
205	FLUOROURACILUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
206	FLUOROURACILUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
207	FLUOROURACILUM	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
208	FLUOROURACILUM	C60.0	NAPLETEK
209	FLUOROURACILUM	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
210	FLUOROURACILUM	C60.2	TRZON PRĄCIA
211	FLUOROURACILUM	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
212	FLUOROURACILUM	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
213	FLUOROURACILUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
214	FLUOROURACILUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
215	FLUOROURACILUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
216	FLUOROURACILUM	C76.2	BRZUCH
217	FLUOROURACILUM	C76.3	MIEDNICA
218	FLUOROURACILUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
219	FLUOROURACILUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
220	FLUOROURACILUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
221	FLUOROURACILUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
222	FLUOROURACILUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
223	FLUOROURACILUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
224	FLUOROURACILUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
225	FLUOROURACILUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ
226	FLUOROURACILUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
227	FLUOROURACILUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
228	FLUOROURACILUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
229	FLUOROURACILUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
230	FLUOROURACILUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
231	FLUOROURACILUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
232	FLUOROURACILUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
233	FLUOROURACILUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
234	FLUOROURACILUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
235	FLUOROURACILUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
236	FLUOROURACILUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
237	FLUOROURACILUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
238	FLUOROURACILUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
239	FLUOROURACILUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
240	FLUOROURACILUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
241	FLUOROURACILUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
242	FLUOROURACILUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
243	FLUOROURACILUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
244	FLUOROURACILUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
245	FLUOROURACILUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
246	FLUOROURACILUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
247	FLUOROURACILUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
248	FLUOROURACILUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
249	FLUOROURACILUM	D48.4	OTRZEWNA
250	FLUOROURACILUM	D48.5	SKÓRA
251	FLUOROURACILUM	D48.6	SUTEK
252	FLUOROURACILUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
253	FLUOROURACILUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.27.

FULVESTRANT

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	FULVESTRANT	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
2	FULVESTRANT	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
3	FULVESTRANT	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
4	FULVESTRANT	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
5	FULVESTRANT	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
6	FULVESTRANT	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
7	FULVESTRANT	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
8	FULVESTRANT	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
9	FULVESTRANT	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
10	FULVESTRANT	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.28.

GEMCYTABINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	GEMCYTABINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
2	GEMCYTABINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
3	GEMCYTABINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
4	GEMCYTABINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
5	GEMCYTABINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
6	GEMCYTABINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
7	GEMCYTABINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
8	GEMCYTABINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
9	GEMCYTABINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
10	GEMCYTABINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
11	GEMCYTABINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
12	GEMCYTABINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
13	GEMCYTABINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
14	GEMCYTABINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
15	GEMCYTABINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
16	GEMCYTABINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
17	GEMCYTABINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
18	GEMCYTABINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
19	GEMCYTABINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
20	GEMCYTABINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
21	GEMCYTABINUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
22	GEMCYTABINUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
23	GEMCYTABINUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	GEMCYTABINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
25	GEMCYTABINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
26	GEMCYTABINUM	C38.4	OPLUCNA
27	GEMCYTABINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
28	GEMCYTABINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
29	GEMCYTABINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
30	GEMCYTABINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
31	GEMCYTABINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
32	GEMCYTABINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
33	GEMCYTABINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
34	GEMCYTABINUM	C45	MIĘDZYBŁONIAK
35	GEMCYTABINUM	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ
36	GEMCYTABINUM	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
37	GEMCYTABINUM	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
38	GEMCYTABINUM	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
39	GEMCYTABINUM	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
40	GEMCYTABINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
41	GEMCYTABINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
42	GEMCYTABINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
43	GEMCYTABINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
44	GEMCYTABINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
45	GEMCYTABINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
46	GEMCYTABINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
47	GEMCYTABINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
48	GEMCYTABINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
49	GEMCYTABINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
50	GEMCYTABINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	GEMCYTABINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
52	GEMCYTABINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
53	GEMCYTABINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
54	GEMCYTABINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
55	GEMCYTABINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
56	GEMCYTABINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
57	GEMCYTABINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
58	GEMCYTABINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
59	GEMCYTABINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
60	GEMCYTABINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
61	GEMCYTABINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
62	GEMCYTABINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
63	GEMCYTABINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
64	GEMCYTABINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
65	GEMCYTABINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
66	GEMCYTABINUM	C57.3	PRZYMATICZA
67	GEMCYTABINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
68	GEMCYTABINUM	C57.7	INNE OKRESŁONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
69	GEMCYTABINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
70	GEMCYTABINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
71	GEMCYTABINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
72	GEMCYTABINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
73	GEMCYTABINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
74	GEMCYTABINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
75	GEMCYTABINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
76	GEMCYTABINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
77	GEMCYTABINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
78	GEMCYTABINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
79	GEMCYTABINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
80	GEMCYTABINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
81	GEMCYTABINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
82	GEMCYTABINUM	C67.5	SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
83	GEMCYTABINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
84	GEMCYTABINUM	C67.7	MOCZOWNIK
85	GEMCYTABINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
86	GEMCYTABINUM	C67.9	PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
87	GEMCYTABINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
88	GEMCYTABINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
89	GEMCYTABINUM	C76.1	KŁATKA PIERSIOWA
90	GEMCYTABINUM	C76.2	BRZUCH
91	GEMCYTABINUM	C76.3	MIEDNICA
92	GEMCYTABINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
93	GEMCYTABINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
94	GEMCYTABINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
95	GEMCYTABINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
96	GEMCYTABINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA

Załącznik C.29.

HYDROXYCARBAMIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	HYDROXYCARBAMIDUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
2	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
3	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
4	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
5	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
6	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
7	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
8	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.6	MÓZDZEK
9	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
10	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
11	HYDROXYCARBAMIDUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
12	HYDROXYCARBAMIDUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
13	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
14	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.1	OGON KOŃSKI
15	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
16	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.3	NERW WZROKOWY
17	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
18	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
19	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
20	HYDROXYCARBAMIDUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
21	HYDROXYCARBAMIDUM	C81	CHOROBA HODGKINA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
22	HYDROXYCARBAMIDUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
23	HYDROXYCARBAMIDUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
24	HYDROXYCARBAMIDUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
25	HYDROXYCARBAMIDUM	C81.3	ZMNIJSZENIE LIMFOCYTÓW
26	HYDROXYCARBAMIDUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
27	HYDROXYCARBAMIDUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
28	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
29	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
30	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
31	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
32	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
33	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
34	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
35	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
36	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
37	HYDROXYCARBAMIDUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
38	HYDROXYCARBAMIDUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
39	HYDROXYCARBAMIDUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
40	HYDROXYCARBAMIDUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
41	HYDROXYCARBAMIDUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
42	HYDROXYCARBAMIDUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
43	HYDROXYCARBAMIDUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
44	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
45	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
46	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
47	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
48	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
50	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
51	HYDROXYCARBAMIDUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
52	HYDROXYCARBAMIDUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
53	HYDROXYCARBAMIDUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
54	HYDROXYCARBAMIDUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
55	HYDROXYCARBAMIDUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
56	HYDROXYCARBAMIDUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
57	HYDROXYCARBAMIDUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
58	HYDROXYCARBAMIDUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
59	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
60	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
61	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
62	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
63	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
64	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
65	HYDROXYCARBAMIDUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
66	HYDROXYCARBAMIDUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
67	HYDROXYCARBAMIDUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
68	HYDROXYCARBAMIDUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
69	HYDROXYCARBAMIDUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
70	HYDROXYCARBAMIDUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
71	HYDROXYCARBAMIDUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
72	HYDROXYCARBAMIDUM	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
73	HYDROXYCARBAMIDUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
74	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
75	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
76	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
77	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
78	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
79	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
80	HYDROXYCARBAMIDUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
81	HYDROXYCARBAMIDUM	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
82	HYDROXYCARBAMIDUM	D57	ZABURZENIA POŁĄCZONE Z SIERPOWATOKRWINKOWOŚCIĄ
83	HYDROXYCARBAMIDUM	D57.0	NIEDOKRWISTOŚĆ SIEROPAWTOKRWINKOWA Z PRZEŁOMEM
84	HYDROXYCARBAMIDUM	D57.1	NIEDOKRWISTOŚĆ SIEROPAWTOKRWINKOWA BEZ PRZEŁOMU
85	HYDROXYCARBAMIDUM	D57.2	PODWÓJNA HETEROZYGOTA W POŁĄCZENIU Z SIERPOWATOKRWINKOWOŚCIĄ
86	HYDROXYCARBAMIDUM	D57.3	CECHA SIERPOWATOKRWINKOWOŚCI
87	HYDROXYCARBAMIDUM	D57.8	INNE SIERPOWATOKRWINKOWOŚCI
88	HYDROXYCARBAMIDUM	D75.2	NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA
89	HYDROXYCARBAMIDUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDEJ
90	HYDROXYCARBAMIDUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
91	HYDROXYCARBAMIDUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM

Załącznik C.30.

IDARUBICIN

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	IDARUBICIN	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
2	IDARUBICIN	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
3	IDARUBICIN	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
4	IDARUBICIN	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
5	IDARUBICIN	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
6	IDARUBICIN	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
7	IDARUBICIN	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
8	IDARUBICIN	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
9	IDARUBICIN	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
10	IDARUBICIN	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
11	IDARUBICIN	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
12	IDARUBICIN	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
13	IDARUBICIN	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
14	IDARUBICIN	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
15	IDARUBICIN	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
16	IDARUBICIN	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
17	IDARUBICIN	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
18	IDARUBICIN	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
19	IDARUBICIN	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
20	IDARUBICIN	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
21	IDARUBICIN	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
22	IDARUBICIN	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
23	IDARUBICIN	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
24	IDARUBICIN	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
25	IDARUBICIN	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
26	IDARUBICIN	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
27	IDARUBICIN	C74.0	KORA NADNERCZY
28	IDARUBICIN	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
29	IDARUBICIN	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
30	IDARUBICIN	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
31	IDARUBICIN	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
32	IDARUBICIN	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
33	IDARUBICIN	C76.2	BRZUCH
34	IDARUBICIN	C76.3	MIEDNICA
35	IDARUBICIN	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
36	IDARUBICIN	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
37	IDARUBICIN	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
38	IDARUBICIN	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
39	IDARUBICIN	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
40	IDARUBICIN	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
41	IDARUBICIN	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
42	IDARUBICIN	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
43	IDARUBICIN	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
44	IDARUBICIN	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
45	IDARUBICIN	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
46	IDARUBICIN	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
47	IDARUBICIN	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
48	IDARUBICIN	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49	IDARUBICIN	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
50	IDARUBICIN	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
51	IDARUBICIN	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
52	IDARUBICIN	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
53	IDARUBICIN	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
54	IDARUBICIN	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
55	IDARUBICIN	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
56	IDARUBICIN	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
57	IDARUBICIN	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
58	IDARUBICIN	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
59	IDARUBICIN	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
60	IDARUBICIN	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
61	IDARUBICIN	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
62	IDARUBICIN	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
63	IDARUBICIN	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
64	IDARUBICIN	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
65	IDARUBICIN	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
66	IDARUBICIN	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
67	IDARUBICIN	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
68	IDARUBICIN	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
69	IDARUBICIN	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
70	IDARUBICIN	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
71	IDARUBICIN	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
72	IDARUBICIN	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
73	IDARUBICIN	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
74	IDARUBICIN	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
75	IDARUBICIN	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
76	IDARUBICIN	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
77	IDARUBICIN	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
78	IDARUBICIN	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
79	IDARUBICIN	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
80	IDARUBICIN	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
81	IDARUBICIN	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
82	IDARUBICIN	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
83	IDARUBICIN	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
84	IDARUBICIN	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
85	IDARUBICIN	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
86	IDARUBICIN	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
87	IDARUBICIN	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
88	IDARUBICIN	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
89	IDARUBICIN	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
90	IDARUBICIN	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
91	IDARUBICIN	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
92	IDARUBICIN	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
93	IDARUBICIN	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
94	IDARUBICIN	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
95	IDARUBICIN	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
96	IDARUBICIN	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.31.

IFOSFAMIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	IFOSFAMIDUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2	IFOSFAMIDUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3	IFOSFAMIDUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4	IFOSFAMIDUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5	IFOSFAMIDUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6	IFOSFAMIDUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7	IFOSFAMIDUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8	IFOSFAMIDUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9	IFOSFAMIDUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10	IFOSFAMIDUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11	IFOSFAMIDUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12	IFOSFAMIDUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13	IFOSFAMIDUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14	IFOSFAMIDUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15	IFOSFAMIDUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16	IFOSFAMIDUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17	IFOSFAMIDUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18	IFOSFAMIDUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19	IFOSFAMIDUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20	IFOSFAMIDUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21	IFOSFAMIDUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22	IFOSFAMIDUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23	IFOSFAMIDUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24	IFOSFAMIDUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25	IFOSFAMIDUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26	IFOSFAMIDUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27	IFOSFAMIDUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28	IFOSFAMIDUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29	IFOSFAMIDUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30	IFOSFAMIDUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31	IFOSFAMIDUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32	IFOSFAMIDUM	C05.2	JĘZYCZEK
33	IFOSFAMIDUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34	IFOSFAMIDUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35	IFOSFAMIDUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36	IFOSFAMIDUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37	IFOSFAMIDUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38	IFOSFAMIDUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39	IFOSFAMIDUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40	IFOSFAMIDUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41	IFOSFAMIDUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42	IFOSFAMIDUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43	IFOSFAMIDUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44	IFOSFAMIDUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45	IFOSFAMIDUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46	IFOSFAMIDUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47	IFOSFAMIDUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48	IFOSFAMIDUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49	IFOSFAMIDUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50	IFOSFAMIDUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	IFOSFAMIDUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52	IFOSFAMIDUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53	IFOSFAMIDUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54	IFOSFAMIDUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55	IFOSFAMIDUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56	IFOSFAMIDUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57	IFOSFAMIDUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58	IFOSFAMIDUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59	IFOSFAMIDUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60	IFOSFAMIDUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61	IFOSFAMIDUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62	IFOSFAMIDUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63	IFOSFAMIDUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64	IFOSFAMIDUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65	IFOSFAMIDUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66	IFOSFAMIDUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67	IFOSFAMIDUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68	IFOSFAMIDUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69	IFOSFAMIDUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70	IFOSFAMIDUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71	IFOSFAMIDUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72	IFOSFAMIDUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73	IFOSFAMIDUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74	IFOSFAMIDUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75	IFOSFAMIDUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76	IFOSFAMIDUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77	IFOSFAMIDUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
78	IFOSFAMIDUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79	IFOSFAMIDUM	C16.0	WPUST
80	IFOSFAMIDUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81	IFOSFAMIDUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82	IFOSFAMIDUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83	IFOSFAMIDUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84	IFOSFAMIDUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85	IFOSFAMIDUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86	IFOSFAMIDUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87	IFOSFAMIDUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88	IFOSFAMIDUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89	IFOSFAMIDUM	C17.0	DWUNASTNICA
90	IFOSFAMIDUM	C17.1	JELITO CZCZE
91	IFOSFAMIDUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92	IFOSFAMIDUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93	IFOSFAMIDUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94	IFOSFAMIDUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95	IFOSFAMIDUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96	IFOSFAMIDUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97	IFOSFAMIDUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98	IFOSFAMIDUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99	IFOSFAMIDUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100	IFOSFAMIDUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101	IFOSFAMIDUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
102	IFOSFAMIDUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103	IFOSFAMIDUM	C18.7	ESICA
104	IFOSFAMIDUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105	IFOSFAMIDUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
106	IFOSFAMIDUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107	IFOSFAMIDUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108	IFOSFAMIDUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109	IFOSFAMIDUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110	IFOSFAMIDUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111	IFOSFAMIDUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112	IFOSFAMIDUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113	IFOSFAMIDUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114	IFOSFAMIDUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115	IFOSFAMIDUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116	IFOSFAMIDUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117	IFOSFAMIDUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118	IFOSFAMIDUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119	IFOSFAMIDUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120	IFOSFAMIDUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121	IFOSFAMIDUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122	IFOSFAMIDUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123	IFOSFAMIDUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124	IFOSFAMIDUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125	IFOSFAMIDUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126	IFOSFAMIDUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127	IFOSFAMIDUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
128	IFOSFAMIDUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129	IFOSFAMIDUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130	IFOSFAMIDUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131	IFOSFAMIDUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132	IFOSFAMIDUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
133	IFOSFAMIDUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134	IFOSFAMIDUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135	IFOSFAMIDUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136	IFOSFAMIDUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137	IFOSFAMIDUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138	IFOSFAMIDUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139	IFOSFAMIDUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140	IFOSFAMIDUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141	IFOSFAMIDUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142	IFOSFAMIDUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143	IFOSFAMIDUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144	IFOSFAMIDUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145	IFOSFAMIDUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146	IFOSFAMIDUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147	IFOSFAMIDUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148	IFOSFAMIDUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149	IFOSFAMIDUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150	IFOSFAMIDUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151	IFOSFAMIDUM	C32	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI
152	IFOSFAMIDUM	C32.0	GŁOŚNIA
153	IFOSFAMIDUM	C32.1	NAGŁOŚNIA
154	IFOSFAMIDUM	C32.2	JAMA PODGŁOŚNIOWA
155	IFOSFAMIDUM	C32.3	CHRZĄSTKI KRTANI
156	IFOSFAMIDUM	C32.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI
157	IFOSFAMIDUM	C32.9	KRTAŃ, NIEOKREŚLONA
158	IFOSFAMIDUM	C33	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
159	IFOSFAMIDUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
160	IFOSFAMIDUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
161	IFOSFAMIDUM	C34.1	PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
162	IFOSFAMIDUM	C34.2	PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
163	IFOSFAMIDUM	C34.3	PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
164	IFOSFAMIDUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
165	IFOSFAMIDUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
166	IFOSFAMIDUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
167	IFOSFAMIDUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
168	IFOSFAMIDUM	C38.0	SERCE
169	IFOSFAMIDUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
170	IFOSFAMIDUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
171	IFOSFAMIDUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
172	IFOSFAMIDUM	C38.4	OPLUCNA
173	IFOSFAMIDUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
174	IFOSFAMIDUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
175	IFOSFAMIDUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
176	IFOSFAMIDUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
177	IFOSFAMIDUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
178	IFOSFAMIDUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
179	IFOSFAMIDUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
180	IFOSFAMIDUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
181	IFOSFAMIDUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
182	IFOSFAMIDUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
183	IFOSFAMIDUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
184	IFOSFAMIDUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
185	IFOSFAMIDUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
186	IFOSFAMIDUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
187	IFOSFAMIDUM	C41.1	ZUCHWA
188	IFOSFAMIDUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
189	IFOSFAMIDUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
190	IFOSFAMIDUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
191	IFOSFAMIDUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
192	IFOSFAMIDUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
193	IFOSFAMIDUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
194	IFOSFAMIDUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
195	IFOSFAMIDUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
196	IFOSFAMIDUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
197	IFOSFAMIDUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
198	IFOSFAMIDUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
199	IFOSFAMIDUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
200	IFOSFAMIDUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
201	IFOSFAMIDUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
202	IFOSFAMIDUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
203	IFOSFAMIDUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
204	IFOSFAMIDUM	C46	MIĘSAK KAPOSI' EGO
205	IFOSFAMIDUM	C46.0	MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY
206	IFOSFAMIDUM	C46.1	MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ
207	IFOSFAMIDUM	C46.2	MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA
208	IFOSFAMIDUM	C46.3	MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
209	IFOSFAMIDUM	C46.7	MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
210	IFOSFAMIDUM	C46.8	MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
211	IFOSFAMIDUM	C46.9	MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY
212	IFOSFAMIDUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
213	IFOSFAMIDUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
214	IFOSFAMIDUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
215	IFOSFAMIDUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
216	IFOSFAMIDUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
217	IFOSFAMIDUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
218	IFOSFAMIDUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
219	IFOSFAMIDUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
220	IFOSFAMIDUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
221	IFOSFAMIDUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
222	IFOSFAMIDUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
223	IFOSFAMIDUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
224	IFOSFAMIDUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
225	IFOSFAMIDUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
226	IFOSFAMIDUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
227	IFOSFAMIDUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
228	IFOSFAMIDUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
229	IFOSFAMIDUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
230	IFOSFAMIDUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
231	IFOSFAMIDUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
232	IFOSFAMIDUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
233	IFOSFAMIDUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
234	IFOSFAMIDUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
235	IFOSFAMIDUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
236	IFOSFAMIDUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
237	IFOSFAMIDUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
238	IFOSFAMIDUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
239	IFOSFAMIDUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
240	IFOSFAMIDUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
241	IFOSFAMIDUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
242	IFOSFAMIDUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
243	IFOSFAMIDUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
244	IFOSFAMIDUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
245	IFOSFAMIDUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
246	IFOSFAMIDUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
247	IFOSFAMIDUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
248	IFOSFAMIDUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
249	IFOSFAMIDUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
250	IFOSFAMIDUM	C51.2	ŁECHTACZKA
251	IFOSFAMIDUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
252	IFOSFAMIDUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
253	IFOSFAMIDUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
254	IFOSFAMIDUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
255	IFOSFAMIDUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
256	IFOSFAMIDUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
257	IFOSFAMIDUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
258	IFOSFAMIDUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
259	IFOSFAMIDUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
260	IFOSFAMIDUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
261	IFOSFAMIDUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
262	IFOSFAMIDUM	C54.2	MIEŚNIÓWKA MACICY
263	IFOSFAMIDUM	C54.3	DNO MACICY
264	IFOSFAMIDUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
265	IFOSFAMIDUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
266	IFOSFAMIDUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
267	IFOSFAMIDUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
268	IFOSFAMIDUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
269	IFOSFAMIDUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
270	IFOSFAMIDUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
271	IFOSFAMIDUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
272	IFOSFAMIDUM	C57.3	PRZYMATICZA
273	IFOSFAMIDUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
274	IFOSFAMIDUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
275	IFOSFAMIDUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
276	IFOSFAMIDUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
277	IFOSFAMIDUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
278	IFOSFAMIDUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
279	IFOSFAMIDUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
280	IFOSFAMIDUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
281	IFOSFAMIDUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
282	IFOSFAMIDUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
283	IFOSFAMIDUM	C63.0	NAJĄDRZE
284	IFOSFAMIDUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
285	IFOSFAMIDUM	C63.2	MOSZNA
286	IFOSFAMIDUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
287	IFOSFAMIDUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
288	IFOSFAMIDUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
289	IFOSFAMIDUM	C64.9	NEPHROBLASTOMA (GUZ WILMSA)
290	IFOSFAMIDUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
291	IFOSFAMIDUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
292	IFOSFAMIDUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
293	IFOSFAMIDUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
294	IFOSFAMIDUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
295	IFOSFAMIDUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
296	IFOSFAMIDUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
297	IFOSFAMIDUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
298	IFOSFAMIDUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
299	IFOSFAMIDUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
300	IFOSFAMIDUM	C67.7	MOCZOWNIK
301	IFOSFAMIDUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
302	IFOSFAMIDUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
303	IFOSFAMIDUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
304	IFOSFAMIDUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
305	IFOSFAMIDUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
306	IFOSFAMIDUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
307	IFOSFAMIDUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
308	IFOSFAMIDUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
309	IFOSFAMIDUM	C69.0	SPOJÓWKA
310	IFOSFAMIDUM	C69.1	ROGÓWKA
311	IFOSFAMIDUM	C69.2	SIATKÓWKA
312	IFOSFAMIDUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
313	IFOSFAMIDUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
314	IFOSFAMIDUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
315	IFOSFAMIDUM	C69.6	OCZODÓŁ
316	IFOSFAMIDUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
317	IFOSFAMIDUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
318	IFOSFAMIDUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
319	IFOSFAMIDUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
320	IFOSFAMIDUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
321	IFOSFAMIDUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
322	IFOSFAMIDUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
323	IFOSFAMIDUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
324	IFOSFAMIDUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
325	IFOSFAMIDUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
326	IFOSFAMIDUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
327	IFOSFAMIDUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
328	IFOSFAMIDUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
329	IFOSFAMIDUM	C71.6	MÓZDŻEK
330	IFOSFAMIDUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
331	IFOSFAMIDUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
332	IFOSFAMIDUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
333	IFOSFAMIDUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
334	IFOSFAMIDUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
335	IFOSFAMIDUM	C72.1	OGON KOŃSKI
336	IFOSFAMIDUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
337	IFOSFAMIDUM	C72.3	NERW WZROKOWY
338	IFOSFAMIDUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
339	IFOSFAMIDUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
340	IFOSFAMIDUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
341	IFOSFAMIDUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
342	IFOSFAMIDUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
343	IFOSFAMIDUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
344	IFOSFAMIDUM	C74.0	KORA NADNERCZY
345	IFOSFAMIDUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
346	IFOSFAMIDUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
347	IFOSFAMIDUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
348	IFOSFAMIDUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
349	IFOSFAMIDUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
350	IFOSFAMIDUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
351	IFOSFAMIDUM	C75.3	SZYSZYŃKA
352	IFOSFAMIDUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
353	IFOSFAMIDUM	C75.5	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
354	IFOSFAMIDUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
355	IFOSFAMIDUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
356	IFOSFAMIDUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
357	IFOSFAMIDUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
358	IFOSFAMIDUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
359	IFOSFAMIDUM	C76.2	BRZUCH
360	IFOSFAMIDUM	C76.3	MIEDNICA
361	IFOSFAMIDUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
362	IFOSFAMIDUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
363	IFOSFAMIDUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
364	IFOSFAMIDUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
365	IFOSFAMIDUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
366	IFOSFAMIDUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
367	IFOSFAMIDUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
368	IFOSFAMIDUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
369	IFOSFAMIDUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
370	IFOSFAMIDUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
371	IFOSFAMIDUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
372	IFOSFAMIDUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
373	IFOSFAMIDUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
374	IFOSFAMIDUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
375	IFOSFAMIDUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
376	IFOSFAMIDUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
377	IFOSFAMIDUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
378	IFOSFAMIDUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
379	IFOSFAMIDUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
380	IFOSFAMIDUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
381	IFOSFAMIDUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
382	IFOSFAMIDUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
383	IFOSFAMIDUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
384	IFOSFAMIDUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
385	IFOSFAMIDUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
386	IFOSFAMIDUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
387	IFOSFAMIDUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
388	IFOSFAMIDUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
389	IFOSFAMIDUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
390	IFOSFAMIDUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
391	IFOSFAMIDUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
392	IFOSFAMIDUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
393	IFOSFAMIDUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
394	IFOSFAMIDUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
395	IFOSFAMIDUM	C81	CHOROBA HODGKINA
396	IFOSFAMIDUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
397	IFOSFAMIDUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
398	IFOSFAMIDUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
399	IFOSFAMIDUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
400	IFOSFAMIDUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
401	IFOSFAMIDUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
402	IFOSFAMIDUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
403	IFOSFAMIDUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
404	IFOSFAMIDUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
405	IFOSFAMIDUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
406	IFOSFAMIDUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
407	IFOSFAMIDUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
408	IFOSFAMIDUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
409	IFOSFAMIDUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
410	IFOSFAMIDUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
411	IFOSFAMIDUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
412	IFOSFAMIDUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
413	IFOSFAMIDUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
414	IFOSFAMIDUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
415	IFOSFAMIDUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
416	IFOSFAMIDUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
417	IFOSFAMIDUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
418	IFOSFAMIDUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
419	IFOSFAMIDUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
420	IFOSFAMIDUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
421	IFOSFAMIDUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
422	IFOSFAMIDUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
423	IFOSFAMIDUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
424	IFOSFAMIDUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
425	IFOSFAMIDUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
426	IFOSFAMIDUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
427	IFOSFAMIDUM	C85.0	MIEŚSAK LIMFATYCZNY
428	IFOSFAMIDUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
429	IFOSFAMIDUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
430	IFOSFAMIDUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
431	IFOSFAMIDUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
432	IFOSFAMIDUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
433	IFOSFAMIDUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
434	IFOSFAMIDUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
435	IFOSFAMIDUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
436	IFOSFAMIDUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
437	IFOSFAMIDUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
438	IFOSFAMIDUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
439	IFOSFAMIDUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
440	IFOSFAMIDUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNAKOMÓRKOWA
441	IFOSFAMIDUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
442	IFOSFAMIDUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
443	IFOSFAMIDUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
444	IFOSFAMIDUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
445	IFOSFAMIDUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
446	IFOSFAMIDUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
447	IFOSFAMIDUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
448	IFOSFAMIDUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
449	IFOSFAMIDUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
450	IFOSFAMIDUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
451	IFOSFAMIDUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
452	IFOSFAMIDUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
453	IFOSFAMIDUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
454	IFOSFAMIDUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
455	IFOSFAMIDUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
456	IFOSFAMIDUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
457	IFOSFAMIDUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
458	IFOSFAMIDUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
459	IFOSFAMIDUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
460	IFOSFAMIDUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
461	IFOSFAMIDUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
462	IFOSFAMIDUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
463	IFOSFAMIDUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
464	IFOSFAMIDUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
465	IFOSFAMIDUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
466	IFOSFAMIDUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
467	IFOSFAMIDUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
468	IFOSFAMIDUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
469	IFOSFAMIDUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
470	IFOSFAMIDUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
471	IFOSFAMIDUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
472	IFOSFAMIDUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
473	IFOSFAMIDUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
474	IFOSFAMIDUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
475	IFOSFAMIDUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
476	IFOSFAMIDUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
477	IFOSFAMIDUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
478	IFOSFAMIDUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
479	IFOSFAMIDUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
480	IFOSFAMIDUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
481	IFOSFAMIDUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
482	IFOSFAMIDUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
483	IFOSFAMIDUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
484	IFOSFAMIDUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
485	IFOSFAMIDUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
486	IFOSFAMIDUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
487	IFOSFAMIDUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
488	IFOSFAMIDUM	D01	RAKI IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
489	IFOSFAMIDUM	D01.0	OKRĘŻNICA
490	IFOSFAMIDUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
491	IFOSFAMIDUM	D01.2	ODBYTNICA
492	IFOSFAMIDUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
493	IFOSFAMIDUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
494	IFOSFAMIDUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
495	IFOSFAMIDUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
496	IFOSFAMIDUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
497	IFOSFAMIDUM	D03	CZERNIAK IN SITU
498	IFOSFAMIDUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
499	IFOSFAMIDUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
500	IFOSFAMIDUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
501	IFOSFAMIDUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
502	IFOSFAMIDUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
503	IFOSFAMIDUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
504	IFOSFAMIDUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
505	IFOSFAMIDUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
506	IFOSFAMIDUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
507	IFOSFAMIDUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
508	IFOSFAMIDUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
509	IFOSFAMIDUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
510	IFOSFAMIDUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
511	IFOSFAMIDUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
512	IFOSFAMIDUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
513	IFOSFAMIDUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
514	IFOSFAMIDUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
515	IFOSFAMIDUM	D07.1	SROM
516	IFOSFAMIDUM	D07.2	POCHWA
517	IFOSFAMIDUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
518	IFOSFAMIDUM	D07.4	PRĄCIE
519	IFOSFAMIDUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
520	IFOSFAMIDUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
521	IFOSFAMIDUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
522	IFOSFAMIDUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
523	IFOSFAMIDUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
524	IFOSFAMIDUM	D09.2	OKO
525	IFOSFAMIDUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
526	IFOSFAMIDUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
527	IFOSFAMIDUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
528	IFOSFAMIDUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
529	IFOSFAMIDUM	D10.0	WARGA
530	IFOSFAMIDUM	D10.1	JĘZYK
531	IFOSFAMIDUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
532	IFOSFAMIDUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
533	IFOSFAMIDUM	D10.4	MIGDAŁEK
534	IFOSFAMIDUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
535	IFOSFAMIDUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
536	IFOSFAMIDUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
537	IFOSFAMIDUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
538	IFOSFAMIDUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
539	IFOSFAMIDUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
540	IFOSFAMIDUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
541	IFOSFAMIDUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
542	IFOSFAMIDUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICZY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
543	IFOSFAMIDUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
544	IFOSFAMIDUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
545	IFOSFAMIDUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
546	IFOSFAMIDUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
547	IFOSFAMIDUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
548	IFOSFAMIDUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
549	IFOSFAMIDUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
550	IFOSFAMIDUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
551	IFOSFAMIDUM	D12.8	ODBYTNICA
552	IFOSFAMIDUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
553	IFOSFAMIDUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
554	IFOSFAMIDUM	D13.0	PRZĘLYK
555	IFOSFAMIDUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
556	IFOSFAMIDUM	D13.2	DWUNASTNICA
557	IFOSFAMIDUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
558	IFOSFAMIDUM	D13.4	WĄTROBA
559	IFOSFAMIDUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
560	IFOSFAMIDUM	D13.6	TRZUSTKA
561	IFOSFAMIDUM	D13.7	WYSPIY TRZUSTKI
562	IFOSFAMIDUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
563	IFOSFAMIDUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
564	IFOSFAMIDUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
565	IFOSFAMIDUM	D14.1	KRTAŃ
566	IFOSFAMIDUM	D14.2	TCHAWICA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
567	IFOSFAMIDUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
568	IFOSFAMIDUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
569	IFOSFAMIDUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
570	IFOSFAMIDUM	D15.0	GRASICA
571	IFOSFAMIDUM	D15.1	SERCE
572	IFOSFAMIDUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
573	IFOSFAMIDUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
574	IFOSFAMIDUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
575	IFOSFAMIDUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
576	IFOSFAMIDUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
577	IFOSFAMIDUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
578	IFOSFAMIDUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
579	IFOSFAMIDUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
580	IFOSFAMIDUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
581	IFOSFAMIDUM	D16.5	ŻUCHWA
582	IFOSFAMIDUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
583	IFOSFAMIDUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
584	IFOSFAMIDUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
585	IFOSFAMIDUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
586	IFOSFAMIDUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
587	IFOSFAMIDUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
588	IFOSFAMIDUM	D20.1	OTRZEWNA
589	IFOSFAMIDUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
590	IFOSFAMIDUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
591	IFOSFAMIDUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
592	IFOSFAMIDUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
593	IFOSFAMIDUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
594	IFOSFAMIDUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
595	IFOSFAMIDUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
596	IFOSFAMIDUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
597	IFOSFAMIDUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
598	IFOSFAMIDUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
599	IFOSFAMIDUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
600	IFOSFAMIDUM	D28.0	SROM
601	IFOSFAMIDUM	D28.1	POCHWA
602	IFOSFAMIDUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
603	IFOSFAMIDUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
604	IFOSFAMIDUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
605	IFOSFAMIDUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
606	IFOSFAMIDUM	D29.0	PRĄCIE
607	IFOSFAMIDUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
608	IFOSFAMIDUM	D29.2	JĄDRO
609	IFOSFAMIDUM	D29.3	NAJĄDRZE
610	IFOSFAMIDUM	D29.4	MOSZNA
611	IFOSFAMIDUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
612	IFOSFAMIDUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
613	IFOSFAMIDUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
614	IFOSFAMIDUM	D30.0	NERKA
615	IFOSFAMIDUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
616	IFOSFAMIDUM	D30.2	MOCZOWÓD
617	IFOSFAMIDUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
618	IFOSFAMIDUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
619	IFOSFAMIDUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
620	IFOSFAMIDUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
621	IFOSFAMIDUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
622	IFOSFAMIDUM	D31.0	SPOJÓWKA
623	IFOSFAMIDUM	D31.1	ROGÓWKA
624	IFOSFAMIDUM	D31.2	SIATKÓWKA
625	IFOSFAMIDUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
626	IFOSFAMIDUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
627	IFOSFAMIDUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
628	IFOSFAMIDUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
629	IFOSFAMIDUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
630	IFOSFAMIDUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
631	IFOSFAMIDUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
632	IFOSFAMIDUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
633	IFOSFAMIDUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
634	IFOSFAMIDUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
635	IFOSFAMIDUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIAOTOWE
636	IFOSFAMIDUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIAOTOWE
637	IFOSFAMIDUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
638	IFOSFAMIDUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
639	IFOSFAMIDUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
640	IFOSFAMIDUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
641	IFOSFAMIDUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
642	IFOSFAMIDUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
643	IFOSFAMIDUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
644	IFOSFAMIDUM	D35.0	NADNERCZA
645	IFOSFAMIDUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
646	IFOSFAMIDUM	D35.2	PRZYSADKA
647	IFOSFAMIDUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
648	IFOSFAMIDUM	D35.4	SZYSZYNKI
649	IFOSFAMIDUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
650	IFOSFAMIDUM	D35.6	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
651	IFOSFAMIDUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
652	IFOSFAMIDUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
653	IFOSFAMIDUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
654	IFOSFAMIDUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
655	IFOSFAMIDUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
656	IFOSFAMIDUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
657	IFOSFAMIDUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
658	IFOSFAMIDUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
659	IFOSFAMIDUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
660	IFOSFAMIDUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
661	IFOSFAMIDUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
662	IFOSFAMIDUM	D37.2	JELITO CIENKIE
663	IFOSFAMIDUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
664	IFOSFAMIDUM	D37.4	OKRĘŻNICA
665	IFOSFAMIDUM	D37.5	ODBYTNICA
666	IFOSFAMIDUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
667	IFOSFAMIDUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
668	IFOSFAMIDUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
669	IFOSFAMIDUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
670	IFOSFAMIDUM	D38.0	KRTAŃ
671	IFOSFAMIDUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
672	IFOSFAMIDUM	D38.2	OPLUCNA
673	IFOSFAMIDUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
674	IFOSFAMIDUM	D38.4	GRASICA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
675	IFOSFAMIDUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
676	IFOSFAMIDUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
677	IFOSFAMIDUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
678	IFOSFAMIDUM	D39.0	MACICA
679	IFOSFAMIDUM	D39.1	JAJNIK
680	IFOSFAMIDUM	D39.2	ŁOŻYSKO
681	IFOSFAMIDUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
682	IFOSFAMIDUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
683	IFOSFAMIDUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
684	IFOSFAMIDUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
685	IFOSFAMIDUM	D40.1	JĄDRO
686	IFOSFAMIDUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
687	IFOSFAMIDUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
688	IFOSFAMIDUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
689	IFOSFAMIDUM	D41.0	NERKA
690	IFOSFAMIDUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
691	IFOSFAMIDUM	D41.2	MOCZOWÓD
692	IFOSFAMIDUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
693	IFOSFAMIDUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY
694	IFOSFAMIDUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
695	IFOSFAMIDUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
696	IFOSFAMIDUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
697	IFOSFAMIDUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
698	IFOSFAMIDUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
699	IFOSFAMIDUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
700	IFOSFAMIDUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
701	IFOSFAMIDUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
702	IFOSFAMIDUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
703	IFOSFAMIDUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
704	IFOSFAMIDUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
705	IFOSFAMIDUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
706	IFOSFAMIDUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
707	IFOSFAMIDUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
708	IFOSFAMIDUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
709	IFOSFAMIDUM	D44.0	TARCZYCA
710	IFOSFAMIDUM	D44.1	NADNERCZA
711	IFOSFAMIDUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
712	IFOSFAMIDUM	D44.3	PRZYSADKA
713	IFOSFAMIDUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
714	IFOSFAMIDUM	D44.5	SZYSZYNKĄ
715	IFOSFAMIDUM	D44.6	KLĘBEK SZYJNY
716	IFOSFAMIDUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
717	IFOSFAMIDUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
718	IFOSFAMIDUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
719	IFOSFAMIDUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
720	IFOSFAMIDUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
721	IFOSFAMIDUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
722	IFOSFAMIDUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
723	IFOSFAMIDUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
724	IFOSFAMIDUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
725	IFOSFAMIDUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
726	IFOSFAMIDUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
727	IFOSFAMIDUM	D48.4	OTRZEWNIA
728	IFOSFAMIDUM	D48.5	SKÓRA
729	IFOSFAMIDUM	D48.6	SUTEK
730	IFOSFAMIDUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
731	IFOSFAMIDUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
732	IFOSFAMIDUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDEJ
733	IFOSFAMIDUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
734	IFOSFAMIDUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
735	IFOSFAMIDUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
736	IFOSFAMIDUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
737	IFOSFAMIDUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
738	IFOSFAMIDUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
739	IFOSFAMIDUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
740	IFOSFAMIDUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
741	IFOSFAMIDUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.32.

INTERFERON ALFA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	INTERFERON ALFA	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
2.	INTERFERON ALFA	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
3.	INTERFERON ALFA	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
4.	INTERFERON ALFA	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
5.	INTERFERON ALFA	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
6.	INTERFERON ALFA	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
7.	INTERFERON ALFA	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
8.	INTERFERON ALFA	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
9.	INTERFERON ALFA	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
10.	INTERFERON ALFA	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
11.	INTERFERON ALFA	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
12.	INTERFERON ALFA	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
13.	INTERFERON ALFA	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
14.	INTERFERON ALFA	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
15.	INTERFERON ALFA	C69.0	SPOJÓWKA
16.	INTERFERON ALFA	C69.1	ROGÓWKA
17.	INTERFERON ALFA	C69.2	SIATKÓWKA
18.	INTERFERON ALFA	C69.3	NACZYNIÓWKA
19.	INTERFERON ALFA	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
20.	INTERFERON ALFA	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
21.	INTERFERON ALFA	C69.6	OCZODÓŁ
22.	INTERFERON ALFA	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	INTERFERON ALFA	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
24.	INTERFERON ALFA	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
25.	INTERFERON ALFA	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
26.	INTERFERON ALFA	C90.0	SZPICZAK MNOGI
27.	INTERFERON ALFA	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA
28.	INTERFERON ALFA	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
29.	INTERFERON ALFA	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
30.	INTERFERON ALFA	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
31.	INTERFERON ALFA	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
32.	INTERFERON ALFA	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
33.	INTERFERON ALFA	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
34.	INTERFERON ALFA	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
35.	INTERFERON ALFA	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
36.	INTERFERON ALFA	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
37.	INTERFERON ALFA	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
38.	INTERFERON ALFA	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
39.	INTERFERON ALFA	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
40.	INTERFERON ALFA	D03	CZERNIAK IN SITU
41.	INTERFERON ALFA	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
42.	INTERFERON ALFA	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
43.	INTERFERON ALFA	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
44.	INTERFERON ALFA	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
45.	INTERFERON ALFA	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
46.	INTERFERON ALFA	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
47.	INTERFERON ALFA	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
48.	INTERFERON ALFA	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
49.	INTERFERON ALFA	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
50.	INTERFERON ALFA	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
51.	INTERFERON ALFA	D18	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
52.	INTERFERON ALFA	D18.0	NACZYNIANKI KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
53.	INTERFERON ALFA	D18.1	NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
54.	INTERFERON ALFA	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
55.	INTERFERON ALFA	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
56.	INTERFERON ALFA	D75.2	NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA
57.	INTERFERON ALFA	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
58.	INTERFERON ALFA	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
59.	INTERFERON ALFA	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
60.	INTERFERON ALFA	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE, POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
61.	INTERFERON ALFA	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA
62.	INTERFERON ALFA	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
63.	INTERFERON ALFA	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
64.	INTERFERON ALFA	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIAWATYCH
65.	INTERFERON ALFA	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
66.	INTERFERON ALFA	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.33.

INTERFERONUM ALFA-2A

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	INTERFERONUM ALFA-2A	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
2.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
3.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
4.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
5.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
6.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
7.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
8.	INTERFERONUM ALFA-2A	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
9.	INTERFERONUM ALFA-2A	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
10.	INTERFERONUM ALFA-2A	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
11.	INTERFERONUM ALFA-2A	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
12.	INTERFERONUM ALFA-2A	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
13.	INTERFERONUM ALFA-2A	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
14.	INTERFERONUM ALFA-2A	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
15.	INTERFERONUM ALFA-2A	D18	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
16.	INTERFERONUM ALFA-2A	D18.0	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
17.	INTERFERONUM ALFA-2A	D18.1	NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
18.	INTERFERONUM ALFA-2A	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
19.	INTERFERONUM ALFA-2A	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
20.	INTERFERONUM ALFA-2A	D75.2	NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA

Załącznik C.34.

INTERFERONUM ALFA-2B

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
2.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
3.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
4.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
5.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
6.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
7.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
8.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
9.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
10.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
11.	INTERFERONUM ALFA-2B	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
12.	INTERFERONUM ALFA-2B	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
13.	INTERFERONUM ALFA-2B	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
14.	INTERFERONUM ALFA-2B	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
15.	INTERFERONUM ALFA-2B	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
16.	INTERFERONUM ALFA-2B	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
17.	INTERFERONUM ALFA-2B	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
18.	INTERFERONUM ALFA-2B	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
19.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
20.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
21.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
22.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
23.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
24.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
25.	INTERFERONUM ALFA-2B	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
26.	INTERFERONUM ALFA-2B	C90.0	SZPICZAK MNOGI
27.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
28.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
29.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
30.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
31.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
32.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
33.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
34.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
35.	INTERFERONUM ALFA-2B	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
36.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
37.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
38.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
39.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
40.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
41.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
42.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
43.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
44.	INTERFERONUM ALFA-2B	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
45.	INTERFERONUM ALFA-2B	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
46.	INTERFERONUM ALFA-2B	D47.1	PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
47.	INTERFERONUM ALFA-2B	D75.2	NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA
48.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
49.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE, POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
50.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA
51.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
52.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
53.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
54.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
55.	INTERFERONUM ALFA-2B	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.35.

IRINOTECANUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	IRINOTECANUM	C15	RAK PRZELYKU
2.	IRINOTECANUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
3.	IRINOTECANUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
4.	IRINOTECANUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
5.	IRINOTECANUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
6.	IRINOTECANUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
7.	IRINOTECANUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
8.	IRINOTECANUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
9.	IRINOTECANUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
10.	IRINOTECANUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
11.	IRINOTECANUM	C16.0	WPUST
12.	IRINOTECANUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
13.	IRINOTECANUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
14.	IRINOTECANUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
15.	IRINOTECANUM	C16.4	ODŹWIERNIK
16.	IRINOTECANUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
17.	IRINOTECANUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
18.	IRINOTECANUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
19.	IRINOTECANUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
20.	IRINOTECANUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
21.	IRINOTECANUM	C17.0	DWUNASTNICA
22.	IRINOTECANUM	C17.1	JELITO CZCZE
23.	IRINOTECANUM	C17.2	JELITO KRĘTE
24.	IRINOTECANUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
25.	IRINOTECANUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
26.	IRINOTECANUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
27.	IRINOTECANUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
28.	IRINOTECANUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
29.	IRINOTECANUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
30.	IRINOTECANUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
31.	IRINOTECANUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
32.	IRINOTECANUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
33.	IRINOTECANUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
34.	IRINOTECANUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
35.	IRINOTECANUM	C18.7	ESICA
36.	IRINOTECANUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
37.	IRINOTECANUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
38.	IRINOTECANUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
39.	IRINOTECANUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
40.	IRINOTECANUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
41.	IRINOTECANUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
42.	IRINOTECANUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
43.	IRINOTECANUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
44.	IRINOTECANUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
45.	IRINOTECANUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
46.	IRINOTECANUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
47.	IRINOTECANUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
48.	IRINOTECANUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
49.	IRINOTECANUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
50.	IRINOTECANUM	C34.1	PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
51.	IRINOTECANUM	C34.2	PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
52.	IRINOTECANUM	C34.3	PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
53.	IRINOTECANUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
54.	IRINOTECANUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
55.	IRINOTECANUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
56.	IRINOTECANUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
57.	IRINOTECANUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
58.	IRINOTECANUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
59.	IRINOTECANUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
60.	IRINOTECANUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
61.	IRINOTECANUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
62.	IRINOTECANUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
63.	IRINOTECANUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
64.	IRINOTECANUM	C41.1	ŻUCHWA
65.	IRINOTECANUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
66.	IRINOTECANUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
67.	IRINOTECANUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
68.	IRINOTECANUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
69.	IRINOTECANUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
70.	IRINOTECANUM	C46.9	MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY
71.	IRINOTECANUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
72.	IRINOTECANUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
73.	IRINOTECANUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
74.	IRINOTECANUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
75.	IRINOTECANUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
76.	IRINOTECANUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
77.	IRINOTECANUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
78.	IRINOTECANUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
79.	IRINOTECANUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
80.	IRINOTECANUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
81.	IRINOTECANUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNIEJ
82.	IRINOTECANUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
83.	IRINOTECANUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNIEJ
84.	IRINOTECANUM	C48.2	OTRZEWNIA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
85.	IRINOTECANUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
86.	IRINOTECANUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
87.	IRINOTECANUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
88.	IRINOTECANUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
89.	IRINOTECANUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
90.	IRINOTECANUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
91.	IRINOTECANUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
92.	IRINOTECANUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
93.	IRINOTECANUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
94.	IRINOTECANUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
95.	IRINOTECANUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
96.	IRINOTECANUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
97.	IRINOTECANUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
98.	IRINOTECANUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
99.	IRINOTECANUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY
100.	IRINOTECANUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
101.	IRINOTECANUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
102.	IRINOTECANUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
103.	IRINOTECANUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
104.	IRINOTECANUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
105.	IRINOTECANUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
106.	IRINOTECANUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
107.	IRINOTECANUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
108.	IRINOTECANUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
109.	IRINOTECANUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
110.	IRINOTECANUM	C67.7	MOCZOWNIK
111.	IRINOTECANUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
112.	IRINOTECANUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
113.	IRINOTECANUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
114.	IRINOTECANUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
115.	IRINOTECANUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
116.	IRINOTECANUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
117.	IRINOTECANUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
118.	IRINOTECANUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
119.	IRINOTECANUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
120.	IRINOTECANUM	C71.6	MÓZDŻEK
121.	IRINOTECANUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
122.	IRINOTECANUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
123.	IRINOTECANUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
124.	IRINOTECANUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
125.	IRINOTECANUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
126.	IRINOTECANUM	C72.1	OGON KOŃSKI
127.	IRINOTECANUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
128.	IRINOTECANUM	C72.3	NERW WZROKOWY
129.	IRINOTECANUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
130.	IRINOTECANUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
131.	IRINOTECANUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
132.	IRINOTECANUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE

Załącznik C.36.

ISOTRETINOINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	ISOTRETINOINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
2.	ISOTRETINOINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
3.	ISOTRETINOINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
4.	ISOTRETINOINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
5.	ISOTRETINOINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
6.	ISOTRETINOINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
7.	ISOTRETINOINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
8.	ISOTRETINOINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
9.	ISOTRETINOINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
10.	ISOTRETINOINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
11.	ISOTRETINOINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
12.	ISOTRETINOINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
13.	ISOTRETINOINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
14.	ISOTRETINOINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
15.	ISOTRETINOINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
16.	ISOTRETINOINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
17.	ISOTRETINOINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
18.	ISOTRETINOINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
19.	ISOTRETINOINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
20.	ISOTRETINOINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE

21.

ISOTRETINOINUM

C92.4

OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA

Załącznik C.37.

LANREOTIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	LANREOTIDUM	C15	RAK PRZELYKU
2.	LANREOTIDUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
3.	LANREOTIDUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
4.	LANREOTIDUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
5.	LANREOTIDUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
6.	LANREOTIDUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
7.	LANREOTIDUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
8.	LANREOTIDUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
9.	LANREOTIDUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
10.	LANREOTIDUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
11.	LANREOTIDUM	C16.0	WPUST
12.	LANREOTIDUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
13.	LANREOTIDUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
14.	LANREOTIDUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
15.	LANREOTIDUM	C16.4	ODŹWIERNIK
16.	LANREOTIDUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
17.	LANREOTIDUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
18.	LANREOTIDUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
19.	LANREOTIDUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
20.	LANREOTIDUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
21.	LANREOTIDUM	C17.0	DWUNASTNICA
22.	LANREOTIDUM	C17.1	JELITO CZCZE
23.	LANREOTIDUM	C17.2	JELITO KRĘTE
24.	LANREOTIDUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
25.	LANREOTIDUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
26.	LANREOTIDUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
27.	LANREOTIDUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
28.	LANREOTIDUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
29.	LANREOTIDUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
30.	LANREOTIDUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
31.	LANREOTIDUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
32.	LANREOTIDUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
33.	LANREOTIDUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
34.	LANREOTIDUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
35.	LANREOTIDUM	C18.7	ESICA
36.	LANREOTIDUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
37.	LANREOTIDUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
38.	LANREOTIDUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
39.	LANREOTIDUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
40.	LANREOTIDUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
41.	LANREOTIDUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
42.	LANREOTIDUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
43.	LANREOTIDUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
44.	LANREOTIDUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
45.	LANREOTIDUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
46.	LANREOTIDUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
47.	LANREOTIDUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
48.	LANREOTIDUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
49.	LANREOTIDUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
50.	LANREOTIDUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
51.	LANREOTIDUM	C26.1	ŚLEDZIONA
52.	LANREOTIDUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
53.	LANREOTIDUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
54.	LANREOTIDUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
55.	LANREOTIDUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
56.	LANREOTIDUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
57.	LANREOTIDUM	C34.2	PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
58.	LANREOTIDUM	C34.3	PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
59.	LANREOTIDUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
60.	LANREOTIDUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
61.	LANREOTIDUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
62.	LANREOTIDUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
63.	LANREOTIDUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
64.	LANREOTIDUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
65.	LANREOTIDUM	C75.3	SZYSZYNKA
66.	LANREOTIDUM	C75.4	KŁĘBEK SZYJNY
67.	LANREOTIDUM	C75.5	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
68.	LANREOTIDUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
69.	LANREOTIDUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
70.	LANREOTIDUM	E34	INNE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE
71.	LANREOTIDUM	E34.0	ZESPÓŁ RAKOWIĄKA
72.	LANREOTIDUM	E34.1	INNE NADMIERNE WYDZIELANIE HORMONÓW POCHODZENIA JELITOWEGO
73.	LANREOTIDUM	E34.2	EKTOPOWE WYDZIELANIE HORMONÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74.	LANREOTIDUM	E34.3	KARŁOWATOŚĆ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
75.	LANREOTIDUM	E34.4	KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST
76.	LANREOTIDUM	E34.5	ZESPÓŁ OPORNOŚCI ANDROGENNEJ
77.	LANREOTIDUM	E34.8	INNE OKREŚLONE ZABURZENIA WEWNĄTRZWDZIELNICZE
78.	LANREOTIDUM	E34.9	ZABURZENIA WEWNĄTRZWDZIELNICZE, NIEOKREŚLONE

Załącznik C.39.

MELPHALANUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	MELPHALANUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
2.	MELPHALANUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
3.	MELPHALANUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
4.	MELPHALANUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
5.	MELPHALANUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
6.	MELPHALANUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
7.	MELPHALANUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
8.	MELPHALANUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
9.	MELPHALANUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
10.	MELPHALANUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
11.	MELPHALANUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
12.	MELPHALANUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
13.	MELPHALANUM	C81	CHOROBA HODGKINA
14.	MELPHALANUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
15.	MELPHALANUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
16.	MELPHALANUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
17.	MELPHALANUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
18.	MELPHALANUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
19.	MELPHALANUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
20.	MELPHALANUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
21.	MELPHALANUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
22.	MELPHALANUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
23.	MELPHALANUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24.	MELPHALANUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
25.	MELPHALANUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
26.	MELPHALANUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
27.	MELPHALANUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
28.	MELPHALANUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
29.	MELPHALANUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
30.	MELPHALANUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
31.	MELPHALANUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
32.	MELPHALANUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
33.	MELPHALANUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
34.	MELPHALANUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
35.	MELPHALANUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
36.	MELPHALANUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
37.	MELPHALANUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
38.	MELPHALANUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
39.	MELPHALANUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
40.	MELPHALANUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
41.	MELPHALANUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
42.	MELPHALANUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
43.	MELPHALANUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
44.	MELPHALANUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
45.	MELPHALANUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
46.	MELPHALANUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
47.	MELPHALANUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
48.	MELPHALANUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
49.	MELPHALANUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
50.	MELPHALANUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
51.	MELPHALANUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
52.	MELPHALANUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
53.	MELPHALANUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
54.	MELPHALANUM	D45	CZERWIENICA PRAWDZIWA
55.	MELPHALANUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
56.	MELPHALANUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
57.	MELPHALANUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
58.	MELPHALANUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
59.	MELPHALANUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
60.	MELPHALANUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
61.	MELPHALANUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
62.	MELPHALANUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.40.

MERCAPTOPURINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	MERCAPTOPURINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
2.	MERCAPTOPURINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
3.	MERCAPTOPURINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
4.	MERCAPTOPURINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
5.	MERCAPTOPURINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
6.	MERCAPTOPURINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
7.	MERCAPTOPURINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
8.	MERCAPTOPURINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
9.	MERCAPTOPURINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
10.	MERCAPTOPURINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
11.	MERCAPTOPURINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
12.	MERCAPTOPURINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
13.	MERCAPTOPURINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
14.	MERCAPTOPURINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
15.	MERCAPTOPURINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
16.	MERCAPTOPURINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
17.	MERCAPTOPURINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
18.	MERCAPTOPURINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
19.	MERCAPTOPURINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
20.	MERCAPTOPURINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
21.	MERCAPTOPURINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
22.	MERCAPTOPURINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
23.	MERCAPTOPURINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
24.	MERCAPTOPURINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
25.	MERCAPTOPURINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
26.	MERCAPTOPURINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
27.	MERCAPTOPURINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
28.	MERCAPTOPURINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
29.	MERCAPTOPURINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
30.	MERCAPTOPURINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
31.	MERCAPTOPURINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
32.	MERCAPTOPURINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
33.	MERCAPTOPURINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
34.	MERCAPTOPURINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
35.	MERCAPTOPURINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
36.	MERCAPTOPURINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
37.	MERCAPTOPURINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
38.	MERCAPTOPURINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
39.	MERCAPTOPURINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
40.	MERCAPTOPURINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
41.	MERCAPTOPURINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
42.	MERCAPTOPURINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
43.	MERCAPTOPURINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
44.	MERCAPTOPURINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
45.	MERCAPTOPURINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
46.	MERCAPTOPURINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
47.	MERCAPTOPURINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
48.	MERCAPTOPURINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
49.	MERCAPTOPURINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
50.	MERCAPTOPURINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
51.	MERCAPTOPURINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
52.	MERCAPTOPURINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
53.	MERCAPTOPURINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
54.	MERCAPTOPURINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
55.	MERCAPTOPURINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
56.	MERCAPTOPURINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
57.	MERCAPTOPURINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
58.	MERCAPTOPURINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
59.	MERCAPTOPURINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
60.	MERCAPTOPURINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
61.	MERCAPTOPURINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
62.	MERCAPTOPURINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
63.	MERCAPTOPURINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
64.	MERCAPTOPURINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
65.	MERCAPTOPURINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
66.	MERCAPTOPURINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
67.	MERCAPTOPURINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
68.	MERCAPTOPURINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
69.	MERCAPTOPURINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
70.	MERCAPTOPURINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
71.	MERCAPTOPURINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
72.	MERCAPTOPURINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
73.	MERCAPTOPURINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
74.	MERCAPTOPURINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
75.	MERCAPTOPURINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
76.	MERCAPTOPURINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
77.	MERCAPTOPURINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
78.	MERCAPTOPURINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
79.	MERCAPTOPURINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
80.	MERCAPTOPURINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
81.	MERCAPTOPURINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
82.	MERCAPTOPURINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
83.	MERCAPTOPURINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
84.	MERCAPTOPURINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
85.	MERCAPTOPURINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
86.	MERCAPTOPURINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
87.	MERCAPTOPURINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
88.	MERCAPTOPURINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
89.	MERCAPTOPURINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
90.	MERCAPTOPURINUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
91.	MERCAPTOPURINUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
92.	MERCAPTOPURINUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
93.	MERCAPTOPURINUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
94.	MERCAPTOPURINUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
95.	MERCAPTOPURINUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
96.	MERCAPTOPURINUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
97.	MERCAPTOPURINUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
98.	MERCAPTOPURINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
99.	MERCAPTOPURINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
100.	MERCAPTOPURINUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
101.	MERCAPTOPURINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
102.	MERCAPTOPURINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
103.	MERCAPTOPURINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
104.	MERCAPTOPURINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
105.	MERCAPTOPURINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
106.	MERCAPTOPURINUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
107.	MERCAPTOPURINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
108.	MERCAPTOPURINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.41.

METHOTREXATUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	METHOTREXATUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2.	METHOTREXATUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3.	METHOTREXATUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4.	METHOTREXATUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5.	METHOTREXATUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6.	METHOTREXATUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7.	METHOTREXATUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8.	METHOTREXATUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9.	METHOTREXATUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10.	METHOTREXATUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11.	METHOTREXATUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12.	METHOTREXATUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13.	METHOTREXATUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14.	METHOTREXATUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15.	METHOTREXATUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16.	METHOTREXATUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17.	METHOTREXATUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18.	METHOTREXATUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19.	METHOTREXATUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20.	METHOTREXATUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21.	METHOTREXATUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22.	METHOTREXATUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE
23.	METHOTREXATUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE
24.	METHOTREXATUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
25.	METHOTREXATUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26.	METHOTREXATUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27.	METHOTREXATUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28.	METHOTREXATUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29.	METHOTREXATUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30.	METHOTREXATUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31.	METHOTREXATUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32.	METHOTREXATUM	C05.2	JĘZYCZEK
33.	METHOTREXATUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34.	METHOTREXATUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35.	METHOTREXATUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36.	METHOTREXATUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37.	METHOTREXATUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38.	METHOTREXATUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39.	METHOTREXATUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40.	METHOTREXATUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41.	METHOTREXATUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42.	METHOTREXATUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43.	METHOTREXATUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44.	METHOTREXATUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45.	METHOTREXATUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46.	METHOTREXATUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47.	METHOTREXATUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48.	METHOTREXATUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49.	METHOTREXATUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50.	METHOTREXATUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
51.	METHOTREXATUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52.	METHOTREXATUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
53.	METHOTREXATUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54.	METHOTREXATUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55.	METHOTREXATUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56.	METHOTREXATUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57.	METHOTREXATUM	C10.4	SZCZELINA SKRZELOWA
58.	METHOTREXATUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59.	METHOTREXATUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60.	METHOTREXATUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61.	METHOTREXATUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62.	METHOTREXATUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63.	METHOTREXATUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64.	METHOTREXATUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65.	METHOTREXATUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (PATRZ)
66.	METHOTREXATUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67.	METHOTREXATUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZACHYLKA GRUSZKOWATEGO
68.	METHOTREXATUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69.	METHOTREXATUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70.	METHOTREXATUM	C13.1	FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71.	METHOTREXATUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72.	METHOTREXATUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73.	METHOTREXATUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74.	METHOTREXATUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75.	METHOTREXATUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
76.	METHOTREXATUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
77.	METHOTREXATUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
78.	METHOTREXATUM	C30.0	JAMA NOSOWA
79.	METHOTREXATUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
80.	METHOTREXATUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
81.	METHOTREXATUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
82.	METHOTREXATUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
83.	METHOTREXATUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
84.	METHOTREXATUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
85.	METHOTREXATUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
86.	METHOTREXATUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
87.	METHOTREXATUM	C32	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI
88.	METHOTREXATUM	C32.0	GŁOŚNIA
89.	METHOTREXATUM	C32.1	NAGŁOŚNIA
90.	METHOTREXATUM	C32.2	JAMA PODGŁOŚNIOWA
91.	METHOTREXATUM	C32.3	CHRZĄSTKI KRTANI
92.	METHOTREXATUM	C32.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI
93.	METHOTREXATUM	C32.9	KRTAŃ, NIEOKREŚLONA
94.	METHOTREXATUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
95.	METHOTREXATUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
96.	METHOTREXATUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
97.	METHOTREXATUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
98.	METHOTREXATUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
99.	METHOTREXATUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
100.	METHOTREXATUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
101.	METHOTREXATUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
102.	METHOTREXATUM	C38.0	SERCE
103.	METHOTREXATUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
104.	METHOTREXATUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
105.	METHOTREXATUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
106.	METHOTREXATUM	C38.4	OPLUCNA
107.	METHOTREXATUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
108.	METHOTREXATUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
109.	METHOTREXATUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
110.	METHOTREXATUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
111.	METHOTREXATUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
112.	METHOTREXATUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
113.	METHOTREXATUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
114.	METHOTREXATUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
115.	METHOTREXATUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
116.	METHOTREXATUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
117.	METHOTREXATUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
118.	METHOTREXATUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
119.	METHOTREXATUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
120.	METHOTREXATUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
121.	METHOTREXATUM	C41.1	ŻUCHWA
122.	METHOTREXATUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
123.	METHOTREXATUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
124.	METHOTREXATUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
125.	METHOTREXATUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
126.	METHOTREXATUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
127.	METHOTREXATUM	C44	INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
128.	METHOTREXATUM	C44.0	SKÓRA WARGI
129.	METHOTREXATUM	C44.1	SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
130.	METHOTREXATUM	C44.2	SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
131.	METHOTREXATUM	C44.3	SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
132.	METHOTREXATUM	C44.4	SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
133.	METHOTREXATUM	C44.5	SKÓRA TUŁOWIA
134.	METHOTREXATUM	C44.6	SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
135.	METHOTREXATUM	C44.7	SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
136.	METHOTREXATUM	C44.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI
137.	METHOTREXATUM	C44.9	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
138.	METHOTREXATUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
139.	METHOTREXATUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
140.	METHOTREXATUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
141.	METHOTREXATUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
142.	METHOTREXATUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
143.	METHOTREXATUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
144.	METHOTREXATUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
145.	METHOTREXATUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
146.	METHOTREXATUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
147.	METHOTREXATUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
148.	METHOTREXATUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
149.	METHOTREXATUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
150.	METHOTREXATUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
151.	METHOTREXATUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
152.	METHOTREXATUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
153.	METHOTREXATUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
154.	METHOTREXATUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
155.	METHOTREXATUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
156.	METHOTREXATUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
157.	METHOTREXATUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
158.	METHOTREXATUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
159.	METHOTREXATUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
160.	METHOTREXATUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
161.	METHOTREXATUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
162.	METHOTREXATUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
163.	METHOTREXATUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
164.	METHOTREXATUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
165.	METHOTREXATUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
166.	METHOTREXATUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
167.	METHOTREXATUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
168.	METHOTREXATUM	C57.3	PRZYMATICZA
169.	METHOTREXATUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
170.	METHOTREXATUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
171.	METHOTREXATUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
172.	METHOTREXATUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
173.	METHOTREXATUM	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
174.	METHOTREXATUM	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
175.	METHOTREXATUM	C60.0	NAPLETEK
176.	METHOTREXATUM	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
177.	METHOTREXATUM	C60.2	TRZON PRĄCIA
178.	METHOTREXATUM	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
179.	METHOTREXATUM	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
180.	METHOTREXATUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
181.	METHOTREXATUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
182.	METHOTREXATUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
183.	METHOTREXATUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
184.	METHOTREXATUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
185.	METHOTREXATUM	C63.0	NAJĄDRZE
186.	METHOTREXATUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
187.	METHOTREXATUM	C63.2	MOSZNA
188.	METHOTREXATUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
189.	METHOTREXATUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
190.	METHOTREXATUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
191.	METHOTREXATUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
192.	METHOTREXATUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
193.	METHOTREXATUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
194.	METHOTREXATUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
195.	METHOTREXATUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
196.	METHOTREXATUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
197.	METHOTREXATUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
198.	METHOTREXATUM	C67.5	SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
199.	METHOTREXATUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
200.	METHOTREXATUM	C67.7	MOCZOWNIK
201.	METHOTREXATUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
202.	METHOTREXATUM	C67.9	PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
203.	METHOTREXATUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
204.	METHOTREXATUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
205.	METHOTREXATUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
206.	METHOTREXATUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
207.	METHOTREXATUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
208.	METHOTREXATUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
209.	METHOTREXATUM	C71.6	MÓZDŻEK
210.	METHOTREXATUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
211.	METHOTREXATUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
212.	METHOTREXATUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
213.	METHOTREXATUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
214.	METHOTREXATUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
215.	METHOTREXATUM	C72.1	OGON KOŃSKI
216.	METHOTREXATUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
217.	METHOTREXATUM	C72.3	NERW WZROKOWY
218.	METHOTREXATUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
219.	METHOTREXATUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
220.	METHOTREXATUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
221.	METHOTREXATUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
222.	METHOTREXATUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
223.	METHOTREXATUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
224.	METHOTREXATUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
225.	METHOTREXATUM	C76.2	BRZUCH
226.	METHOTREXATUM	C76.3	MIEDNICA
227.	METHOTREXATUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
228.	METHOTREXATUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
229.	METHOTREXATUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
230.	METHOTREXATUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
231.	METHOTREXATUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
232.	METHOTREXATUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
233.	METHOTREXATUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
234.	METHOTREXATUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
235.	METHOTREXATUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
236.	METHOTREXATUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
237.	METHOTREXATUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
238.	METHOTREXATUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
239.	METHOTREXATUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
240.	METHOTREXATUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
241.	METHOTREXATUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
242.	METHOTREXATUM	C81	CHOROBA HODGKINA
243.	METHOTREXATUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
244.	METHOTREXATUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
245.	METHOTREXATUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
246.	METHOTREXATUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
247.	METHOTREXATUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
248.	METHOTREXATUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
249.	METHOTREXATUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
250.	METHOTREXATUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
251.	METHOTREXATUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
252.	METHOTREXATUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
253.	METHOTREXATUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
254.	METHOTREXATUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
255.	METHOTREXATUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
256.	METHOTREXATUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
257.	METHOTREXATUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
258.	METHOTREXATUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
259.	METHOTREXATUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
260.	METHOTREXATUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
261.	METHOTREXATUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
262.	METHOTREXATUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
263.	METHOTREXATUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
264.	METHOTREXATUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
265.	METHOTREXATUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
266.	METHOTREXATUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
267.	METHOTREXATUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
268.	METHOTREXATUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
269.	METHOTREXATUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
270.	METHOTREXATUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
271.	METHOTREXATUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
272.	METHOTREXATUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
273.	METHOTREXATUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
274.	METHOTREXATUM	C85.0	MIEŚSAK LIMFATYCZNY
275.	METHOTREXATUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
276.	METHOTREXATUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
277.	METHOTREXATUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
278.	METHOTREXATUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
279.	METHOTREXATUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
280.	METHOTREXATUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
281.	METHOTREXATUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
282.	METHOTREXATUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
283.	METHOTREXATUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
284.	METHOTREXATUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
285.	METHOTREXATUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
286.	METHOTREXATUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
287.	METHOTREXATUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
288.	METHOTREXATUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
289.	METHOTREXATUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
290.	METHOTREXATUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
291.	METHOTREXATUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
292.	METHOTREXATUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
293.	METHOTREXATUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
294.	METHOTREXATUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
295.	METHOTREXATUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
296.	METHOTREXATUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
297.	METHOTREXATUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
298.	METHOTREXATUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
299.	METHOTREXATUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
300.	METHOTREXATUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
301.	METHOTREXATUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
302.	METHOTREXATUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
303.	METHOTREXATUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
304.	METHOTREXATUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
305.	METHOTREXATUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
306.	METHOTREXATUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
307.	METHOTREXATUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
308.	METHOTREXATUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
309.	METHOTREXATUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
310.	METHOTREXATUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
311.	METHOTREXATUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
312.	METHOTREXATUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
313.	METHOTREXATUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
314.	METHOTREXATUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
315.	METHOTREXATUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
316.	METHOTREXATUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
317.	METHOTREXATUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
318.	METHOTREXATUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
319.	METHOTREXATUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
320.	METHOTREXATUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
321.	METHOTREXATUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
322.	METHOTREXATUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
323.	METHOTREXATUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
324.	METHOTREXATUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
325.	METHOTREXATUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
326.	METHOTREXATUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
327.	METHOTREXATUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
328.	METHOTREXATUM	C96.3	PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
329.	METHOTREXATUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
330.	METHOTREXATUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
331.	METHOTREXATUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
332.	METHOTREXATUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
333.	METHOTREXATUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
334.	METHOTREXATUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
335.	METHOTREXATUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
336.	METHOTREXATUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
337.	METHOTREXATUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
338.	METHOTREXATUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
339.	METHOTREXATUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
340.	METHOTREXATUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
341.	METHOTREXATUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
342.	METHOTREXATUM	D38.4	GRASICA
343.	METHOTREXATUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
344.	METHOTREXATUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
345.	METHOTREXATUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
346.	METHOTREXATUM	D39.0	MACICA
347.	METHOTREXATUM	D39.1	JAJNIK
348.	METHOTREXATUM	D39.2	CIAŻOWA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA
349.	METHOTREXATUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
350.	METHOTREXATUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
351.	METHOTREXATUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
352.	METHOTREXATUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
353.	METHOTREXATUM	D40.1	JĄDRO
354.	METHOTREXATUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
355.	METHOTREXATUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
356.	METHOTREXATUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
357.	METHOTREXATUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
358.	METHOTREXATUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
359.	METHOTREXATUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
360.	METHOTREXATUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
361.	METHOTREXATUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIAOTOWE
362.	METHOTREXATUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIAOTOWE
363.	METHOTREXATUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
364.	METHOTREXATUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
365.	METHOTREXATUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
366.	METHOTREXATUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
367.	METHOTREXATUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
368.	METHOTREXATUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
369.	METHOTREXATUM	D44.5	SZYSZYNKA
370.	METHOTREXATUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
371.	METHOTREXATUM	D46	ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
372.	METHOTREXATUM	D46.0	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
373.	METHOTREXATUM	D46.1	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
374.	METHOTREXATUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
375.	METHOTREXATUM	D46.3	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
376.	METHOTREXATUM	D46.4	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
377.	METHOTREXATUM	D46.7	INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
378.	METHOTREXATUM	D46.9	ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
379.	METHOTREXATUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
380.	METHOTREXATUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
381.	METHOTREXATUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
382.	METHOTREXATUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
383.	METHOTREXATUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
384.	METHOTREXATUM	D48.4	OTRZEWNA
385.	METHOTREXATUM	D48.5	SKÓRA
386.	METHOTREXATUM	D48.6	SUTEK
387.	METHOTREXATUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
388.	METHOTREXATUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
389.	METHOTREXATUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
390.	METHOTREXATUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
391.	METHOTREXATUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
392.	METHOTREXATUM	O01	ZAŚNIAD GRONIASTY
393.	METHOTREXATUM	O01.0	KLASYCZNY ZAŚNIAD GRONIASTY
394.	METHOTREXATUM	O01.1	NIEZUPEŁNY LUB CZĘŚCIOWY ZAŚNIAD GRONIASTY
395.	METHOTREXATUM	O01.9	ZAŚNIAD GRONIASTY NIEOKREŚLONY
396.	METHOTREXATUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
397.	METHOTREXATUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
398.	METHOTREXATUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
399.	METHOTREXATUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
400.	METHOTREXATUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
401.	METHOTREXATUM	E85.4	ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
402.	METHOTREXATUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
403.	METHOTREXATUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.42.

MITOMYCINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	MITOMYCINUM	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU
2.	MITOMYCINUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
3.	MITOMYCINUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
4.	MITOMYCINUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
5.	MITOMYCINUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
6.	MITOMYCINUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
7.	MITOMYCINUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
8.	MITOMYCINUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
9.	MITOMYCINUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
10.	MITOMYCINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
11.	MITOMYCINUM	C16.0	WPUST
12.	MITOMYCINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
13.	MITOMYCINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
14.	MITOMYCINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
15.	MITOMYCINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
16.	MITOMYCINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
17.	MITOMYCINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
18.	MITOMYCINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
19.	MITOMYCINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
20.	MITOMYCINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
21.	MITOMYCINUM	C17.0	DWUNASTNICA
22.	MITOMYCINUM	C17.1	JELITO CZCZE
23.	MITOMYCINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
24.	MITOMYCINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
25.	MITOMYCINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
26.	MITOMYCINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
27.	MITOMYCINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
28.	MITOMYCINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
29.	MITOMYCINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
30.	MITOMYCINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
31.	MITOMYCINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
32.	MITOMYCINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
33.	MITOMYCINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
34.	MITOMYCINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
35.	MITOMYCINUM	C18.7	ESICA
36.	MITOMYCINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
37.	MITOMYCINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
38.	MITOMYCINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
39.	MITOMYCINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
40.	MITOMYCINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
41.	MITOMYCINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
42.	MITOMYCINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
43.	MITOMYCINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
44.	MITOMYCINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
45.	MITOMYCINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
46.	MITOMYCINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
47.	MITOMYCINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
48.	MITOMYCINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
49.	MITOMYCINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
50.	MITOMYCINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
51.	MITOMYCINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
52.	MITOMYCINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
53.	MITOMYCINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
54.	MITOMYCINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
55.	MITOMYCINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
56.	MITOMYCINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
57.	MITOMYCINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
58.	MITOMYCINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
59.	MITOMYCINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
60.	MITOMYCINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
61.	MITOMYCINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
62.	MITOMYCINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
63.	MITOMYCINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
64.	MITOMYCINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI
65.	MITOMYCINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
66.	MITOMYCINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
67.	MITOMYCINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
68.	MITOMYCINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
69.	MITOMYCINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
70.	MITOMYCINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
71.	MITOMYCINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
72.	MITOMYCINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
73.	MITOMYCINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
74.	MITOMYCINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
75.	MITOMYCINUM	C34.1	PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
76.	MITOMYCINUM	C34.2	PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
77.	MITOMYCINUM	C34.3	PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
78.	MITOMYCINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
79.	MITOMYCINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
80.	MITOMYCINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
81.	MITOMYCINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
82.	MITOMYCINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
83.	MITOMYCINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
84.	MITOMYCINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
85.	MITOMYCINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
86.	MITOMYCINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
87.	MITOMYCINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
88.	MITOMYCINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
89.	MITOMYCINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
90.	MITOMYCINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
91.	MITOMYCINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
92.	MITOMYCINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
93.	MITOMYCINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
94.	MITOMYCINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
95.	MITOMYCINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
96.	MITOMYCINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
97.	MITOMYCINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
98.	MITOMYCINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
99.	MITOMYCINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
100.	MITOMYCINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
101.	MITOMYCINUM	C51	RAK SROMU
102.	MITOMYCINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
103.	MITOMYCINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
104.	MITOMYCINUM	C51.2	ŁECHTACZKA
105.	MITOMYCINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
106.	MITOMYCINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
107.	MITOMYCINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
108.	MITOMYCINUM	C53.0	BLONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
109.	MITOMYCINUM	C53.1	BLONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
110.	MITOMYCINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
111.	MITOMYCINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
112.	MITOMYCINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
113.	MITOMYCINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
114.	MITOMYCINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
115.	MITOMYCINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
116.	MITOMYCINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
117.	MITOMYCINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
118.	MITOMYCINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
119.	MITOMYCINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
120.	MITOMYCINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
121.	MITOMYCINUM	C67.7	MOCZOWNIK
122.	MITOMYCINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
123.	MITOMYCINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.43.

MITOTANUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	MITOTANUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
2.	MITOTANUM	C74.0	KORA NADNERCZY
3.	MITOTANUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
4.	MITOTANUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
5.	MITOTANUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
6.	MITOTANUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
7.	MITOTANUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
8.	MITOTANUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
9.	MITOTANUM	C75.3	SZYSZYNKA
10.	MITOTANUM	C75.4	KŁĘBEK SZYJNY
11.	MITOTANUM	C75.5	CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
12.	MITOTANUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
13.	MITOTANUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.45.

OCTREOTIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	OCTREOTIDUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
2.	OCTREOTIDUM	C16.0	WPUST
3.	OCTREOTIDUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
4.	OCTREOTIDUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
5.	OCTREOTIDUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
6.	OCTREOTIDUM	C16.4	ODŹWIERNIK
7.	OCTREOTIDUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
8.	OCTREOTIDUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
9.	OCTREOTIDUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
10.	OCTREOTIDUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
11.	OCTREOTIDUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
12.	OCTREOTIDUM	C17.0	DWUNASTNICA
13.	OCTREOTIDUM	C17.1	JELITO CZCZE
14.	OCTREOTIDUM	C17.2	JELITO KRĘTE
15.	OCTREOTIDUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
16.	OCTREOTIDUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
17.	OCTREOTIDUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
18.	OCTREOTIDUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
19.	OCTREOTIDUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
20.	OCTREOTIDUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
21.	OCTREOTIDUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
22.	OCTREOTIDUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
23.	OCTREOTIDUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
24.	OCTREOTIDUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
25.	OCTREOTIDUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
26.	OCTREOTIDUM	C18.7	ESICA
27.	OCTREOTIDUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
28.	OCTREOTIDUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
29.	OCTREOTIDUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
30.	OCTREOTIDUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
31.	OCTREOTIDUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
32.	OCTREOTIDUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
33.	OCTREOTIDUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
34.	OCTREOTIDUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
35.	OCTREOTIDUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
36.	OCTREOTIDUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
37.	OCTREOTIDUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
38.	OCTREOTIDUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
39.	OCTREOTIDUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
40.	OCTREOTIDUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
41.	OCTREOTIDUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
42.	OCTREOTIDUM	C26.1	ŚLEDZIONA
43.	OCTREOTIDUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
44.	OCTREOTIDUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
45.	OCTREOTIDUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
46.	OCTREOTIDUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
47.	OCTREOTIDUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
48.	OCTREOTIDUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
49.	OCTREOTIDUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
50.	OCTREOTIDUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
51.	OCTREOTIDUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
52.	OCTREOTIDUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
53.	OCTREOTIDUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
54.	OCTREOTIDUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
55.	OCTREOTIDUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
56.	OCTREOTIDUM	C75.3	SZYSZYNKA
57.	OCTREOTIDUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
58.	OCTREOTIDUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
59.	OCTREOTIDUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
60.	OCTREOTIDUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
61.	OCTREOTIDUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
62.	OCTREOTIDUM	E34	INNE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE
63.	OCTREOTIDUM	E34.0	ZESPÓŁ RAKOWIAKA
64.	OCTREOTIDUM	E34.1	INNE NADMIERNE WYDZIELANIE HORMONÓW POCHODZENIA JELITOWEGO
65.	OCTREOTIDUM	E34.2	EKTOPOWE WYDZIELANIE HORMONÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
66.	OCTREOTIDUM	E34.3	KARŁOWATOŚĆ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
67.	OCTREOTIDUM	E34.4	KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST
68.	OCTREOTIDUM	E34.5	ZESPÓŁ OPORNOŚCI ANDROGENNEJ
69.	OCTREOTIDUM	E34.8	INNE OKREŚLONE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE
70.	OCTREOTIDUM	E34.9	ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE, NIEOKREŚLONE

Załącznik C.46.

OXALIPLATINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	OXALIPLATINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
2.	OXALIPLATINUM	C16.0	WPUST
3.	OXALIPLATINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
4.	OXALIPLATINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
5.	OXALIPLATINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
6.	OXALIPLATINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
7.	OXALIPLATINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
8.	OXALIPLATINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
9.	OXALIPLATINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
10.	OXALIPLATINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
11.	OXALIPLATINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
12.	OXALIPLATINUM	C17.0	DWUNASTNICA
13.	OXALIPLATINUM	C17.1	JELITO CZCZE
14.	OXALIPLATINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
15.	OXALIPLATINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
16.	OXALIPLATINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
17.	OXALIPLATINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
18.	OXALIPLATINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
19.	OXALIPLATINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
20.	OXALIPLATINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
21.	OXALIPLATINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
22.	OXALIPLATINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
23.	OXALIPLATINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
24.	OXALIPLATINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
25.	OXALIPLATINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
26.	OXALIPLATINUM	C18.7	ESICA
27.	OXALIPLATINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
28.	OXALIPLATINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
29.	OXALIPLATINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
30.	OXALIPLATINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
31.	OXALIPLATINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
32.	OXALIPLATINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
33.	OXALIPLATINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
34.	OXALIPLATINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
35.	OXALIPLATINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
36.	OXALIPLATINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
37.	OXALIPLATINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
38.	OXALIPLATINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
39.	OXALIPLATINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
40.	OXALIPLATINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
41.	OXALIPLATINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
42.	OXALIPLATINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
43.	OXALIPLATINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
44.	OXALIPLATINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
45.	OXALIPLATINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
46.	OXALIPLATINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
47.	OXALIPLATINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
48.	OXALIPLATINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE

Załącznik C.47.

PACLITAXELUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	PACLITAXELUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2.	PACLITAXELUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3.	PACLITAXELUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4.	PACLITAXELUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5.	PACLITAXELUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6.	PACLITAXELUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7.	PACLITAXELUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8.	PACLITAXELUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9.	PACLITAXELUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10.	PACLITAXELUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11.	PACLITAXELUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12.	PACLITAXELUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13.	PACLITAXELUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14.	PACLITAXELUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15.	PACLITAXELUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16.	PACLITAXELUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17.	PACLITAXELUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18.	PACLITAXELUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19.	PACLITAXELUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20.	PACLITAXELUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21.	PACLITAXELUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22.	PACLITAXELUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	PACLITAXELUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE
24.	PACLITAXELUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25.	PACLITAXELUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26.	PACLITAXELUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27.	PACLITAXELUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28.	PACLITAXELUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29.	PACLITAXELUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30.	PACLITAXELUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31.	PACLITAXELUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32.	PACLITAXELUM	C05.2	JĘZYCZEK
33.	PACLITAXELUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34.	PACLITAXELUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35.	PACLITAXELUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36.	PACLITAXELUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37.	PACLITAXELUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38.	PACLITAXELUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39.	PACLITAXELUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40.	PACLITAXELUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41.	PACLITAXELUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42.	PACLITAXELUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43.	PACLITAXELUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44.	PACLITAXELUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45.	PACLITAXELUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46.	PACLITAXELUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47.	PACLITAXELUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48.	PACLITAXELUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY
49.	PACLITAXELUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
50.	PACLITAXELUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
51.	PACLITAXELUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52.	PACLITAXELUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53.	PACLITAXELUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54.	PACLITAXELUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55.	PACLITAXELUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56.	PACLITAXELUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57.	PACLITAXELUM	C10.4	SZCZELINA SKRZELOWA
58.	PACLITAXELUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59.	PACLITAXELUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60.	PACLITAXELUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61.	PACLITAXELUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62.	PACLITAXELUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63.	PACLITAXELUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64.	PACLITAXELUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65.	PACLITAXELUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (PATRZ)
66.	PACLITAXELUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67.	PACLITAXELUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZACHYLKA GRUSZKOWATEGO
68.	PACLITAXELUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69.	PACLITAXELUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70.	PACLITAXELUM	C13.1	FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71.	PACLITAXELUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72.	PACLITAXELUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73.	PACLITAXELUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74.	PACLITAXELUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
75.	PACLITAXELUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76.	PACLITAXELUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
77.	PACLITAXELUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
78.	PACLITAXELUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
79.	PACLITAXELUM	C30.0	JAMA NOSOWA
80.	PACLITAXELUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
81.	PACLITAXELUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
82.	PACLITAXELUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
83.	PACLITAXELUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
84.	PACLITAXELUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
85.	PACLITAXELUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
86.	PACLITAXELUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
87.	PACLITAXELUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
88.	PACLITAXELUM	C32	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI
89.	PACLITAXELUM	C32.0	GŁOŚNIA
90.	PACLITAXELUM	C32.1	NAGŁOŚNIA
91.	PACLITAXELUM	C32.2	JAMA PODGŁOŚNIOWA
92.	PACLITAXELUM	C32.3	CHRZĄSTKI KRTANI
93.	PACLITAXELUM	C32.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI
94.	PACLITAXELUM	C32.9	KRTAŃ, NIEOKREŚLONA
95.	PACLITAXELUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
96.	PACLITAXELUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
97.	PACLITAXELUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
98.	PACLITAXELUM	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
99.	PACLITAXELUM	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
100.	PACLITAXELUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
101.	PACLITAXELUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
102.	PACLITAXELUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
103.	PACLITAXELUM	C38.0	SERCE
104.	PACLITAXELUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
105.	PACLITAXELUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
106.	PACLITAXELUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
107.	PACLITAXELUM	C38.4	OPLUCNA
108.	PACLITAXELUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
109.	PACLITAXELUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
110.	PACLITAXELUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
111.	PACLITAXELUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
112.	PACLITAXELUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
113.	PACLITAXELUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
114.	PACLITAXELUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
115.	PACLITAXELUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
116.	PACLITAXELUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
117.	PACLITAXELUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
118.	PACLITAXELUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
119.	PACLITAXELUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
120.	PACLITAXELUM	C46	MIĘSAK KAPOS'I EGO
121.	PACLITAXELUM	C46.0	MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY
122.	PACLITAXELUM	C46.1	MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ
123.	PACLITAXELUM	C46.2	MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA
124.	PACLITAXELUM	C46.3	MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
125.	PACLITAXELUM	C46.7	MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
126.	PACLITAXELUM	C46.8	MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
127.	PACLITAXELUM	C46.9	MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY
128.	PACLITAXELUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNIEJ
129.	PACLITAXELUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
130.	PACLITAXELUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNIEJ
131.	PACLITAXELUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
132.	PACLITAXELUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
133.	PACLITAXELUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
134.	PACLITAXELUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
135.	PACLITAXELUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
136.	PACLITAXELUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
137.	PACLITAXELUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
138.	PACLITAXELUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
139.	PACLITAXELUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
140.	PACLITAXELUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
141.	PACLITAXELUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
142.	PACLITAXELUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
143.	PACLITAXELUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
144.	PACLITAXELUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
145.	PACLITAXELUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
146.	PACLITAXELUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
147.	PACLITAXELUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
148.	PACLITAXELUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
149.	PACLITAXELUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
150.	PACLITAXELUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
151.	PACLITAXELUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
152.	PACLITAXELUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
153.	PACLITAXELUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
154.	PACLITAXELUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
155.	PACLITAXELUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
156.	PACLITAXELUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY
157.	PACLITAXELUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
158.	PACLITAXELUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
159.	PACLITAXELUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
160.	PACLITAXELUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
161.	PACLITAXELUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
162.	PACLITAXELUM	C54.3	DNO MACICY
163.	PACLITAXELUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
164.	PACLITAXELUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
165.	PACLITAXELUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
166.	PACLITAXELUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
167.	PACLITAXELUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
168.	PACLITAXELUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
169.	PACLITAXELUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
170.	PACLITAXELUM	C57.3	PRZYMAGICZA
171.	PACLITAXELUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
172.	PACLITAXELUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
173.	PACLITAXELUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
174.	PACLITAXELUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
175.	PACLITAXELUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
176.	PACLITAXELUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
177.	PACLITAXELUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
178.	PACLITAXELUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
179.	PACLITAXELUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
180.	PACLITAXELUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
181.	PACLITAXELUM	C67.1	SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
182.	PACLITAXELUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
183.	PACLITAXELUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
184.	PACLITAXELUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
185.	PACLITAXELUM	C67.5	SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
186.	PACLITAXELUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
187.	PACLITAXELUM	C67.7	MOCZOWNIK
188.	PACLITAXELUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
189.	PACLITAXELUM	C67.9	PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
190.	PACLITAXELUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
191.	PACLITAXELUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
192.	PACLITAXELUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
193.	PACLITAXELUM	C76.2	BRZUCH
194.	PACLITAXELUM	C76.3	MIEDNICA
195.	PACLITAXELUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
196.	PACLITAXELUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
197.	PACLITAXELUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
198.	PACLITAXELUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
199.	PACLITAXELUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
200.	PACLITAXELUM	D39.2	CIAŻOWA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA

Załącznik C.48.

PEGASPARAGASUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	PEGASPARAGASUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2.	PEGASPARAGASUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
3.	PEGASPARAGASUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
4.	PEGASPARAGASUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
5.	PEGASPARAGASUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
6.	PEGASPARAGASUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
7.	PEGASPARAGASUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
8.	PEGASPARAGASUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
9.	PEGASPARAGASUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
10.	PEGASPARAGASUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
11.	PEGASPARAGASUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
12.	PEGASPARAGASUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
13.	PEGASPARAGASUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
14.	PEGASPARAGASUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
15.	PEGASPARAGASUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
16.	PEGASPARAGASUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
17.	PEGASPARAGASUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
18.	PEGASPARAGASUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
19.	PEGASPARAGASUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
20.	PEGASPARAGASUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
21.	PEGASPARAGASUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
22.	PEGASPARAGASUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
23.	PEGASPARAGASUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
24.	PEGASPARAGASUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
25.	PEGASPARAGASUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
26.	PEGASPARAGASUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
27.	PEGASPARAGASUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
28.	PEGASPARAGASUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
29.	PEGASPARAGASUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
30.	PEGASPARAGASUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
31.	PEGASPARAGASUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
32.	PEGASPARAGASUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
33.	PEGASPARAGASUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
34.	PEGASPARAGASUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
35.	PEGASPARAGASUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
36.	PEGASPARAGASUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
37.	PEGASPARAGASUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
38.	PEGASPARAGASUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
39.	PEGASPARAGASUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
40.	PEGASPARAGASUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
41.	PEGASPARAGASUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
42.	PEGASPARAGASUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
43.	PEGASPARAGASUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
44.	PEGASPARAGASUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
45.	PEGASPARAGASUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
46.	PEGASPARAGASUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
47.	PEGASPARAGASUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.49.

PEMETREKSED

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	PEMETREKSED	C45	MIĘDZYBŁONIAK
2.	PEMETREKSED	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
3.	PEMETREKSED	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
4.	PEMETREKSED	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
5.	PEMETREKSED	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
6.	PEMETREKSED	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.51.

RITUXIMABUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	RITUXIMABUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
2.	RITUXIMABUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
3.	RITUXIMABUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
4.	RITUXIMABUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
5.	RITUXIMABUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
6.	RITUXIMABUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
7.	RITUXIMABUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
8.	RITUXIMABUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
9.	RITUXIMABUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
10.	RITUXIMABUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
11.	RITUXIMABUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
12.	RITUXIMABUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
13.	RITUXIMABUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
14.	RITUXIMABUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
15.	RITUXIMABUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
16.	RITUXIMABUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
17.	RITUXIMABUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
18.	RITUXIMABUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
19.	RITUXIMABUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
20.	RITUXIMABUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
21.	RITUXIMABUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
22.	RITUXIMABUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
23.	RITUXIMABUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA

24.	RITUXIMABUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
25.	RITUXIMABUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
26.	RITUXIMABUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
27.	RITUXIMABUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
28.	RITUXIMABUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.52.

TAMOXIFENUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	TAMOXIFENUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
2.	TAMOXIFENUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
3.	TAMOXIFENUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
4.	TAMOXIFENUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
5.	TAMOXIFENUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
6.	TAMOXIFENUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
7.	TAMOXIFENUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
8.	TAMOXIFENUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
9.	TAMOXIFENUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
10.	TAMOXIFENUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
11.	TAMOXIFENUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
12.	TAMOXIFENUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
13.	TAMOXIFENUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
14.	TAMOXIFENUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
15.	TAMOXIFENUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
16.	TAMOXIFENUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
17.	TAMOXIFENUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
18.	TAMOXIFENUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
19.	TAMOXIFENUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
20.	TAMOXIFENUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
21.	TAMOXIFENUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
22.	TAMOXIFENUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
23.	TAMOXIFENUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
24.	TAMOXIFENUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
25.	TAMOXIFENUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
26.	TAMOXIFENUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
27.	TAMOXIFENUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
28.	TAMOXIFENUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
29.	TAMOXIFENUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
30.	TAMOXIFENUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
31.	TAMOXIFENUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
32.	TAMOXIFENUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
33.	TAMOXIFENUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
34.	TAMOXIFENUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
35.	TAMOXIFENUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
36.	TAMOXIFENUM	C54.3	DNO MACICY
37.	TAMOXIFENUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
38.	TAMOXIFENUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
39.	TAMOXIFENUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
40.	TAMOXIFENUM	D03	CZERNIAK IN SITU
41.	TAMOXIFENUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
42.	TAMOXIFENUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
43.	TAMOXIFENUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
44.	TAMOXIFENUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
45.	TAMOXIFENUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
46.	TAMOXIFENUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
47.	TAMOXIFENUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
48.	TAMOXIFENUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
49.	TAMOXIFENUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
50.	TAMOXIFENUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
51.	TAMOXIFENUM	Q85.0	NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ NIEZŁOŚLIWA
52.	TAMOXIFENUM	Q85.1	STWARDNIENIE GUZOWATE
53.	TAMOXIFENUM	Q85.8	INNE FAKOMATOZY NIE SKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
54.	TAMOXIFENUM	Q85.9	FAKOMATOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.55.

THIOTEPUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	THIOTEPUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
2.	THIOTEPUM	C38.0	SERCE
3.	THIOTEPUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
4.	THIOTEPUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
5.	THIOTEPUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
6.	THIOTEPUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
7.	THIOTEPUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
8.	THIOTEPUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
9.	THIOTEPUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
10.	THIOTEPUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
11.	THIOTEPUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
12.	THIOTEPUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
13.	THIOTEPUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
14.	THIOTEPUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
15.	THIOTEPUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
16.	THIOTEPUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
17.	THIOTEPUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
18.	THIOTEPUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
19.	THIOTEPUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
20.	THIOTEPUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
21.	THIOTEPUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
22.	THIOTEPUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	THIOTEPUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
24.	THIOTEPUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
25.	THIOTEPUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
26.	THIOTEPUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
27.	THIOTEPUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
28.	THIOTEPUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
29.	THIOTEPUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
30.	THIOTEPUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
31.	THIOTEPUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
32.	THIOTEPUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
33.	THIOTEPUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
34.	THIOTEPUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
35.	THIOTEPUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
36.	THIOTEPUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
37.	THIOTEPUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
38.	THIOTEPUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
39.	THIOTEPUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
40.	THIOTEPUM	C67.6	UIŚCIE MOCZOWODU
41.	THIOTEPUM	C67.7	MOCZOWNIK
42.	THIOTEPUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
43.	THIOTEPUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
44.	THIOTEPUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
45.	THIOTEPUM	C69.0	SPOJÓWKA
46.	THIOTEPUM	C69.1	ROGÓWKA
47.	THIOTEPUM	C69.2	SIATKÓWKA
48.	THIOTEPUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
49.	THIOTEPUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
50.	THIOTEPUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
51.	THIOTEPUM	C69.6	OCZODÓŁ
52.	THIOTEPUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
53.	THIOTEPUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
54.	THIOTEPUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
55.	THIOTEPUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
56.	THIOTEPUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
57.	THIOTEPUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
58.	THIOTEPUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
59.	THIOTEPUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
60.	THIOTEPUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
61.	THIOTEPUM	C71.6	MÓZDŻEK
62.	THIOTEPUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
63.	THIOTEPUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
64.	THIOTEPUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
65.	THIOTEPUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
66.	THIOTEPUM	C74.9	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY (NADNERCZE NIEOKREŚLONE)
67.	THIOTEPUM	C81	CHOROBA HODGKINA
68.	THIOTEPUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
69.	THIOTEPUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
70.	THIOTEPUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
71.	THIOTEPUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
72.	THIOTEPUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
73.	THIOTEPUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
74.	THIOTEPUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
75.	THIOTEPUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
76.	THIOTEPUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
77.	THIOTEPUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
78.	THIOTEPUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
79.	THIOTEPUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
80.	THIOTEPUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
81.	THIOTEPUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
82.	THIOTEPUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
83.	THIOTEPUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
84.	THIOTEPUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
85.	THIOTEPUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
86.	THIOTEPUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
87.	THIOTEPUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
88.	THIOTEPUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITA
89.	THIOTEPUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
90.	THIOTEPUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
91.	THIOTEPUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
92.	THIOTEPUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
93.	THIOTEPUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
94.	THIOTEPUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
95.	THIOTEPUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
96.	THIOTEPUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
97.	THIOTEPUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
98.	THIOTEPUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
99.	THIOTEPUM	C85.0	MIEŚSAK LIMFATYCZNY
100.	THIOTEPUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
101.	THIOTEPUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
102.	THIOTEPUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY

Załącznik C.56.

TIOGUANINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	TIOGUANINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
2.	TIOGUANINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
3.	TIOGUANINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
4.	TIOGUANINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
5.	TIOGUANINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
6.	TIOGUANINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
7.	TIOGUANINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
8.	TIOGUANINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
9.	TIOGUANINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
10.	TIOGUANINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
11.	TIOGUANINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
12.	TIOGUANINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
13.	TIOGUANINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
14.	TIOGUANINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
15.	TIOGUANINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
16.	TIOGUANINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
17.	TIOGUANINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
18.	TIOGUANINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
19.	TIOGUANINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
20.	TIOGUANINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
21.	TIOGUANINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
22.	TIOGUANINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
23.	TIOGUANINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
24.	TIOGUANINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
25.	TIOGUANINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
26.	TIOGUANINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
27.	TIOGUANINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
28.	TIOGUANINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
29.	TIOGUANINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
30.	TIOGUANINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
31.	TIOGUANINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
32.	TIOGUANINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
33.	TIOGUANINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
34.	TIOGUANINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
35.	TIOGUANINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
36.	TIOGUANINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
37.	TIOGUANINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
38.	TIOGUANINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
39.	TIOGUANINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
40.	TIOGUANINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
41.	TIOGUANINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
42.	TIOGUANINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
43.	TIOGUANINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
44.	TIOGUANINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
45.	TIOGUANINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
46.	TIOGUANINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
47.	TIOGUANINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
48.	TIOGUANINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
49.	TIOGUANINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
50.	TIOGUANINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
51.	TIOGUANINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
52.	TIOGUANINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
53.	TIOGUANINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
54.	TIOGUANINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
55.	TIOGUANINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
56.	TIOGUANINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
57.	TIOGUANINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
58.	TIOGUANINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
59.	TIOGUANINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
60.	TIOGUANINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
61.	TIOGUANINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
62.	TIOGUANINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
63.	TIOGUANINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
64.	TIOGUANINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
65.	TIOGUANINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
66.	TIOGUANINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
67.	TIOGUANINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
68.	TIOGUANINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
69.	TIOGUANINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
70.	TIOGUANINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
71.	TIOGUANINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
72.	TIOGUANINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
73.	TIOGUANINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
74.	TIOGUANINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
75.	TIOGUANINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
76.	TIOGUANINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
77.	TIOGUANINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
78.	TIOGUANINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
79.	TIOGUANINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
80.	TIOGUANINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
81.	TIOGUANINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
82.	TIOGUANINUM	D46.2	OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW

Załącznik C.57.1.

TOPOTECANUM p.o.

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	TOPOTECANUM doustnie	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
2.	TOPOTECANUM doustnie	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
3.	TOPOTECANUM doustnie	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
4.	TOPOTECANUM doustnie	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
5.	TOPOTECANUM doustnie	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
6.	TOPOTECANUM doustnie	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
7.	TOPOTECANUM doustnie	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
8.	TOPOTECANUM doustnie	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA

Załącznik C.57.2.

TOPOTECANUM inj.

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
2.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
3.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
4.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34.2	PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
5.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34.3	PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
6.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
7.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
8.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
9.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38.0	SERCE
10.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
11.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
12.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
13.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38.4	OPŁUCNA
14.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ
15.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
16.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
17.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
18.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
19.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
20.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
21.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
22.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
24.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
25.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
26.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
27.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
28.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
29.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
30.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
31.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
32.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
33.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
34.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
35.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
36.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
37.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
38.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
39.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
40.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
41.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
42.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
43.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY
44.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
45.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
46.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
47.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
48.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C74.0	KORA NADNERCZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
50.	TOPOTECANUM wstrzyknięcie	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE

Załącznik C.58.

TRETINOINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	TRETINOINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
2.	TRETINOINUM	C38.0	SERCE
3.	TRETINOINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
4.	TRETINOINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
5.	TRETINOINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
6.	TRETINOINUM	C38.4	OPLUCNA
7.	TRETINOINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
8.	TRETINOINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
9.	TRETINOINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
10.	TRETINOINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
11.	TRETINOINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
12.	TRETINOINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
13.	TRETINOINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
14.	TRETINOINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
15.	TRETINOINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
16.	TRETINOINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
17.	TRETINOINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
18.	TRETINOINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
19.	TRETINOINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
20.	TRETINOINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
21.	TRETINOINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
22.	TRETINOINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
23.	TRETINOINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU

24.

TRETINOINUM

C94.7

INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA

Załącznik C.60.

VINBLASTINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	VINBLASTINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2.	VINBLASTINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3.	VINBLASTINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4.	VINBLASTINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5.	VINBLASTINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6.	VINBLASTINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7.	VINBLASTINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8.	VINBLASTINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9.	VINBLASTINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10.	VINBLASTINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11.	VINBLASTINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12.	VINBLASTINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13.	VINBLASTINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14.	VINBLASTINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15.	VINBLASTINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16.	VINBLASTINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17.	VINBLASTINUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18.	VINBLASTINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19.	VINBLASTINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20.	VINBLASTINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21.	VINBLASTINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22.	VINBLASTINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	VINBLASTINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE
24.	VINBLASTINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25.	VINBLASTINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26.	VINBLASTINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27.	VINBLASTINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28.	VINBLASTINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29.	VINBLASTINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30.	VINBLASTINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31.	VINBLASTINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32.	VINBLASTINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33.	VINBLASTINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34.	VINBLASTINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35.	VINBLASTINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36.	VINBLASTINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37.	VINBLASTINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38.	VINBLASTINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39.	VINBLASTINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40.	VINBLASTINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41.	VINBLASTINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42.	VINBLASTINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43.	VINBLASTINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44.	VINBLASTINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45.	VINBLASTINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46.	VINBLASTINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47.	VINBLASTINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48.	VINBLASTINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49.	VINBLASTINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50.	VINBLASTINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
51.	VINBLASTINUM	C09.9	MIGDALEK, NIEOKREŚLONY
52.	VINBLASTINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53.	VINBLASTINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54.	VINBLASTINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55.	VINBLASTINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56.	VINBLASTINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57.	VINBLASTINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZEŁOWA
58.	VINBLASTINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59.	VINBLASTINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60.	VINBLASTINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61.	VINBLASTINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62.	VINBLASTINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63.	VINBLASTINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64.	VINBLASTINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65.	VINBLASTINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66.	VINBLASTINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67.	VINBLASTINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68.	VINBLASTINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69.	VINBLASTINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70.	VINBLASTINUM	C13.1	FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71.	VINBLASTINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72.	VINBLASTINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73.	VINBLASTINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74.	VINBLASTINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
75.	VINBLASTINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76.	VINBLASTINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77.	VINBLASTINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
78.	VINBLASTINUM	C15	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU
79.	VINBLASTINUM	C15.0	SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU
80.	VINBLASTINUM	C15.1	PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU
81.	VINBLASTINUM	C15.2	BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU
82.	VINBLASTINUM	C15.3	GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
83.	VINBLASTINUM	C15.4	ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
84.	VINBLASTINUM	C15.5	DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU
85.	VINBLASTINUM	C15.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU
86.	VINBLASTINUM	C15.9	PRZELYK, NIEOKREŚLONY
87.	VINBLASTINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
88.	VINBLASTINUM	C16.0	WPUST
89.	VINBLASTINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
90.	VINBLASTINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
91.	VINBLASTINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
92.	VINBLASTINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
93.	VINBLASTINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
94.	VINBLASTINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
95.	VINBLASTINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
96.	VINBLASTINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
97.	VINBLASTINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
98.	VINBLASTINUM	C17.0	DWUNASTNICA
99.	VINBLASTINUM	C17.1	JELITO CZCZE
100.	VINBLASTINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
101.	VINBLASTINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
102.	VINBLASTINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
103.	VINBLASTINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
104.	VINBLASTINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
105.	VINBLASTINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
106.	VINBLASTINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
107.	VINBLASTINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
108.	VINBLASTINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
109.	VINBLASTINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
110.	VINBLASTINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
111.	VINBLASTINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
112.	VINBLASTINUM	C18.7	ESICA
113.	VINBLASTINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
114.	VINBLASTINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
115.	VINBLASTINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
116.	VINBLASTINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
117.	VINBLASTINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
118.	VINBLASTINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
119.	VINBLASTINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
120.	VINBLASTINUM	C21.2	STREFA KŁOAKOGENNA
121.	VINBLASTINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
122.	VINBLASTINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
123.	VINBLASTINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
124.	VINBLASTINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
125.	VINBLASTINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
126.	VINBLASTINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
127.	VINBLASTINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
128.	VINBLASTINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
129.	VINBLASTINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
130.	VINBLASTINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
131.	VINBLASTINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
132.	VINBLASTINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
133.	VINBLASTINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
134.	VINBLASTINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
135.	VINBLASTINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
136.	VINBLASTINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI
137.	VINBLASTINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
138.	VINBLASTINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
139.	VINBLASTINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
140.	VINBLASTINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
141.	VINBLASTINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
142.	VINBLASTINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
143.	VINBLASTINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
144.	VINBLASTINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
145.	VINBLASTINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
146.	VINBLASTINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
147.	VINBLASTINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
148.	VINBLASTINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
149.	VINBLASTINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
150.	VINBLASTINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
151.	VINBLASTINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
152.	VINBLASTINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
153.	VINBLASTINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
154.	VINBLASTINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
155.	VINBLASTINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
156.	VINBLASTINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
157.	VINBLASTINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
158.	VINBLASTINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
159.	VINBLASTINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
160.	VINBLASTINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
161.	VINBLASTINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
162.	VINBLASTINUM	C34.1	PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
163.	VINBLASTINUM	C34.2	PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
164.	VINBLASTINUM	C34.3	PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
165.	VINBLASTINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
166.	VINBLASTINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
167.	VINBLASTINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
168.	VINBLASTINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
169.	VINBLASTINUM	C38.0	SERCE
170.	VINBLASTINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
171.	VINBLASTINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
172.	VINBLASTINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
173.	VINBLASTINUM	C38.4	OPLUCNA
174.	VINBLASTINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
175.	VINBLASTINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
176.	VINBLASTINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
177.	VINBLASTINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
178.	VINBLASTINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
179.	VINBLASTINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
180.	VINBLASTINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
181.	VINBLASTINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
182.	VINBLASTINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
183.	VINBLASTINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
184.	VINBLASTINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
185.	VINBLASTINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
186.	VINBLASTINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
187.	VINBLASTINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
188.	VINBLASTINUM	C41.1	ŻUCHWA
189.	VINBLASTINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
190.	VINBLASTINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
191.	VINBLASTINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
192.	VINBLASTINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
193.	VINBLASTINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
194.	VINBLASTINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
195.	VINBLASTINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
196.	VINBLASTINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
197.	VINBLASTINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
198.	VINBLASTINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
199.	VINBLASTINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
200.	VINBLASTINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
201.	VINBLASTINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
202.	VINBLASTINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
203.	VINBLASTINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
204.	VINBLASTINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
205.	VINBLASTINUM	C46	MIĘSAK KAPOS'I EGO
206.	VINBLASTINUM	C46.0	MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
207.	VINBLASTINUM	C46.1	MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ
208.	VINBLASTINUM	C46.2	MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA
209.	VINBLASTINUM	C46.3	MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
210.	VINBLASTINUM	C46.7	MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
211.	VINBLASTINUM	C46.8	MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
212.	VINBLASTINUM	C46.9	MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY
213.	VINBLASTINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
214.	VINBLASTINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
215.	VINBLASTINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
216.	VINBLASTINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
217.	VINBLASTINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
218.	VINBLASTINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
219.	VINBLASTINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
220.	VINBLASTINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
221.	VINBLASTINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
222.	VINBLASTINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
223.	VINBLASTINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
224.	VINBLASTINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
225.	VINBLASTINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
226.	VINBLASTINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
227.	VINBLASTINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
228.	VINBLASTINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
229.	VINBLASTINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
230.	VINBLASTINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
231.	VINBLASTINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
232.	VINBLASTINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
233.	VINBLASTINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
234.	VINBLASTINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
235.	VINBLASTINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
236.	VINBLASTINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
237.	VINBLASTINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
238.	VINBLASTINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
239.	VINBLASTINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
240.	VINBLASTINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
241.	VINBLASTINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
242.	VINBLASTINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
243.	VINBLASTINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
244.	VINBLASTINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
245.	VINBLASTINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
246.	VINBLASTINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
247.	VINBLASTINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
248.	VINBLASTINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
249.	VINBLASTINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
250.	VINBLASTINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
251.	VINBLASTINUM	C51.2	ŁECHTACZKA
252.	VINBLASTINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
253.	VINBLASTINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
254.	VINBLASTINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
255.	VINBLASTINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
256.	VINBLASTINUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
257.	VINBLASTINUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
258.	VINBLASTINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
259.	VINBLASTINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
260.	VINBLASTINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
261.	VINBLASTINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
262.	VINBLASTINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
263.	VINBLASTINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
264.	VINBLASTINUM	C54.3	DNO MACICY
265.	VINBLASTINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
266.	VINBLASTINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
267.	VINBLASTINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
268.	VINBLASTINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
269.	VINBLASTINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
270.	VINBLASTINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
271.	VINBLASTINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
272.	VINBLASTINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
273.	VINBLASTINUM	C57.3	PRZYMAGICZA
274.	VINBLASTINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
275.	VINBLASTINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
276.	VINBLASTINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
277.	VINBLASTINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
278.	VINBLASTINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
279.	VINBLASTINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
280.	VINBLASTINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
281.	VINBLASTINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
282.	VINBLASTINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
283.	VINBLASTINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
284.	VINBLASTINUM	C63.0	NAJĄDRZE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
285.	VINBLASTINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
286.	VINBLASTINUM	C63.2	MOSZNA
287.	VINBLASTINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
288.	VINBLASTINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
289.	VINBLASTINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
290.	VINBLASTINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
291.	VINBLASTINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
292.	VINBLASTINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
293.	VINBLASTINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
294.	VINBLASTINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
295.	VINBLASTINUM	C67.1	SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
296.	VINBLASTINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
297.	VINBLASTINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
298.	VINBLASTINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
299.	VINBLASTINUM	C67.5	SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
300.	VINBLASTINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
301.	VINBLASTINUM	C67.7	MOCZOWNIK
302.	VINBLASTINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO
303.	VINBLASTINUM	C67.9	PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
304.	VINBLASTINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
305.	VINBLASTINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
306.	VINBLASTINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
307.	VINBLASTINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
308.	VINBLASTINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
309.	VINBLASTINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
310.	VINBLASTINUM	C69.0	SPOJÓWKA
311.	VINBLASTINUM	C69.1	ROGÓWKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
312.	VINBLASTINUM	C69.2	SIATKÓWKA
313.	VINBLASTINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
314.	VINBLASTINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
315.	VINBLASTINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
316.	VINBLASTINUM	C69.6	OCZODÓŁ
317.	VINBLASTINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
318.	VINBLASTINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
319.	VINBLASTINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
320.	VINBLASTINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
321.	VINBLASTINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
322.	VINBLASTINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
323.	VINBLASTINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
324.	VINBLASTINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
325.	VINBLASTINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
326.	VINBLASTINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
327.	VINBLASTINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
328.	VINBLASTINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
329.	VINBLASTINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
330.	VINBLASTINUM	C71.6	MÓZDZEK
331.	VINBLASTINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
332.	VINBLASTINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
333.	VINBLASTINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
334.	VINBLASTINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
335.	VINBLASTINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
336.	VINBLASTINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
337.	VINBLASTINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
338.	VINBLASTINUM	C72.3	NERW WZROKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
339.	VINBLASTINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
340.	VINBLASTINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
341.	VINBLASTINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
342.	VINBLASTINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
343.	VINBLASTINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
344.	VINBLASTINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
345.	VINBLASTINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
346.	VINBLASTINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
347.	VINBLASTINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
348.	VINBLASTINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
349.	VINBLASTINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
350.	VINBLASTINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
351.	VINBLASTINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
352.	VINBLASTINUM	C75.3	SZYSZYŃKA
353.	VINBLASTINUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
354.	VINBLASTINUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
355.	VINBLASTINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
356.	VINBLASTINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
357.	VINBLASTINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
358.	VINBLASTINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
359.	VINBLASTINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
360.	VINBLASTINUM	C76.2	BRZUCH
361.	VINBLASTINUM	C76.3	MIEDNICA
362.	VINBLASTINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
363.	VINBLASTINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
364.	VINBLASTINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
365.	VINBLASTINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
366.	VINBLASTINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
367.	VINBLASTINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
368.	VINBLASTINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
369.	VINBLASTINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
370.	VINBLASTINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
371.	VINBLASTINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
372.	VINBLASTINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
373.	VINBLASTINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
374.	VINBLASTINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
375.	VINBLASTINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
376.	VINBLASTINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
377.	VINBLASTINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
378.	VINBLASTINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
379.	VINBLASTINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
380.	VINBLASTINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
381.	VINBLASTINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
382.	VINBLASTINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
383.	VINBLASTINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
384.	VINBLASTINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
385.	VINBLASTINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
386.	VINBLASTINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
387.	VINBLASTINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
388.	VINBLASTINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
389.	VINBLASTINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
390.	VINBLASTINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
391.	VINBLASTINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
392.	VINBLASTINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
393.	VINBLASTINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
394.	VINBLASTINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
395.	VINBLASTINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
396.	VINBLASTINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
397.	VINBLASTINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
398.	VINBLASTINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
399.	VINBLASTINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
400.	VINBLASTINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
401.	VINBLASTINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
402.	VINBLASTINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
403.	VINBLASTINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
404.	VINBLASTINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
405.	VINBLASTINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
406.	VINBLASTINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
407.	VINBLASTINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
408.	VINBLASTINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
409.	VINBLASTINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
410.	VINBLASTINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
411.	VINBLASTINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
412.	VINBLASTINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
413.	VINBLASTINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
414.	VINBLASTINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
415.	VINBLASTINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
416.	VINBLASTINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
417.	VINBLASTINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
418.	VINBLASTINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
419.	VINBLASTINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
420.	VINBLASTINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
421.	VINBLASTINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
422.	VINBLASTINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
423.	VINBLASTINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
424.	VINBLASTINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
425.	VINBLASTINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
426.	VINBLASTINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
427.	VINBLASTINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
428.	VINBLASTINUM	C85.0	MIĘSAK LIMFATYCZNY
429.	VINBLASTINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
430.	VINBLASTINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
431.	VINBLASTINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
432.	VINBLASTINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
433.	VINBLASTINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
434.	VINBLASTINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
435.	VINBLASTINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
436.	VINBLASTINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
437.	VINBLASTINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
438.	VINBLASTINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
439.	VINBLASTINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
440.	VINBLASTINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
441.	VINBLASTINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
442.	VINBLASTINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
443.	VINBLASTINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
444.	VINBLASTINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
445.	VINBLASTINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
446.	VINBLASTINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
447.	VINBLASTINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
448.	VINBLASTINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
449.	VINBLASTINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
450.	VINBLASTINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
451.	VINBLASTINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
452.	VINBLASTINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
453.	VINBLASTINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
454.	VINBLASTINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
455.	VINBLASTINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
456.	VINBLASTINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
457.	VINBLASTINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
458.	VINBLASTINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
459.	VINBLASTINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
460.	VINBLASTINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
461.	VINBLASTINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
462.	VINBLASTINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
463.	VINBLASTINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
464.	VINBLASTINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
465.	VINBLASTINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
466.	VINBLASTINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
467.	VINBLASTINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
468.	VINBLASTINUM	D00.2	ZOŁĄDEK

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
469.	VINBLASTINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
470.	VINBLASTINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
471.	VINBLASTINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
472.	VINBLASTINUM	D01.2	ODBYTNICA
473.	VINBLASTINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
474.	VINBLASTINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
475.	VINBLASTINUM	D01.5	WĄTROBA, PEŁCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
476.	VINBLASTINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
477.	VINBLASTINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
478.	VINBLASTINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
479.	VINBLASTINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
480.	VINBLASTINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
481.	VINBLASTINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
482.	VINBLASTINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
483.	VINBLASTINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
484.	VINBLASTINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
485.	VINBLASTINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
486.	VINBLASTINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
487.	VINBLASTINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
488.	VINBLASTINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
489.	VINBLASTINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
490.	VINBLASTINUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
491.	VINBLASTINUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
492.	VINBLASTINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
493.	VINBLASTINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
494.	VINBLASTINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
495.	VINBLASTINUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
496.	VINBLASTINUM	D07.1	SROM
497.	VINBLASTINUM	D07.2	POCHWA
498.	VINBLASTINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ZEŃSKIE
499.	VINBLASTINUM	D07.4	PRĄCIE
500.	VINBLASTINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
501.	VINBLASTINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
502.	VINBLASTINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
503.	VINBLASTINUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
504.	VINBLASTINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
505.	VINBLASTINUM	D09.2	OKO
506.	VINBLASTINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
507.	VINBLASTINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
508.	VINBLASTINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
509.	VINBLASTINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
510.	VINBLASTINUM	D10.0	WARGA
511.	VINBLASTINUM	D10.1	JĘZYK
512.	VINBLASTINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
513.	VINBLASTINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
514.	VINBLASTINUM	D10.4	MIGDAŁEK
515.	VINBLASTINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
516.	VINBLASTINUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
517.	VINBLASTINUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
518.	VINBLASTINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
519.	VINBLASTINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
520.	VINBLASTINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
521.	VINBLASTINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
522.	VINBLASTINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
523.	VINBLASTINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
524.	VINBLASTINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
525.	VINBLASTINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
526.	VINBLASTINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
527.	VINBLASTINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
528.	VINBLASTINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
529.	VINBLASTINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
530.	VINBLASTINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
531.	VINBLASTINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
532.	VINBLASTINUM	D12.8	ODBYTNICA
533.	VINBLASTINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
534.	VINBLASTINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
535.	VINBLASTINUM	D13.0	PRZEŁYK
536.	VINBLASTINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
537.	VINBLASTINUM	D13.2	DWUNASTNICA
538.	VINBLASTINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
539.	VINBLASTINUM	D13.4	WĄTROBA
540.	VINBLASTINUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
541.	VINBLASTINUM	D13.6	TRZUSTKA
542.	VINBLASTINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
543.	VINBLASTINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
544.	VINBLASTINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
545.	VINBLASTINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
546.	VINBLASTINUM	D14.1	KRTAŃ
547.	VINBLASTINUM	D14.2	TCHAWICA
548.	VINBLASTINUM	D14.3	OSKRZELA I PLUCA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
549.	VINBLASTINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
550.	VINBLASTINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
551.	VINBLASTINUM	D15.0	GRASICA
552.	VINBLASTINUM	D15.1	SERCE
553.	VINBLASTINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
554.	VINBLASTINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
555.	VINBLASTINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
556.	VINBLASTINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
557.	VINBLASTINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
558.	VINBLASTINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
559.	VINBLASTINUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
560.	VINBLASTINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
561.	VINBLASTINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
562.	VINBLASTINUM	D16.5	ŻUCHWA
563.	VINBLASTINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
564.	VINBLASTINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
565.	VINBLASTINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
566.	VINBLASTINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
567.	VINBLASTINUM	D18	NACZYNIAKI KRWIONOŚNE I NACZYNIAKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
568.	VINBLASTINUM	D18.0	NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
569.	VINBLASTINUM	D18.1	NACZYNIAK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
570.	VINBLASTINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
571.	VINBLASTINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
572.	VINBLASTINUM	D20.1	OTRZEWNA
573.	VINBLASTINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
574.	VINBLASTINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
575.	VINBLASTINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
576.	VINBLASTINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
577.	VINBLASTINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
578.	VINBLASTINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
579.	VINBLASTINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
580.	VINBLASTINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
581.	VINBLASTINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
582.	VINBLASTINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
583.	VINBLASTINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
584.	VINBLASTINUM	D28.0	SROM
585.	VINBLASTINUM	D28.1	POCHWA
586.	VINBLASTINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
587.	VINBLASTINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
588.	VINBLASTINUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
589.	VINBLASTINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
590.	VINBLASTINUM	D29.0	PRĄCIE
591.	VINBLASTINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
592.	VINBLASTINUM	D29.2	JĄDRO
593.	VINBLASTINUM	D29.3	NAJĄDRZE
594.	VINBLASTINUM	D29.4	MOSZNA
595.	VINBLASTINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
596.	VINBLASTINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
597.	VINBLASTINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
598.	VINBLASTINUM	D30.0	NERKA
599.	VINBLASTINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
600.	VINBLASTINUM	D30.2	MOCZOWÓD
601.	VINBLASTINUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
602.	VINBLASTINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
603.	VINBLASTINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
604.	VINBLASTINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
605.	VINBLASTINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
606.	VINBLASTINUM	D31.0	SPOJÓWKA
607.	VINBLASTINUM	D31.1	ROGÓWKA
608.	VINBLASTINUM	D31.2	SIATKÓWKA
609.	VINBLASTINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
610.	VINBLASTINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
611.	VINBLASTINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
612.	VINBLASTINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
613.	VINBLASTINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
614.	VINBLASTINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
615.	VINBLASTINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
616.	VINBLASTINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
617.	VINBLASTINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
618.	VINBLASTINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
619.	VINBLASTINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
620.	VINBLASTINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
621.	VINBLASTINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
622.	VINBLASTINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
623.	VINBLASTINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
624.	VINBLASTINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
625.	VINBLASTINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
626.	VINBLASTINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
627.	VINBLASTINUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
628.	VINBLASTINUM	D35.0	NADNERCZA
629.	VINBLASTINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
630.	VINBLASTINUM	D35.2	PRZYSADKA
631.	VINBLASTINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
632.	VINBLASTINUM	D35.4	SZYSZYNKA
633.	VINBLASTINUM	D35.5	KLĘBEK SZYJNY
634.	VINBLASTINUM	D35.6	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
635.	VINBLASTINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
636.	VINBLASTINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
637.	VINBLASTINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
638.	VINBLASTINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
639.	VINBLASTINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
640.	VINBLASTINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
641.	VINBLASTINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
642.	VINBLASTINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
643.	VINBLASTINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
644.	VINBLASTINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
645.	VINBLASTINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
646.	VINBLASTINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
647.	VINBLASTINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
648.	VINBLASTINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
649.	VINBLASTINUM	D37.5	ODBYTNICA
650.	VINBLASTINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
651.	VINBLASTINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
652.	VINBLASTINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
653.	VINBLASTINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
654.	VINBLASTINUM	D38.0	KRTAŃ
655.	VINBLASTINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
656.	VINBLASTINUM	D38.2	OPŁUCNA
657.	VINBLASTINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
658.	VINBLASTINUM	D38.4	GRASICA
659.	VINBLASTINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
660.	VINBLASTINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
661.	VINBLASTINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
662.	VINBLASTINUM	D39.0	MACICA
663.	VINBLASTINUM	D39.1	JAJNIK
664.	VINBLASTINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
665.	VINBLASTINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
666.	VINBLASTINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
667.	VINBLASTINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
668.	VINBLASTINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
669.	VINBLASTINUM	D40.1	JĄDRO
670.	VINBLASTINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
671.	VINBLASTINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
672.	VINBLASTINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
673.	VINBLASTINUM	D41.0	NERKA
674.	VINBLASTINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
675.	VINBLASTINUM	D41.2	MOCZOWÓD
676.	VINBLASTINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
677.	VINBLASTINUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
678.	VINBLASTINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
679.	VINBLASTINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
680.	VINBLASTINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
681.	VINBLASTINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
682.	VINBLASTINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
683.	VINBLASTINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
684.	VINBLASTINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
685.	VINBLASTINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
686.	VINBLASTINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
687.	VINBLASTINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
688.	VINBLASTINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
689.	VINBLASTINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
690.	VINBLASTINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
691.	VINBLASTINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
692.	VINBLASTINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
693.	VINBLASTINUM	D44.0	TARCZYCA
694.	VINBLASTINUM	D44.1	NADNERCZA
695.	VINBLASTINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
696.	VINBLASTINUM	D44.3	PRZYSADKA
697.	VINBLASTINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
698.	VINBLASTINUM	D44.5	SZYSZYNKA
699.	VINBLASTINUM	D44.6	KLĘBEK SZYJNY
700.	VINBLASTINUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
701.	VINBLASTINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
702.	VINBLASTINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
703.	VINBLASTINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
704.	VINBLASTINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
705.	VINBLASTINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
706.	VINBLASTINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
707.	VINBLASTINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
708.	VINBLASTINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
709.	VINBLASTINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
710.	VINBLASTINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
711.	VINBLASTINUM	D48.4	OTRZEWNA
712.	VINBLASTINUM	D48.5	SKÓRA
713.	VINBLASTINUM	D48.6	SUTEK
714.	VINBLASTINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
715.	VINBLASTINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
716.	VINBLASTINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSZA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
717.	VINBLASTINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
718.	VINBLASTINUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM

Załącznik C.61.

VINCRISTINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	VINCRISTINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2.	VINCRISTINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3.	VINCRISTINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4.	VINCRISTINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5.	VINCRISTINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6.	VINCRISTINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7.	VINCRISTINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8.	VINCRISTINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9.	VINCRISTINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10.	VINCRISTINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11.	VINCRISTINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12.	VINCRISTINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13.	VINCRISTINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14.	VINCRISTINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15.	VINCRISTINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16.	VINCRISTINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17.	VINCRISTINUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18.	VINCRISTINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19.	VINCRISTINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20.	VINCRISTINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21.	VINCRISTINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22.	VINCRISTINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	VINCRISTINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE
24.	VINCRISTINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25.	VINCRISTINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26.	VINCRISTINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27.	VINCRISTINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28.	VINCRISTINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29.	VINCRISTINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30.	VINCRISTINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31.	VINCRISTINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32.	VINCRISTINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33.	VINCRISTINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34.	VINCRISTINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35.	VINCRISTINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36.	VINCRISTINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37.	VINCRISTINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38.	VINCRISTINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39.	VINCRISTINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40.	VINCRISTINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41.	VINCRISTINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42.	VINCRISTINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43.	VINCRISTINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44.	VINCRISTINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45.	VINCRISTINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46.	VINCRISTINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47.	VINCRISTINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48.	VINCRISTINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49.	VINCRISTINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY)
50.	VINCRISTINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
51.	VINCRISTINUM	C09.9	MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY
52.	VINCRISTINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53.	VINCRISTINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54.	VINCRISTINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55.	VINCRISTINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56.	VINCRISTINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57.	VINCRISTINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZELOWA
58.	VINCRISTINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59.	VINCRISTINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60.	VINCRISTINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61.	VINCRISTINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62.	VINCRISTINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63.	VINCRISTINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64.	VINCRISTINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65.	VINCRISTINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66.	VINCRISTINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67.	VINCRISTINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68.	VINCRISTINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX)
69.	VINCRISTINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70.	VINCRISTINUM	C13.1	FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71.	VINCRISTINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72.	VINCRISTINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73.	VINCRISTINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74.	VINCRISTINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
75.	VINCRISTINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76.	VINCRISTINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77.	VINCRISTINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
78.	VINCRISTINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79.	VINCRISTINUM	C16.0	WPUST
80.	VINCRISTINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81.	VINCRISTINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82.	VINCRISTINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83.	VINCRISTINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84.	VINCRISTINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85.	VINCRISTINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86.	VINCRISTINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87.	VINCRISTINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88.	VINCRISTINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89.	VINCRISTINUM	C17.0	DWUNASTNICA
90.	VINCRISTINUM	C17.1	JELITO CZCZE
91.	VINCRISTINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92.	VINCRISTINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93.	VINCRISTINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94.	VINCRISTINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95.	VINCRISTINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96.	VINCRISTINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97.	VINCRISTINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98.	VINCRISTINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99.	VINCRISTINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100.	VINCRISTINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101.	VINCRISTINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
102.	VINCRISTINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103.	VINCRISTINUM	C18.7	ESICA
104.	VINCRISTINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105.	VINCRISTINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
106.	VINCRISTINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107.	VINCRISTINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108.	VINCRISTINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109.	VINCRISTINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110.	VINCRISTINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111.	VINCRISTINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112.	VINCRISTINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113.	VINCRISTINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114.	VINCRISTINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115.	VINCRISTINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116.	VINCRISTINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117.	VINCRISTINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118.	VINCRISTINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119.	VINCRISTINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120.	VINCRISTINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121.	VINCRISTINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122.	VINCRISTINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123.	VINCRISTINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124.	VINCRISTINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125.	VINCRISTINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126.	VINCRISTINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127.	VINCRISTINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
128.	VINCRISTINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129.	VINCRISTINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130.	VINCRISTINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131.	VINCRISTINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132.	VINCRISTINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI
133.	VINCRISTINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134.	VINCRISTINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135.	VINCRISTINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136.	VINCRISTINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137.	VINCRISTINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138.	VINCRISTINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139.	VINCRISTINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140.	VINCRISTINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141.	VINCRISTINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142.	VINCRISTINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143.	VINCRISTINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144.	VINCRISTINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145.	VINCRISTINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146.	VINCRISTINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147.	VINCRISTINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148.	VINCRISTINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149.	VINCRISTINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150.	VINCRISTINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151.	VINCRISTINUM	C33	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
152.	VINCRISTINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
153.	VINCRISTINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
154.	VINCRISTINUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
155.	VINCRISTINUM	C34.2	PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
156.	VINCRISTINUM	C34.3	PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
157.	VINCRISTINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
158.	VINCRISTINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
159.	VINCRISTINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
160.	VINCRISTINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
161.	VINCRISTINUM	C38.0	SERCE
162.	VINCRISTINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
163.	VINCRISTINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
164.	VINCRISTINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
165.	VINCRISTINUM	C38.4	OPLUCNA
166.	VINCRISTINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
167.	VINCRISTINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
168.	VINCRISTINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
169.	VINCRISTINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
170.	VINCRISTINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
171.	VINCRISTINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
172.	VINCRISTINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
173.	VINCRISTINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
174.	VINCRISTINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
175.	VINCRISTINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
176.	VINCRISTINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
177.	VINCRISTINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
178.	VINCRISTINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
179.	VINCRISTINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
180.	VINCRISTINUM	C41.1	ŻUCHWA
181.	VINCRISTINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
182.	VINCRISTINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
183.	VINCRISTINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
184.	VINCRISTINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
185.	VINCRISTINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
186.	VINCRISTINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
187.	VINCRISTINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
188.	VINCRISTINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
189.	VINCRISTINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
190.	VINCRISTINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
191.	VINCRISTINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
192.	VINCRISTINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
193.	VINCRISTINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
194.	VINCRISTINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
195.	VINCRISTINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
196.	VINCRISTINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
197.	VINCRISTINUM	C45	MIĘDZYBŁONIAK
198.	VINCRISTINUM	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ
199.	VINCRISTINUM	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
200.	VINCRISTINUM	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
201.	VINCRISTINUM	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
202.	VINCRISTINUM	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
203.	VINCRISTINUM	C46	MIĘSAK KAPOS'I EGO
204.	VINCRISTINUM	C46.0	MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY
205.	VINCRISTINUM	C46.1	MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ
206.	VINCRISTINUM	C46.2	MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
207.	VINCRISTINUM	C46.3	MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
208.	VINCRISTINUM	C46.7	MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
209.	VINCRISTINUM	C46.8	MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
210.	VINCRISTINUM	C46.9	MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY
211.	VINCRISTINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
212.	VINCRISTINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
213.	VINCRISTINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
214.	VINCRISTINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
215.	VINCRISTINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
216.	VINCRISTINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
217.	VINCRISTINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
218.	VINCRISTINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
219.	VINCRISTINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
220.	VINCRISTINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
221.	VINCRISTINUM	C48.	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
222.	VINCRISTINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
223.	VINCRISTINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
224.	VINCRISTINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
225.	VINCRISTINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
226.	VINCRISTINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
227.	VINCRISTINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
228.	VINCRISTINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
229.	VINCRISTINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
230.	VINCRISTINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
231.	VINCRISTINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
232.	VINCRISTINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
233.	VINCRISTINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
234.	VINCRISTINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
235.	VINCRISTINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
236.	VINCRISTINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA
237.	VINCRISTINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
238.	VINCRISTINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
239.	VINCRISTINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
240.	VINCRISTINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
241.	VINCRISTINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
242.	VINCRISTINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
243.	VINCRISTINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
244.	VINCRISTINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
245.	VINCRISTINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
246.	VINCRISTINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
247.	VINCRISTINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
248.	VINCRISTINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
249.	VINCRISTINUM	C51.2	ŁECHTACZKA
250.	VINCRISTINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
251.	VINCRISTINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
252.	VINCRISTINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
253.	VINCRISTINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
254.	VINCRISTINUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
255.	VINCRISTINUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
256.	VINCRISTINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY
257.	VINCRISTINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
258.	VINCRISTINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
259.	VINCRISTINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
260.	VINCRISTINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
261.	VINCRISTINUM	C54.2	MIEŚNIÓWKA MACICY
262.	VINCRISTINUM	C54.3	DNO MACICY
263.	VINCRISTINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY
264.	VINCRISTINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
265.	VINCRISTINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
266.	VINCRISTINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
267.	VINCRISTINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
268.	VINCRISTINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
269.	VINCRISTINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
270.	VINCRISTINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
271.	VINCRISTINUM	C57.3	PRZYMACICZA
272.	VINCRISTINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
273.	VINCRISTINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
274.	VINCRISTINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
275.	VINCRISTINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
276.	VINCRISTINUM	C58	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
277.	VINCRISTINUM	C60	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA
278.	VINCRISTINUM	C60.0	NAPLETEK
279.	VINCRISTINUM	C60.1	ŻOŁĄDŹ PRĄCIA
280.	VINCRISTINUM	C60.2	TRZON PRĄCIA
281.	VINCRISTINUM	C60.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA
282.	VINCRISTINUM	C60.9	PRĄCIE, NIEOKREŚLONE
283.	VINCRISTINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOLU KROKOWEGO
284.	VINCRISTINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
285.	VINCRISTINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
286.	VINCRISTINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
287.	VINCRISTINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
288.	VINCRISTINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
289.	VINCRISTINUM	C63.0	NAJĄDRZE
290.	VINCRISTINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
291.	VINCRISTINUM	C63.2	MOSZNA
292.	VINCRISTINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
293.	VINCRISTINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
294.	VINCRISTINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
295.	VINCRISTINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
296.	VINCRISTINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
297.	VINCRISTINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
298.	VINCRISTINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
299.	VINCRISTINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
300.	VINCRISTINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
301.	VINCRISTINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
302.	VINCRISTINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
303.	VINCRISTINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
304.	VINCRISTINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
305.	VINCRISTINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
306.	VINCRISTINUM	C67.7	MOCZOWNIK
307.	VINCRISTINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
308.	VINCRISTINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
309.	VINCRISTINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
310.	VINCRISTINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
311.	VINCRISTINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
312.	VINCRISTINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
313.	VINCRISTINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
314.	VINCRISTINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
315.	VINCRISTINUM	C69.0	SPOJÓWKA
316.	VINCRISTINUM	C69.1	ROGÓWKA
317.	VINCRISTINUM	C69.2	SIATKÓWKA
318.	VINCRISTINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
319.	VINCRISTINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
320.	VINCRISTINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
321.	VINCRISTINUM	C69.6	OCZODÓŁ
322.	VINCRISTINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
323.	VINCRISTINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE
324.	VINCRISTINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
325.	VINCRISTINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
326.	VINCRISTINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
327.	VINCRISTINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
328.	VINCRISTINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
329.	VINCRISTINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
330.	VINCRISTINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
331.	VINCRISTINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
332.	VINCRISTINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
333.	VINCRISTINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
334.	VINCRISTINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
335.	VINCRISTINUM	C71.6	MÓZDZEK
336.	VINCRISTINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
337.	VINCRISTINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
338.	VINCRISTINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
339.	VINCRISTINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
340.	VINCRISTINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
341.	VINCRISTINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
342.	VINCRISTINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
343.	VINCRISTINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
344.	VINCRISTINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
345.	VINCRISTINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
346.	VINCRISTINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
347.	VINCRISTINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
348.	VINCRISTINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
349.	VINCRISTINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
350.	VINCRISTINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
351.	VINCRISTINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
352.	VINCRISTINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
353.	VINCRISTINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
354.	VINCRISTINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
355.	VINCRISTINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
356.	VINCRISTINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
357.	VINCRISTINUM	C75.3	SZYSZYŃKA
358.	VINCRISTINUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
359.	VINCRISTINUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
360.	VINCRISTINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
361.	VINCRISTINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
362.	VINCRISTINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
363.	VINCRISTINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
364.	VINCRISTINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
365.	VINCRISTINUM	C76.2	BRZUCH
366.	VINCRISTINUM	C76.3	MIEDNICA
367.	VINCRISTINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
368.	VINCRISTINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
369.	VINCRISTINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
370.	VINCRISTINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
371.	VINCRISTINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
372.	VINCRISTINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
373.	VINCRISTINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
374.	VINCRISTINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
375.	VINCRISTINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
376.	VINCRISTINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
377.	VINCRISTINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
378.	VINCRISTINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
379.	VINCRISTINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
380.	VINCRISTINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
381.	VINCRISTINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
382.	VINCRISTINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
383.	VINCRISTINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ
384.	VINCRISTINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
385.	VINCRISTINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
386.	VINCRISTINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
387.	VINCRISTINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
388.	VINCRISTINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
389.	VINCRISTINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
390.	VINCRISTINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
391.	VINCRISTINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
392.	VINCRISTINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
393.	VINCRISTINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
394.	VINCRISTINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
395.	VINCRISTINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
396.	VINCRISTINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
397.	VINCRISTINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
398.	VINCRISTINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
399.	VINCRISTINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
400.	VINCRISTINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
401.	VINCRISTINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
402.	VINCRISTINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
403.	VINCRISTINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
404.	VINCRISTINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
405.	VINCRISTINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
406.	VINCRISTINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
407.	VINCRISTINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
408.	VINCRISTINUM	C82	CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
409.	VINCRISTINUM	C82.0	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
410.	VINCRISTINUM	C82.1	MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
411.	VINCRISTINUM	C82.2	WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
412.	VINCRISTINUM	C82.7	INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
413.	VINCRISTINUM	C82.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
414.	VINCRISTINUM	C83	CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
415.	VINCRISTINUM	C83.0	Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
416.	VINCRISTINUM	C83.1	Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
417.	VINCRISTINUM	C83.2	MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
418.	VINCRISTINUM	C83.3	WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
419.	VINCRISTINUM	C83.4	IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
420.	VINCRISTINUM	C83.5	LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
421.	VINCRISTINUM	C83.6	NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
422.	VINCRISTINUM	C83.7	GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
423.	VINCRISTINUM	C83.8	INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
424.	VINCRISTINUM	C83.9	ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
425.	VINCRISTINUM	C84	OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
426.	VINCRISTINUM	C84.0	ZIARNINIAK GRZYBIASTY
427.	VINCRISTINUM	C84.1	CHOROBA SEZARY' EGO
428.	VINCRISTINUM	C84.2	CHŁONIAK STREFY T
429.	VINCRISTINUM	C84.3	CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
430.	VINCRISTINUM	C84.4	OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
431.	VINCRISTINUM	C84.5	INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
432.	VINCRISTINUM	C85	INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
433.	VINCRISTINUM	C85.0	MIEŚAK LIMFATYCZNY
434.	VINCRISTINUM	C85.1	CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
435.	VINCRISTINUM	C85.7	INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
436.	VINCRISTINUM	C85.9	CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
437.	VINCRISTINUM	C88	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
438.	VINCRISTINUM	C88.0	MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
439.	VINCRISTINUM	C88.1	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
440.	VINCRISTINUM	C88.2	CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
441.	VINCRISTINUM	C88.3	CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
442.	VINCRISTINUM	C88.7	INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
443.	VINCRISTINUM	C88.9	ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
444.	VINCRISTINUM	C90	SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
445.	VINCRISTINUM	C90.0	SZPICZAK MNOGI
446.	VINCRISTINUM	C90.1	BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
447.	VINCRISTINUM	C90.2	POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
448.	VINCRISTINUM	C91	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
449.	VINCRISTINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
450.	VINCRISTINUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
451.	VINCRISTINUM	C91.2	PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
452.	VINCRISTINUM	C91.3	BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
453.	VINCRISTINUM	C91.4	BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
454.	VINCRISTINUM	C91.5	BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
455.	VINCRISTINUM	C91.7	INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
456.	VINCRISTINUM	C91.9	BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
457.	VINCRISTINUM	C92	BIAŁACZKA SZPIKOWA
458.	VINCRISTINUM	C92.0	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
459.	VINCRISTINUM	C92.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
460.	VINCRISTINUM	C92.2	PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
461.	VINCRISTINUM	C92.3	MIĘSAK SZPIKOWY
462.	VINCRISTINUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
463.	VINCRISTINUM	C92.5	OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
464.	VINCRISTINUM	C92.7	INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
465.	VINCRISTINUM	C92.9	BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
466.	VINCRISTINUM	C93	BIAŁACZKA MONOCYTOWA
467.	VINCRISTINUM	C93.0	OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
468.	VINCRISTINUM	C93.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
469.	VINCRISTINUM	C93.2	PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
470.	VINCRISTINUM	C93.7	INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
471.	VINCRISTINUM	C93.9	BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
472.	VINCRISTINUM	C94	INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
473.	VINCRISTINUM	C94.0	OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
474.	VINCRISTINUM	C94.1	PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
475.	VINCRISTINUM	C94.2	OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
476.	VINCRISTINUM	C94.3	BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
477.	VINCRISTINUM	C94.4	OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
478.	VINCRISTINUM	C94.5	OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
479.	VINCRISTINUM	C94.7	INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
480.	VINCRISTINUM	C95	BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
481.	VINCRISTINUM	C95.0	OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
482.	VINCRISTINUM	C95.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
483.	VINCRISTINUM	C95.2	PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
484.	VINCRISTINUM	C95.7	INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
485.	VINCRISTINUM	C95.9	BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
486.	VINCRISTINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
487.	VINCRISTINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
488.	VINCRISTINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
489.	VINCRISTINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
490.	VINCRISTINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
491.	VINCRISTINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
492.	VINCRISTINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
493.	VINCRISTINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
494.	VINCRISTINUM	D00.2	ŻOŁĄDEK
495.	VINCRISTINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
496.	VINCRISTINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
497.	VINCRISTINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
498.	VINCRISTINUM	D01.2	ODBYTNICA
499.	VINCRISTINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
500.	VINCRISTINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
501.	VINCRISTINUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
502.	VINCRISTINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
503.	VINCRISTINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
504.	VINCRISTINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
505.	VINCRISTINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
506.	VINCRISTINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
507.	VINCRISTINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
508.	VINCRISTINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
509.	VINCRISTINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
510.	VINCRISTINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
511.	VINCRISTINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
512.	VINCRISTINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
513.	VINCRISTINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
514.	VINCRISTINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
515.	VINCRISTINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
516.	VINCRISTINUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
517.	VINCRISTINUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
518.	VINCRISTINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
519.	VINCRISTINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
520.	VINCRISTINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
521.	VINCRISTINUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
522.	VINCRISTINUM	D07.1	SROM
523.	VINCRISTINUM	D07.2	POCHWA
524.	VINCRISTINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
525.	VINCRISTINUM	D07.4	PRĄCIE
526.	VINCRISTINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
527.	VINCRISTINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
528.	VINCRISTINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
529.	VINCRISTINUM	D09.0	PĘCZERZ MOCZOWY
530.	VINCRISTINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
531.	VINCRISTINUM	D09.2	OKO
532.	VINCRISTINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
533.	VINCRISTINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
534.	VINCRISTINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
535.	VINCRISTINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
536.	VINCRISTINUM	D10.0	WARGA
537.	VINCRISTINUM	D10.1	JĘZYK
538.	VINCRISTINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
539.	VINCRISTINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
540.	VINCRISTINUM	D10.4	MIGDAŁEK
541.	VINCRISTINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
542.	VINCRISTINUM	D10.6	CZEŚĆ NOSOWA GARDŁA
543.	VINCRISTINUM	D10.7	CZEŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
544.	VINCRISTINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
545.	VINCRISTINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
546.	VINCRISTINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
547.	VINCRISTINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
548.	VINCRISTINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
549.	VINCRISTINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
550.	VINCRISTINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
551.	VINCRISTINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
552.	VINCRISTINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
553.	VINCRISTINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
554.	VINCRISTINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
555.	VINCRISTINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
556.	VINCRISTINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
557.	VINCRISTINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
558.	VINCRISTINUM	D12.8	ODBYTNICA
559.	VINCRISTINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
560.	VINCRISTINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
561.	VINCRISTINUM	D13.0	PRZĘLYK
562.	VINCRISTINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
563.	VINCRISTINUM	D13.2	DWUNASTNICA
564.	VINCRISTINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
565.	VINCRISTINUM	D13.4	WĄTROBA
566.	VINCRISTINUM	D13.5	DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZ WĄTROBOWE
567.	VINCRISTINUM	D13.6	TRZUSTKA
568.	VINCRISTINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
569.	VINCRISTINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
570.	VINCRISTINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
571.	VINCRISTINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
572.	VINCRISTINUM	D14.1	KRTAŃ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
573.	VINCRISTINUM	D14.2	TCHAWICA
574.	VINCRISTINUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
575.	VINCRISTINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
576.	VINCRISTINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
577.	VINCRISTINUM	D15.0	GRASICA
578.	VINCRISTINUM	D15.1	SERCE
579.	VINCRISTINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
580.	VINCRISTINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
581.	VINCRISTINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
582.	VINCRISTINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
583.	VINCRISTINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
584.	VINCRISTINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
585.	VINCRISTINUM	D16.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
586.	VINCRISTINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
587.	VINCRISTINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
588.	VINCRISTINUM	D16.5	ŻUCHWA
589.	VINCRISTINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
590.	VINCRISTINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
591.	VINCRISTINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
592.	VINCRISTINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
593.	VINCRISTINUM	D18	NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
594.	VINCRISTINUM	D18.0	NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
595.	VINCRISTINUM	D18.1	NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
596.	VINCRISTINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
597.	VINCRISTINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
598.	VINCRISTINUM	D20.1	OTRZEWNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
599.	VINCRISTINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
600.	VINCRISTINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
601.	VINCRISTINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
602.	VINCRISTINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
603.	VINCRISTINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
604.	VINCRISTINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
605.	VINCRISTINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
606.	VINCRISTINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
607.	VINCRISTINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
608.	VINCRISTINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
609.	VINCRISTINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
610.	VINCRISTINUM	D28.0	SROM
611.	VINCRISTINUM	D28.1	POCHWA
612.	VINCRISTINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
613.	VINCRISTINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
614.	VINCRISTINUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
615.	VINCRISTINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
616.	VINCRISTINUM	D29.0	PRĄCIE
617.	VINCRISTINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
618.	VINCRISTINUM	D29.2	JĄDRO
619.	VINCRISTINUM	D29.3	NAJĄDRZE
620.	VINCRISTINUM	D29.4	MOSZNA
621.	VINCRISTINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
622.	VINCRISTINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
623.	VINCRISTINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
624.	VINCRISTINUM	D30.0	NERKA
625.	VINCRISTINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
626.	VINCRISTINUM	D30.2	MOCZOWÓD
627.	VINCRISTINUM	D30.3	PĘCHERZ MOCZOWY
628.	VINCRISTINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
629.	VINCRISTINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
630.	VINCRISTINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
631.	VINCRISTINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
632.	VINCRISTINUM	D31.0	SPOJÓWKA
633.	VINCRISTINUM	D31.1	ROGÓWKA
634.	VINCRISTINUM	D31.2	SIATKÓWKA
635.	VINCRISTINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA
636.	VINCRISTINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
637.	VINCRISTINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
638.	VINCRISTINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
639.	VINCRISTINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
640.	VINCRISTINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
641.	VINCRISTINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
642.	VINCRISTINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
643.	VINCRISTINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
644.	VINCRISTINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
645.	VINCRISTINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
646.	VINCRISTINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
647.	VINCRISTINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
648.	VINCRISTINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
649.	VINCRISTINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
650.	VINCRISTINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
651.	VINCRISTINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
652.	VINCRISTINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
653.	VINCRISTINUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
654.	VINCRISTINUM	D35.0	NADNERCZA
655.	VINCRISTINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
656.	VINCRISTINUM	D35.2	PRZYSADKA
657.	VINCRISTINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
658.	VINCRISTINUM	D35.4	SZYSZYNKĄ
659.	VINCRISTINUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
660.	VINCRISTINUM	D35.6	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
661.	VINCRISTINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
662.	VINCRISTINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
663.	VINCRISTINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
664.	VINCRISTINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
665.	VINCRISTINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
666.	VINCRISTINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
667.	VINCRISTINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
668.	VINCRISTINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
669.	VINCRISTINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
670.	VINCRISTINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
671.	VINCRISTINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
672.	VINCRISTINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
673.	VINCRISTINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
674.	VINCRISTINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
675.	VINCRISTINUM	D37.5	ODBYTNICA
676.	VINCRISTINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
677.	VINCRISTINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
678.	VINCRISTINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
679.	VINCRISTINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
680.	VINCRISTINUM	D38.0	KRTAŃ
681.	VINCRISTINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
682.	VINCRISTINUM	D38.2	OPLUCNA
683.	VINCRISTINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
684.	VINCRISTINUM	D38.4	GRASICA
685.	VINCRISTINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
686.	VINCRISTINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
687.	VINCRISTINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
688.	VINCRISTINUM	D39.0	MACICA
689.	VINCRISTINUM	D39.1	JAJNIK
690.	VINCRISTINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
691.	VINCRISTINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
692.	VINCRISTINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
693.	VINCRISTINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
694.	VINCRISTINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
695.	VINCRISTINUM	D40.1	JĄDRO
696.	VINCRISTINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
697.	VINCRISTINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
698.	VINCRISTINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
699.	VINCRISTINUM	D41.0	NERKA
700.	VINCRISTINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
701.	VINCRISTINUM	D41.2	MOCZOWÓD

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
702.	VINCRISTINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
703.	VINCRISTINUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY
704.	VINCRISTINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
705.	VINCRISTINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
706.	VINCRISTINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
707.	VINCRISTINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
708.	VINCRISTINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
709.	VINCRISTINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
710.	VINCRISTINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
711.	VINCRISTINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMBIOTOWE
712.	VINCRISTINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMBIOTOWE
713.	VINCRISTINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
714.	VINCRISTINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
715.	VINCRISTINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
716.	VINCRISTINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
717.	VINCRISTINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
718.	VINCRISTINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
719.	VINCRISTINUM	D44.0	TARCZYCA
720.	VINCRISTINUM	D44.1	NADNERCZA
721.	VINCRISTINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
722.	VINCRISTINUM	D44.3	PRZYSADKA
723.	VINCRISTINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
724.	VINCRISTINUM	D44.5	SZYSZYŃKA
725.	VINCRISTINUM	D44.6	KLĘBEK SZYJNY
726.	VINCRISTINUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
727.	VINCRISTINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
728.	VINCRISTINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
729.	VINCRISTINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
730.	VINCRISTINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRZEGO I TKANEK POKREWNYCH
731.	VINCRISTINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
732.	VINCRISTINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
733.	VINCRISTINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
734.	VINCRISTINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
735.	VINCRISTINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
736.	VINCRISTINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
737.	VINCRISTINUM	D48.4	OTRZEWNA
738.	VINCRISTINUM	D48.5	SKÓRA
739.	VINCRISTINUM	D48.6	SUTEK
740.	VINCRISTINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
741.	VINCRISTINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
742.	VINCRISTINUM	D69.3	SAMOISTNA PLAMICA MAŁOPLYTKOWA
743.	VINCRISTINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
744.	VINCRISTINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ
745.	VINCRISTINUM	D76.2	ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTARNY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
746.	VINCRISTINUM	E85	AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
747.	VINCRISTINUM	E85.0	SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
748.	VINCRISTINUM	E85.1	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
749.	VINCRISTINUM	E85.2	SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
750.	VINCRISTINUM	E85.3	WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
751.	VINCRISTINUM	E85.4	ZŁOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
752.	VINCRISTINUM	E85.8	INNE AMYLOIDOZY
753.	VINCRISTINUM	E85.9	AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

Załącznik C.63.

VINORELBINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1.	VINORELBINUM	C00	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI
2.	VINORELBINUM	C00.0	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
3.	VINORELBINUM	C00.1	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
4.	VINORELBINUM	C00.2	POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA
5.	VINORELBINUM	C00.3	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
6.	VINORELBINUM	C00.4	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
7.	VINORELBINUM	C00.5	POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
8.	VINORELBINUM	C00.6	SPOIDŁO WARGI
9.	VINORELBINUM	C00.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI
10.	VINORELBINUM	C00.9	WARGA, NIEOKREŚLONA
11.	VINORELBINUM	C01	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
12.	VINORELBINUM	C02	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA
13.	VINORELBINUM	C02.0	POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
14.	VINORELBINUM	C02.1	BRZEG JĘZYKA
15.	VINORELBINUM	C02.2	DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
16.	VINORELBINUM	C02.3	PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
17.	VINORELBINUM	C02.4	MIGDAŁEK JĘZYKOWY
18.	VINORELBINUM	C02.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA
19.	VINORELBINUM	C02.9	JĘZYK, NIEOKREŚLONY
20.	VINORELBINUM	C03	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA
21.	VINORELBINUM	C03.0	DZIAŚŁO GÓRNE
22.	VINORELBINUM	C03.1	DZIAŚŁO DOLNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23.	VINORELBINUM	C03.9	DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE
24.	VINORELBINUM	C04	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ
25.	VINORELBINUM	C04.0	PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
26.	VINORELBINUM	C04.1	BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
27.	VINORELBINUM	C04.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ
28.	VINORELBINUM	C04.9	DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE
29.	VINORELBINUM	C05	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA
30.	VINORELBINUM	C05.0	PODNIEBIENIE TWARDE
31.	VINORELBINUM	C05.1	PODNIEBIENIE MIĘKKIE
32.	VINORELBINUM	C05.2	JĘZYCZEK
33.	VINORELBINUM	C05.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
34.	VINORELBINUM	C05.9	PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE
35.	VINORELBINUM	C06	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
36.	VINORELBINUM	C06.0	ŚLUZÓWKA POLICZKA
37.	VINORELBINUM	C06.1	PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
38.	VINORELBINUM	C06.2	PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
39.	VINORELBINUM	C06.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ
40.	VINORELBINUM	C06.9	JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA
41.	VINORELBINUM	C07	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
42.	VINORELBINUM	C08	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
43.	VINORELBINUM	C08.0	ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
44.	VINORELBINUM	C08.1	ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
45.	VINORELBINUM	C08.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
46.	VINORELBINUM	C08.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
47.	VINORELBINUM	C09	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA
48.	VINORELBINUM	C09.0	DÓŁ MIGDAŁKOWY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
49.	VINORELBINUM	C09.1	ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNEBIENNO-GARDŁOWY)
50.	VINORELBINUM	C09.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA
51.	VINORELBINUM	C09.9	MIGDALEK, NIEOKREŚLONY
52.	VINORELBINUM	C10	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX)
53.	VINORELBINUM	C10.0	DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
54.	VINORELBINUM	C10.1	PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
55.	VINORELBINUM	C10.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
56.	VINORELBINUM	C10.3	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
57.	VINORELBINUM	C10.4	SZCZELINA SKRZELOWA
58.	VINORELBINUM	C10.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
59.	VINORELBINUM	C10.9	CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
60.	VINORELBINUM	C11	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX)
61.	VINORELBINUM	C11.0	ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
62.	VINORELBINUM	C11.1	ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
63.	VINORELBINUM	C11.2	ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
64.	VINORELBINUM	C11.3	ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
65.	VINORELBINUM	C11.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
66.	VINORELBINUM	C11.9	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
67.	VINORELBINUM	C12	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO
68.	VINORELBINUM	C13	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX)
69.	VINORELBINUM	C13.0	OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
70.	VINORELBINUM	C13.1	FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
71.	VINORELBINUM	C13.2	TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
72.	VINORELBINUM	C13.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
73.	VINORELBINUM	C13.9	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA
74.	VINORELBINUM	C14	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
75.	VINORELBINUM	C14.0	GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
76.	VINORELBINUM	C14.2	PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
77.	VINORELBINUM	C14.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA
78.	VINORELBINUM	C16	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA
79.	VINORELBINUM	C16.0	WPUST
80.	VINORELBINUM	C16.1	DNO ŻOŁĄDKA
81.	VINORELBINUM	C16.2	TRZON ŻOŁĄDKA
82.	VINORELBINUM	C16.3	UJŚCIE ODŹWIERNIKA
83.	VINORELBINUM	C16.4	ODŹWIERNIK
84.	VINORELBINUM	C16.5	KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
85.	VINORELBINUM	C16.6	KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA
86.	VINORELBINUM	C16.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA
87.	VINORELBINUM	C16.9	ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY
88.	VINORELBINUM	C17	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
89.	VINORELBINUM	C17.0	DWUNASTNICA
90.	VINORELBINUM	C17.1	JELITO CZCZE
91.	VINORELBINUM	C17.2	JELITO KRĘTE
92.	VINORELBINUM	C17.3	UCHYLEK MECKELA
93.	VINORELBINUM	C17.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO
94.	VINORELBINUM	C17.9	JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE
95.	VINORELBINUM	C18	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO
96.	VINORELBINUM	C18.0	JELITO ŚLEPE
97.	VINORELBINUM	C18.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
98.	VINORELBINUM	C18.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
99.	VINORELBINUM	C18.3	ZGIĘCIE WĄTROBOWE
100.	VINORELBINUM	C18.4	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
101.	VINORELBINUM	C18.5	ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
102.	VINORELBINUM	C18.6	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
103.	VINORELBINUM	C18.7	ESICA
104.	VINORELBINUM	C18.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY
105.	VINORELBINUM	C18.9	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
106.	VINORELBINUM	C19	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
107.	VINORELBINUM	C20	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
108.	VINORELBINUM	C21	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
109.	VINORELBINUM	C21.0	ODBYT, NIEOKREŚLONY
110.	VINORELBINUM	C21.1	KANAŁ ODBYTU
111.	VINORELBINUM	C21.2	STREFA KLOAKOGENNA
112.	VINORELBINUM	C21.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
113.	VINORELBINUM	C22	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
114.	VINORELBINUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
115.	VINORELBINUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
116.	VINORELBINUM	C22.2	WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
117.	VINORELBINUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
118.	VINORELBINUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
119.	VINORELBINUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
120.	VINORELBINUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
121.	VINORELBINUM	C23	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO
122.	VINORELBINUM	C24	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH
123.	VINORELBINUM	C24.0	ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE
124.	VINORELBINUM	C24.1	BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
125.	VINORELBINUM	C24.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH
126.	VINORELBINUM	C24.9	DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE
127.	VINORELBINUM	C25	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
128.	VINORELBINUM	C25.0	GŁOWA TRZUSTKI
129.	VINORELBINUM	C25.1	TRZON TRZUSTKI
130.	VINORELBINUM	C25.2	OGON TRZUSTKI
131.	VINORELBINUM	C25.3	PRZEWÓD TRZUSTKOWY
132.	VINORELBINUM	C25.4	CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
133.	VINORELBINUM	C25.7	INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
134.	VINORELBINUM	C25.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI
135.	VINORELBINUM	C25.9	TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA
136.	VINORELBINUM	C26	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
137.	VINORELBINUM	C26.0	PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
138.	VINORELBINUM	C26.1	ŚLEDZIONA
139.	VINORELBINUM	C26.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
140.	VINORELBINUM	C26.9	CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA
141.	VINORELBINUM	C30	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO
142.	VINORELBINUM	C30.0	JAMA NOSOWA
143.	VINORELBINUM	C30.1	UCHO ŚRODKOWE
144.	VINORELBINUM	C31	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH
145.	VINORELBINUM	C31.0	ZATOKA SZCZĘKOWA
146.	VINORELBINUM	C31.1	KOMÓRKI SITOWE
147.	VINORELBINUM	C31.2	ZATOKA CZOŁOWA
148.	VINORELBINUM	C31.3	ZATOKA KLINOWA
149.	VINORELBINUM	C31.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
150.	VINORELBINUM	C31.9	ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA
151.	VINORELBINUM	C33	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
152.	VINORELBINUM	C34	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA
153.	VINORELBINUM	C34.0	OSKRZELE GŁÓWNE
154.	VINORELBINUM	C34.1	PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
155.	VINORELBINUM	C34.2	PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
156.	VINORELBINUM	C34.3	PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
157.	VINORELBINUM	C34.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA
158.	VINORELBINUM	C34.9	OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE
159.	VINORELBINUM	C37	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
160.	VINORELBINUM	C38	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
161.	VINORELBINUM	C38.0	SERCE
162.	VINORELBINUM	C38.1	SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
163.	VINORELBINUM	C38.2	SRÓDPIERSIE TYLNE
164.	VINORELBINUM	C38.3	SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
165.	VINORELBINUM	C38.4	OPLUCNA
166.	VINORELBINUM	C38.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ
167.	VINORELBINUM	C39	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
168.	VINORELBINUM	C39.0	GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
169.	VINORELBINUM	C39.8	ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ
170.	VINORELBINUM	C39.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
171.	VINORELBINUM	C40	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
172.	VINORELBINUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
173.	VINORELBINUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
174.	VINORELBINUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
175.	VINORELBINUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
176.	VINORELBINUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN
177.	VINORELBINUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE
178.	VINORELBINUM	C41	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
179.	VINORELBINUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
180.	VINORELBINUM	C41.1	ŻUCHWA
181.	VINORELBINUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
182.	VINORELBINUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
183.	VINORELBINUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
184.	VINORELBINUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
185.	VINORELBINUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
186.	VINORELBINUM	C43	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
187.	VINORELBINUM	C43.0	CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
188.	VINORELBINUM	C43.1	CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
189.	VINORELBINUM	C43.2	CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
190.	VINORELBINUM	C43.3	CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
191.	VINORELBINUM	C43.4	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
192.	VINORELBINUM	C43.5	CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
193.	VINORELBINUM	C43.6	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
194.	VINORELBINUM	C43.7	CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
195.	VINORELBINUM	C43.8	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
196.	VINORELBINUM	C43.9	CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
197.	VINORELBINUM	C46	MIĘSAK KAPOSI' EGO
198.	VINORELBINUM	C46.0	MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY
199.	VINORELBINUM	C46.1	MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ
200.	VINORELBINUM	C46.2	MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA
201.	VINORELBINUM	C46.3	MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
202.	VINORELBINUM	C46.7	MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
203.	VINORELBINUM	C46.8	MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
204.	VINORELBINUM	C46.9	MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY
205.	VINORELBINUM	C47	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
206.	VINORELBINUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
207.	VINORELBINUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
208.	VINORELBINUM	C47.2	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
209.	VINORELBINUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
210.	VINORELBINUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
211.	VINORELBINUM	C47.5	NERWY OBWODOWE MIEDNICY
212.	VINORELBINUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
213.	VINORELBINUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
214.	VINORELBINUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
215.	VINORELBINUM	C48	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
216.	VINORELBINUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
217.	VINORELBINUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
218.	VINORELBINUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
219.	VINORELBINUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
220.	VINORELBINUM	C49	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
221.	VINORELBINUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
222.	VINORELBINUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
223.	VINORELBINUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
224.	VINORELBINUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
225.	VINORELBINUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
226.	VINORELBINUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
227.	VINORELBINUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
228.	VINORELBINUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
229.	VINORELBINUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
230.	VINORELBINUM	C50	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
231.	VINORELBINUM	C50.0	BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
232.	VINORELBINUM	C50.1	CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
233.	VINORELBINUM	C50.2	ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
234.	VINORELBINUM	C50.3	ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
235.	VINORELBINUM	C50.4	ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
236.	VINORELBINUM	C50.5	ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
237.	VINORELBINUM	C50.6	CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
238.	VINORELBINUM	C50.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA
239.	VINORELBINUM	C50.9	SUTEK, NIEOKREŚLONY
240.	VINORELBINUM	C51	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU
241.	VINORELBINUM	C51.0	WARGI SROMOWE WIĘKSZE
242.	VINORELBINUM	C51.1	WARGI SROMOWE MNIEJSZE
243.	VINORELBINUM	C51.2	ŁECHTACZKA
244.	VINORELBINUM	C51.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU
245.	VINORELBINUM	C51.9	SROM, NIEOKREŚLONE
246.	VINORELBINUM	C52	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
247.	VINORELBINUM	C53	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY
248.	VINORELBINUM	C53.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
249.	VINORELBINUM	C53.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
250.	VINORELBINUM	C53.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY
251.	VINORELBINUM	C53.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
252.	VINORELBINUM	C54	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY
253.	VINORELBINUM	C54.0	CIEŚŃ MACICY
254.	VINORELBINUM	C54.1	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
255.	VINORELBINUM	C54.2	MIĘŚNIÓWKA MACICY
256.	VINORELBINUM	C54.3	DNO MACICY
257.	VINORELBINUM	C54.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
258.	VINORELBINUM	C54.9	TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE
259.	VINORELBINUM	C55	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
260.	VINORELBINUM	C56	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
261.	VINORELBINUM	C57	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
262.	VINORELBINUM	C57.0	TRĄBKA FALLOPIA
263.	VINORELBINUM	C57.1	WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
264.	VINORELBINUM	C57.2	WIĘZADŁO OBŁE MACICY
265.	VINORELBINUM	C57.3	PRZYMATICZA
266.	VINORELBINUM	C57.4	PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE
267.	VINORELBINUM	C57.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
268.	VINORELBINUM	C57.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
269.	VINORELBINUM	C57.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
270.	VINORELBINUM	C61	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
271.	VINORELBINUM	C62	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA
272.	VINORELBINUM	C62.0	JĄDRO NIEZSTĄPIONE
273.	VINORELBINUM	C62.1	JĄDRO ZSTĄPIONE
274.	VINORELBINUM	C62.9	JĄDRO, NIEOKREŚLONE
275.	VINORELBINUM	C63	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
276.	VINORELBINUM	C63.0	NAJĄDRZE
277.	VINORELBINUM	C63.1	POWRÓZEK NASIENNY
278.	VINORELBINUM	C63.2	MOSZNA
279.	VINORELBINUM	C63.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
280.	VINORELBINUM	C63.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
281.	VINORELBINUM	C63.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
282.	VINORELBINUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
283.	VINORELBINUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
284.	VINORELBINUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
285.	VINORELBINUM	C67	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO
286.	VINORELBINUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
287.	VINORELBINUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
288.	VINORELBINUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
289.	VINORELBINUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
290.	VINORELBINUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
291.	VINORELBINUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
292.	VINORELBINUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
293.	VINORELBINUM	C67.7	MOCZOWNIK
294.	VINORELBINUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
295.	VINORELBINUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
296.	VINORELBINUM	C68	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH
297.	VINORELBINUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
298.	VINORELBINUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
299.	VINORELBINUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
300.	VINORELBINUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
301.	VINORELBINUM	C69	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA
302.	VINORELBINUM	C69.0	SPOJÓWKA
303.	VINORELBINUM	C69.1	ROGÓWKA
304.	VINORELBINUM	C69.2	SIATKÓWKA
305.	VINORELBINUM	C69.3	NACZYNIÓWKA
306.	VINORELBINUM	C69.4	CIAŁO RZĘSKOWE
307.	VINORELBINUM	C69.5	GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
308.	VINORELBINUM	C69.6	OCZODÓŁ
309.	VINORELBINUM	C69.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA
310.	VINORELBINUM	C69.9	OKO, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
311.	VINORELBINUM	C70	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON
312.	VINORELBINUM	C70.0	OPONY MÓZGOWE
313.	VINORELBINUM	C70.1	OPONY RDZENIOWE
314.	VINORELBINUM	C70.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
315.	VINORELBINUM	C71	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU
316.	VINORELBINUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
317.	VINORELBINUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
318.	VINORELBINUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
319.	VINORELBINUM	C71.3	PŁAT CIEMIENOWY
320.	VINORELBINUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
321.	VINORELBINUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
322.	VINORELBINUM	C71.6	MÓZDŻEK
323.	VINORELBINUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
324.	VINORELBINUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU
325.	VINORELBINUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
326.	VINORELBINUM	C72	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
327.	VINORELBINUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
328.	VINORELBINUM	C72.1	OGON KOŃSKI
329.	VINORELBINUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
330.	VINORELBINUM	C72.3	NERW WZROKOWY
331.	VINORELBINUM	C72.4	NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
332.	VINORELBINUM	C72.5	INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
333.	VINORELBINUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
334.	VINORELBINUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
335.	VINORELBINUM	C73	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
336.	VINORELBINUM	C74	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
337.	VINORELBINUM	C74.0	KORA NADNERCZY
338.	VINORELBINUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
339.	VINORELBINUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
340.	VINORELBINUM	C75	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH
341.	VINORELBINUM	C75.0	GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
342.	VINORELBINUM	C75.1	PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
343.	VINORELBINUM	C75.2	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
344.	VINORELBINUM	C75.3	SZYSZYNKA
345.	VINORELBINUM	C75.4	KLĘBEK SZYJNY
346.	VINORELBINUM	C75.5	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
347.	VINORELBINUM	C75.8	ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
348.	VINORELBINUM	C75.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
349.	VINORELBINUM	C76	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH
350.	VINORELBINUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
351.	VINORELBINUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
352.	VINORELBINUM	C76.2	BRZUCH
353.	VINORELBINUM	C76.3	MIEDNICA
354.	VINORELBINUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
355.	VINORELBINUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
356.	VINORELBINUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
357.	VINORELBINUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
358.	VINORELBINUM	C77	WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
359.	VINORELBINUM	C77.0	WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
360.	VINORELBINUM	C77.1	WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ
361.	VINORELBINUM	C77.2	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
362.	VINORELBINUM	C77.3	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
363.	VINORELBINUM	C77.4	WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
364.	VINORELBINUM	C77.5	WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
365.	VINORELBINUM	C77.8	WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
366.	VINORELBINUM	C77.9	WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE
367.	VINORELBINUM	C78	WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO
368.	VINORELBINUM	C78.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
369.	VINORELBINUM	C78.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
370.	VINORELBINUM	C78.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
371.	VINORELBINUM	C78.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
372.	VINORELBINUM	C78.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
373.	VINORELBINUM	C78.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
374.	VINORELBINUM	C78.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
375.	VINORELBINUM	C78.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
376.	VINORELBINUM	C78.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
377.	VINORELBINUM	C79	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
378.	VINORELBINUM	C79.0	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
379.	VINORELBINUM	C79.1	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
380.	VINORELBINUM	C79.2	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
381.	VINORELBINUM	C79.3	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
382.	VINORELBINUM	C79.4	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
383.	VINORELBINUM	C79.5	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
384.	VINORELBINUM	C79.6	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
385.	VINORELBINUM	C79.7	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
386.	VINORELBINUM	C79.8	WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
387.	VINORELBINUM	C80	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
388.	VINORELBINUM	C81	CHOROBA HODGKINA
389.	VINORELBINUM	C81.0	PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
390.	VINORELBINUM	C81.1	STWARDNIENIE GUZKOWE
391.	VINORELBINUM	C81.2	MIESZANOKOMÓRKOWA
392.	VINORELBINUM	C81.3	ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
393.	VINORELBINUM	C81.7	INNA CHOROBA HODGKINA
394.	VINORELBINUM	C81.9	CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
395.	VINORELBINUM	C96	INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
396.	VINORELBINUM	C96.0	CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
397.	VINORELBINUM	C96.1	HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
398.	VINORELBINUM	C96.2	GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
399.	VINORELBINUM	C96.3	PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
400.	VINORELBINUM	C96.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
401.	VINORELBINUM	C96.9	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE
402.	VINORELBINUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
403.	VINORELBINUM	D00.2	ŻOŁĄDEK
404.	VINORELBINUM	D01	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
405.	VINORELBINUM	D01.0	OKRĘŻNICA
406.	VINORELBINUM	D01.1	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
407.	VINORELBINUM	D01.2	ODBYTNICA
408.	VINORELBINUM	D01.3	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
409.	VINORELBINUM	D01.4	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
410.	VINORELBINUM	D01.5	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
411.	VINORELBINUM	D01.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
412.	VINORELBINUM	D01.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
413.	VINORELBINUM	D03	CZERNIAK IN SITU
414.	VINORELBINUM	D03.0	CZERNIAK IN SITU WARGI
415.	VINORELBINUM	D03.1	CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
416.	VINORELBINUM	D03.2	CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
417.	VINORELBINUM	D03.3	CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
418.	VINORELBINUM	D03.4	CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
419.	VINORELBINUM	D03.5	CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
420.	VINORELBINUM	D03.6	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
421.	VINORELBINUM	D03.7	CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
422.	VINORELBINUM	D03.8	CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
423.	VINORELBINUM	D03.9	CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
424.	VINORELBINUM	D06	RAK IN SITU SZYJKI MACICY
425.	VINORELBINUM	D06.0	BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
426.	VINORELBINUM	D06.1	BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
427.	VINORELBINUM	D06.7	INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
428.	VINORELBINUM	D06.9	SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA
429.	VINORELBINUM	D07	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
430.	VINORELBINUM	D07.0	BŁONA ŚLUZOWA MACICY
431.	VINORELBINUM	D07.1	SROM
432.	VINORELBINUM	D07.2	POCHWA
433.	VINORELBINUM	D07.3	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
434.	VINORELBINUM	D07.4	PRĄCIE
435.	VINORELBINUM	D07.5	GRUCZOŁ KROKOWY
436.	VINORELBINUM	D07.6	INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
437.	VINORELBINUM	D09	RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
438.	VINORELBINUM	D09.0	PĘCHERZ MOCZOWY
439.	VINORELBINUM	D09.1	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
440.	VINORELBINUM	D09.2	OKO
441.	VINORELBINUM	D09.3	TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
442.	VINORELBINUM	D09.7	RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
443.	VINORELBINUM	D09.9	RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY
444.	VINORELBINUM	D10	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA
445.	VINORELBINUM	D10.0	WARGA
446.	VINORELBINUM	D10.1	JĘZYK
447.	VINORELBINUM	D10.2	DNO JAMY USTNEJ
448.	VINORELBINUM	D10.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
449.	VINORELBINUM	D10.4	MIGDAŁEK
450.	VINORELBINUM	D10.5	INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
451.	VINORELBINUM	D10.6	CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
452.	VINORELBINUM	D10.7	CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
453.	VINORELBINUM	D10.9	GARDŁO, NIEOKREŚLONE
454.	VINORELBINUM	D11	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
455.	VINORELBINUM	D11.0	ŚLINIANKA PRZYUSZNA
456.	VINORELBINUM	D11.7	INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
457.	VINORELBINUM	D11.9	DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE
458.	VINORELBINUM	D12	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU
459.	VINORELBINUM	D12.0	JELITO ŚLEPE
460.	VINORELBINUM	D12.1	WYROSTEK ROBACZKOWY
461.	VINORELBINUM	D12.2	OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
462.	VINORELBINUM	D12.3	OKRĘŻNICA POPRZECZNA
463.	VINORELBINUM	D12.4	OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
464.	VINORELBINUM	D12.5	OKRĘŻNICA ESOWATA
465.	VINORELBINUM	D12.6	OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA
466.	VINORELBINUM	D12.7	ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
467.	VINORELBINUM	D12.8	ODBYTNICA
468.	VINORELBINUM	D12.9	ODBYT I KANAŁ ODBYTU
469.	VINORELBINUM	D13	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO
470.	VINORELBINUM	D13.0	PRZĘLYK
471.	VINORELBINUM	D13.1	ŻOŁĄDEK
472.	VINORELBINUM	D13.2	DWUNASTNICA
473.	VINORELBINUM	D13.3	INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
474.	VINORELBINUM	D13.4	WĄTROBA
475.	VINORELBINUM	D13.5	DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
476.	VINORELBINUM	D13.6	TRZUSTKA
477.	VINORELBINUM	D13.7	WYSPY TRZUSTKI
478.	VINORELBINUM	D13.9	NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
479.	VINORELBINUM	D14	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO
480.	VINORELBINUM	D14.0	UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
481.	VINORELBINUM	D14.1	KRTAŃ
482.	VINORELBINUM	D14.2	TCHAWICA
483.	VINORELBINUM	D14.3	OSKRZELA I PŁUCA
484.	VINORELBINUM	D14.4	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE
485.	VINORELBINUM	D15	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
486.	VINORELBINUM	D15.0	GRASICA
487.	VINORELBINUM	D15.1	SERCE
488.	VINORELBINUM	D15.2	SRÓDPIERSIE
489.	VINORELBINUM	D15.7	INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
490.	VINORELBINUM	D15.9	NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
491.	VINORELBINUM	D16	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH
492.	VINORELBINUM	D16.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
493.	VINORELBINUM	D16.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
494.	VINORELBINUM	D16.2	KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
495.	VINORELBINUM	D16.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
496.	VINORELBINUM	D16.4	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
497.	VINORELBINUM	D16.5	ŻUCHWA
498.	VINORELBINUM	D16.6	KRĘGOSŁUP
499.	VINORELBINUM	D16.7	ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
500.	VINORELBINUM	D16.8	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
501.	VINORELBINUM	D16.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
502.	VINORELBINUM	D18	NACZYNIAKI KRWIONOŚNE I NACZYNIAKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
503.	VINORELBINUM	D18.0	NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
504.	VINORELBINUM	D18.1	NACZYNIAK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
505.	VINORELBINUM	D20	NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOEJ
506.	VINORELBINUM	D20.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
507.	VINORELBINUM	D20.1	OTRZEWNA
508.	VINORELBINUM	D21	INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH
509.	VINORELBINUM	D21.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
510.	VINORELBINUM	D21.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
511.	VINORELBINUM	D21.2	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
512.	VINORELBINUM	D21.3	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
513.	VINORELBINUM	D21.4	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
514.	VINORELBINUM	D21.5	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
515.	VINORELBINUM	D21.6	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
516.	VINORELBINUM	D21.9	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE
517.	VINORELBINUM	D27	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
518.	VINORELBINUM	D28	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
519.	VINORELBINUM	D28.0	SROM
520.	VINORELBINUM	D28.1	POCHWA
521.	VINORELBINUM	D28.2	JAJOWODY I WIĘZADŁA
522.	VINORELBINUM	D28.7	INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
523.	VINORELBINUM	D28.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
524.	VINORELBINUM	D29	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
525.	VINORELBINUM	D29.0	PRĄCIE
526.	VINORELBINUM	D29.1	GRUCZOŁ KROKOWY
527.	VINORELBINUM	D29.2	JĄDRO
528.	VINORELBINUM	D29.3	NAJĄDRZE
529.	VINORELBINUM	D29.4	MOSZNA
530.	VINORELBINUM	D29.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
531.	VINORELBINUM	D29.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
532.	VINORELBINUM	D30	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH
533.	VINORELBINUM	D30.0	NERKA
534.	VINORELBINUM	D30.1	MIEDNICZKA NERKOWA
535.	VINORELBINUM	D30.2	MOCZOWÓD
536.	VINORELBINUM	D30.3	PĘCZERZ MOCZOWY
537.	VINORELBINUM	D30.4	CEWKA MOCZOWA
538.	VINORELBINUM	D30.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
539.	VINORELBINUM	D30.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
540.	VINORELBINUM	D31	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA
541.	VINORELBINUM	D31.0	SPOJÓWKA
542.	VINORELBINUM	D31.1	ROGÓWKA
543.	VINORELBINUM	D31.2	SIATKÓWKA
544.	VINORELBINUM	D31.3	NACZYNIÓWKA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
545.	VINORELBINUM	D31.4	CIAŁO RZĘSKOWE
546.	VINORELBINUM	D31.5	GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
547.	VINORELBINUM	D31.6	OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY
548.	VINORELBINUM	D31.9	OKO, NIEOKREŚLONE
549.	VINORELBINUM	D32	NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH
550.	VINORELBINUM	D32.0	OPONY MÓZGOWE
551.	VINORELBINUM	D32.1	OPONY RDZENIOWE
552.	VINORELBINUM	D32.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
553.	VINORELBINUM	D33	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
554.	VINORELBINUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIAOTOWE
555.	VINORELBINUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIAOTOWE
556.	VINORELBINUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
557.	VINORELBINUM	D33.3	NERWY CZASZKOWE
558.	VINORELBINUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
559.	VINORELBINUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
560.	VINORELBINUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
561.	VINORELBINUM	D34	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
562.	VINORELBINUM	D35	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
563.	VINORELBINUM	D35.0	NADNERCZA
564.	VINORELBINUM	D35.1	PRZYTARCZYCE
565.	VINORELBINUM	D35.2	PRZYSADKA
566.	VINORELBINUM	D35.3	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
567.	VINORELBINUM	D35.4	SZYSZYNKA
568.	VINORELBINUM	D35.5	KŁĘBEK SZYJNY
569.	VINORELBINUM	D35.6	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
570.	VINORELBINUM	D35.7	INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
571.	VINORELBINUM	D35.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
572.	VINORELBINUM	D35.9	GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY
573.	VINORELBINUM	D36	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
574.	VINORELBINUM	D36.0	WĘZŁY CHŁONNE
575.	VINORELBINUM	D36.1	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
576.	VINORELBINUM	D36.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
577.	VINORELBINUM	D36.9	NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
578.	VINORELBINUM	D37	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH
579.	VINORELBINUM	D37.0	WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
580.	VINORELBINUM	D37.1	ŻOŁĄDEK
581.	VINORELBINUM	D37.2	JELITO CIENKIE
582.	VINORELBINUM	D37.3	JELIO ŚLEPE
583.	VINORELBINUM	D37.4	OKRĘŻNICA
584.	VINORELBINUM	D37.5	ODBYTNICA
585.	VINORELBINUM	D37.6	WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE
586.	VINORELBINUM	D37.7	INNE NARZĄDY TRAWIENNE
587.	VINORELBINUM	D37.9	NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE
588.	VINORELBINUM	D38	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ
589.	VINORELBINUM	D38.0	KRTAŃ
590.	VINORELBINUM	D38.1	TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
591.	VINORELBINUM	D38.2	OPLUCNA
592.	VINORELBINUM	D38.3	SRÓDPIERSIE
593.	VINORELBINUM	D38.4	GRASICA
594.	VINORELBINUM	D38.5	INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
595.	VINORELBINUM	D38.6	UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY
596.	VINORELBINUM	D39	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
597.	VINORELBINUM	D39.0	MACICA
598.	VINORELBINUM	D39.1	JAJNIK
599.	VINORELBINUM	D39.2	ŁOŻYSKO
600.	VINORELBINUM	D39.7	INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
601.	VINORELBINUM	D39.9	ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
602.	VINORELBINUM	D40	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
603.	VINORELBINUM	D40.0	GRUCZOŁ KROKOWY
604.	VINORELBINUM	D40.1	JĄDRO
605.	VINORELBINUM	D40.7	INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
606.	VINORELBINUM	D40.9	MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE
607.	VINORELBINUM	D41	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH
608.	VINORELBINUM	D41.0	NERKA
609.	VINORELBINUM	D41.1	MIEDNICZKA NERKOWA
610.	VINORELBINUM	D41.2	MOCZOWÓD
611.	VINORELBINUM	D41.3	CEWKA MOCZOWA
612.	VINORELBINUM	D41.4	PĘCZERZ MOCZOWY
613.	VINORELBINUM	D41.7	INNE NARZĄDY MOCZOWE
614.	VINORELBINUM	D41.9	NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE
615.	VINORELBINUM	D42	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON
616.	VINORELBINUM	D42.0	OPONY MÓZGOWE
617.	VINORELBINUM	D42.1	OPONY RDZENIOWE
618.	VINORELBINUM	D42.9	OPONY, NIEOKREŚLONE
619.	VINORELBINUM	D43	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
620.	VINORELBINUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
621.	VINORELBINUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
622.	VINORELBINUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
623.	VINORELBINUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
624.	VINORELBINUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
625.	VINORELBINUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
626.	VINORELBINUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
627.	VINORELBINUM	D44	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
628.	VINORELBINUM	D44.0	TARCZYCA
629.	VINORELBINUM	D44.1	NADNERCZA
630.	VINORELBINUM	D44.2	PRZYTARCZYCE
631.	VINORELBINUM	D44.3	PRZYSADKA
632.	VINORELBINUM	D44.4	PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
633.	VINORELBINUM	D44.5	SZYSZYNKA
634.	VINORELBINUM	D44.6	KŁĘBEK SZYJNY
635.	VINORELBINUM	D44.7	CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE
636.	VINORELBINUM	D44.8	ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
637.	VINORELBINUM	D44.9	GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE
638.	VINORELBINUM	D47.3	SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
639.	VINORELBINUM	D47.7	INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
640.	VINORELBINUM	D47.9	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE
641.	VINORELBINUM	D48	NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
642.	VINORELBINUM	D48.0	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
643.	VINORELBINUM	D48.1	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
644.	VINORELBINUM	D48.2	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
645.	VINORELBINUM	D48.3	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
646.	VINORELBINUM	D48.4	OTRZEWNA

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
647.	VINORELBINUM	D48.5	SKÓRA
648.	VINORELBINUM	D48.6	SUTEK
649.	VINORELBINUM	D48.7	INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
650.	VINORELBINUM	D48.9	NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY
651.	VINORELBINUM	D76.0	HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
652.	VINORELBINUM	D76.1	LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ

Załącznik C.64.

TEMOZOLOMIDUM

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

L.p.	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	TEMOZOLOMIDUM	C22.0	RAK KOMÓREK WĄTROBY
2	TEMOZOLOMIDUM	C22.1	RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
3	TEMOZOLOMIDUM	C22.3	MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
4	TEMOZOLOMIDUM	C22.4	INNE MIĘSAKI WĄTROBY
5	TEMOZOLOMIDUM	C22.7	INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
6	TEMOZOLOMIDUM	C22.9	WĄTROBA, NIEOKREŚLONA
7	TEMOZOLOMIDUM	C38.0	SERCE
8	TEMOZOLOMIDUM	C38.1	ŚRÓDPIERSIE PRZEDNIE
9	TEMOZOLOMIDUM	C38.2	ŚRÓDPIERSIE TYLNE
10	TEMOZOLOMIDUM	C38.3	ŚRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
11	TEMOZOLOMIDUM	C38.4	OPLUCNA
12	TEMOZOLOMIDUM	C40.0	ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
13	TEMOZOLOMIDUM	C40.1	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
14	TEMOZOLOMIDUM	C40.2	KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
15	TEMOZOLOMIDUM	C40.3	KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
16	TEMOZOLOMIDUM	C40.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYNY
17	TEMOZOLOMIDUM	C40.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYNY, NIEOKREŚLONE
18	TEMOZOLOMIDUM	C41.0	KOŚCI CZASZKI I TWARZY
19	TEMOZOLOMIDUM	C41.1	ŻUCHWA
20	TEMOZOLOMIDUM	C41.2	KOŚCI KRĘGOSŁUPA
21	TEMOZOLOMIDUM	C41.3	KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
22	TEMOZOLOMIDUM	C41.4	KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA

L.p.	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
23	TEMOZOLOMIDUM	C41.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ
24	TEMOZOLOMIDUM	C41.9	KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE
25	TEMOZOLOMIDUM	C45.0	MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
26	TEMOZOLOMIDUM	C45.1	MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
27	TEMOZOLOMIDUM	C45.2	MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
28	TEMOZOLOMIDUM	C45.7	MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
29	TEMOZOLOMIDUM	C45.9	MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY
30	TEMOZOLOMIDUM	C47.0	NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
31	TEMOZOLOMIDUM	C47.1	NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
32	TEMOZOLOMIDUM	C47.3	NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ
33	TEMOZOLOMIDUM	C47.4	NERWY OBWODOWE BRZUCHA
34	TEMOZOLOMIDUM	C47.6	NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE
35	TEMOZOLOMIDUM	C47.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
36	TEMOZOLOMIDUM	C47.9	NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE
37	TEMOZOLOMIDUM	C48.0	PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
38	TEMOZOLOMIDUM	C48.1	OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
39	TEMOZOLOMIDUM	C48.2	OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA
40	TEMOZOLOMIDUM	C48.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ
41	TEMOZOLOMIDUM	C49.0	TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
42	TEMOZOLOMIDUM	C49.1	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
43	TEMOZOLOMIDUM	C49.2	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
44	TEMOZOLOMIDUM	C49.3	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
45	TEMOZOLOMIDUM	C49.4	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
46	TEMOZOLOMIDUM	C49.5	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
47	TEMOZOLOMIDUM	C49.6	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA
48	TEMOZOLOMIDUM	C49.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ
49	TEMOZOLOMIDUM	C49.9	TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE
50	TEMOZOLOMIDUM	C63.0	NAJĄDRZE

L.p.	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
51	TEMOZOLOMIDUM	C64	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
52	TEMOZOLOMIDUM	C65	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
53	TEMOZOLOMIDUM	C66	NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
54	TEMOZOLOMIDUM	C67.0	TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO
55	TEMOZOLOMIDUM	C67.1	SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO
56	TEMOZOLOMIDUM	C67.2	ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
57	TEMOZOLOMIDUM	C67.3	ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO
58	TEMOZOLOMIDUM	C67.4	ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO
59	TEMOZOLOMIDUM	C67.5	SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO
60	TEMOZOLOMIDUM	C67.6	UJŚCIE MOCZOWODU
61	TEMOZOLOMIDUM	C67.7	MOCZOWNIK
62	TEMOZOLOMIDUM	C67.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO
63	TEMOZOLOMIDUM	C67.9	PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
64	TEMOZOLOMIDUM	C68.0	CEWKA MOCZOWA
65	TEMOZOLOMIDUM	C68.1	GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
66	TEMOZOLOMIDUM	C68.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO
67	TEMOZOLOMIDUM	C68.9	UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY
68	TEMOZOLOMIDUM	C69.2	SIATKÓWKA
69	TEMOZOLOMIDUM	C69.6	OCZODÓŁ
70	TEMOZOLOMIDUM	C71.0	MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR
71	TEMOZOLOMIDUM	C71.1	PŁAT CZOŁOWY
72	TEMOZOLOMIDUM	C71.2	PŁAT SKRONIOWY
73	TEMOZOLOMIDUM	C71.3	PŁAT CIEMIENIOWY
74	TEMOZOLOMIDUM	C71.4	PŁAT POTYLICZNY
75	TEMOZOLOMIDUM	C71.5	KOMORY MÓZGOWE
76	TEMOZOLOMIDUM	C71.6	MÓZDŻEK
77	TEMOZOLOMIDUM	C71.7	PIEŃ MÓZGU
78	TEMOZOLOMIDUM	C71.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU

L.p.	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
79	TEMOZOLOMIDUM	C71.9	MÓZG, NIEOKREŚLONY
80	TEMOZOLOMIDUM	C72.0	RDZEŃ KRĘGOWY
81	TEMOZOLOMIDUM	C72.1	OGON KOŃSKI
82	TEMOZOLOMIDUM	C72.2	NERW WĘCHOWY
83	TEMOZOLOMIDUM	C72.3	NERW WZROKOWY
84	TEMOZOLOMIDUM	C72.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
85	TEMOZOLOMIDUM	C72.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE
86	TEMOZOLOMIDUM	C74.0	KORA NADNERCZY
87	TEMOZOLOMIDUM	C74.1	RDZEŃ NADNERCZY
88	TEMOZOLOMIDUM	C74.9	NADNERCZE, NIEOKREŚLONE
89	TEMOZOLOMIDUM	C76.0	GŁOWA, TWARZ I SZYJA
90	TEMOZOLOMIDUM	C76.1	KLATKA PIERSIOWA
91	TEMOZOLOMIDUM	C76.2	BRZUCH
92	TEMOZOLOMIDUM	C76.3	MIEDNICA
93	TEMOZOLOMIDUM	C76.4	KOŃCZYNA GÓRNA
94	TEMOZOLOMIDUM	C76.5	KOŃCZYNA DOLNA
95	TEMOZOLOMIDUM	C76.7	INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
96	TEMOZOLOMIDUM	C76.8	ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
97	TEMOZOLOMIDUM	C97	NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
98	TEMOZOLOMIDUM	D33.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
99	TEMOZOLOMIDUM	D33.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
100	TEMOZOLOMIDUM	D33.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY
101	TEMOZOLOMIDUM	D33.4	RDZEŃ KRĘGOWY
102	TEMOZOLOMIDUM	D33.7	INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
103	TEMOZOLOMIDUM	D33.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY
104	TEMOZOLOMIDUM	D43.0	MÓZG, NADNAMIOTOWE
105	TEMOZOLOMIDUM	D43.1	MÓZG, PODNAMIOTOWE
106	TEMOZOLOMIDUM	D43.2	MÓZG, NIEOKREŚLONY

L.p.	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
107	TEMOZOLOMIDUM	D43.3	NERWY CZASZKOWE
108	TEMOZOLOMIDUM	D43.4	RDZEŃ KRĘGOWY
109	TEMOZOLOMIDUM	D43.7	INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
110	TEMOZOLOMIDUM	D43.9	CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE

Załącznik C.65.

ARSENICUM TRIOXIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŚLI DOTYCZY – DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	ARSENICUM TRIOXIDUM	C92.4	OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA <i>w przypadku: indukcji remisji i konsolidacji ostrej białaczki promielocytowej u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się translokacją t(15;17) i (lub) obecnością genu PML/RAR-alfa po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie choroby. Wcześniejsze leczenie powinno obejmować stosowanie retinoidu i chemioterapii.</i>

Załącznik C.66.

CLOFARABINUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŚLI DOTYCZY – DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	CLOFARABINUM	C91.0	OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA <i>w przypadku: leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi, u chorych kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.</i>

Załącznik C.67.

BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM

Lp	NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŚLI DOTYCZY – DROGA PODANIA	KOD ICD-10	NAZWA ICD-10
1	BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM	C91.1	PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA w przypadku: a) przewlekłej białaczki limfocytowej (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta) – leczenie I rzutu u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie schematów chemioterapii zawierających fludarabinę, b) przewlekłej białaczki limfocytowej - leczenie II i następnych linii u chorych w stanie ogólnym 2 lub lepszym wg skali WHO, opornych na wcześniej zastosowane leczenie, które nie obejmowało bendamustyny.